

Contribuições da Consulta Pública sobre Penicilina para o tratamento da sífilis congênita - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/03/2015	Secretaria Municipal de Saúde	<p>1ª: Concordo com a rotineira aplicação de Penicilina Benzatina no pré-natal, pois reduziremos a ocorrência de sífilis congênita. Observar que a aplicação deve ser ATÉ, NO MÁXIMO, 30 dias ANTES do parto. Do contrário não será prevenção e, de acordo com a definição de caso, SERÁ CASO de sífilis congênita, MESMO com aplicação do medicamento.</p> <p>2ª: -</p>	
24/03/2015	Ministério da Saúde	<p>1ª: Apesar de detecção eficaz, muitas mulheres grávidas com sífilis continuam incorretamente tratadas, resultando em mortalidade perinatal evitável. A benzilpenicilina por via parentérica há mais de 50 anos é utilizada eficazmente para tratamento e prevenção da sífilis; contudo, ainda não se fizeram estudos comparativos adequados para orientar a escolha de um esquema terapêutico ótimo (dose, duração e preparação).</p> <p>2ª: -</p>	
06/04/2015	Secretaria Municipal de Saúde	<p>1ª: - No município de Itabuna-Bahia até o ano de 2012 a Penicilina só era administrada nos hospitais e no Centro de Referência em DST/AIDS. No ano de 2013, em uma ação conjunta entre o Centro de Referência em DST/AIDS, Área de Saúde da Mulher e Vigilância Epidemiológica, a mesma passou a ser administrada nas unidades básicas de saúde. De acordo com os dados levantados em 2013 e 2014, o número de gestantes tratadas para sífilis teve um aumento de 5 vezes e houve uma redução considerável de sífilis congênita.</p> <p>2ª: -</p>	
07/04/2015	Secretaria Municipal de Saúde	<p>1ª: Sugiro que a o Relatório de Recomendação explicita o protocolo de dessensibilização à penicilina em gestantes alérgicas: medicamento indicado e esquema de dessensibilização.</p> <p>2ª: -</p>	