

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Mesilato de rasagilina para Parkinson - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho experiencia com a Rasagilina ha mais de 10a, quando importávamos o produto que cumpre um papel importante no manejo das flutuações motoras da Doença de Parkinson , sendo mais segura e eficaz que seu antecessor ( Silegilina )</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rasagilina, Positivo: Prolongar periodo ON e diminuir periodo OFF, Negativo: Hipertensao arterial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Silegilina , Pramipexol , entacapona, Positivo: Silegilina -- aumentar a disponibilidade da L-dopa prolongando seu efeito, resultado modesto Pramipexol -- Agonista da Dopamina , melhora sintomas motores e nao motores da Doença de Prakinson entacapona -- Diminui a degradação da L- Dopa , prolonga periodo On , diminui periodo OFF, Negativo: Silegilina -- efeito anfetamina like ( sub produto da silegilina )Pramipexol -- alucinacoes , compulsoes e sonolencia excessiva diurna Entacapona -- discinesias</p>
18/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os demais medicamentos indicados para o tratamento daDoença de Parkinson., Positivo: Trata-se de inibidor da MAO de segunda geração. Vários estudos clínicos demonstraram eficácia em todos os estágios da doença de Parkinson, com ótimo perfil de segurança e tolerabilidade. Além disso, a posologia em tomada única diária é um fator positivo, pois aumenta a adesão dos pacientes, Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os demais , Positivo: Efocacia comprovada, Negativo: Agonistas de dopamina: alucinações. Selegilina: perfil desfavorável de interação medicamentosa e efeito anfetaminico. Levodopa: complicações motoras.</p>
18/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os demais medicamentos indicados para o tratamento daDoença de Parkinson., Positivo: Trata-se de inibidor da MAO de segunda geração. Vários estudos clínicos demonstraram eficácia em todos os estágios da doença de Parkinson, com ótimo perfil de segurança e tolerabilidade. Além disso, a posologia em tomada única diária é um fator positivo, pois aumenta a adesão dos pacientes, Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os demais , Positivo: Efocacia comprovada, Negativo: Agonistas de dopamina: alucinações. Selegilina: perfil desfavorável de interação medicamentosa e efeito anfetaminico. Levodopa: complicações motoras.</p>
18/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PROLOPA,PRAMIPXOL,ENTACAPONA, Positivo: MELHORA DOS SINTOMAS, Negativo: NAUSEAS</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: AZILECT, Positivo: MELHORA CONSIDERAVEL, Negativo: NADA</p>
19/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: levodopa, Positivo: controle dos sintomas, Negativo: muitas tomadas diarias</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, EU, LUCIANO GUILHERME DOS SANTOS ESTAVA TRAVANDO MUITO AO PONTO DE CAIR QUANDO RETORNEI A CONSULTA DO MEU MEDICO RELATEI AO MESMO SOBRE O QUE ESTAVA ACONTECENDO COMIGO,O MESMO ME DEU UMA AMOSTRA GRÁTIS DO Aziilect 1 mg para fazer uma experiencia da qual comecei a tomar no mesmo dia recomendado com quatro dias já mim sentir bem melhor o travamento aos poucos fui melhorando.e cada dia melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Trata-se de excelente fármaco para terapia adjuvante a levodopa; tem se mostrado seguro, com baixo perfil de efeitos adversos, possui tomada única diária facilitando a adesão, e é muito bem tolerado pelos pacientes, com muito boa resposta clínica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rasagilina, Positivo: Melhora motora, redução na flutuação dos sintomas parkinsonianos., Negativo: Até o momento não observado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Levodopa, pramipexol, entacapona, selegilina, amantadina, rotigotina, biperideno., Positivo: Melhora sintomática motora e não motora., Negativo: Varia conforme a dose utilizada, o tempo de uso e a fase da doença, mas em geral todos bem tolerados quando bem indicados.</p>
22/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mesilato de Rasagilina, Positivo: Obtive melhoras no tratamento no que se refere ao tremor e lentidão dos movimentos. , Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dicloridrato de PramipexolProlopa HBSProlopa dispersívelMesilato de Rasagilina, Positivo: Todos estes medicamentos citados acima me proporcionam melhoras nos sintomas da doença de Parkinson, bem como o Mesilato de Rasagilina. , Negativo: Todos os medicamentos citados houve efeitos colaterais como ansiedade, depressão... mas somente nos três ou quatro primeiros dias, após só benefícios com a melhora dos sintomas.</p>
27/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RAZAGILINA, Positivo: MELHORA SIGNIFICATIVA DE FUNÇÃO MOTORA, COM REDUÇÃO DE DISCINESIAS INDUZIDAS PELA LEVODOPA, Negativo: NÃO TIVE</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LEVODOPAPRAMIPXOLAMANTADINA, Positivo: MELHORA DOS SINTOMAS MOTORES, Negativo: BAIXA ADESÃO AO TRATAMENTO PELA POSOLOGIA DIMINUIÇÃO EFICACIA DROGAS COM PASSAR DO TEMPO</p>
30/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Levodopa, pramipexol, entacapone, , Positivo: entacapone - melhora das flutuações motoras de fim de dose pramipexol - melhora motora levodopa - melhora motora com melhora da marcha e independência nas atividades, Negativo: entacapona - alucinações pramipexol - sonolência e alucinações levodopa - flutuações motoras</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: amantadina, Positivo: tratamento das reações extrapiramidais induzidas por drogas, Negativo: anorexia, náuseas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os resultados com a rasagilina são muito bons.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rasagilina, Positivo: Redução das discinesias, melhora da dor causada pela rigidez e melhora da sialorréia, Negativo: Bem tolerado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Levodopa, selegilina, amantadina, pramipexol, rotigotina, entacapona, Positivo: Levodopa, selegilina, amantadina, pramipexol, rotigotina, entacapona: melhora dos sintomas da doença de Parkinson, Negativo: Levodopa: discinesiasselegilina: pouco toleradoamantadina: perde eficácia com o tempoprampipexol e rotigotina: alucinações entacapona: discinesias</p>
01/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rasagilina, Positivo: Melhora sintomatica, Negativo: Ausência de respista</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os usados para a doença: Idopao, Pramipexole, selegilina, anti-colinergicos. E outros, Positivo: Melhora sintomática, Negativo: Efeitos gastrointestinais e psiquiátricos</p>
01/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A rasagilina constitui uma excelente opção de tratamento para os pacientes com doença de Parkinson e complicações motoras. Tem posologia fácil (uma vez ao dia), melhorando a aderência ao tratamento destes pacientes uma vez que na maioria das vezes esses pacientes são polimedicados.Tem boa eficácia no controle das flutuações motoras.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A rasagilina constitui uma excelente opção de tratamento para os pacientes com doença de Parkinson e complicações motoras. Tem posologia fácil (uma vez ao dia), melhorando a aderência ao tratamento destes pacientes uma vez que na maioria das vezes esses pacientes são polimedicados.Tem boa eficácia no controle das flutuações motoras., Positivo: Boa aderenciaFácil posologiaPoucos efeitos adversosBoa eficácia no controle das flutuações motoras, Negativo: Efeitos adversos: a minoria dos pacientes referiu tontura que melhorou com a continuidade do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Levodopa, pramipexol, rotigotina, amantadina, entacapone e biperideno , Positivo: cada um deles tem indicação em determinada fase e sintomas da doença, o que é individualizado no caso da doença de Parkinson, Negativo: Podem levar a discinesias, flutuações motoras, intolerância gástrica, colúria, transtornos do impulso e alucinações</p>
18/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os demais medicamentos indicados para o tratamento daDoença de Parkinson., Positivo: Trata-se de inibidor da MAO de segunda geração. Vários estudos clínicos demonstraram eficácia em todos os estágios da doença de Parkinson, com ótimo perfil de segurança e tolerabilidade. Além disso, a posologia em tomada única diária é um fator positivo, pois aumenta a adesão dos pacientes, Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os demais , Positivo: Efocacia comprovada, Negativo: Agonistas de dopamina: alucinações. Selegilina: perfil desfavorável de interação medicamentosa e efeito anfetaminico. Levodopa: complicações motoras.</p>
12/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rasagilina, Positivo: Melhora da atividade motora, sem ocorrencia de discinesias., Negativo: Não observei.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Levodopa, Pramipexol, Amantadina., Positivo: Contrle dos disturbios motores., Negativo: Discinesias.</p>
18/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rasagilina 1mg, Positivo: Ele é um medicamento que atua nos efeitos da doença de Parkinson com excelentes resultados , Negativo: Não tive até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prolopa, pramipexol, Positivo: Melhora dos tremores, rigidez e bradicinesia , Negativo: Discinesia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É droga fundamental no tratamento da Doença e Parkinson</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Em avaliação a Rasagilina , Positivo: melhora na sintomatologia e retardo na progressão, Negativo: Nauseas, hipotensão postural</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: L dopa, pramipexol, entacapone, Amantadina, selegilina, biperideno, , Positivo: melhora nos sintomas , Negativo: são peculiares a cada droga</p>
12/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rasagilina, Positivo: Melhora na fase inicial, como coadjuvante da levodopa, melhora da marcha., Negativo: ansiedade, alucinação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Levodopa, pramipexol, biperideno, amantadina, selegilina, Positivo: levodopa: melhor medicamento para D. ParkinsonPramipexol: melhora motora tanto em monoterapia ou combinado com outros medicamentos, previne discinesiasAmantadina: melhora discinesiasBiperideno: melhora tremorselegilina: melhora marcha, aumenta efeito da levodopa, Negativo: Prolopa: náuseas, perda do efeitoPramipexol: sonolência, alucinações, transtornos do controle do impulso, edemaAmantadina: edema, confusão mentalBiperideno: boca seca, alucinações, confusão mental, embaçamento visual especialmente em idososselegilina:alucinações, insônia, confusão especialmente em idosos</p>
13/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Trabalho em Hospital Público Universitário e sou responsável pelo Setor de doença de Parkinson e distúrbios do movimento. Atendo &gt;150 pacientes com parkinsonismo e vários têm indicação do uso de rasagilina. Seria uma grande conquista para estes pacientes poderem usufruir, não só desta medicação, mas de outras para o tratamento da doença de Parkinson, pois com o tratamento correto, nas doses corretas, podemos manter estes pacientes independentes em suas atividades de vida diária por muito tempo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: biperideno e trihexifenidil - indicados no tratamento do tremor com grande eficáciaamantadina - indicada no tratamento do tremor e das discinesias pela levodopalevodopa - indicada em todas as fases da doença, é a droga mais eficaz para o tratamento dos sintomas motorespramipexol e rotigotina - indicados em todas as fases da doença, têm eficácia menor que a levodopa, mas ajudam a diminuir as discinesias por propiciar a diminuição da dose da levodopaselegilina e rasagilina - indicadas em todas as fases da doença, têm eficácia menor que a levodopa, mas ajudam a diminuir as discinesias por propiciar a diminuição da dose da levodopapiribedil - indicado em todas as fases da doença, tem eficácia menor que a levodopa, mas ajuda a diminuir as discinesias por propiciar a diminuição da dose da levodopa e tem boa ação no tremor. Não está mais sendo distribuído no Brasil.entacapon e tolcapona - indicadas na fase avançada da doença, têm eficácia menor que a levodopa, mas ajudam a diminuir as discinesias por propiciar a diminuição da dose da levodopa. A Tolcapona não está mais sendo distribuída no Brasil.Cirurgia para estimulação cerebral profunda - indicada na fase avançada da doença para diminuir as flutuações motoras e discinesias, assim como o tremor intratável., Negativo: biperideno e trihexifenidil - constipação intestinal, xerostomia, confusão mentalamantadina - constipação intestinal, xerostomia, confusão mental, edema de membros inferiores e livedo reticularislevodopa - discinesia, náusea, vômito e hipotensão posturalpramipexol e rotigotina - edema de membros inferiores, sonolência diurna, distúrbios da impulsividadeselegilina - agitação psicomotorarasagilina - náusea e mal-estarpiribedil - náusea e mal-estar, agitação psicomotoraentacapon - náusea e mal-estar, piora das discinesiastolcapona - observar hepatograma pelo risco de hepatotoxicidadeCirurgia para estimulação cerebral profunda - hemorragia cerebral.</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso do medicamento e os efeitos são importantes para redução dos sintomas causados pela Doença de Parkisnon</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Azilect, Positivo: Melhora do controle motormelhora na qualidade da marchaaumento do efeito do prolopa, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: pramipexol (sifrol), Positivo: redução da rigidezumento da resposta do prolopa, Negativo: enjoomal estarsalivaçãoânsia de vomitotontura</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A medicação melhora os sintomas, principalmente no início da doença. E melhora dos sintomas associada ao levodopa.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rasagilina., Positivo: Melhora da aknesia e dos tremores no início da doença e nas fases mais avançadas. Fácil adesão do paciente, uma vez que a posologia de 1mg é de uma vez por dia, Negativo: Ainda não constatei efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Levodopa, amantadina, pramipexol, triexifenidil, biperideno e outros, Positivo: Levodopa: melhora aknesia e tremores e a hipertonia. É o medicamento mais importante no tratamento. Os demais são utilizados em associação, com o objetivo de diminuir a dosagem do levodopa., Negativo: Levodopa: efeitos colaterais, como a distonia.Pramipexol: sonolência e aumento de peso.Amantadina: alucinações.</p>
15/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, o Parkinson e uma doença incapacitante, mesmo aposentada, a pessoa precisa ter sua independência nos seus cuidados diários e toda medicação disponível deve ser dispensada pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: PROLOPA 200/50, PROLOPA 100/25DB, PROLOPA HBS 100/25, SELEGILINA 0,5 MG, SIFROL 1MG, Positivo: faz 12 anos que diagnóstica sem o uso destes medicados estaria totalmente incapacitada ate para me vestir e escovar os dentes, Melhora a bradicinesia, o tremor tudo, fico quase como era antes. , Negativo: Constipação intestinal, gases, sono súbito, e hipotensão</p>
12/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rasagilina, Positivo: - melhora do parkinsonismo (bradicinesia, rigidez muscular), melhora do wearing-off, Negativo: associação com antidepressivos pacientes mostraram tontura</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Levodopa/benserazida, levodopa/carbidopa, entacapone, amantadina, pramipexol, ropinirole, Positivo: melhora do parkinsonismo, Negativo: sonolência, alucinações, distubios de impulso, edema em tornozelos</p>
12/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Administração da Levodopa para meu avô , Positivo: Após a tomada da Levodopa meu avô fica bem, pena que quando o efeito acaba ele se sente travado , Negativo: Quando o efeito do produto acaba, meu avô sente algumas dores ao longo do dia, estamos aguardando avaliação do meu para introduzir novas medicações.</p>
16/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Possibilidade com essa terapia associada, de uma melhor qualidade de vida aos pacientes, em tratamento, principalmente os de longo período de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Levodopa+ Cloridrato de benzerazida 200/50mgMantidan ( Cloridrato de Amandatina) 100mgRivotril (clonazepan) 2,5mg/mLParmelon 10mg, Positivo: Estabilização dos tremores por algumas horas, Negativo: rigidez muscular. mais acentuada na boca e gargantadificuldade de deglutição, inclusive da saliva, ocasionando secreção contínua em forma de "baba"</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Parmelon 10mg, Positivo: Estabilização geral do quadro, entretanto pelos 33 anos da doença em que a paciente convive, essa estabilidade e bem frágil e rápida.Lucidez mental mantida, Negativo: Perda inicial gradativa e atualmente acentuada das funções motoras, ocasionando dificuldades para deambulação, fala, deglutição.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Todo medicamento que venha contribuir com o tratamento da DP e que tenha poucos efeitos colaterais será bem vindo. Contudo ainda aguardo por uma medicação que seja a cura definitiva da DP, embora esteja ciente que não há medicação eficaz e que nós pacientes necessitamos das terapias complementares, com FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIAS, PSICOLOGIA, ETC.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: LEVODOPA + BENZERACIDAPRAMIPEXOLAMANTADINA, Positivo: LEVODOPA: Equilibra os sintomas da DP.PRAMIPEXOL: Potencializa o Levodopa;AMANTADINA: Potencializa o Levodopa., Negativo: LEVODOPA: Tem efeitos colaterais com movimentos involuntários.PRAMIPEXOL reações adversas como alucinações, tonturas.AMANTADINA idem pramipexol , com menor desequilíbrio.</p>
18/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Estou usando e tendo bons resultados</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: AZILECT, Positivo: MELHORA NA DOENÇA, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: PROLOPA,ENTACAPONA,PRAMIPEXOL, Positivo: MELHORA NA DOENÇA, Negativo: NENHUM</p>
12/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, os resultados são excelentes, o fator limitador é o preço</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azilect, Positivo: melhora dos sinais motores da doença de Parkinson, redução das discinesias e wearing off, Negativo: poucas vezes reações gástricas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entacapone, levodopa, pramipexol e rotigotina, Positivo: melhora da parte motora e reducao das discinesias, Negativo: perda do efeito, discinesias e distonias</p>