

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Fumarato de dimetila para Esclerose Múltipla - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho justo ter o direito de tentar essa opção. 2ª - Não 3ª - Não
30/04/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/04/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Melhoria para os portadores de esclerose múltipla 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, Positivo: Melhora nos sintomas da esclerose múltipla, Negativo: Não tive
30/04/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferon, Positivo: Redução de surtos, Negativo: Cansaço
30/04/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A EM possui manifestação diversas em diferentes pacientes e quanto maior o arsenal terapêutico disponível maiores as possibilidades de tratamento para os pacientes. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon, Positivo: Controle dos surtos da doença, Negativo: Inflamações locais
30/04/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera 240mg, Positivo: Tomo esta medicação à 9 meses e meus exames estão ótimos. Até consegui voltar a trabalhar, sem prejuízos nenhum ao meu dia a dia por tomar uma medicação diária., Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon Beta, Positivo: Ser fornecido gratuitamente pelo SUS e entregue à domicílio., Negativo: Diversos. Tive reação alérgica, tive hepatite medicamentosa, e mesmo aplicando à noite, no dia seguinte ficava muito mal.
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Países de primeiro mundo permitem a utilização do medicamento 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tentativas com Interferon Beta, Copaxone e sessões de pulsoterapia. , Positivo: Desaceleração de surtos., Negativo: Interferon Beta - febre, reações locais Copaxone - reações locais e impossibilidade de aplicação na região abdominal devido a dor intensa Solumedrol - hemorragia nasal</p>
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por se tratar de uma doença sem cura é fundamental a utilização dos medicamentos para retardar o avanço da mesma. Devido a isto é necessário inúmeras opções de medicamentos pois com o passar do tempo ocorre a chamada "falha terapêutica" e o paciente pode utilizar o que for melhor recomendado. Além disto o Tecfidera (Fumarato de Dimetila) é um medicamento oral, sendo menos evasivo do que os tradicionais inteferonas e outros injetáveis.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: A praticidade para utilização do mesmo, o que possibilita que qualquer paciente possa utilizar sem ajuda, além de não ser evasivo., Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex (Betainterferona 1A)., Positivo: Utilizei durante 5 anos com apenas 2 surtos neste período e ter que utilizar o mesmo apenas semanalmente., Negativo: Muitos efeitos colaterais, como dor de cabeça, dor no corpo e área de aplicação dolorida, além de possuir muita dificuldade para me auto medicar devido a necessidade de ter que me aplicar a injeção.</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Primeira falha? E quantas experiências foram bem sucedidas? E o outros pacientes que estão respondendo bem ao tratamento, não contam?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos científicos dos EUA comprovam a grande eficácia do medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: fumarato de dimetila , Positivo: Menos efeitos adversos e eficácia comprovada., Negativo: Ausentes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glatirâmer Interferon Natalizumabe Fingolimode, Positivo: Drogas de primeira linha para Esclerose Múltipla , Negativo: Muitos efeitos adversos.</p>
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferon, Positivo: Redução de surtos, Negativo: Cansaço</p>
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento altamente eficaz, bem tolerado, primeira linha em muitos países. Excelente relação custo-benefício.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila. Relato minha experiência como paciente e como MÉDICO também. Excelente experiência., Positivo: Controle rápido e eficaz dos meus sintomas e muito pouco efeitos colaterais. , Negativo: Esporadicamente apresento rubor na face e tronco.</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O médico e os pacientes com Esclerose Múltipla devem ter ao seu alcance uma ampla variedade de medicamentos, para que juntos possam decidir a melhor opção de medicamento para cada caso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferona Beta 1-b (Betaferon) e Natalizumabe (Tysabri), Positivo: Interferona Beta 1-b (Betaferon): continuei tendo surtos e houve piora no EDSS. Natalizumabe (Tysabri): doença estabilizada. Não houve novos surtos e não houve evolução no EDSS., Negativo: Interferona Beta 1-b (Betaferon): efeitos gripais fortes, como dor de cabeça, secreção nasal e febre, além de endurecimento da pele na região de aplicação. Natalizumabe (Tysabri): Efeitos gripais leves no dia da aplicação, como secreção nasal.</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser testado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que se o paciente não teve sucesso com algum outro tratamento, e o mais indicado seria o uso do Fumarato de dimetila, o governo TEM A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR O MESMO, conforme solicitação médica com o amparo legal da Constituição Federal em seu artigo 5.º e seus incisos que são as garantias fundamentais individuais de todos os cidadãos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferon, Positivo: Redução de surtos, Negativo: Cansaço</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Me adaptei super bem ao medicamento e não tive efeitos colaterais, na ressonância magnética que fiz recentemente a doença não evoluiu. e</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: A qualidade de aumentou, não tem efeitos colaterais como outros medicamentos que fiz o uso., Negativo: Não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Tive efeitos positivos, Negativo: Tinha muita dor de cabeça, além da falha terapêutica.</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o medicamento é "amplamente utilizado com sucesso" em outros países.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MetiprednisolonaCampath, Positivo: Controle de crises., Negativo: Campath foi retirado do mercado.Solumedrol possui os efeitos indesejáveis de qlq corticoide.</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação é muito importante para quem não se adapta a primeira opção</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É fundamental disponibilizar medicamentos orais mais modernos para pacientes com esclerose múltipla, de forma a aumentar a aderência ao tratamento. Os medicamentos injetáveis hoje disponíveis são desconfortáveis e provocam muitos efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex (Betainterferona 1a), Positivo: Não tive lesões novas após 7 meses de tratamento com Avonex (Betainterferona 1a) , Negativo: Durante o início do tratamento com Avonex apresentei lesões novas, o que só parou de acontecer após 7 meses de uso contínuo do medicamento. Faço aplicação 1 vez por semana, e neste dia tenho muitos efeitos colaterais, como febre alta e dores no corpo, o que me deixa incapacitada para outras atividades. Os locais da aplicação da injeção (coxas) ficam constantemente com hematomas e dores locais. O medicamento provoca ocorrência de depressão: os momentos de melancolia vem e vão, mas após 1 ano de uso do medicamento este sintoma melhorou. As injeções são desconfortáveis. O medicamento precisa manter-se refrigerado, o que atrapalha em momentos de viagem em que preciso levá-lo comigo.</p>
30/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos científicos dos EUA comprovam a grande eficácia do medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: fumarato de dimetila , Positivo: Menos efeitos adversos e eficácia comprovada., Negativo: Ausentes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: GlatirâmerInterferon Natalizumabe Fingolimode, Positivo: Drogas de primeira linha para Esclerose Múltipla , Negativo: Muitos efeitos adversos.</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo medicamento para tratamento deve estar disponível para uso após decisão entre médico e paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Betainterferona e Copaxone, Positivo: Nenhum relevante., Negativo: Dor e inflamação no local de aplicação da injeção que é diária.</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque eu acredito que toda medicação tem que ser testada, muita das vezes o medicamento que não é bom para um, é bom para o outro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Beta interferona, mesmo assim a doença estava avançando com rapidez, dai então, uma nova tentativa com Natalizumabe., Positivo: Com o Natalizumabe, os efeitos colaterais são bem menor do que com a Beta Interferona, o meu esposo se sente bem melhor com ele., Negativo: Beta Interferona: Fraqueza nas pernas, falta de equilíbrio, febre e sensação de gripe. Natalizumabe: Nenhum efeito negativo</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se um remédio é necessário para o tratamento de um paciente, a disponibilidade e o acesso ao remédio não deveriam ser negados em momento nenhum. Principalmente tratando-se de uma doença que pode causar riscos de vida altíssimos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos devem ter acesso a oportunidades reais de tratamento, ainda mais se já vem sido aplicado em países de 1º mundo. Tem que utilizar aqui, SIM. Direito à vida! Todos temos o direito à vida e de utilizarmos tudo ao nosso alcance para mantê-la.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha namorada é portadora da esclerose múltipla, descobriu a doença recentemente e lhe foi indicado o uso do medicamento tecfidera, que tem surtido efeito de forma excepcional. Uma vez que sua doença se encontra controlada com a não ocorrência de quase nenhum surto. Ela faz parte de um grupo de usuários iniciantes no Brasil através de estudos feitos pela UFRJ no hospital universitário Clementino Fraga Filho. Além disso, o medicamento apresenta várias vantagens, uma vez que é administrado via oral em cápsulas, não existindo a necessidade de injeção e de ir ao hospital para tomar o remédio. O que permite uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Por se tratar de uma doença sem cura é fundamental a utilização dos medicamentos para retardar o avanço da mesma. Devido a isto é necessário inúmeras opções de medicamentos pois com o passar do tempo ocorre a chamada "falha terapêutica" e o paciente pode utilizar o que for melhor recomendado. Além disto o Tecfidera (Fumarato de Dimetila) é um medicamento oral, sendo menos evasivo do que os tradicionais interferonas e outros injetáveis.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera (Fumarato de Dimetila), Positivo: O medicamento Tecfidera (Fumarato de Dimetila) quando eu comecei a usá-lo por meio de doação da minha médica estava com duas lesões em processo inflamatório, o mesmo teve um efeito perfeito, pois a inflamação melhorou e desde então não tive lesões., Negativo: O Tecfidera (Fumarato de Dimetila) no meu caso não teve nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 1 A, Positivo: No início do tratamento ele foi super eficaz., Negativo: Depois de um tempo de uso o mesmo não conseguiu mais controlar minhas lesões</p>
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento altamente eficaz, bem tolerado, primeira linha em muitos países. Excelente relação custo-benefício.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila. Relato minha experiência como paciente e como MÉDICO também. Excelente experiência., Positivo: Controle rápido e eficaz dos meus sintomas e muito pouco efeitos colaterais. , Negativo: Esporadicamente apresento rubor na face e tronco.</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma amiga é portadora Esclerose Múltipla, faz uso do medicamento que atualmente controla a progressão da doença e não terá condições financeiras de arcar com os custos se o mesmo deixar de ser oferecido pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Trata-se de uma patologia que merece uma seleção maior quanto as preferências para o tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44, Positivo: Uso desde setembro do ano passado, até agora não fui acometida por algum surto, mas não é a realidade de muitos., Negativo: A forma de ser injetável, poderia melhorar a forma de administração.</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que os pacientes devem ter amplo acesso aos medicamentos existentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não acho que se deve descartar o tratamento SÓ após o primeiro uso. Cada corpo é diferente, cada indivíduo também é diferente. A resposta do corpo de um, será diferente do outro. Então porque generalizar e acabar de uma vez só com a primeira falha de um tratamento de EM ou outra doença que possa gerar maiores gastos públicos?! Temos que ampliar nosso pensamento e ver mais adiante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Rebitesfeliz 22 e 44, Positivo: Não tenho, Negativo: Cefaléia, intensa dor muscular, fadiga</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif22 e 44. Figolimode, Positivo: Figolimode ainda em uso. Pouca reação , Negativo: Rebif22e44 muita dor muscular, cefaléia intensa, fadiga, fraqueza.</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera e Tysabri, Positivo: Tysabri - extremamente eficiente Tecfidera - não me adaptei devido à alergia (inferior ao Tysabri), Negativo: Tecfidera- prurido e aquecimento da pele Tysabri - para soro positivo do vírus JC, estimula o desenvolvimento de LAMP</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tysabri e tecfidera , Positivo: Tysabri muito eficiente Tecfidera - não me adaptei , Negativo: Vide resposta na pergunta 8.3</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoal, o irmão de uma amiga q trabalha comigo m etec Tqt está c esclerose múltipla. O medicamento dele custa 60 mil reais, é uma injeção q deve ser aplicada mensalmente. Até mês passado o governo forneceu, porém, semana passada a família recebeu a notícia de q o fornecimento foi cortado e obviamente eles não tem como arcar c este valor mensalmente. Estão com processos judiciais para conseguir o remédio, e dentre as etapas, pedem A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou enfermeira e minha irmã está usando está medicação é está se sentindo melhor, mas não está conseguindo pelo estado, o laboratório fabricante está fornecendo no momento. Ela melhorou muito creio que outras pessoas devem ter acesso pelo Estado incluindo ela. Tenho colega de trabalho que está na 4 medicação fornecida pelo Estado e 3 falharam, minha irmã só conseguiu tomar 1 pelo Estado e ainda sim não teve um resultado eficiente as outras não pode tomar., Positivo: Ela se sente melhor fisicamente, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Respondido acima Copaxane, Interferon, Positivo: Não tem, Negativo: Falha no tratamento irritabilidade extrema, diarreias</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem pessoas que usam e est"ao obtendo resultados satisfatórios.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente deve ter outras opcoes de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ja tive e estou tento experiencia com o medicamento avonex, Positivo: O efeito positivo é que este medicamento tem controlado os surtos da EM, Negativo: Os efeitos negativos do medicamento são: o desconforto a cada aplicação por ser em forma de injeção intramuscular, o mal estar que causa toda vez apos a aplicação, como dor de cabeça forte, febre, dor no corpo, entre outros.</p>
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beta interferona 1A 44mg, Positivo: Pelo menos não tive reação contrário do beta interferona, mas ouvi relatos de outros pacientes, que não tiveram a mesma reação do organismo, tendo febre, dores, e outros sintomas., Negativo: O efeito negativo é ter que aplicar injeção 3 vezes na semana</p>
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1b, Positivo: Com o tratamento os surtos diminuirão a sua frequência , Negativo: Como ele é injetável está deformando pois já uso há 6 anos, no dia que aplico fico com mal estar como se estivesse com gripe, as vezes dor de cabeça.</p>
30/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos científicos dos EUA comprovam a grande eficácia do medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: fumarato de dimetila , Positivo: Menos efeitos adversos e eficácia comprovada., Negativo: Ausentes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: GlatirâmerInterferon Natalizumabe Fingolimode, Positivo: Drogas de primeira linha para Esclerose Múltipla , Negativo: Muitos efeitos adversos.</p>
30/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Melhora dos sintomas da esclerose multipla, Negativo: nao tive</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mais estudos deveriam ter sido feito. Uma droga que é usada em outros países e que possuem uma boa resposta no tratamento da doença, não pode ser descartada por uma possível falha num teste ou por falta de mais testes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicação de calor proibitivo tratando-se de doença crônica e de caráter evolutivo, deveria ser provida gratuitamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque fiz uso de outros medicamentos na qual me causou alergia e o único que me adaptei foi justamente o tecfidera por tanto hoje sou dependente dessa medicação para que eu não venha ter surtos...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o uso do Betainterferona 1a, Positivo: Não tive efeitos positivos, Negativo: Com o uso do betainterferona não impediu que eu tivesse os sintomas e ainda tive uma séria alergia de pele.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tive experiência com o betainterferona 1a , Positivo: Não tive efeitos positivos, Negativo: Desenvolvi uma alergia de pele</p>
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44 e Compaxone 22mm, Positivo: Retardamento de surtos por um ano com Compaxone. , Negativo: Muitos efeitos colaterais com o Rebif e muitos surtos. Compaxone a base de óleo muito dolorido divide aplicar todos os dias.</p>
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera e Tysabri, Positivo: Tysabri - extremamente eficiente Tecfidera - não me adaptei devido à alergia (inferior ao Tysabri), Negativo: Tecfidera- prurido e aquecimento da pele Tysabri - para soro positivo do vírus JC, estimula o desenvolvimento de LAMP</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tysabri e tecfidera , Positivo: Tysabri muito eficiente Tecfidera - não me adaptei , Negativo: Vide resposta na pergunta 8.3</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O acesso a medicamentos comprovadamente eficazes em estudos científicos devem ser oferecidos aos portadores de EM.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon, Rebife, Copaxone, Azatioprina., Positivo: Estabilizaram a EM., Negativo: Com o tempo de uso perderam a eficácia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Natalizumabe., Positivo: Impede novos surtos da EM., Negativo: Atraso no recebimento do medicamento via judicial.</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma sobrinha que toma essa medicação. Sem efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante disponibilizar diversas opções de tratamento aos pacientes, pois cada organismo reage de forma diferente aos medicamentos. A diversidade é MUITO importante para que todos possam ter a DIREITO de encontrar o medicamento certo para sua SAUDE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex (Betainterferona 1A), Positivo: Não apareceram lesões novas após 7 meses de uso do Avonex., Negativo: Muitos efeitos colaterais ao paciente: depressão, febres, dor no corpo; além de dificuldades práticas como: dificuldade de mobilidade pelo volume e condições de armazenamento do medicamento.</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Não tive nenhum surto desde a utilização deste medicamento., Negativo: Efeito colateral como febre e for no corpo</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por se tratar de uma doença sem cura é fundamental a utilização dos medicamentos para retardar o avanço da mesma. Devido a isto é necessário inúmeras opções de medicamentos pois com o passar do tempo ocorre a chamada "falha terapêutica" e o paciente pode utilizar o que for melhor recomendado. Além disto o Tecfidera (Fumarato de Dimetila) é um medicamento oral, sendo menos evasivo do que os tradicionais inteferonas e outros injetáveis</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um resultado negativo não feve ser determinante para a política pública , especialmente se há estudos que comprovam a eficácia do medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Interferon Avonex, Positivo: Ausência de surtos, Negativo: Depois de 8 anos ainda tem reação a injecao</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A não incorporação do medicamento no momento do tratamento em que se torna necessária uma alternativa de medicamento, torna inviável financeiramente a continuidade e constância de medicação do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Precisamos ter mais conclusões sobre os resultados</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon, Positivo: Não tive surtos, Negativo: Efeitos colaterais intensos fadiga, dores nas articulações, sintomas de gripe, tontura, dor de estômago, ansiedade, depressão.</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A não incorporação do medicamento no momento do tratamento em que se torna necessária uma alternativa de medicamento, torna inviável financeiramente a continuidade e constância de medicação do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No meu caso, tenho problema cardíaco, ja fiz três cirurgias, sou alérgica a diversos medicamentos, não sou indicada para tomar medicamento que o Sus tem disponível.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Mais disposição para tarefas diarias, não sinto dor, não houve aumento das lesões.Maior qualidade de vida., Negativo: No inicio do tratamento distúrbio gastrointestinal, continuo com a medicação e não apresento mais este sintoma.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1a - 22 e 44 &#956;g, Positivo: No inicio do tratamento um controle da doença., Negativo: Baixa qualidade de vida.Dores no corpo e na cabeça, indisposição, intolerancia as injeções (intramuscular e subcutânea), aumento das lesões (surtos)</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer, Positivo: Doença instável sem surtos , Negativo: Aplicação de medicação injetáveis e diário</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A não incorporação do medicamento no momento do tratamento em que se torna necessária uma alternativa de medicamento, torna inviável financeiramente a continuidade e constância de medicação do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A não incorporação do medicamento no momento do tratamento em que se torna necessária uma alternativa de medicamento, torna inviável financeiramente a continuidade e constância de medicação do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Acho q todos têm direito a tentar melhorar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A não incorporação do medicamento no momento do tratamento em que se torna necessária uma alternativa de medicamento, torna inviável financeiramente a continuidade e constância de medicação do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso o Tecidera a 11 meses e não tive mais nenhum surto desde então.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A não incorporação do medicamento no momento do tratamento em que se torna necessária uma alternativa de medicamento, torna inviável financeiramente a continuidade e constância de medicação do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não estou totalmente inteirada do assunto em pauta! Sou portadora de esclerose múltipla, uso injeção, se o remédio em pauta for melhor não vejo porque não aprova-lo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Desde que fui diagnosticada só usei avonex, Negativo: Mal estar sintomas gripais, muita fadiga nos músculos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon 1 a Natalizumabe, Positivo: Betainterferon 1 a - ajudou no inicio a abrandar a doença Natalizumabe - o melhor remédio do mundo para mim. Segurou 100% a doença (já faço 4 anos de uso- seguindo um protocolo internacional) e me proporciona uma qualidade de vida excelente ., Negativo: Beta interferon - segura a doença mas acaba com sua qualidade de vida . Efeitos colaterais diversos. Tomei por 10 anos-Tysabri - pra mim , perfeito. Mas iniciei com cuidados que ainda não estão na bula e faço uso a cada 8 semanas - que ainda não está na bula ...</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso do tecfidera para pacientes como eu é muito importante pela eficácia e facilidade na portabilidade do mesmo. Controla a doença e me favorece mais qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Eu tive uma ótima adaptação ao medicamento, com poucos eventos adversos. A indicação para 1º escolha é devido aos tipos de lesões encontradas em meu cérebro e cervical. O fato de ser cápsula facilita a vida dos portadores de EM que ainda tem vida ativa e trabalham. Evitando idas frequentes ao hospital para tomadas de medicamento e a facilidade de transporte., Negativo: Foram poucos os efeitos adversos. No início tive flushing e dores de estômago, mas seguindo as recomendações médicas consegui driblar esses efeitos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Em surto fiz uso de metilprednisolona, Positivo: Diminui os efeitos que o surto me causou. Por exemplo, diminuição das dor, diminuição das dormência, recuperação da visão plena, recuperação da força., Negativo: Agitação, amargo na boca, sonolência excessiva.</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Atualmente tomo o Tecfidera, anteriormente tomava o Rebif 22MG, Positivo: Tecfidera - comprimido, conforme artigos que li tem boa cobertura/eficiência no tratamento da doença e na reversão de lesões., Negativo: Rubor facial e sensação de calor.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Desde junho/16 tomo o Tecfidera, anteriormente tomava o Rebif 22MG (tomei de nov/2007 a junho/2016), Positivo: O medicamento teve uma boa cobertura, mas nos últimos anos minha doença evoluiu, o que fez com que alterasse para o Tecfidera., Negativo: Ser injeção, corpo cansado e sintomas de gripe no dia ou no dia seguinte. Frio que dói os ossos, o local da injeção fica vermelho e coçando.</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pulsoterapias Rebiff 44mg merck serono, Positivo: Pulsoterapia para barrar o avanço durante surto Rebiff é imunomodulador para evitar que tenha surtos , diminuindo as chances de seqüelas permanentes, Negativo: Pulsoterapia é muito forte. O organismo fica debilitado. O imunomodulador Rebiff causa muitas reações como dores no corpo, de cabeça, febre , fadiga...</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone...beta interferon...natalizumabe , Positivo: Foi eficaz durante 4 anos...foi aplicada 6 injeções do interderon e nao houve eficiencia...evo natalizumabe estou em uso há 4 anos sem crises, Negativo: 1...nenhum 2 interferon crises constantes 3 natalizumabe a aplicação da infusão</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatirâmer - copaxone, Positivo: ausência de novos surtos., Negativo: Dor após as aplicações diárias, inchaço e lesões na pele (local das aplicações)
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pergunta mal formulada, leva a duplos interpreta. Precisa formular pergunta mais direta e objetiva. 2ª - Não 3ª - Não
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como é uma doença individual o SUS não possui tratamentos disponíveis 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Beta inter serona e também singolimoide., Positivo: Não obteve resultado, Negativo: Não obteve resultado 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Beta inter serona e também singolimoide, Positivo: Não obteve resultado, Negativo: Não obteve resultado
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é uma doença que se manifesta individualmente e o Sus nao dispoe de opcoes 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: beta inter serona e singo limóide, Positivo: Nao houve efeitos, Negativo: Vomitos e dores musculares 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: beta inter serona e singo limóide, Positivo: nao houve, Negativo: vomitos e dores musculares
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila (Tecfidera), Positivo: Estabilização das lesões e ingestão oral., Negativo: Não é fornecido pelo SUS e possui alto custo.</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A não incorporação do medicamento protege os laboratórios e impede que os pacientes tenham acesso gratuito a medicamentos que controlam a doença, especialmente se tratando de um medicamento que é o mais utilizado nos EUA e mais barato do que os demais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento precisa de mais testes, e estar disponível na lista de possíveis tratamentos para a EM.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila (Tecfidera), Positivo: Estabilização das lesões e ingestão oral., Negativo: Não é fornecido pelo SUS e possui alto custo.</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O médico atestou o remédio porque o paciente necessita</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quando o médico prescreve este remédio e porque o paciente necessita do mesmo e porque já foi tentado outros remédios que não deram certo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu mesma como paciente, antes de começar o tratamento com este fármaco, tentei outros dois que são distribuídos pela farmácia de auto custo, mas para mim não funcionou, ou seja não estabilizou, breçou a doença, continuei tendo surtos, comprovados com exames de imagem, com lesões ativas e novas lesões, ficando com algumas sequelados, não visíveis a olhos nus e um outro fármaco, nem pude começar a tomar, devido a não aceitação do meu organismo... Enfim, comecei a tomar este fármaco desde novembro de 2015 e desde então, não tive mais surtos, minhas lesões estão quietinhas, não tive lesão nova, não tive efeito colateral grave, que precisasse parar com o tratamento, tudo comprovado através de exames de imagem e laboratoriais.Enfim, para minha pessoa, meu organismo, deu certo e está dando, então eu acho que deve ter mais pessoas que devem estar dando certo e precisamos sim que este fármaco, seja incorporado na grade de medicações distribuídas pelo governo, porque, pelo menos eu, não tenho condições de bancar todo mês, o valor desta medicação!!!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tomo ele desde novembro de 2015 e até o momento, não tive problemas, efeitos colaterais graves e está sendo muito bom para mim , Positivo: Iniciei tratamento com betaferon 1 B e não funcionou, passei para o copaxone é mais uma tentativa frustrante, iria passar para o tysabre e não pude, devido a ser jc positivo e desde então comecei com o tecfidera e está funcionando, estou muito bem com o tratamento, Negativo: As duas primeiras medicações, além de efeitos colaterais bastante brusco, você tem o incômodo de ter que tomar injeções todos os dias, transtorno na hora de transportar, principalmente se for viagem e o transtorno e incômodo de dependendo do local onde esteja, de ter que tomar a medicação.Já com o tecfidera, por ser via oral,não não tenho metade dos transtornos descritos acima e efeitos colaterais, tive bem pouco e somente no início do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon 1 B, copaxone, Positivo: Nenhum, Negativo: Efeitos colaterais, todos é bem ruins, transtorno na hora de transportar as medicações e tomar, não vi no meu caso, melhora na doença, para mim, não funcionou, não deu certo</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este tratamento é utilizado no exterior. Havendo a recomendação de um especialista da área o SUS deve fornecer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualquer meio mesmo que caro aos cofres públicos deve ser alternativa aos portadores de esclerose</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não aplica, Positivo: Não aplica, Negativo: Não aplica</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem paciente que responde bem ao uso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fumarato de dimetila , Positivo: Na, Negativo: Na</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, &#8203; conheço uma pessoa que está usando e está respondendo muito bem ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou a favor do aconselhamento individual de cada medico assistente a seus pacientes!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: com interferona porem tive dois surtos em menos de 3 meses, Positivo: nenhum efeito, Negativo: apatia, febre, fadiga ao extremo, dores neuropaticas, dores de cabeça, lesoes na area de aplicação de remedio e nodulos nos locais de aplicação que nao se desfizeram apos a interrupção.</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acho que a opção se o paciente deve utilizar o medicamento deve ser realizada pelo médico que acompanha o paciente, e não de forma generalizada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona., Positivo: Betainterferona: Minha doença se mantém controlada, sem surtos com o uso do medicamento., Negativo: Betainterferona: No dia seguinte após a aplicação surte um efeito de resfriado, mas que fica controlado tomando um Ibuprofeno.</p>
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com outros medicamentos eu, portadora de esclerose múltipla, tive diversos efeitos colaterais como encefaleia intermitente em graus variados de dor, muito cansaço e sonolência, que inviabilizaram efetuar atividades cotidianas, além de eu ter fobia a agulha e ser obrigada a tomar subcutânea.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon 1B, Positivo: Controle dos surtos, Negativo: Sonolência. encefaleia intermitente variando o grau de dor. dor , enxaço, roxidão no local de aplicação. Intolerância ao forma de aplicação.</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AvonexCopaxone, Positivo: Avonex aplicação semanalCopaxone melhor resposta na doença , Negativo: Avonex excesso de efeito colateral Copaxone aplicação diaria</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento amplamente utilizado e com eficacia comprovada em outros Países por pacientes com esclerose multipla</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nós precisamos de medicamentos, onde tenha melhor forma de uso no caso que seja comprimido e faça nos termos melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex fiz o uso de 2 anos, onde sofri com surtos após 2 anos Natalizumabe, estou a três meses fazendo o uso dessa medicação, onde ela precisa de ter muito cuidado, por causa do vírus JC., Positivo: Avonex, eu estava me sentindo muito bem, após 2 anos tive surtos e muito forte Natalizumabe, ainda não da, pra falar por que só estou a três meses fazendo o uso da medicação., Negativo: Avonex, tive surtos após 2 anos de uso</p>
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pode ser um novo tratamento para as pessoas com Esclerose Múltipla</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Posso andar para lugares mais longe, ficar de pé., Negativo: Calafrios, dor de cabeça, mas esses efeitos são momentâneos.</p>
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera e Tysabri, Positivo: Tysabri - extremamente eficiente Tecfidera - não me adaptei devido à alergia (inferior ao Tysabri), Negativo: Tecfidera- prurido e aquecimento da pele Tysabri - para soro positivo do vírus JC, estimula o desenvolvimento de LAMP</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tysabri e tecfidera , Positivo: Tysabri muito eficiente Tecfidera - não me adaptei , Negativo: Vide resposta na pergunta 8.3</p>
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betferon, Copaxone, natalizumabe, azatioprina, Positivo: Natalizumabe surtos diminuíram Copaxone evitou surtos durante cinco anos, Negativo: Betaferon não evitou surtos, efeitos colaterais Copaxone evitou surtos até certo momento da evolução da doença Azatioprina muitas infecções Natalizumabe não evita todos surtos</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E direito das pessoas ter o medicamento que elas precisam pra ficar bem</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betainterferon, Positivo: Não houve efeito positivo, Negativo: Muitos efeitos colaterais e machucados nos locais de aplicação da injeção</p>
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os portadores de EMRR precisam de um medicamento que provoque menos efeitos colaterais , oral, pois a maioria dos portadores tem efeitos psicológicos por conta do barulho ao injetar a medicação .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1A três vezes por semana e betainterferona 1A uma vez por semana (atual)., Positivo: No caso da betainterferona 1A três vezes por semana, o único efeito positivo foi o controle da doença . Já o betainterferona 1A uma vez por semana, os efeitos positivos foram o controle dos surtos, a aceitação do organismo ., Negativo: Betainterferona 1A três vezes por semana : meu organismo não se adaptou ao medicamento , fazendo com que ao aplicar ficasse com hematomas no local, sem contar com a dor e os efeitos colaterais , tais como : tontura, dor de cabeça , náuseas, falta de apetite , dores no corpo, o efeito psicológico por conta do barulho ao aplicar entre outros. Betainterferona 1A uma vez por semana: o psicológico por conta do barulho ao aplicar , calafrios ,dores de cabeça, cansaço, náuseas, sintomas gripais entre outros .</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento já se mostrou eficiente no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, tenho um amigo com a doença e o remedio lhe faz muito bem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/04/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/04/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem milhares de casos com resultados excelentes! 2ª - Não 3ª - Não
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há pessoas em tratamento com resultados muito positivos. O medicamento é eficaz e defe estar ao acesso de todos. 2ª - Não 3ª - Não
30/04/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é muito importante para o tratamento dá doença, visto que para algumas pessoas ele é a única opção é o valor de tratamento é absurdo para ser pago.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos de mais tempo no tratamento visto que em muitos países é o medicamento de ponta com muito sucesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é utilizado com segurança e eficiência em outros países do mundo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é amplamente utilizado em outros países com comprovado grau de eficiência.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento que teve o uso autorizado por diversas agências tegulador a de outros países por ter a eficácia desejada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento já aprovado pela Anvisa, fortalece o arsenal terapêutico é necessária p atualizar o protocolo clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente, e por isso. A esclerose múltipla se manifesta de diferentes modos em cada pacientes, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maiô número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovado pela Anvisa.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aubagio, teriflunomida, Positivo: Fumarato de Dimitila, controlou as crises, sem efeitos colaterais Teruflunomida não controlou as crises, Negativo: Fumarato de dimitila efeitos negativos nulosTeruflunomida não controlou as crises</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terflunomida, Positivo: Fumarato contolou as crises e nao teve efeitos colaterais, Negativo: Fumarato sem efeitos negativosTerflunomida não fez efeito</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamente amplamente utilizado nos EUA e Canadá. Paciente precisa se virar pra comprar o medicamento por lá. O fato é que quem pode, já se trata com ele, por prescrição dos médicos no brasil</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: N/a, Positivo: N/a, Negativo: N/a</p>
08/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Algumas formas de Esclerose Surto e Remissão no primeiro episodio, como na Síndrome Clínica Isolada, favorece a boa aderência e resposta.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato de dimetila , Positivo: Boa aderência do paciente.Baixos efeitos colaterais.Boa resposta na Síndrome Clínica Isolada e ou primeiro surto., Negativo: Os medicamentos injetáveis possuem vários efeitos adversos como febre e dor local. Possui dificuldade na aderência do paciente. No caso do Fumarato de dimetila podemos utilizar como uma boa opção terapêutica.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os disponíveis no SUS (interferons, natalizumab, alentuzumab, fingolimod, glatiramer e etc)., Positivo: Toda possuem uma efetividade. , Negativo: Efeitos adversos, baixa aderência principalmente nos medicamentos injetáveis. LEMP e etc.</p>
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas com esclerose múltipla necessitam desse medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço uma parente de paciente de esclerose múltipla e está tendo uma eficácia neste paciente muito grande. Se adaptou muito bem com este medicamento. 2ª - Não 3ª - Não
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trabalho com uma pessoa que é parente de um paciente que usa o medicamento e este paciente se adaptou muito bem a este medicamento, que trouxe ótimos resultados. 2ª - Não 3ª - Não
08/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço uma parente de paciente que se adaptou muito bem com o medicamento. 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA; 2ª - Não 3ª - Não
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Fumarato de Dimetila é uma medicação fundamental para uso em via oral, em pacientes com falha terapêutica com interferons ou glatiramer, ou em caso de efeitos colaterais com esses medicamentos. Tem um perfil de efeitos colaterais menor que o fingolimode, sem contar que não podemos ter apenas uma opção nestes casos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato de Dimetila, Positivo: Controle de surtos de Esclerose Múltipla, e ressonância magnética sem novas lesões. , Negativo: Não identifiquei efeitos colaterais relevantes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferons, Glatiramer, Fingolimode e Natalizumabe., Positivo: Fingolimode é muito bom para conter surtos e novas lesões, além de ser oral.Natalizumabe também., Negativo: Interferons tem baixa capacidade de controle da doença.Fingolimode tem efeitos colaterais na visão.Natalizumabe é injetável e tem risco de LEMP.</p>
15/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a sua incorporação do medicamento ao SUS é de extrema importância na ampliação das possibilidades de tratamentos, uma vez que cada pessoa reage de maneira diferente podendo apresentar falhas terepeuticas com os medicamentos que se encontram disponíveis no SUS atualmente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Nenhuma melhora significativa até o momento, Negativo: muitas dores no corpo, cabeça e rouidão no local da aplicação</p>
15/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a medicação precisa ser fornecida como forma alternativa quando outros medicamentos resultam em falha terapêutica, devidamente comprovada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rebif 44 e Aubagio., Positivo: Rebif 44: sem surtos; Aubagio: melhora na marcha., Negativo: Rebif 44: plaquetopenia; Aubagio: surto (fadiga, fraqueza muscular, visão turva etc.)</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A propria CONITEC na 54ª reunião realizada na data de 05/04/2017, considerou que o fumarato de dimetila não se apresenta como uma opção custo-efetiva quando comparado ao tratamento com o fingolimode. Mas pelo que entendi não esta sendo essa a proposta de uso comparado ao fingolimode e sim a incorporação de um medicamento com eficácia e segurança semelhante aos medicamentos usados para tratar EMRR de baixa atividade. É muito importante ao médico e ao paciente ter opções reais e seguras para tratar uma doença tao imprevisível e incapacitante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AVONEX, REBIF, BETAIFERON, COPAXONE, TYSABRI, GILENYA, AUBAGIO, Positivo: SEGUINDO ESQUEMAS DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS CHAMADOS DE PRIMEIRA LINHA TIVERAM EFEITOS POSITIVOS ATE A FALHA TERAPÊUTICA. MAS EM GERAL HÁ UM BOM CONTROLE DE SURTOS COM MELHORA NA EVOLUÇÃO CLINICA, Negativo: os efeitos negativos todos foram decorrentes a falha terapêutica com novos surtos da doença ou positividade com alto index para virus JC no uso de nataluzumabe.</p>
15/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse remedio é muito usado em países desenvolvidos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente q conheço precisa dessa medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisa urgente ser liberado pelo SUS para salvar vidas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Se amigos precisam, é porque obtém resultados...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA; Muito Obrigada mesmo! <3</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex - betainterferon 1a, Positivo: Até então não senti tantos efeitos colaterais, Negativo: Sinto calafrios sempre que aplico, cansaço e leve dor de cabeça</p>
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pagamos nossos impostos e quando ficamos doentes não podemos ter o direito de escolher um remédio com menos efeitos colaterais, deve ser caro pois a maioria dos planos de saúde não cobre. Não pedimos ou escolhemos para ficarmos doentes aconteceu.. Nossos governantes não fazem quase nada por nós pelo menos na área da saúde deveriam fazer algo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: TECFDERA 240 mg, Positivo: Fui diagnosticada em Novembro 2016, minha médica disse que foi um achado, só sentia formigamento nos pés e mão, foi confirmado diagnóstico pelo liquor. Estou tomando remédio duas vezes ao dia e os sintomas se foram., Negativo: Quase não sinto efeito colateral pois sigo todas as orientações evitar gordura ruim e consumir gordura boa. Se consumir uma pizza por exemplo, você terá dor abdominal mais passa rápido toma buscopam orientada pelo médico.</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não fui tolerante às medicações disponíveis no SUS. Hoje estou nas mãos do laboratório para receber a unica medicação que meu corpo aceitou sem restrições.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Furamato de dimetila, Positivo: Tolerância total ao medicamento. , Negativo: Inclui uma quantidade de "gordura boa" na minha alimentação, maior do que a que eu usava normalmente para proteger meu intestino.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: glatirâmer, betainterferonas, azatioprina, , Positivo: Diminuíram os intervalos entre um surto e outro., Negativo: Intolerância ao princípio ativo</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há pessoas em tratatamento que dependem do medicamento e apresentaram melhora com o uso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo medicamento é bem vindo à melhoria da doença uma vez que alguns tratamentos já não fazem efeito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone (acetato de glatirâmer), Positivo: Os efeitos colaterais são mais amenos e por ser injetável, agride menos o estômago., Negativo: Nenhum medicamento para a esclerose múltipla está isento de pontos negativos. O copaxone provoca dor e inchaço no local de aplicação, causando nódulos bem doloridos.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rebiff 44, Positivo: A paciente ficou por mais tempo sem entrar em surto, Negativo: Tinha febre sempre após a medicação.</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente, utilizo o medicamento e ele é eficaz e tem poucos efeitos colaterais além de ser prático, por ser um comprimido.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera fumarato de dimetila, Positivo: Paralisação das desmielinizações., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: O tecfidera não precisa ser conservado em geladeira, apresenta poucos efeitos colaterais e é eficaz para prevenir novas crises., Negativo: O avonex não paralisou desmielinizações depois de um tempo e tem vários efeitos colaterais.</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: avonex e copaxone, Positivo: diminuição da frequência dos surtos e melhor qualidade de vida, Negativo: avonex - sensação de febre e dores no corpo copaxone - reações no local da aplicação.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, esse governo é ridículo... todos temos direito a tratamento gratuito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é o mais utilizado atualmente em outros países. É o medicamento com o menor número de efeitos colaterais e com os melhores resultados no controle da doença. Tomo o Avonex e a médica me recomendou o Tecfidera, já que o Avonex não está segurando a progressão da doença. Não comecei porque não posso pagar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Fez efeito por uns três meses somente. Utilizo há um ano e meio., Negativo: Utilizo Avonex há um ano e meio e não me adaptei até hoje. Os efeitos colaterais aparecem toda semana: dores no corpo, febre, sudorese, cãibras, enxaqueca. Acho que são piores que a própria doença. Além de tudo, o Avonex já não faz mais efeito, visto que tive vários surtos mesmo com o uso da medicação. A cada aplicação fico com um hematoma no local. Minhas pernas já estão cheias de manchas. Toda semana eu cogito parar de usar o medicamento, pois para mim ele é uma espécie de tortura.</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sem mais palavras para com a administração pública em Nosso país, acho da mais alta maldade e falta de escrúpulos desviar verbas públicas e não utilizá-las para compra de remédios para os cidadãos. Se esta opção de medicamentos é válida, deve ser incorporada ao SUS. Pagamos os impostos para ter saúde e tudo mais que deveríamos ter. Já não temos nada de hospitais e pronto socorros, agora nem remédio mais?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Beta interferon e Gylenia . O beta é horrível pelos efeitos colaterais e por causa das injeções. O Gylenia é melhor em relação aos efeitos e por ser via oral também, porém não atende às expectativas da doença de minha esposa., Positivo: Nenhum, Negativo: Injeções, fadiga, pressão arterial ruim, falta de força, sono, dores de cabeça, marcas pelo corpo, estados depressivos.</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Temos que continuar com testes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Compacson, Natalizumab, Fingolimod, Positivo: Nem um efeito positivo, pois tenho a forma primária progressiva, Negativo: Fiquei com efeitos colaterais com o uso de todos os medicamentos.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todo novo medicamento para tratamento da doença é sempre bem aceito. E no estudo em tela, o Fumarato de Dimetila apresenta vários benefícios aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif e Gilenya, Positivo: Com o uso do Rebif, permaneci estável, sem surtos aparentes. Já o Gilenya me trouxe muito mais qualidade de vida, devido à facilidade na administração do medicamento, além de não ter sentido qualquer efeito colateral e também apresentei redução das lesões na ressonância magnética após o uso., Negativo: Com o Rebif, o local da aplicação ficava sempre muito dolorido, com vermelhidão e edema. Além disso, os efeitos colaterais após a medicação eram sempre muito desconfortáveis, já que se assimilavam a sintomas de gripe. Também, o transporte da medicação era muito difícil. Por fim, com o uso do Rebif apesar da inexistência de surtos aparentes, sempre surgiam novas lesões na ressonância magnética, o que ensejou a troca da medicação pelo Fingolimode. Este segundo, até o presente momento, não apresentou qualquer efeito negativo.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Cada caso deve ser analisado individualmente. A EM é uma doença conhecida como 1000 caras! O neuro do paciente que deverá analisar a situação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif, copaxone é atualmente Tysabri., Positivo: Rebif apenas negativo Copaxone segurou a fadiga um tempo. Tysabri ajudou na fadiga e também menores níveis de reações, Negativo: Rebif. Febre, dores no corpo; fraqueza Copaxone. Muita dor na aplicação Tysabri. Nada relevante</p>
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, Positivo: Só usei Betainterferona então não posso falar em comparação com outros, Negativo: O medicamento me deixa com lesões avermelhadas, as vezes com caroços nos locais aplicados. um pouco dolorido quando o medicamento está sendo ejetado.</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Eu acho que as pesquisas ou as experiências ,feitas em análises dessa medicação é a única esperança para o portador dessa doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dimetil fumato, Positivo: Efeito Via de administração Eficácia Tolerabilidade , Negativo: Efeitos adversos iniciais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Copaxone Interferons em geral NatalizumabeGilenyaAubagio Lemtrada , Positivo: Cada medicamento tem sua particularidade ., Negativo: Cada medicamento tem sua particularidade</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA, o que entra em contraste com a avaliação da CONITEC. O SUS não possui o aparelho necessário para a comprovação da eficiência do medicamento e deve ter seu arsenal de recursos baseado nas recomendações da associação com reconhecimento próprio que é a ANVISA, qualquer detrimento entre as partes ou laboratórios terceiros não deve afetar decisões de fornecimento, salvo alterações feitas pela própria ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: copaxone, Positivo: diminuição de surtos., Negativo: tomar todos os dias, dificuldade de armazenamento e transporte.</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento possui um alto custo e deve ser concedido a fim de ajudar as pessoas no avanço do tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pedido de AJUDA <3Queridos amigos, família e colegas...Meu filho está precisando muito de um medicamento de alto custo e estamos tendo grandes dificuldades para consegui-lo. :(Precisamos que respondam esse questionário (bem rapidinho) para que tenhamos acesso ao medicamento.Obrigada! <3 É muito importante pra nós e pra outras tantas famílias com o mesmo problema.1) Acessar o site: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao--31449e preencher dados pessoais.2) Copiar e colar esse texto na questão 7:A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pedido de AJUDA <3Queridos amigos, alunos, colegas...Meu irmão está precisando muito de um medicamento de alto custo e estamos tendo grandes dificuldades para consegui-lo. :(Precisamos que respondam esse questionário (bem rapidinho) para que tenhamos acesso ao medicamento.Obrigada! <3 É muito importante pra nós e pra outras tantas famílias com o mesmo problema.1) Acessar o site: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao--31449e preencher dados pessoais.2) Copiar e colar esse texto na questão 7:A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento possui um alto custo e deve ser concedido a fim de ajudar as pessoas no avanço do tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fiz uso de medicação intra muscular e a cada injeção me sentia pior eu estava sabotando meu próprio tratamento e só percebi o quanto a injeção estava me fazendo sofrer quando aconteceu um imprevisto com o auto custo e fiquei dois meses sem injeção foram os dois meses mais felizes da minha vida um alívio saber que ficaria sem medicação, foi então que pedi ajuda ao meu médico e expliquei o que estava acontecendo foi daí que ele resolveu me passar o fumarato de dimetila e pra mim foi um alívio uma felicidade que não tenho nem como descrever hoje faz 6 meses que utilizo pois consigo ganhar amostra grátis espero que esta medicação seja incorporadora no auto custo pois não se sabe até quando o laboratório vai disponibilizar as amostras ao médico, e só de pensar em injeção tenho calafrios... P</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já usei betainterferona 1a por 2anos e 5 meses Fumarato de dimetila 6meses, Positivo: Betainterferona 1a não tive efeitos positivos Fumarato de dimetila medicação de fácil utilização a vida segue sem preocupação afinal no dia a dia não tenho reações quase nenhuma, Negativo: Betainterferona 1a a cada injeção , dores no , mal estar, e o pior de tudo o medo da injeção. Fumarato de dimetila só tenho as vezes um pouco de calor e se comer doces industrializados ou muita coisa gordurosa da cólica intestinal, mas em 6 meses só passei mal duas vezes.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já usei betainterferona 1a por 2anos e 5 meses Fumarato de dimetila 6meses, Positivo: Betainterferona 1a não tive efeitos positivos Fumarato de dimetila medicação de fácil utilização a vida segue sem preocupação afinal no dia a dia não tenho reações quase nenhuma, Negativo: Betainterferona 1a a cada injeção , dores no , mal estar, e o pior de tudo o medo da injeção. Fumarato de dimetila só tenho as vezes um pouco de calor e se comer doces industrializados ou muita coisa gordurosa da cólica intestinal, mas em 6 meses só passei mal duas vezes.</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapeutico. Ampliar o arsenal terapeutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovadas pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo plenamente que a Conitec seja recomendada</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pedido de AJUDA <3 Queridos amigos, família e colegas... Meu filho está precisando muito de um medicamento de alto custo e estamos tendo grandes dificuldades para consegui-lo. :(Precisamos que respondam esse questionário (bem rapidinho) para que tenhamos acesso ao medicamento. Obrigada! <3 É muito importante pra nós e pra outras tantas famílias com o mesmo problema. 1) Acessar o site: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao--31449 e preencher dados pessoais. 2) Copiar e colar esse texto na questão 7: A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA; 3) Questão 6: Resposta: selecionar última alternativa: DISCORDO TOTALMENTE DA RECOMENDAÇÃO PRELIMINAR. 4) Apertar botão: GRAVAR 5) Conferir nome. Muito Obrigada mesmo! <3</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Por se tratar de uma doença sem cura é fundamental a utilização dos medicamentos para retardar o avanço da mesma. Devido a isto é necessário inúmeras opções de medicamentos pois com o passar do tempo ocorre a chamada "falha terapêutica" e o paciente pode utilizar o que for melhor recomendado. Além disto o Tecfidera (Fumarato de Dimetila) é um medicamento oral, sendo menos evasivo do que os tradicionais inteferonas e outros injetáveis.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes precisam de uma maior gama de remédios</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rebif, Positivo: Sumiu novas resoes. Mas nao ajuda nas ja existentes, Negativo: Nao ajuda nos efeitos da doenca</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: O fumarato de dimetila (TecfideraTM) é a medicação que utilizo para o tratamento da Esclerose Múltipla Reminente-Recorrente. Faço uso há um ano, após o betainterferona não se adaptar ao meu organismo, e além de falhar na sua proposta, ocasionava várias e diferentes reações colaterais. O tecfidera, até o momento, está sendo eficaz no meu tratamento., Positivo: Poucas e quase nenhuma reação colateral, facilidade, eficaz, praticidade, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: A oportunidade que cada pessoa diagnosticada com Esclerose Múltipla tem de poder contar com diferentes opções de medicamentos para o tratamento, uma vez que a EM se desenvolve de maneiras diferentes em cada paciente. Por tanto, ter mais uma opção de medicação na lista do SUS, é uma maneira que o cidadão diagnosticado com EM tem de realizar o tratamento gratuito pelo governo, que é direito garantido pela Constituição e ter qualidade de vida., Negativo: Reações colaterais dependendo do organismo</p>
01/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Via oral e sem reações adversas, Negativo: Não entregue pelo sus</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon, Positivo: Sem remissão de surtos, Negativo: Dores, inchaço na pele, machucado, inflamação local e reações adversas severas</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pedido de AJUDA <3 Queridos amigos, família e colegas... Meu filho está precisando muito de um medicamento de alto custo e estamos tendo grandes dificuldades para consegui-lo. :(Precisamos que respondam esse questionário (bem rapidinho) para que tenhamos acesso ao medicamento. Obrigada! <3 É muito importante pra nós e pra outras tantas famílias com o mesmo problema. A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fumarão de Dimetila, Positivo: Remédio muito eficaz para o controle da doença , Negativo: Diarreia</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho q devem continuar os estudos e os pacientes devem ter acesso ja q o medicamento acertou nos outros casos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Betaferon, Positivo: Medicamento impediu q minha irma tivesse novos surtos, Negativo: Aplicacao na pele dia sim dia nao causou muitas manchas e dores oq pode ser evitado com medicacao vo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha esposa tem EM e não temos condições de estar comprando o medicamento, creio que o mesmo acontece com milhares de pessoas com necessidades financeiras que também têm EM</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fumarato de Dimetila, Positivo: Evita os surtos recorrentes, Negativo: O Fumarato de Dimetila não teve efeitos negativos, apenas o preço é o fator negativo</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio eficaz, com poucos efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Controle dos sintomas com poucos efeitos colaterais., Negativo: Vermelhidão no corpo.</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Creio que tudo que é favorável vale ser testado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex injeção semanal. , Positivo: Não notado nenhum ainda., Negativo: Altíssimos efeitos colaterais</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com EM tem um arsenal terapeutico limitado e merecem a oportunidade de drogas orais de primeira lingua, principalmente diante da falta recente de finholimode no mercado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rebif, fingolimode, Positivo: Fingolimode é uma dtoga excelente que realmente dominui a quantidade de durtos e a progressao da doença , Negativo: Rebif é uma droga muito limitada perante as demais (fingolimode, natalizumab, ...)</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, As pessoas precisam do medicamento...vamos colaborar..obrigada</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Tecfidera (fumarato de dimetila) é um dos medicamentos mais prescritos hoje em dia no mundo todo para o tratamento de esclerose múltipla, com eficácia já amplamente comprovada pela comunidade científica (nos EUA é "líder de audiência" e no Canadá e Reino Unido também já foi incorporado em seus respectivos sistemas de saúde para distribuição gratuita). Portanto, não há justificativa para esse entendimento contrário do SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sendo um medicamento prescrito na maior parte do mundo, com eficácia comprovada, não há razão para não incluir na lista do SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Familiar usa e foi controlado à lesão mais quem tá fornecendo é o laboratório</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera , Positivo: Sem efeito colateral e fácil administração , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Copaxone , Positivo: Nenhum , Negativo: Administração</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes sem condições financeiras, impossível o alto valor do medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Após ter recebido o diagnóstico de E.M, comecei o tratamento com Avonex no qual me trazia muitos efeitos colaterais. Depois de 3 anos com Avonex, tive novo surto e então foi decidido fazer a troca da medicação para Fumarato de Dimetila. A troca foi excelente, pois não obtive mais surtos, não sinto efeitos colaterais, tenho muito mais qualidade de vida e seria interessante que todos os portadores tivessem a oportunidade de receber essa medicação via SUS. Utilizo o Fumarato há 2 anos e desde então, não sei o que é ter E.M.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: So efeito negativo. Vários efeitos colaterais. Toda vez que eu precisava aplicar o medicamento era um momento horrível, pois sabia o que eu teria que enfrentar após a administração da droga., Negativo: Avonex: Dores no corpo, indisposição, baixa auto estima, tristeza.</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, É preciso uma investigação melhor, mais a fundo, para dizer se o medicamento realmente não está fazendo efeito.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera., Positivo: Os efeitos colaterais do tecfidera são mais tranquilos. Não é injeção. É melhor para transportar pois não precisa estar refrigerado., Negativo: ainda não observei efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex., Positivo: Aplicação uma vez por semana., Negativo: Os efeitos colaterais são mais complicados. Febre, dor de cabeça, dor no corpo. Sintomas que duram por dois dias ou mais. O transporte é mais complicado pois o medicamento precisa estar refrigerado e a aplicação é mais dolorida.</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já faço uso da medicação há 6 meses, após falha de interfderon e glatiramer. Não tive mais surtos e me sinto bem com a medicação. Tem sido a ideal para mim, mas não posso pagar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Ausência de surtos da doença e boa tolerância ao medicamento, exames de acompanhamento normais, Negativo: No início tive flush, hoje não tenho mais nenhuma reação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif e copaxone, Positivo: Nenhum, Negativo: Rebif: efeito colateral não esperado, reações adversas insuportáveis e falha terapêutica Copaxone: falha terapêutica</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A existência de pacientes que já fazem uso da medicação que se mostrou eficaz.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera, Positivo: Diminui os surtos, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas precisa desse remédio q tem um custo Muito elevado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Número de aceitação alta de pacientes que respondem positivamente ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pergunta mal formulada, leva a duplos interpreta. Precisa formular pergunta mais direta e objetiva.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem pessoas que necessitam dessa medicação e que não possuem condições financeiras de comprá-la no particular. Não é justo que apenas poucas pessoas que tenham mais recursos financeiros tenham a possibilidade de usar o medicamento que mais se adequa a suas necessidades. 2ª - Não 3ª - Não
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
28/04/2017	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acredito que devem haver mais opções de medicamentos para os pacientes pois, cada organismo reage diferente ao tratamento. Podendo ser uma alternativa para aqueles pacientes que fizeram uso de outros medicamentos e não tiveram o resultado esperado. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone , Positivo: Não tenho efeitos colaterais significativos. , Negativo: Dor imediata no local da aplicação e o fato de ter que fazer a aplicação todos os dias.
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Apenas uma tentativa é muito pouco 2ª - Sim, como paciente, Qual: Procedimento de crosslink para ceratocone, Positivo: Redução do grau e estabilização , Negativo: Sem efeito negativo 3ª - Não
28/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda população tem direito ao tratamento mais adequado ao seu caso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon e acetato de glatiramer, Positivo: Controle da evolução da doença., Negativo: Efeitos colaterais</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acredito no embasamento do CONITEC</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AVONEX, Positivo: Aplicações somente uma vez por semana. Quadro estável da doença., Negativo: Reações do medicamento. Dor no corpo, corrida, febre.</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente portadora de esclerose múltipla em uso da medicação com controle adequado da doença, com boa adesão e sem efeitos colaterais de relevância, apresento intolerância a administração parenteral, também tenho receio de abrir portas de entrada para infecções, devido trabalhar na área de saúde, visto que a cada aplicação, há solução de continuidade da pele. Como profissional da área de saúde, sei como é difícil a adesão de tratamento a longo prazo por via parenteral, devido desconforto, intolerância, e a dificuldade para aplicação. Se a pessoa para precisar viajar ou mesmo se apresentar alta carga horária de trabalho ou de ensino fica refém a toda dificuldade de armazenamento para aplicação em horários regulares da medicação, o que é importante para qualquer tratamento, ainda mais relevante em doenças crônicas. Como a definição de saúde não envolve apenas a ausência de doença, e sim o bem estar biopsicosocioambiental de cada ser humano, a recomendação preliminar de não ser a favor da incorporação do fumarato de dimetila vai contra a garantia de saúde integral ao paciente, pensando holisticamente no ser humano, que tem seus medos, angústias, desconforto e intolerância a administração diária por tempo prolongado (talvez a vida inteira) de medicação por via parenteral, deve haver a opção terapêutica disponível pelo SUS de uma medicação por via oral, segura e eficaz como o fumarato de dimetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Sou paciente portadora de esclerose múltipla em uso da medicação com controle adequado da doença, com boa adesão e sem efeitos colaterais de relevância, apresento intolerância a administração parenteral, também tenho receio de abrir portas de entrada para infecções, devido trabalhar na área de saúde, visto que a cada aplicação, há solução de continuidade da pele. Também, há a facilidade de carregar as cápsulas a qualquer ambiente. Sabe-se da dificuldade para aplicação. Se a pessoa para precisar viajar ou mesmo se apresentar alta carga horária de trabalho ou de ensino fica refém a toda dificuldade de armazenamento para aplicação em horários regulares da medicação, o que é importante para qualquer tratamento, ainda mais relevante em doenças crônicas., Negativo: Fumarato de dimetila não me traz efeitos negativos, exceto pelo alto custo da medicação e a falta de disponibilidade pelo SUS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferon Glatiramer, Positivo: Controle da doença com as duas medicações., Negativo: Aplicação parenteral. Abrir portas de entrada para infecções, visto que a cada aplicação, há solução de continuidade da pele. Difícil/baixa adesão de tratamento a longo prazo por via parenteral, devido a dor, desconforto, medo, angústia, intolerância e dificuldade para aplicação parenteral. Se a pessoa para precisar viajar ou mesmo se apresentar alta carga horária de trabalho ou de ensino fica refém a toda dificuldade de armazenamento para aplicação em horários regulares da medicação, o que é importante para qualquer tratamento, ainda mais relevante em doenças crônicas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glântiramer, Rebif44, Positivo: Não tive ,, Negativo: Os dois causaram muitos efeitos colaterais, como febre, dores no corpo e fraqueza muscular, náuseas.</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, tenho meu esposo com EM e é necessário medicamentos eficazes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: fampyra, betaferon, copaxone, Positivo: betaferon 9 anos de uso, fampyra efeito imediato no equilíbrio 1ano de uso, Negativo: não teve efeitos negativos de imediato</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1aNatalizumabe, Positivo: Natalizumabe possui menos efeitos colaterais,ser aplicado so uma vez por mês., Negativo: Betainterferona 1a da muitos efeitos colaterais como febre,dores no corpo e mto mal estar no dia da aplicação, por ser semanal a aplicação.</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Somente o médico pode avaliar a situação do seu paciente antes de mudar o medicamento, há grandes variáveis que devem ser considerados pelo médico como por exemplo os problemas psicológicos que podem trazer surtos ao paciente. E não esquecermos também que alguns medicamentos trazem grandes efeitos colaterais a algumas pessoas que temos de levar em conta ao trocar o medicamento a qualquer momento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone- glatiramer subcutânea , Positivo: Não tive efeitos colaterais , Negativo: Os espaços de tempo entre os surtos diminuíram após alguns anos, o que meu médico optou por trocar o medicamento, além do incômodo de ser injeção diária. Hoje tomo o medicamento Natalizumabe</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Natalizumabe , Positivo: Medicamento ministrado em soro, mensalmente. Muito tranquilo., Negativo: É um medicamento caro, há um efeito colateral de brotoejas na pele na área da aplicação do soro, tive apenas brotoejas em todo corpo na primeira aplicação, e também há um risco deste medicamento trazer uma inflamação no cérebro, neste caso tenho que fazer monitoramento com exame de sangue diretamente com o laboratório do medicamento para ver se eu me enquadro nesta faixa de pessoas com maior probabilidade.</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/04/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimode, Positivo: Estabilizou a doença , Negativo: Nenhum
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço paciente em uso da medicação que e foi a única medicação positiva. 2ª - Não 3ª - Não
28/04/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Via de administração, adesão ao tratamento, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: AvonexCopaxone, Positivo: Tive controle de surtos por um período., Negativo: Via de administraçãoEfeitos colaterais
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com base no parecer da abem 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Betaferom , Positivo: Controle dos surtos , Negativo: Efeitos colaterais, como calafrios, apenas nas primeiras aplicações
27/04/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon beta 1a 22 e 44, Positivo: Controle dos surtos, Negativo: Efeitos colaterais, como fadiga, pseudogripe e dor de cabeça no dia seguinte à aplicação.
27/04/2017	Grupos/associação/organização de pacientes	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
27/04/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: fingolimode, Positivo: Praticidade pois em cápsulas e alta eficiência, Negativo: Nenhum

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex 30mcg, Positivo: Não tive novos surtos desde 2002, Negativo: Aplicação IM, desconfortável</p>
27/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É importante mais uma medicação pra tratamento de esclerose múltipla, visto que é uma doença sem cura, e com um arsenal terapêutico limitado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso Avonex IM uma vez por semana desde 2009., Positivo: Controle da doença até 2016, quando foi detectado falha terapêutica. , Negativo: Reações adversas toda vez que aplicava a medicação Avonex .</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento importante para opção de tratamento quando há falha terapêutica dos inclusos no rol do SUS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Copaxone, Avonex, Tysabri, Positivo: Tysabri sem efeitos colaterais , Negativo: Copaxone e Avonex Não controlaram os surtos Tysabri problema com JC vírus</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, (i) O medicamento é comprovadamente eficaz, nos termos da profunda análise-técnica realizada pelo NICE, sendo aprovado para uso na Grã-Bretanha;(ii) É fundamental agregar opções ao arsenal terapêutico colocado à disposição do médico e do paciente; e(iii) É possível a incorporação condicionada à redução de preços pela indústria.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo com a recomendação preliminar por conta de nem sempre o resultado para um usuário de Fumarato de dimetila será o mesmo que o de outro usuário, com esse composto os pacientes teriam maior gama de opções de tratamento e custo mensal seria inviável para os pacientes sem maiores possibilidades de tratamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos de alternativas. O preço do remédio existente é impraticável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Fumarato de Dimetila deve ser disponibilizado pelo SUS, para quem tiver a doença possa ter opções de tratamento. Não é porque o Fumarato não deu certo para uma pessoa que não irá dar certo para outras pessoas. Uma vez também, que os interferons estão ultrapassados. E a população merece essa opção para tentar ter o controle da doença, vendo que essa doença é incurável, merece ao menos ter a possibilidade de estabilizar a doença e assim não haver mais surtos, ou diminuir.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rebif, Positivo: As reações foram muito fortes, que não foram observado efeitos positivos., Negativo: Muitos sintomas, desde febre diária, dores articulares, picadas 3x por semana, estado quase vegetativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Azitromicina, Positivo: Não houve mais surtos., Negativo: Problemas gastrointestinais, queda excessiva de cabelo.</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1b e 1a, Positivo: Betainterferona 1a, não obtive resultados positivosBetainterferona 1b 22ug, resultado positivo parcial, nao voltou 100% a sensibilidade nos membrosBetainterferona 1b 44ug, inicio do tratamento, aguardando resultados, Negativo: betainterferona 1b, sistema hepatico ficou extremamente debilitado, segundo o medico, quase tive uma hepatite fatalBetainterferona 1a 22ug, nao sessou o surto 100%, efeitos colaterais como dores de cabeça, apatia, fadiga, hematomas, depressão, entre outrosBetainterferona 1b 44ug, inicio do tratamento</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente deve ter a opção de se tratar com o remédio mais indicado para seu caso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Copaxone, Positivo: Tem ajudado a espaçar os surtos., Negativo: Aplicação todo dia. E a necessidade de refrigeração, para a conservação, complica em viagem.</p>
27/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve haver mais de uma opção no SUS. O tratamento nao pode ser igual para todos os portadores, considerando que cada um reage o tratamento de uma forma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes de EM, tem direito a ter acesso no SUS, todas as medicações registradas pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon Betaferon 1B e Tecfidera, Positivo: Após 7 anos de tratamento com Betaferon 1B o meu corpo já não suportava o uso do medicamento, quando fiz uma RM a minha médica observou que a EM não estava mais estacionada. Quanto ao TECFIDERA trouxe para mim mais praticidade e conforto., Negativo: Os efeitos colaterais foram muito intensos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon Betaferon 1B e Tecfidera, Positivo: Após 7 anos de tratamento com Betaferon 1B o meu corpo já não suportava o uso do medicamento, quando fiz uma RM a minha médica observou que a EM não estava mais estacionada. Quanto ao TECFIDERA trouxe para mim mais praticidade e conforto., Negativo: Os efeitos colaterais do TECFIDERA foram muito intensos.</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento ajudaria a milhares de pacientes que não tem condições financeiras para arcar com o tratamento utilizando o medicamento mais indicado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou totalmente A FAVOR da incorporação do Fumarato de dimetila para o uso após a 1ª falha de tratamento da Esclerose Multipla e/ou falta de aderência ou intolerância às formas parenterais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 1) Tem eficácia comprovada 2) Boa tolerabilidade 3) Fácil administração 4) Boa opção para pacientes que não tolerem medicamentos injetáveis ou tenham dificuldade para utilizar os acessórios de aplicação 5) Boa opção para pacientes que não obtenham resultados satisfatórios com os medicamentos disponíveis no momento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato de Dimetila, Positivo: Facilidade do uso, eficácia nos ensaios clínicos e baixa incidência de efeitos adversos, Negativo: Custo elevado, duas tomadas diárias</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferon Beta 1A, Interferon Beta 1B, Acetato de Glatiramer, Natalizumabe, Fingolimod, Positivo: Todos são medicamentos com eficácia comprovada em ensaios clínicos, não existem estudos comparativos diretos entre todos, porém meta-análises mostram eficácia semelhante entre os interferons e acetato de glatiramer, mostram também a segurança destes medicamentos. O Natalizumab e Fingolimod oferecem maior eficácia e redução mais significativas nas taxas de surto e progressão da doença. , Negativo: Os interferons tem maior incidência de sintomas flu-like e maiores taxas de abandono de tratamento; O acetato de Glatiramer tem maior adesão dos pacientes mas deve ser injetado diariamente. Existem complicações potencialmente graves com Natalizumab (LEMP) e com frequência observamos leucopenia em pacientes que utilizam Fingolimod.</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço paciente que o utiliza e que se sente muito bem</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quando existe um medicamento para tratamento da Esclerose Múltipla que é via oral e que possui mesma eficácia ou melhor dos medicamentos parenterais este medicamento não devia ser a primeira escolha após a falha dos medicamentos parenterais, e sim o primeiro medicamento para tratamento pois uma pessoas que acaba de descobrir que esta doente, passou por vários exames e ainda pode ficar meses recebendo medicação intramuscular ou subcutânea, esses medicamentos podem causar depressão no paciente e esta depressão está escrita na Bula do medicamento.Quando existe a possibilidade de um medicamento Oral, nossa vida se torna outra.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: BetaInterferon (Avonex), Positivo: Remédio protege e através das ressonâncias identificamos melhoras nas lesões já existentes., Negativo: Depressão, Febre, Dor no Corpo, Calafrios pós injeção do medicamento, alto custo com medicamentos para tratar efeitos colaterais (Anti-térmicos, Anti-térmicos e antigripais), difícil manuseio pois deve estar na geladeira e grande embalagem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera (Fumarato de Dimetila), Positivo: Proteção melhor que os medicamentos parenterais, fácil manuseio por ser comprimidos., Negativo: Na bula do remédio diz que pode causar, diarreia, enjojo e uma vermelhidão no corpo.Porém na primeira semana que utilizei o remédio me senti enjoado apenas uma vez, não tive diarreia, e de acordo com a minha alimentação, pode ocorrer a vermelhidão.</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão um novo medicamento,já aprovado pela ANVISA fortalece a terapia farmacológica.Amplia-lá é necessário para atualizar o Protocolo Clinico da Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.Por se manifestar de diversos modos em cada paciente,deve ser dado ao médico e pacientes o maior número de opções possíveis,sendo seguras e eficazes.Este medicamento é uma destas opções,aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a medicação deve ser indicado sim aos pacientes, logo depois de uma falha terapêutica ou alergia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: é a medicação que eu sempre usei desde o início da ESCLEROSE MÚLTIPLA, 2011., Negativo: Não posso dizer que tem efeitos negativos o que é para minha saúde, até agora tudo bem</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apoio a inclusão do medicamento na lista do SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Podendo termos mais opções de medicamentos disponovéis no sistema a chance do prognóstico ser melhor é maior, uma vez que a doença age de maneira única em cada paciente, não dá para receitar o mesmo remédio a todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer e fingolimode, , Positivo: Surtos bem controláveis, sem sequelas graves e uma qualidade de vida melhor., Negativo: Efeitos colaterais, fadiga, tontura, dor de cabeça, maior facilidade de pegar uma infecção.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma importante medicação com eficácia superior ao interferon já existente no sus .Ótima aderência ao tratamento .Sem efeitos colaterais temporários incapacitantes como o interferon. Com o mesmo custo para o sus .Beneficiando o paciente porque ganha qualidade de vida devido a medicação ser oral e não ter efeitos colaterais incapacitantes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tecfidera 120 mg e 240 mg , Positivo: Melhora da qualidade de vida do paciente mantedo-o capaz para a vida laborativa durante o tratamento.Sem intercorências hospitalares .Com bom controle de evolução da doença.Medicação via oral sem riscos de reações tóxicas., Negativo: Só um rash cutâneo que é controlável com AAS e não incomoda em nada o paciente perto dos efeitos colaterais de outras drogas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferons , fingolimode, vitamina D ., Positivo: Interferons além de seerem injetáveis causando artralgias intensas e reações locais tem baixa eficácia de controle da doença.Em torno de 30%.Eram muito utilizadas pois não existiam outras alternativas.Fingolimode benefício oral com riscos de alterações hepáticas e cardiovasculares.Vitamina D util só no início da doença , Negativo: Interferons além de seerem injetáveis causando artralgias intensas e reações locais tem baixa eficácia de controle da doença.Em torno de 30%.Eram muito utilizadas pois não existiam outras alternativas.Fingolimode benefício oral com riscos de alterações hepáticas e cardiovasculares.Vitamina D util só no início da doença</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou usando o medicamento há menos de um mês e já não tenho mais nenhum efeito colateral. Me sinto bem de saúde.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Azatioprina, Positivo: Na época não tinha diagnóstico fechado , Negativo: Na época não tinha diagnóstico fechado</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apoio a inclusão do Fumarato de dimetila na lista de medicamentos disponibilizados pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso diariamente o Tecfidera (240mg 12/12h), Positivo: O índice de diminuição de risco de novo surto, os efeitos colaterais são superficiais e passam rapidamente, além da praticidade, pois é uso oral. , Negativo: Até hoje não tive efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de corticoide oral (prednisona) e por pulsoterapia. Plasmaférese por 14 dias. , Positivo: Consegui sair do surto e minha visão voltou parcialmente. , Negativo: Pressão alta, ansiedade e aumento da glicose apenas no período do uso dos corticoides. Quanto à Plasmaferese, tive apenas queda de pressão.</p>
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A disponibilidade de mais opções de medicamento facilita para o médico, e para paciente escolherem a melhor forma de tratameto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Gilenya, Positivo: Melhora da disposição. Não ter efeitos adversos que causam aumento da incapacidade. E não ser injetável. , Negativo: Não teve.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente da decisão. Tomar agulhadas dia sim, dia não é terrível. Fico com hematomas e sinto muitas dores e fica com calombos. Tecfidera é via oral. Prático e eficaz</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon 1b e tecfidera, Positivo: Betaferon melhorou os sintomas.Tecfidera está sendo ótimo. Sem reações e pratico , Negativo: Betaferon: dor na aplicação, hematomas, calombos, dificuldade p transporte, pois tem q ficar refrigerado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon 1b , Positivo: Melhoras nos sintomas , Negativo: Betaferon: dor na aplicação, hematomas, calombos, dificuldade p transporte, pois tem q ficar refrigerado</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos que possuir uma ampla variedade disponível para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: REBIF, Positivo: Injeção apenas 3x por semana e indolor., Negativo: Apresentei surto visual durante o tratamento.</p>
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Droga com poucos efeitos colaterais e via oral. Muito importante para os pacientes com EM</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Leitura científica e recomendações de órgão de saúde em outros locais do mundo. , Positivo: ser via oral e de fácil cooperação por parte do paciente e familiares, controla evitando novos os surtos mais eficazmente., Negativo: adaptação com náuseas mas depois do `período inicial é bem aceito pela maioria dos usuários</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Acetato de glatiramer, Positivo: controla crises em casos bem brandos, Negativo: ser injetável e causar reações locais bem desagradáveis incluindo a lipodistrofia e a aderência a longo prazo das injeções até pelo fato de necessitar ser refrigerado</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque é um medicamento muito importante para os portadores de Esclerose Múltipla.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Não tive nenhum surto com essa medicação. , Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: glatirâmer e betainterferona, Positivo: Não teve., Negativo: Tive surtos e me sentia muito mal com os efeitos colaterais.</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quanto mais cedo conseguirmos estagnar a EM, poderemos seguir com nossa vida sem nos tornarmos dependentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, betaferon, copaxone e natalizumabe., Positivo: Apenas o natalizumabe parou a progressão da doença e sem efeitos colaterais., Negativo: Nenhum efeito benéfico com os três primeiros, fiquei com sequelas q impedem uma vida saudável.</p>
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon, Positivo: Por um tempo não tive surto. , Negativo: Problemas com aplicações e efeitos colaterais.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Considerando que a Esclerose Múltipla não age da mesma forma em todos os portadores da doença, é muito importante proporcionar aos médicos mais opções de medicamentos para tratamento e que ele possa determinar o melhor para cada paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Acetato de GlatiramerBetainterferona 1ABetainterferona 44Teriflunomida (em uso no momento), Positivo: O uso do Betainterferona 1A e do Betainterferona 44 controlaram os surtos por algum tempo, mantendo a doença estabilizada., Negativo: O Acetato de Glatiramer causou reação alérgica logo no início do tratamento. O Betainterferona 44 causou leucopenia na paciente durante o uso do mesmo. Tanto o Betainterferona 1A e o Betainterferona 44 perderam o efeito após aproximadamente 1 ano e meio de uso continuado. A teriflunomida causou enjoo forte nas primeiras semanas de uso e continua, porém mais fraco.</p>
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O valor exorbitante do remédio é a primeira questão. Somente com o apoio do SUS um paciente com renda média nacional poderá adquiri-lo; e em segundo lugar e não menos importante, há muitos relatos de compatibilidade com a medicação o que a torna viável a muitos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. A EM se manifesta de diferentes modos em cada paciente, por isso, devem ser dados ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: uso apenas do Fumarato de Dimetila (Tecfidera), Positivo: com uso do Fumarato de Dimetila (Tecfidera), tive melhoras no meu sintomas e logo após um semana de uso da medicação voltei ao normal., Negativo: Fumarato de Dimetila (Tecfidera) na primeira semana ocorreu um leve diarreia</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não se deve limitar as opções de medicação para uma doença tão grave e inesperada como a esclerose múltipla. Esta medicação é de uso oral e já aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Efeitos colaterais administrável, índice razoável de remissão dos surtos e praticidade no transporte., Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticóide oral, pulsoterapia e plasmaférese., Positivo: Controle do surto e recuperação parcial dá visão., Negativo: Variação dá pressão arterial, do índice glicêmico, ansiedade.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex, Positivo: Bom comportamento com o medicamento avonex, Negativo: Cansaço, febre dor no corpo</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Paralisou a doença, Negativo: As reações adversas causam dor, febre, e calafrios</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Paralisou a doença, Negativo: As reações adversas causam febre, calafrios, dor.</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso da medicação atualmente, após ter falha terapêutica com medicação anterior.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Sem surtos e sem novas lesões , Negativo: Em análise</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona , Positivo: Nenhuma , Negativo: Reações em todo o tempo de uso, má qualidade de vida.</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AvonexRebiff 44Gilenya, Positivo: Avonex - Injeção uma vez por semana.Rebiff 44 - Menos reação que o Avonex.Gilenya - Medicação oral., Negativo: Avonex - Medicação injetável, dava muitas reações.Rebiff 44 - Medicação injetável 3x na semana, tb dava reações.Gilenya - Tb tive reações.</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conviver com uma doença autoimune e não ter a certeza de ter a medicação adequada é desesperador.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon , Positivo: Durante 5 anos me protegeu dos surtos., Negativo: Conviver com agulhas de 2 em 2 dias e o transporte em bolsas térmicas, com a preocupação de tempo de validade do gelo, custo elevado em acomodações pela preocupação de ter frigar.</p>
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deu muito certo com minha amiga. E o único medicamento recomendado pelo médico e é caro</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Fumarato de dimetila deve ser incorporado ao tratamento pelo SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: A ausência dos surtos no período do uso do medicamento, além de ser via oral. O betainterferona estava fazendo efeito contrário, além de ser injetável, Negativo: Até o momento só efeitos positivos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona e Rebif, Positivo: Estabilizou a doença por um tempo. No decorrer do tratamento a doença voltou com muita força, Negativo: Além dos efeitos colaterais horríveis, houve falha terapêutica no decorrer do tratamento. O uso do medicamento sempre foi acompanhado de muita fadiga e depressão. Bem como, internações hospitalares e pulsoterapias.</p>
25/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif (Betainterferona 1A), Positivo: Mantém a doença estagnada, Negativo: A aplicação e os efeitos colaterais são bastante destrutivos ao decorrer dos dias, já que o paciente tem todas as suas atividades alteradas por influência da aplicação/efeitos do remédio, que vão desde a dor e o desconforto da picada, a náuseas, dores de cabeça, febre e mal estar causados pelo uso da droga</p>
25/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entendo que nós pacientes com Esclerose Múltipla devemos ter o máximo de opções de medicamentos para nosso tratamento devido a se tratar de uma doença complexa na qual cada paciente reage de uma forma ao tratamento e medicamento que lhe é indicado pelos médicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44 (betainterferona 1a) faço uso 3 vezes por semana desde 05/2012., Positivo: Desde que comecei o tratamento não sofri mais surtos da doença., Negativo: A cada aplicação das injeções sinto muitas dores no local aplicado, além de fadiga é sintoma de gripe.</p>
25/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex e capaxone e agora tecfidera, Positivo: Doença controlada, Negativo: Difícil acesso imediato a medicação. Tive que entrar com um processo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex e capaxone e agora tecfidera, Positivo: Facil acesso, Negativo: Doença não controlada</p>
25/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: interferons e galatiramer, Positivo: Nada, Negativo: Não tiveram bons resultados. Os efeitos colaterais são incompatíveis com uma vida ativa além de prejudicarem o fígado</p>
25/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As falhas terapêuticas são comuns em pacientes com esclerose múltipla e a variedade de medicação permite ao médico possibilidades para melhorar a qualidade de vida do paciente e tratar a evolução da doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimod, Positivo: Dois anos sem surtos , Negativo: Aumento das bilirrubinas, manchas na pele (rosto) e esofagite.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beta interferona, acetato de glatiramer, e fingolimode., Positivo: Beta interferona - foi a primeira medicação, restringiu surto apenas no primeiro ano. Acetato de glatiramer - melhor medicação, permaneci com ela por 8 anos, sem surto e/ou intercorrências. Fingolimod - dois anos sem surtos, medicação via oral, facilidade no tratamento., Negativo: Beta inteferona - sintomas agudos, náuseas, dor de cabeça, dor no corpo, sempre um dia após a aplicação. Glatiramer - o único aspecto negativo da medicação é ser injetável. Nenhum efeito colateral. Fingolimode - aumento de bilirrubinas, manchas avermelhadas na pele (rosto) e esofagite.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fui diagnosticado com esclerose múltipla há um ano e meu médico conseguiu com o laboratório esse o Tecfidera e uso há um ano e não tive mais nenhum surto, mas não sei até quando vou receber o remédio e graças ao remédio, hoje continuo trabalhando sendo registrado e ganho meu salário, então colocando o Tecfidera o governo terá mais adultos ativos no mercado de trabalho.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o Tecfidera e tem sido muito bom para mim. Não tive nenhum surto em um ano e o meu problema melhorou muito, Positivo: Tecfidera uso oral, fácil para tomar, não tem efeitos colaterais como as injeções, vida normal e ativa. Por favor coloquem o Tecfidera no SUS quero muito continuar ativo. muito obrigado, Negativo: vermelhidão em casos esporádicos 3 vezes em um ano então esse medicamento é muito bom.</p> <p>3ª - Não</p>
25/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vou iniciar o tratamento com o medicamento Tecfidera, pois tive falha terapêutica com Copaxone, Positivo: Vou iniciar o tratamento, Negativo: Vou iniciar o tratamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: Com exceção das reações na pele, o medicamento não apresentou nenhuma outra reação., Negativo: Falha terapêutica, lesões subcutâneas, vermelhidão nos locais de aplicação, aplicações diárias</p>
25/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Betaferon, Copaxone e Fingolimode., Positivo: Fingolimode não apresentou efeitos colaterais, por enquanto. Faço uso há mais de um ano., Negativo: Avonex- aumentou muito minhas enzimas hepáticas (TGO, TGP), inviabilizando a continuidade do tratamento. Copaxone- tinha muita falta de ar, inviabilizando a continuidade do tratamento.</p>
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso diariamente o Tecfidera (240mg 12/12h), Positivo: O índice de diminuição de risco de novo surto, os efeitos colaterais são superficiais e passam rapidamente, além da praticidade, pois é uso oral. , Negativo: Até hoje não tive efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de corticoide oral (prednisona) e por pulsoterapia. Plasmaférese por 14 dias. , Positivo: Consegui sair do surto e minha visão voltou parcialmente. , Negativo: Pressão alta, ansiedade e aumento da glicose apenas no período do uso dos corticoides. Quanto à Plasmaférese, tive apenas queda de pressão.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quanto mais opções de tratamento melhor!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como disse uma paciente, Cynthia Macedo:Para mim, a questão é muito simples: por não haver nenhum exame ou estudo clínico que identifique especificamente o tratamento (eficácia x efeitos colaterais) para o paciente de Esclerose Múltipla, TODOS os medicamentos devem ser alternativas viáveis e disponíveis, haja vista a possibilidade de falha terapêutica (necessidade de interrupção da medicação) e necessidade de alteração a qualquer tempo.Somente o médico, mediante estudo clínico, pode indicar o(s) melhor(es) tratamento(s) ao seu paciente, cabendo unicamente a ele (--paciente) realizar a escolha, levando em conta a via e a frequência de administração, bem como o perfil de reações adversas. A eficácia de qualquer medicamento depende destas circunstâncias para regular adesão no tratamento pelos pacientes.Nas palavras do colega advogado, e também esclerosado, Marco Aurélio A. Torronteguy, do Departamento Jurídico da AME, “limitar as possibilidades do arsenal terapêutico para EM pode significar, em muitos casos, deixar o paciente sem alternativa. Ao contrário, manter essa opção, a critério da livre prescrição médica, significa dar ao paciente uma chance a mais de enfrentar a EM”.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou quase 1 ano na espera desse medicamento. Preciso urgente !</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon Beta 1aTecfidera 240, Positivo: Interferon nenhumTecfidera: bem estar, aumento da imunidade, sem lesões na pele, sem surtos , Negativo: Interferon: baixa imunidade, lesões na pele , depressão , cansaço Tecfidera: calor excessivo após o uso, mas em 30min estava normal.</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sou um caso que não pôde seguir o tratamento com o Betainterferin 1a e no momento estou tendo problemas com o Acetato de Glatirâmer, e acho essencial que existam opções diferentes de tratamento para pessoas como eu, que começam a ficar sem opção de medição para manter a qualidade de vida e se manter ativo na sociedade, trabalhando e pagando impostos, ao invés de vir a ter perdas físicas significativas que implicariam em ainda mais necessidade de auxílio do governo, como isenções de impostos e dependência da previdência social.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex - betainterferina 1a e Copaxone - Acetato de Glatirâmer, Positivo: O Avonex apresentou falha terapêutica e eu desenvolvi alergia ao medicamento. Com o Acetato de Glatirâmer estava tudo correndo bem, até eu começar a ficar com deformações no corpo por causa de lipodistrofia., Negativo: O Avonex apresentou falha terapêutica e eu desenvolvi alergia ao medicamento. Com o Acetato de Glatirâmer estava tudo correndo bem, até eu começar a ficar com deformações no corpo por causa de lipodistrofia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico, o que é medida necessária para atualizar O protocolo Clinico de Esclesoe Multipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: medicação oral sem efeitos colaterais e estou sem surtos desde o inicio da medicação, Negativo: nenhum até o momento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Nenhum, Negativo: Muitos efeitos colaterias limitantes</p>
26/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico, o que é medida necessária para atualizar O protocolo Clinico de Esclesoe Multipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quanto maior a gama de terapias disponíveis para esclerose múltipla melhor, tendo em vista que estamos falando de uma doença incerta e cada paciente deve ter maior autonomia pra escolher o remédio que lhe trouxer melhores benefícios.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1a 6000 ui (avonex)Betainterferona 1a 22mcg (rebif), Positivo: O avonex me deixou bem um tempo e ate diminui o tamanho de algumas lesões.Com o rebif não tenho efeitos colaterais., Negativo: O avonex tem uma aplicacao dolorosa e mesmo que leves os efeitos colaterais sempre ocorriam.Com o rebif não tenho efeitos colaterais.</p>
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há muitos pacientes que se dão bem com tal medicamento e procedendo.O objetivo de um medicamento é ajudar, prevenir, curar e por quê não pode ser favorável, se há quem precise?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quanto mais medicamentos forem disponibilizados aos pacientes,maiores são as chances de exito no tratamento no sentido de impedir a evolução da doença e seus danos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon Rebif 22, Positivo: A doença não evoluiu., Negativo: Dores de cabeça ,Dores no corpo .Praticamente todos os dias,dificultando um minimo de qualidade de vida.</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considerando que a doença responde diferentemente em cada paciente a cada medicamento, acredito ser de extrema importância uma maior disponibilidade de medicamentos para que médicos e pacientes possam juntos decidir qual poderá melhorar as condições de vida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: natalizumabVitamina D, Positivo: natalizumabVitamina D ambos causaram pequenas melhoras na mobilidade, Negativo: natalizumab causa muita fraqueza mesmo após vários dias de sua aplicaçãoVitamina D</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: betainterferonaglatiramer, Positivo: os dois tiveram efeitos positivos, Negativo: nenhum efeito negativo para ser relatado</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é muito caro e a maioria das pessoas não tem condições de comprar. A esclerose múltipla é uma doença que precisa de mais atenção do SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento possui em seu princípio ativo uma redução significativa na atividade da doença incluindo os surtos e o desenvolvimento de lesões cerebrais portanto é favorável.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro do medicamento utilizado., Positivo: Teve efeito paliativo, retardou o desenvolvimento da doença., Negativo: Muito lento o processo, demora para realização dos exames medicamento de difícil acesso.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro, Positivo: Retardamento no desenvolvimento da doença, Negativo: Não há cura</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar esse arsenal é medida necessária para atualizar o protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1A 44mg (Rebif), Positivo: A betainterferona por dois anos foi a medicação que auxiliou na contenção da EM, melhorando minha qualidade de vida e permitindo que não ocorressem surtos da doença., Negativo: A betainterferona possui vários efeitos colaterais, principalmente relativos a dor no corpo, dor de cabeça, entre outros relacionados a gripe. Após um período passou a apresentar falha terapêutica (aumento na quantidade de lesões detectado por RM e ocorrência de surtos).</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Nós, os portadores de Esclerose Múltipla, precisamos de um leque maior de medicamentos destinados a controlar a doença, a fim de paralisá-la e evitar novas lesões. Como a Esclerose Múltipla é uma doença degenerativa, pode ocorrer que, ao usar certos medicamentos, há a falha terapêutica, necessitando a mudança para um remédio mais eficaz. Quanto maior a possibilidade de remédios, maior a chance de se controlar a doença, reduzir as lesões e sequelas, dando a possibilidade dos portadores trabalhar, ter uma vida social e uma vida normal.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu estou tomando o Fumarato de dimetila, Positivo: Maior disposição, melhor humor, menos fadiga, menos reações adversas e não precisar ser aplicado por meio de injeção, já que ele é comprimido., Negativo: Inicialmente, eu tive muita gastrite e rubor facial, contudo, com o tempo, esses sintomas diminuíram.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu usei o copaxone - acetato de glatiramer, remédio específico para a esclerose múltipla. Uso o mantidan (cloridrato de amantadina) para fadiga. Uso calmantes naturais, Positivo: Mantidan é indicado para melhor a fadiga e a marcha. O copaxone é indicado para controlar a esclerose múltipla, Negativo: O copaxone me deu muita instabilidade emocional, meu humor variava muito e acabei desenvolvendo depressão. Por ser administrado via injeções diárias, os locais de aplicação, com o passar do tempo, foram desenvolvendo inchaço e vermelhidão, os quais não sumiam e só se acumulavam. Isso resultou em poucos locais disponíveis de aplicação da injeção. O copaxone me deu muitas reações adversas, como palpitação, e severas, como dor aguda nas costas, sensação de morte, perda do fôlego e sensação que fosse desmaiar.</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glatiramer, Interferona, Positivo: Interferona colocou a doença em remissão, Negativo: Glatiramer não controlou a progressão da doença, muita dor na aplicação, dificuldade de armazenamento e transporte da medicação (principalmente em viagens). Interferona controlou a progressão da doença, mas causou muitos efeitos colaterais de dor no corpo/febre e mal estar no dia seguinte à administração do remédio, além da dor na aplicação e dificuldade de armazenamento e transporte da medicação.</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, acredito que quanto mais opções de tratamento maior é chance do paciente se adaptar a determinada medicação e ter uma qualidade de vida melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou portador de EM desde janeiro de 2015 e desde junho do mesmo ano iniciei com o Betainterferona1A da Rebif, Positivo: Desde o início do tratamento não tive mais surtos, sendo que antes do tratamento tive dois surtos em quatro meses., Negativo: Dor de cabeça e cansaço são os efeitos negativos. Tive febre somente nas primeiras aplicações, hoje o maior incomodo é a dor de cabeça que administro com outra medicação como paracetamol ou ibuprofeno.</p>
27/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Antes de tomar o tecfidera, os sintomas da esclerose estavam muito fortes. Após 1 mês de uso, voltei a realizar caminhadas sem precisar parar muitas vezes, e consegui voltar a estudar, o que antes era quase impossível, devido as dificuldades motoras e cognitivas., Negativo: Como efeito negativo, posso citar o rubor, mas se ingerir alguma gordura boa, como a castanha, o rubor se torna ameno, e dura em torno de 20 minutos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aubagio, Positivo: Continuei sentido todos os sintomas da escleros, como fadiga, alteração de sensibilidade. Não funcionou comigo., Negativo: Os efeitos colaterais eram diários, grande perda de cabelo, e diarreia constante.</p>
27/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sendo essa uma doença muito complexa, e o medicamento algo essencial para o tratamento e completamente inacessível para a maioria dos pacientes. Vejo como base fundamental seu fornecimento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A decisão protege o mercado de laboratórios com medicamentos menos eficientes e com mais efeitos colaterais, a revelia do direito a qualidade de vida de nós, portadores de EM. O dimetil-fumerato é um medicamento de maior eficiência, sem problemas para uso e armazenamento e com efeitos colaterais mínimos. Atualmente uso o dimetil-fumerato, tecfidera, com doação do laboratório... O SUS deveria fazer isso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera. Dimetil-fumerato., Positivo: Controle da progressão da doença, EM surto remissão. Efeitos colaterais mínimos. Armazenamento facilitado, pois não precisa de geladeira., Negativo: O pior efeito é experimentá-lo e não ser fornecido pelo SUS, me deixa o efeito de impotência, a mercê de medicamentos que não controlam a doença no meu caso...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramerBeta interferona, Positivo: Nenhum., Negativo: Efeito reboot, com dores horrendas depois da aplicação. Local de injeção supersensibilizado. Armazenamento em geladeira com temperatura supercontrolada. Não controlou a progressão da doença, havendo surtos durante o uso.</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As medicações disponíveis para nós portadores de EM são escassas, com muitos efeitos colaterais e pouca efetividade contra os surtos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif, Positivo: Nenhum, Negativo: Enjôo náusea dor febre ideação suicida</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Natalizumabe, Positivo: A aplicação é de 28 em 28 dias. Não tem efeitos colaterais., Negativo: Ainda não experimentei efeitos negativos.</p>
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Interferon beta, Positivo: Retardou a progressão da doença , Negativo: Dor, mal estar</p>
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço o tratamento há 10 meses com o Tecfidera, obtendo melhora gradativa, inclusive apresentando redução das manchas na medula, apresentadas na RM. Tenho uma qualidade de vida muito melhor com o medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Retorno da sensibilidade nos membros inferiores, que apresentavam parestesia após um surto. Redução das manchas constantes na medula e encéfalo, repetindo a RM após uso do medicamento. Melhora na alteração do humor, redução na fadiga, redução de espasmos e principalmente nas dores., Negativo: Rubor na face e colo e vômitos ocasionais.</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1a 44mcg, Positivo: Ausência de surtos , Negativo: Febre, calafrios, insônia, indisposição.</p>
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fumarato de dimetila,, Positivo: diminuição do índice de surtos anuais, efeitos colaterais administráveis, facilidade dno transporte e na administração por ser oral. , Negativo: desconheço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticóides orais e pulsoterapia e plasmaferese. , Positivo: acabaram com.o surto e houvr recuperacao parcial da visão. , Negativo: variacao da pressão arterial, ansiedade e aumento da glicose. enquanto os procedimentos estavam sendo aplicados.</p>
27/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do medicamento há um ano e desde então não tive mais nenhum surto da doença. Já passei por todos os medicamentos do sus e todos apresentaram falha terapêutica. Preciso muito deste medicamento, estou desempregada por conta da doença e não consigo me aposentar. Peço muito que incorporem ao sus, tenho duas filhas pequenas para criar e não posso mais ter surtos!!!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera , Positivo: Há um ano minha qualidade de vida aumentou muito. Estou sem surtos depois que passei a usar o Tecfidera., Negativo: Nenhum efeito negativo, só positivos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, glatiramer, natalizumab, , Positivo: Só negativo, picadas diárias, semanais d mensais. Dores no corpo e surtos constantes, Negativo: Falha terapêutica Vírus JC</p>
26/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio eficaz e de fácil adesão aos portadores de EM</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Acontece, Capoxone e Rebif, Positivo: Tecfidera. Fácil adesão. , Negativo: Dores, febre, sintomas gripais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Capoxone, Rebif, Avonex e Tecfidera, Positivo: Tecfidera. Fácil adesão. Sem dores. Nem lembro que tomo remedio, Negativo: Rebif, Avonex e capoxone. Dores, febre e sintomas gripais</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Queridos amigos e familiares, vcs poderiam perder uns 5 minutinhos respondendo essas duas consultas públicas!?! POR FAVOR! Elas visam analisar a inclusão de dois medicamentos, o Alentuzumabe (Lemtrada) e o Fumarato de Dimetila (Tecfidera) para Esclerose Múltipla no SUS. Isso é muito importante para nós já que essas medicações são caríssimas! Links:Consulta Pública n. 20:http://bit.ly/opinio20Consulta Pública n.21: http://bit.ly/opinio21* Sugestões de resposta a respeito dos tópicos 6 e 7 do formulário de contribuições de experiência ou opinião:6) A recomendação preliminar da CONITEC foi (20) NÃO favorável à proposta de incorporação do Alentuzumabe indicado para portadores de esclerose múltipla remitente recorrente, previamente tratados com betainterferona ou acetato de glatirâmer. / (21) NÃO favorável à proposta de incorporação do Fumarato de dimetila para o uso após a 1ª falha de tratamento da Esclerose Múltipla e/ou falta de aderência ou intolerância às formas parenterais. Você concorda?(X) Discordo totalmente da recomendação preliminar.7) Comente:A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Via oral, pouquíssimas reações, maior eficácia, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Era necessário, Negativo: Injetável, dolorido, reações fortes de febre, calafrios, dores de cabeça, fraqueza, enjoo por 2 dias seguidos uma vez por semana, difícil armazenamento por necessitar ser refrigerado.</p>
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A EM manifesta-se de diferentes maneiras em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: Pouquíssimos efeitos colaterais, fácil aplicação, seguro, não costuma faltar o medicamento, pode ser tomado durante a gravidez., Negativo: Injeções diárias, não ser via oral, dor e ardência decorrente das injeções,</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do medicamento há um ano e desde então não tive mais nenhum surto da doença. Já passei por todos os medicamentos do sus e todos apresentaram falha terapêutica. Preciso muito deste medicamento, estou desempregada por conta da doença e não consigo me aposentar. Peço muito que incorporem ao sus, tenho duas filhas pequenas para criar e não posso mais ter surtos!!!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera , Positivo: Há um ano minha qualidade de vida aumentou muito. Estou sem surtos depois que passei a usar o Tecfidera., Negativo: Nenhum efeito negativo, só positivos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, glatiramer, natalizumab, , Positivo: Só negativo, picadas diárias, semanais e mensais. Dores no corpo e surtos constantes, Negativo: Falha terapêutica Vírus JC</p>
26/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este é um medicamento que poderá auxiliar no tratamento de milhões de portadores desta doença.A Anvisa aprovou esse medicamento. Portanto, não tem pq não ser oferecido aos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considero muito importante a incorporação do fumarato de dimetila, inclusive para primeiro uso, oferecendo um maior arsenal de medicamentos comprovadamente eficazes na melhoria da qualidade de vida dos portadores de esclerose múltipla, para que cada paciente seja medicado de forma individualizada com o melhor medicamento desde seu primeiro uso, garantindo assim redução dos surtos e danos à bainha de mielina, o que gerará maior qualidade de vida ao paciente o mais rápido possível. Também é bom destacar a vantagem para os pacientes quanto ao uso do fumarato de dimetila, que é um medicamento oral que não demanda refrigeração, garantindo maior liberdade ao usuário a ir e vir sem se preocupar com o armazenamento de sua medicação sob refrigeração além de eliminar a necessidade de se perfurar para aplicar medicamentos injetáveis.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha esposa foi diagnosticada há três meses com EM e vem utilizando Tecfidera desde o primeiro uso, escolhido à partir das opções indicadas pelo médico para a condição específica da doença da minha esposa., Positivo: Uso oral, efeitos colaterais mínimos e pouco incômodos, sem necessidade de armazenagem em refrigeração, sem necessidade de se aplicar injeções e sem ocorrência de novos surtos após o início do tratamento com essa medicação., Negativo: Até o momento, com dois meses de uso, sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimode, Positivo: Usava o rebif e os efeitos colaterais eram muitos e as falhas terapeuticas geravam duvidas sobre o meu bem estar futuro, inclusive capacidade laboral. A troca da medicação foi fundamental para o meu bem estar atual,, fisico, emocional e psicológico. , Negativo: Rebif é uma mal estar generalizado com adata marcada, dia sim dia não. A falha ttrapeutica leva a repetição maior dos surtos da doença a necessudade de pulsoterapia. Internação. .. licença médica. .. mal estar.... insegurança emocional....</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif - interferon e pulsoterapias com altissimas doses de cortizona, Positivo: Intetferom foi util um período, mas não foi suficiente. Pulsoterapia interrompe a crise inflamatória. , Negativo: Interferon:febre, calafrios, sudorese, cefaléia intensa, dores musculares, manchas vermelhas no local da aplicação, enjôo. Pulsoterapia: reclusão hospitalar, náuseas, vômitos, confusão mental e emocional, dores de cabeça, alterações de paladar, fome intensa, almento de peso, inchaço corporal, sensação de dor na pele, boca seca, intestino preso, queda de cabelo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pode ser que o medicamento não apresente mais respostas negativas mas para isso temos que testar. Não tem como ficar sem, não posso ficar doente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona - interferon 1a, Positivo: Não tive muitos surtos., Negativo: Estou cansada de usar injeções e acredito que um medicamento em comprimido seria muito melhor. Fora que ele deixa o local avermelhado, dolorido e direto tenho sintomas de gripe por causa dele.</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, Positivo: Comecei o tratamento essa semana , Negativo: Aplicação semanal alternando as coxas</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon-beta1a, Positivo: Controle de surtos e evita progressão da doença , Negativo: Nenhum. Os benefícios do uso superam os efeitos colaterais que podem ocorrer.</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Aplicação simples, semanl, Negativo: Efeitos colaterais, dor na aplicação</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo medicamento desta natureza deve ser disponibilizado gratuitamente aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1.a 30mg, (Caneta injetável), Positivo: Após o início do tratamento com referido medicamento, não houve remissão (novo surto), Negativo: Efeitos colaterais, diminuídos ao longo do uso, porém sempre estiveram presentes em 7 (sete) anos de uso.</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex - Betainterferona 1A, Positivo: Minha esclerose regrediu para grau 1, Negativo: Efeitos colaterais como febre, insônia, náuseas e dores no corpo</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Desenvolvi pânico dá medicação intramuscular, pela dor que causava não só na aplicação,mas também nos dias seguintes a esta. O fumarato de dimetila foi o medicamento a que melhor me ajustei</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona e fumarato de dimetila, Positivo: Betainterferona: era apenas uma vez por semanaFumarato: efeitos colaterais não afetam minha qualidade de vida e é comprimido., Negativo: Betainterferona: efeitos colaterais afetavam minha qualidade de vida. Não conhecia dormir e nos dias seguintes à aplicação sentia muita dor no corpo, influenciando nas atividades no dia-a-dia e conseqüentemente na minha qualidade de vida.Fumarato: as primeiras semanas tem efeitos colaterais bem intensos</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento que ajudará muito no tratamento da minha filha se ele for disponibilizado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Betainterferona interferon 1a, Positivo: É fácil e rápido de aplicar., Negativo: ELA FICA TRISTE QUANDO EU APLICO ESSA INJEÇÃO E ELA CHORA, AS VEZES MUITO, E JA ESTÁ CANSADA DE TODA ESSA INJUSTIÇA.</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: AvonexCopaxoneGyleniaE agora Tecfidera (fumarato de dimetila), Positivo: Tive falhas terapeuticas com Copaxone e AvoneCom Gylenia tive alteracao dos niveis hepaticos Com Tecfidera tenho tido boa resposta sem contar a melhora da qualidade de vida por ser uma medicacao oral e com minimos efeitos colaterais, Negativo: Avonex - Grandes efeitos colaterais,baixa qualidade de vida (injetavel),falha terapêuticaCopaxone - Baixa qualidade de vida (injetavel),falha terapêutica Gylenia - Boa qualidade de vida (oral),poucos efeitos colaterais, apresentações de altetacoes das enzimas hepáticasTecfidera - otima aceitação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AvonexCopaxoneGyleniaTecfidera, Positivo: Avonex - Nenhum ponto positivoCopaxone - Nenhum ponto positivoGylenia - Via oral (boa qualidade de vida) mas apresentou alteracao de enzimas hepáticas Tecfidera - Via oral (boa qualidade de vida) e nenhuma inter correnca ate o momento, Negativo: Avonex - Grandes efeitos colaterais,baixa qualidade de vida (injetavel),falha terapêuticaCopaxone - Baixa qualidade de vida (injetavel),falha terapêutica Gylenia - Boa qualidade de vida (oral),poucos efeitos colaterais, apresentações de altetacoes das enzimas hepáticasTecfidera - otima aceitação</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon, Avonex, Fingomilod e Natalizumab., Positivo: Betaferon com pouco insultos, natalizunab tenho uso de 5 meses. A, Negativo: Avonex insulto de 6 à 6 meses e Fingomilod abaixava a minha imunidade.</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Deveria ser fornecido para todos os pacientes com esclerose múltipla,que se adapte ao tratamento.Ja que é um tratamento menos invasivo,menos agressivo fisicamente e emocionalmente para o paciente é para família que convive com o paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Experiência com medicamento Betainterferona 1 A,AVONEX., Positivo: Fácil aplicação e principalmente controle da doença,que é sua maior eficácia e beneficio. O que acalma e conforta no momento da aplicação., Negativo: O medicamento é invasivo,dolorido a picada e o líquido entrando,em algumas aplicações fica-se com hematoma no local da aplicação. Fragilidade emocional para o paciente e para familiares que convivem com o paciente.</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon, Copaxone, Fingolimode, Natalizumabe, Positivo: Fiingolimode, tomei por 13 meses e tive 1 surto, dentro da minha média de surtos.Natalizumabe, estou na décima quinta infusão e sem surtos., Negativo: Betaferon, aumentou muito as enzimas hepáticas e tive que parar.Copaxone, tive uma reação alérgica muito forte e tive dificuldade em tomar todos dias e com as dores nos locais de aplicação.</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera, Positivo: Redução o percentual de incidência de surtos anuais, efeitos colaterais de fácil administração e praticidade no transporte e consumo., Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: corticóides orais, pulsoterapia e plasmaferese, Positivo: Remissão do surto. Recuperação parcial dá visão., Negativo: Corticóide - oscilação dá pressão arterial e dá glicose. Plasmaferese baixa dá pressão arterial.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beta Interferona 1a -Avonex, Positivo: Utilizo o Avonex desde q fui diagnosticada em 2014, no primeiro surto e nunca mais tive nenum surto ou progrçao da doença., Negativo: Não há nenum efeito negativo nesta medicamento. Apenas me incomodo com o fato do cuidado contante que devo ter devido ao seu refrigetamento</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1a, Positivo: Uma vez por semana, Negativo: No início tive febre leve, atualmente não tenho qualquer reação</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Não tive mais surtos, Negativo: Apenas pq é injetável</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o medicamento deve ser incorporado, como mais uma opção de tratamento para os pacientes com Esclerose Multipla que tiveram falha terapeutica e para aqueles que tem impossibilidade de tomar outro tipo de medicamento. Visto que o fumaratob de dimetila mostou ser eficiente no controle da progressão da doença nos pacientes que apresentam a doença em sua forma Renitente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do fumarato de dimetila, Positivo: Está sendo eficiente no controle de novos focos e de atividades inflamatórias relacionadas à Esclerose Múltipla, Negativo: Não evidenciei nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex e Copaxone, Positivo: Ambas as medicações estão disponíveis pelo sistema único de saúde., Negativo: Ambas as medicações não foram eficientes para o controle da progressão da doença.</p>
27/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois faz parte do argumento do protocolo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Rebif, Positivo: Avonex. Aplicação uma vez por semana, reduzindo a possibilidade de não adesão ao tratamento, Negativo: Falha Terapêutica</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: TECFIDERA , Positivo: mais uma tentativa de lidar com EM , Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif, Fingolimoid , Positivo: Nenhum , Negativo: Não funcionaram. Mal estar Febre.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Hoje não existe nenhum medicamento disponível no SUS para pessoas que estão no início da doença, ou seja, é preciso ter um quadro mais agravado para poder iniciar com alguma medicação disponível. Isso é um total absurdo. Faço uso do Tecfidera há mais de 1 ano, não possuo sequelas causadas pela doença justamente porque uso ele desde o início, e provavelmente se outras pessoas tiverem acesso a este medicamento, não vão precisar passar por grandes traumas ou surtos que podem atrapalhar suas vidas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Apenas o Tecfidera., Positivo: 1 ano e 5 meses fazendo uso do medicamento e sem nenhum sintoma da Esclerose Múltipla e sem nenhum novo surto. Medicamento não possui quaisquer efeitos colaterais na maioria das vezes, e quando tem, são muito pequenos que não atrapalham meu dia-a-dia., Negativo: O único defeito deste medicamento é ele ainda não ser fornecido pelo SUS.</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovadas pela</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera.240 mg , Positivo: Não teve nenhum efeito colateral , sentiu-se bem disposto. , Negativo: Antes do Tecfidera sentia cansaço, mal estar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Betainterferona, Positivo: Não mostrou muita mudança , Negativo: As veias ficaram fracas, sangramento</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Não tenho efeitos da doença desde o início da administração do medicamento, Negativo: Preciso tomar outro medicamento para amenizar os efeitos colaterais do avonex</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitas pessoas dependem da inclusão desse medicamento no SUS. Ao meu ver o parecer foi desfavorável, principalmente, quanto ao custo elevado do mesmo. Ora, senhores, se para o governo federal que recebe trilhões em tributos, e levando em consideração que estamos trabalhando quase 5 meses somente para pagar tributos Municipal, estadual e Federal. Nada mais justo e sensato que o governo tenha este ônus, pois se tiver competência dá pra incluir este como diversos medicamentos e ainda assim vai sobrar recursos. A parcela da população que usa este medicamento é pequena e a grande maioria dela de poder aquisitivo reduzido.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex interferon 6.000.000, Positivo: Tive três surtos frequente e passei a usar o medicamento uma vez por semana e os surtos pararam , Negativo: No início me sentia como se estivesse pegando um resfriado agora não sinto mais mas no dia da vacina procuro beber mais água do que do costume</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, fingolimode e natalizumabe, Positivo: Controle dos surtos, Negativo: Avonex - aplicação</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso e está sendo bem eficaz. Bem melhor que os interferindo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Bem melhor que as injeções. Não há efeitos colaterais. Não tive mais surtos. Mais barato para o Sus., Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Não há , Negativo: Efeitos colaterais fortíssimos. As agulhas deixaram minhas pernas dormentes. Além de ser muito mais alto o custo para o Sus</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quem sofre de rejeição a formas de tratamento principais deve ter acesso a outros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, É necessária uma produção rápida mas, em contra ponto, se faz necessário mais tempo de pesquisa e desenvolvimento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex (betainterferona), Positivo: Controle, Negativo: Muitas reações adversas, dores musculares e a logística delicada</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o protocolo clínico de Esclerose múltipla e permite maior disponibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior numero possível de opções seguras e eficazes. o medicamento em questão é uma dessas opções aprovada pela ANVISA..</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone e tysabri, Positivo: Copaxone: auto-aplicacao.Tysabri: Espaçamento dos surtos., Negativo: Tysabri: Dependência de aplicação por profissionais da saúde. Copaxone: Aplicação diária.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beta Interferon. Copaxone, Positivo: Nenhum, Negativo: Sintomas de gripe. Dor de cabeça</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex e Natalizumabe, Positivo: Avonex ...muitas reações Natalizumabe - - Melhorou muito o andar , equilíbrio e o humor, Negativo: Avonex - muias reações e muitos surtosNatalizumabe - Algumas reações no organismo....Jc positivo.</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faltam opções de tratamento, se o mesmo já foi testado e alguns pacientes se adaptam bem com ele. O mesmo deve ser liberado. Os gastos para pedir liberação via liminar, são consideráveis e muitas vezes não conseguimos pagar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera , Positivo: Sem problemas na aplicação da injeção, onde já tive com o copaxone., Negativo: Não tem estudo para pessoas que têm tem problemas com aumento da pressão intracraniana.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex e copaxone , Positivo: Copaxone não tinha nenhum efeito colateral e a injeção não era dolorida, fácil de aplicar. Foi o que mais me seguiu sem surtos.Avonex era apenas uma vez por semana., Negativo: Avonex, muito efeito colateral, febre, indisposição. Injeção difícil de aplicar e não tinha injeção tradição para pedir para um profissional aplicar.Copaxone, causou alguns nódulos nos pontos de aplicação. Isso causou uma falha terapêutica.</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: COPAXONE E REBIF 44, Positivo: REBIF- APLICADO SOMENTE 3 VEZES POR SEMANACOPAXONE- NAO DA MUITOS EFEITOS COLATERAIS EM MIM, Negativo: REBIF- MUITOS EFEITOS COLATERIAS- SINTOMAS GRIPAISCOPAXONE- DEVE SER PLICADO TODOS OS DIAS</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A esclerose múltipla já é por si só uma enfermidade degenerativa progressivamente incapacitante cujo protocolo vigente é, além de economicamente penosa de sustentar, de resultados clínicos insatisfatórios para conter os avanços dos agravos dessa entidade clínica, e necessita muito da inclusão de novas drogas que melhorem os resultados estatísticos de controle dessa afecção de saúde. A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, é muito necessário para o arsenal terapêutico, que já é muito restrito, economicamente difícil de manutenção aos pacientes e suas famílias. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico da Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tecfidera, Positivo: Não presenciei até o presente novos surtos em pacientes já com oito meses de acompanhamento clínico., Negativo: Sintomas gastrintestinais e surtos de rubores de fogachos de calores com tonturas e sudorese transitórios. Todos toleráveis.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pulsoterapia com metilprednisolona e predinisona oral.Plasmaferese., Positivo: Contensão insatisfatória do agravo agudo dos surtos de esclerose múltipla com a combinação da pulsoterapia de corticosteróides com a plasmaferese. , Negativo: Risco elevado de vida e de complicações pela plasmaferese, risco de trombose, complicações hemodinâmicas, distúrbio de coagulação; e reações adversas sintomáticas com palpitações, taquicardia, náuseas,dispepsias, rubores, tonturas, desconfortos torácicos decorrentes da metilprednisolona e da predinisona .</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou portador de Esclerose múltipla e a 1 ano e 6 meses venho fazendo o tratamento com fumarato de dimetila e minha doença está parada, nunca mais tive crises e nada relacionado a doença.Faço tratamento particular</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera 240mg, Positivo: A doença está para, nunca mais tive nada ., Negativo: Até hoje tenho muita diarreia por causa do medicamento</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Resultados muito favoráveis no uso do medicamento pela minha amiga.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 22 e 44mg, Avonex, Betaferon e Natalizumabe., Positivo: Natalizumabe foi o melhor de todos. Tive melhora no problema de incontinência urinária e diminuição de lesões., Negativo: Medicamentos à exceção do Natalizumabe, não senti melhoras.</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os portadores de esclerose múltipla precisam de mais opções de medicações para o tratamento da doença, pois, muitos desses fornecidos pelo SUS não são bem tolerados e muitas vezes não oferece a eficiência no controle da doença .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon (Rebif) 44 mcg, Positivo: A favor da doença, nenhum, em 6 meses de uso do interferon continuei apresentando um surto por mês, Negativo: Mesma resposta dá questão acima. .muitos efeitos colaterais indesejáveis</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso dessa medicação e está sendo muito bom para meu tratamento, sem nenhuma lesão nova em 2 anos de tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Em dois anos de tratamento, não tive nenhuma lesão nova, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex, Positivo: Não avanço da doença , Negativo: Efeitos colaterais indesejados</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Absurdo ainda ter que passar por recomendação preliminar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon 1bNatalizumab, Positivo: Após o uso do betaferon ao longo de 2 anos tive que trocar para o Natalizumab que me deu uma melhor qualidade de vida, Negativo: Betaferon me deixava com dores no corpo e febre</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Precisamos pensar nos pós e nos contras , porém esse medicamento pode melhorar o problema de muitos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Somente com Avonex - Interferon..., Positivo: Em nove anos sendo portadora de Esclerose Múltipla, só usei e uso Avonex- beta interferon, e nestes anos todos só tive um surto e foi o primeiro antes de usar o remédio., Negativo: Não sei se pode ser considerado negativo, mas após usar tenho efeitos colaterais (dores fortes por todo corpo , febre, desânimo)</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex, Positivo: Não avanço da doença., Negativo: Efeitos colaterais indesejados.</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na Esclerose Múltipla cada paciente responde diferente a medição,o que surge efeito pra uns não significa que exito pra outros . É uma patologia complexa se tem a possibilidade de nova medição porque não aprova-la par que pacientes que até agora não tiveram êxito com as que já estão a disposição possam ter oportunidade de uma nova medição.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rebife, Positivo: Minha filha utilizou por alguns foi bom ? Foi mais depois não surtos mais efeito., Negativo: Depois de um tempo de tratamento o mesmo não fazia mais efeito.</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Esclerose Múltipla por ser tão grave e atingir uma grande variedade de indivíduos também se faz necessário uma grande variedade de medicamentos a disposição.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon, Positivo: Foi possível uma redução dos surtos, Negativo: São os efeitos colaterais</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu tive a oportunidade de ver a luta de uma amiga para conseguir esse medicamento todo mês para seu esposo,portador dessa enfermidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A EM trata-se de uma doença muito individual. Ela se manifesta de maneiras diferentes em cada indivíduo. Por tanto, alguns pacientes não se adaptam aos medicamentos disponíveis no SUS. Os efeitos colaterais dessa medicação são bem menores que os das medicações disponíveis. Sem mencionar que essas medicações tem alta risco de infecção pelo vírus JC.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, fingolimoide, corticoide e fumaram de dimetila. , Positivo: Betainterferona não tem efeitos positivos.Fingolimoide mesmos efeitos adversos que o betainterferona e é via oral.Corticoide não tem efeitos positivos.Fumarato de dimetila tem menos risco de desenvolver infecção por vírus JC, é via oral e tem menos efeitos adversos., Negativo: Betainterferona tem muitos efeitos adversos sérios. E é injeção. Fingolimoide tem risco para desenvolver infecção pelo vírus JC. Corticoide tem muitos efeitos adversos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, fingolimoide, corticoide e fumaram de dimetila, Positivo: Betainterferona não tem efeitos positivos.Fingolimoide mesmos efeitos adversos que o betainterferona e é via oral.Corticoide não tem efeitos positivos.Fumarato de dimetila tem menos risco de desenvolver infecção por vírus JC, é via oral e tem menos efeitos adversos., Negativo: Betainterferona tem muitos efeitos adversos sérios. E é injeção. Fingolimoide tem risco para desenvolver infecção pelo vírus JC. Corticoide tem muitos efeitos adversos.</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Direito a saúde é um direito constitucional então todas as formas de tratamento existentes devem ser disponibilizadas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Apenas com o Tecfidera., Positivo: Tive melhora significativa em uma lesão na coluna Vertebral., Negativo: nos primeiros 2 meses de tratamento tive vermelhidão na pele 3 horas após tomar a medicação.Esses sintomas foram reduzidos até que pararam.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon, Positivo: Durante os 7 anos de tratamento tive apenas 1 surto., Negativo: após os 7 anos de tratamento tive uma lesão na coluna vertebral e minha médica optou pela troca da medicação.</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A não incorporação do medicamento protege os laboratórios e impede que os pacientes tenham acesso gratuito a medicamentos que controlam a doença, especialmente se tratando de um medicamento que é o mais utilizado nos EUA e mais barato do que os demais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Não tenho base de qq conhecimento para opinar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Auxilia na prevenção de surtos., Negativo: Ainda não senti.</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fiz parte do programa de pesquisa e só parei pq pretendo engravidar. Conhecem a expressão "Um santo remédio "?!?! É o tecfidera. Precisa ser incorporado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera , Positivo: Diminuição dos surtos e não houve novas lesões em 2 anos de uso, tampouco lesões em atividade. Isso é a sorte grande de um portador de esclerose múltipla. O fato de ser em comprimidos deixando viável viagens, ou seja, tornando a vida do portador perfeitamente possível e normal., Negativo: Como todo e qualquer medicamento há efeitos colaterais mas passageiro.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Passei a usar copaxone. , Positivo: Menos efeito colateral. , Negativo: Não me agrada tomar injeção todos os dias, difícil transporte, viagem e dói depois aplicação</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: TysabriInterferonsGylenia, Positivo: Nenhum, Negativo: Sem efeitos</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, No caso das outras medicações usadas não darem resultado os pacientes tem direito de tentarem tudo que for possível. No meu caso o interferon beta tem funcionado muito bem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos medicamentos devem estar disponível para os pacientes, cada pessoa se adapta a um tratamento diferentes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Sem surtos a 3 anos, Negativo: Efeito colateral do medicamento.</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ótima medicação</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Sem dores, sem efeitos colaterais , Negativo: Vermelhidão</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se um remédio não faz efeito, deve-se tentar outro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Precisamos pensar nos pós e nos contras , porém esse medicamento pode melhorar o problema de muitos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Somente com Avonex - Interferon..., Positivo: Em nove anos sendo portadora de Esclerose Múltipla, só usei e uso Avonex- beta interferon, e nestes anos todos só tive um surto e foi o primeiro antes de usar o remédio., Negativo: Não sei se pode ser considerado negativo, mas após usar tenho efeitos colaterais (dores fortes por todo corpo , febre, desânimo)</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex, Positivo: Controle efetivo da doença , Negativo: Febre, mialgia, astenia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex, Positivo: Paciente não apresentou avanços da doença , Negativo: Paciente teve muitos efeitos colaterais indesejados</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beta Interferona 1a -Avonex, Positivo: Utilizo o Avonex desde q fui diagnosticada em 2014, no primeiro surto e nunca mais tive nenum surto ou progrqcao da doença., Negativo: Não há nenum efeito negativo nesta medicamento. Apenas me incomodo com o fato do cuidado contante que devo ter devido ao seu refrigetamento</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, fiz o relatório da CONITEC e como relata elevado grau de incerteza quanto a suas superioridade em relação aos imunomoduladores (beta interferonas e acetado de glatirâmer) como também alto impacto financeiro, entendo que devo concordar com a posição da CONITEC</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: faço controle da EM há mais de três anos com a medicação AVONEX (betainterferona 1a - intramuscular). Após primeiro surto, e até o momento, com a graça de Deus e o acompanhamento da Dra. Natasha Consul, não tive mais surtos., Positivo: Como efeito positivo, NÃO ter mais surto desde o 1º caso, ocorrido há mais de três anos., Negativo: Não posso dizer que seja efeito negativo, em virtude da eficácia da medicação, mas ocorre um incômodo após as aplicações, retratadas em dores no corpo, que são facilmente sanadas com a ingestão de um comprimido para dor (buprovil - ibuprofeno) quatro horas antes de tomar a injeção.</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: betainterferona, Positivo: evolução positiva da patologia, Negativo: injeções</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se temos a oportunidade de ter novos e mais modernos medicamentos, pq não dar a opção para os pacientes que necessitam dela</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Aumento da força muscular e efeitos colaterais bem mais amenos, Negativo: Até o momento não senti</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon Beta 1B e gylenia, Positivo: O gylenia foi tranquilo no começo, Negativo: Interferon por ser injetável me gerava muita dor nos locais de aplicação e muito mal estar físico. O gylenia no começo foi tranquilo, mas ao longo do tratamento me causou muita dor de estômago.</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma nova esperança para os portadores da doença, com resultados positivo em outros países. Este medicamento tem a vantagem de ter menos efeitos colaterais, o que afeta significativamente a vida do portador.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Bom controle da evolução da doença, Negativo: Efeitos colaterais que afetam as atividades diárias frequentemente (uma vez por semana)</p>
29/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento recomendado por especialista</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex, Positivo: Não avanço da doença, Negativo: Efeitos colaterais indesejados</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA. Além disso minha mãe tem Esclerose Múltipla e já testou diversos medicamentos, com efeitos colaterais horríveis em que ela sempre ia parar no hospital internada. Começou a usar este medicamento há um ano atrás e a partir daí não teve mais nenhum surto. Não temos condições de pagar o medicamento e precisamos dele disponibilizado pelo SUS, pelo bem de nossa família.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos tem direito a uma vida digna,alguns precisa de remedio para isso!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitas pacientes necessitam desse medicamento, suspender o uso seria prejudicial ja que esse medicamento esta ajudando muito no tratamento de pessoas com esclerose múltipla.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser incorporado já que o medicamento antigo não está dando resultado esperado para os portadores de EM</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é de suma importância para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aubagio, Positivo: Via oral sua administração . Não invasivo e sem efeito colateral . Otimo, Negativo: Não tem</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: corticoides, betainterferona, natalizumabe, glatirâmer, Positivo: aumento da força motora na perna afetada, Negativo: não observado</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex e, atualmente, gilenyaMas tenho amigos que necessitam recorrer a justiça p ter o tecfidera, Positivo: Gilenya: controle da doençaAvonex: , Negativo: Gilenya: afeta o fígadoAvonex: sintomas gripais após administração, administração injetável</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44mcg, Positivo: Rebiff 44 reduziu a quantidade dos surtos., Negativo: Rebif machuca no local da aplicação. Dor generalizada no corpo após aplicação febre alta</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois é um medicamento utilizado nos EUA como primeira linha e mostra muitos resultados positivos conforme os dados levantados nos EUA. So que é portador dessa enfermidade sabe o quanto é difícil encontrar um medicamento que possa ajudar a controlar a doença, aumentando a quantidade aumenta mais nossas chances de não termos surtos que possam diminuir nossa qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Iniciei o tratamento a 2 meses e meio, vi melhoras em sentido de caminhar, dormir, diminuiu a ansiedade, recuperação de alguns efeitos que as lesões causaram e fácil de se adaptar por serem comprimidos., Negativo: Tive um surto na troca do copaxone para ele, pois o copaxone não ajudou estabilizar minha esclerose então ainda não dá para dizer se foi o tecfidera que não segurou, pois está muito cedo para dizer falha terapêutica</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: Nenhum., Negativo: Tive 4 surtos em 6 meses.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio tem um valor muito alto, e muitos não tem como comprar e é muito importante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É importante aumentar as possibilidades de escolha para médicos e pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera 240mg, Positivo: Não tive efeitos colaterais a medicação. A forma de administração é ótima, comparada aos similares injetáveis. Para quem descobre a doença tomar os comprimidos é um método que não choca tanto quanto as injeções. , Negativo: Não vejo efeitos negativos ainda.</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acredito que deva ser dada mais esta opção de medicamento para uma doença autoimune e degenerativa tão agressiva. Se todos os outros tratamentos de primeira linha (interferons e acetato de glatiramer) apresentaram falha terapêutica, o médico deve ter a opção de mais medicamentos para indicar ao paciente, já que o natalizumabe e o fingolimode (também disponíveis nas farmácias de alto custo) podem prejudicar o paciente que já tenha outros agravantes devido às reações adversas que podem ser causadas por estes medicamentos. Creio que quem deve decidir sobre a melhor linha de tratamento para o paciente seja o médico, que tem informações sobre o histórico do paciente. Quanto mais opções para estabilizar ou diminuir o progresso de uma doença degenerativa, melhor. Isso agiliza o processo e diminui as chances de complicações maiores.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon Beta 1-b (Betaferon), Acetato de glatiramer (Copaxone)., Positivo: Utilizei o interferon beta 1-b por 1 ano e apresentou falha terapêutica. Tive muitos surtos e então trocaram para o Acetato de Glatiramer. Tive somente 2 surtos em 8,5 anos de tratamento com este medicamento., Negativo: Comecei, há alguns anos, a apresentar reações adversas do Acetato de Glatiramer. Apresento lipopatia severa em todos os locais de aplicação e secura de mucosas. Atualmente, estou na justiça tentando obter o teriflunomida.</p>
28/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que o medicamento para Esclerose Múltipla deveria ser distribuído pelo sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu faço uso do Tecfidera, pois tive falha terapêutica em outras 4 medicações e estou fazendo uso a 1 ano e três meses e meu organismo se deu bem com ele, por isso ele tem que entrar na lista dos medicamentos liberados pelo Sus, para o bem de muitos portadores que fazem uso dele, liberem o Tecfidera (fumarato de Dimetila), obrigada</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Comecei com o Avonex, depois fui para o Copaxone, Natalizumabe, Gylenia., Positivo: Com o Avonex, tive 3 surtos em 1 ano, com o Copaxone surgiram dez lesões no meu cérebro, com o Bnatalizumabe, o meu JC deu positivo, só pude tomar por dois anos, com o Gilenya tive 2 surtos em 10 meses, aí mudei para o Tecfidera, e sem surto até hoje, Negativo: Com o Avonex, nos primeiros meses o ruim era ter febre e mal estar, com o Copaxone, não tinha nada, nas como surgiram as dez lesões, ele não estava segurando, com o Gylenia, de vez sentia palpitação no coração, e com o Tecfidera, só um vermelhidão que dura uns 20 minutos</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se é uma opção para a cura, deve estar à disposição do público que precisa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nós pacientes, vivemos na expectativa de um tratamento menos invasivo e agressivo, em busca de diminuir os efeitos da doença. Os medicamentos atualmente disponíveis causam inúmeros efeitos colaterais, os quais necessitam de outros medicamentos para suportá-los.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone e Avonex, Positivo: O Copaxone não trouxe nenhum efeito positivo. Já o avonex, apesar de ser muito dolorido e me deixar incapacitada no dia de sua aplicação (mesmo tomando os analgésicos, ainda sinto fortes sintomas de gripe, dor no corpo, calafrios, febre alta, etc) tem controlado os surtos., Negativo: O Copaxone causou alergia no local da aplicação (vermelhidão e coceira insuportáveis). Avonex já citados acima.</p>
27/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera , Positivo: Qualidade de vida, poucas reações, redução de surto, estabilidade da doença , Negativo: Como usuária do tecfidera não tenho nada a reclamar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44mcg, Positivo: Nenhum , Negativo: Pior experiência da minha vida</p>
28/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: rebif 44mcg, Positivo: devido a tantas reações negativas, não observei efeitos positivos, Negativo: Dores por todo corpo, febre diária, descamação da pele do corpo, dores nas articulações, estado semi-vegetativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Azatioprina, Positivo: Não houve mais surtos dentro 6 meses de uso., Negativo: Queda excessiva de cabelo, problemas gastrointestinais</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fumarato, Positivo: Melhora motora do paciente , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento muito útil para o não andamento da Doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Frone avonex e rebiff22, Positivo: Muita melhora, Negativo: Nenhum</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho na família que usa e está muito bem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de Dimetila, Positivo: Fumarato de Dimetila - Nunca tive surto durante o tratamento., Negativo: Fumarato de Dimetila - Efeitos colaterais levíssimos: rubor e alergia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona., Positivo: Nenhum, Negativo: Tive um surto durante o tratamento. Efeitos colaterais fortes: gripe, febre, tristeza, depressão.</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1A 44mg, Positivo: Estabilidade da doença, Negativo: Efeitos colaterais</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Após apenas a primeira falha não é possível abolir a medicação, tratamentos novos devem ser testar e re-testados várias vezes antes de ser excluído como opção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fingolimode, Positivo: Não causa náuseas ou efeitos de mal estar colaterais , Negativo: Deixa machas roxas no local de aplicação</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento tem se mostrado um recurso eficaz em muitos pacientes. Como portadora de EM RR, utilizei betainterferona 1A e sofri demasiados efeitos colaterais que sobrepuseram os efeitos positivos do medicamento. A substituição por fumarato de dimetila foi extremamente positiva, tanto em relação aos efeitos colaterais quanto a praticidade da via de administração em relação ao medicamento anterior.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila (Tecfidera), Positivo: O medicamento mostrou-se eficaz nos exames de laboratório e imagem, além de possuir efeitos colaterais muito mais toleráveis em relação a medicamentos como a betainterfeona 1A. A via de administração é muito menos invasiva, o que também o torna muito mais prático. A injeção intramuscular sempre foi um procedimento muito difícil para mim, portanto a mudança nesse aspecto foi extremamente significativa. , Negativo: Possui efeitos colaterais como dores abdominais, diarreia (somente nas primeiras semanas de uso) e rubor, porém são praticamente insignificantes comparados aos do medicamento anterior, dos quais incluíam enxaquecas fortes, dores musculares, calafrios e febre que persistiram por pelo menos um ano de uso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1A (Avonex), Positivo: Mostrou-se eficaz no combate a doença, prevenindo surtos durante todo seu tempo de uso., Negativo: Cada dose era acompanhada de efeitos colaterais intensos, que foram citados anteriormente. A via de administração (injeção intramuscular) era também, em geral, um processo extremamente incômodo - tanto físico como psicologicamente.</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, Positivo: O controle da doença , Negativo: Efeitos colaterais: dor no corpo, dor de cabeça, lesão no local da aplicação</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acompanho o tratamento com este medicamento em um amigo e é a droga de escolha entre seus médicos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferona 1B 44mcg RebifNatalizumab (Tysabre), Positivo: Não posso reclamar de nenhum das medicações me sentia bem com ambos, a troca só ocorreu devido ao interferona não estar mais segurando pra não ativar a EM e com Natalizumab foi td ótimo pois nunca mais tive surtos, agora resolveu trocar por motivos de infecções., Negativo: Interferona não tem.Natalizumab começou a dar problemas com infecção de urina e leucocitose muito alta, fora isso me sem bem.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Embora concorde com a incorporação pelo SUS do medicamento, pelo valor elevado ao consumidor final, o valor parece ser também elevado para o sistema de saúde. Mas, o sistema de saúde(contribuintes) é o único que pode absorver essa dívida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44, Avonex e natalizumabe(tysabri)., Positivo: Rebif 44 e Avonex- não vi efeitos positivos. Continuei a ter surtos. Tysabri- praticamente não tive mais surtos e efeitos colaterais a curto prazo., Negativo: Avonex e Rebif 44- efeitos colaterais gripal, impossibilitando de continuar atividades cotidianas. Além do desconforto por ser injetável. Natalizumabe- temor em desenvolver a doença de LEMP, devido ao vírus JC.</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Naovejo sentido na recomendacao, dado que entendo que os tratamentos devem sim passar por correcoes quando das intolerancias ao medicamento e falha no tratamento independente de ser a primeira ou nao. Deve ser dado aos pacientes com a doenca, as opcoes mais modernas e eficazes disponiveis. Afinal estamos falando de saude e da vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, NOS PACIENTES TEMOS DIREITO DE SER TRATADOS COM OUTRAS FORMAS POIS SE A PESSOA NÃO SE ADPTA COM OUTRAS TERAPIAS TEM QUE TER OUTROS TRATAMENTOS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: BETAINTERFERONCORTICOIDES, Positivo: NÃO TEM EFEITOS POSITIVOS, Negativo: MUITA DOR, DIFICUDADE DE ESTAR LEVANDO EM VIAGENS LONGAS E APLICAR EM LUGARES QUE NÃO TEM UM RESERVADO PARA PREPARO E APLICAÇÃO</p>
28/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A doença é seria, e incapacitante. Por isso os pacientes precisam ter opções.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Retardo da progressao da doença , Negativo: Reação violenta no dia seguinte à aplicação, além do surgimento de crises de enxaqueca.</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: REBIFFE E COPAXONE. EU TIVE INTOLERÂNCIA. AGORA USO O NATALIZUMAB., Positivo: Com o uso do Natalizumab desde 2013, eu não tive mais nenhum surto., Negativo: O efeito negativo do rebife era a formação de nódulos roxos no local de aplicação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: RebifeCOPAXONENatalizumab, Positivo: Desde 2013 tomo o Natalizumab.Ele é excelente porque n tive mais nenhum surtoA aplicação é mensal, Negativo: A aplicação do COPAXONE é diária</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Se falhou não se deve considerar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon 1a e 1b, Positivo: A doença foi estabilizada sem novos surtos em 11 anos de uso, já o segundo uso há menos tempo mas em questão de aplicabilidade tem sido muito bom, e continuo sem surtos., Negativo: O primeiro o desgaste corporal e considerável pois enrijesse os locais de aplicação e como o uso é constante, o desgaste também.O segundo seria a questão dos sintomas de gripe que são fortes, a princípio ficar gripado uma vez por semana é chato, mas acredito que com o tempo isso diminua.</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essencial a disponibilidade de novas opções terapêuticas para os portadores de Esclerose Múltipla, visto que há pacientes com falha terapeutica nos tratamentos disponíveis atualmente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon - 6 anosCopaxone - 6 mesesGilenya - 8 mesesTysabri - 2 anos e meio, Positivo: Betaferon - conseguiu reduzir o numero de surtos de 3 para 1 surto por anoCopaxone - poucos efeitos colateraisGilenya - medicamento via oralTysabri - maravilhoso, apenas 1 surto em quase 3 anos, Negativo: Betaferon - muitos efeitos colaterais e muita fadiga incapacitanteCopaxone - não conseguiu barrar a evolução da doença Gilenya - não conseguiu barrar a evolução da doença Tysabri - interagir com o virus JCV podendo causar a LMP</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tal medicação, sendo ministrada inicialmente, não havendo rejeição, pode propiciar ao paciente menos danos em seu tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer, Positivo: Redução quase total dos surtos, por aproximadamente 08 anos., Negativo: Injeções subcutânea diariamente.</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona e natalizumabe, Positivo: Natalizumabe : mensal as aplicações e baixo sintomas colaterais., Negativo: Natalizumabe : sonolência</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer, Positivo: A 3 anos sem surtos, Negativo: Nenhum ate o momento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente precisa tomar a medicação que é mais adequada indicada pelo médico. É irresponsabilidade da CONITEC achar que o paciente pode utilizar outros medicamentos para tratamento da doença sendo que já é sabido pela equipe médica que acompanha o paciente que não fará o efeito desejado pelos compostos presentes na medicação ou por qualquer outro motivo. Isso é negligenciar pacientes que precisam de uma medicação de alto custo, não aceitando o fato de que cada organismo responde da sua forma. Por lei, a saúde do brasileiro deve ser preservada, e a lei não permite que seja apenas para alguns e não para outros.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera., Positivo: Somente tive efeitos positivos com o Tecfidera. Conteve meus surtos desde que comecei a tomar e está contendo o surgimento de novas lesões., Negativo: O Tecfidera não me deu nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex e Fingolimode, Positivo: Nenhum dos dois me trouxe efeitos positivos., Negativo: Continuei tendo surtos a cada dois meses tomando o Avonex, e por pouco não tive hepatite medicamentosa pelo Fingolimode.</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sistema de saúde deve oferecer o que tem de melhor no tratamento de todas as doenças, sem que o fator financeiro determine qual tratamento o paciente deve fazer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex , Positivo: Possibilitou o tratamento sem fazer depressão do meu sistema imunológico. É um tratamento inovador e que melhorou a minha qualidade d vida, diminuindo significamente a atividade da doença ., Negativo: É intramuscular e gera estresse e medo inerentes ao seu método de aplicação!</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif/ Tysabri , Positivo: Diminuição no número de surtos de esclerose múltipla, Negativo: Dor de cabeça, febre, cansaço</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Acredito que, se de fácil acesso e indicação do médico, esse método possa ser utilizado por outros pacientes, de acordo com o desejo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex (betainterferona), Positivo: Aplicação semanal, Negativo: Difícil a logística de conservação e transporte e consideráveis reações alérgicas</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento inacessível financeiramente!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tec Fidera 120mg., Positivo: Diminuição , dos episódios de "Surtos", da Esclerose múltipla! Mesmo diante de situações, tipicamente consideradas, ""Gatilhos"!, Negativo: Inicialmente, apenas uma certa indisposição estomacal e intestinal!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera120mg, Positivo: Cessaçã o dos surtos da E.M., Negativo: Desconforto gástrico!.</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os medicamentos para esclerose múltipla possuem efeitos colaterais nem sempre tolerados pelos pacientes. Havendo poucas alternativas de tratamento, fica-se sem alternativa muito facilmente. O fumarato de dimetila se mostrou consideravelmente mais eficaz que medicamentos mais caros e, ainda assim, distribuídos pelo SUS mais facilmente. Seria grande o tamanho do lobby? Quem lucra com isso certamente não são os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila. , Positivo: Em uso do fumarato de dimetila, não houve ocorrência de surtos, nem de efeitos colaterais. , Negativo: Fumarato de dimetila: fornecimento somente por boa ação da empresa farmacêutica temporariamente para experiência ou por processo judicial.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer. , Positivo: Com o acetato de glatiramer, houveram surtos menos intensos, mas muito frequentes — a cada dois meses. , Negativo: Acetato de glatiramer: medicamento injetável com frequentes hematomas, inchaço, dor e coceira no local de aplicação. Há ainda a necessidade de refrigeração do produto.</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Relacionado ao custo-benefício os medicamentos tem uma eficácia muito parecida com as poucas medicações aprovadas e fornecidas pelo sus, porém à um custo muito menor. Acho que isso deve ser levado em consideração. Não acho que dever haver exclusividade de alguns laboratórios, pois quanto maior as possibilidades para o portador de EM maiores serão os benefícios e menores serão os custos. Esse assunto deve ser discutido mais amplamente e de forma aberta com a população e especialistas no assunto em canais de comunicação democráticos como esse, assim todo mundo sai ganhando.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rebif e avonex, Positivo:, Negativo: Altíssimo custo, administração com muitos aspectos técnicos-científicos que dificulta a aplicação pelo próprio paciente ou familiares sem conhecimento ou treinamento adequado, medicação em falta no mês de março e abril de 2017 no hospital das clínicas de são paulo, baixa eficácia.....</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importante novas possibilidades de tratamento para pacientes com EM</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Controle dos surtos , Negativo: Muita intolerância a medicação, fadiga, mialgia e mal estar</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, copaxone, natalizumabe , Positivo: Natalizumabe, mais efetivo, menos dolorido, mais pratico que os demais., Negativo: Dificil transporte em viagens, doloridos, manchas na pele, lipoatrofia nos braços e pernas, reação alérgica.</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Natalizumabe, Positivo: Controle dos surtos, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinisona, Positivo: Retardou os surtos, Negativo: Muitas acnes</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito na possibilidade de ser inserida e aperfeiçoamento do estudo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera, Positivo: Melhoria na qualidade de vida do paciente, êxito quanto ao não cometimento de crises graves, etc., Negativo: apenas efeitos colaterais de medicação terapêutica</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo medicamento desta natureza deve ser disponibilizado gratuitamente aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1.a 30mg, (Caneta injetável), Positivo: Após o início do tratamento com referido medicamento, não houve remissão (novo surto), Negativo: Efeitos colaterais, diminuídos ao longo do uso, porém sempre estiveram presentes em 7 (sete) anos de uso.</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acompanho o tratamento de uma paciente com excelentes resultados a partir do início do tratamento com o medicamento, como a regressão das manchas da medula avaliados em exame e cessão dos espasmos e dores.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera., Positivo: Acompanho o tratamento de uma paciente com excelentes resultados a partir do início do tratamento com o medicamento, como a regressão das manchas da medula avaliados em exame e cessão dos espasmos e dores., Negativo: Não houve diagnóstico negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lemtrada., Positivo: Acompanho o tratamento de uma paciente com excelentes resultados a partir do início do tratamento com o medicamento, como a regressão das manchas da medula avaliados em exame e cessão dos espasmos e dores., Negativo: Não houve.</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Pagamos tantos impostos, nada mais justo se fonecido a quem necessita. Até por que é uma medicação .(Caríssimo) sem grato.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prescrição médica, por tempo indeterminado., Positivo: Pelo menos retarda a doença., Negativo: Acesso o medicamento!</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente, e por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: rebif 22 e rebif 44, Positivo: O rebif 44 atende à necessidade do usuário em questão, minha filha, graças a Deus não teve mais surtos violentos a partir do início de seu uso, Negativo: Rebif 22 não foi eficaz devido a dosagem ser fraca para o organismo do portador de EM</p>
28/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicação eficaz e de baixo efeito colateral com posologia bastante favorável para o paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: interferon beta, Positivo: boa resposta preliminar, Negativo: efeitos colaterais algumas vezes piores q o sintoma da doença é refrigerado, podendo estragar mais facilmente se o paciente precisar levar em viagem utilização de agulhas</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o protocolo clínico de Esclerose múltipla e permite maior disponibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. o medicamento em questão é uma dessas opções aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A doença é seria, e incapacitante. Por isso os pacientes precisam ter opções.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Retardo da progressao da doença , Negativo: Reação violenta no dia seguinte à aplicação, além do surgimento de crises de enxaqueca.</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o protocolo clinico de Esclerose múltipla e permite maior disponibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior numero possível de opções seguras e eficazes. o medicamento em questão é uma dessas opções aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço diversas pessoas que usam o Fumarato de dimetila, por favor amparem estas pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Redução de surtos, Negativo: Maior fadiga, confusão mental e tremores</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tysabri , Positivo: Melhorou muito as crises , Negativo: Não tenho nada contra</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o médico prescreve, o medicamento deve ser fornecido pelo governo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AVONEXCOPAXONE, Positivo: O Avonex fez eu não ter surtos.O Copaxone não deu reação desconfortável., Negativo: Ambos são injetáveis.Avonex, depois de 4 anos de administração, deu reações desagradáveis.</p>
28/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nao</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Azatioprina, Avonex, Rebif 22 e Natalizumabe., Positivo: Não houveram surtos graves, avanço ou sequelas da doença., Negativo: Reações adversas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone e Natalizumabe, Positivo: Diminuição dos sintomas da doença, Negativo: Nenhum.</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Excelente em todos os aspectos., Negativo: Não houve</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve-se ter tratamentos alternativos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Medicamento via oral e não intramuscular. Efeitos colaterais sem dor., Negativo: Alergia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Controle da doença., Negativo: Efeitos colaterais com dor. Aplicação com dor.</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, Positivo: Controle da doença (não tive novos surtos após o início do tratamento com a Betainterferona), Negativo: Dor no corpo, dor de cabeça, sensação de gripe forte após os primeiros usos</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se for para ajudar nós os pacientes com Esclerose Múltipla temos que experimentar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já usei acetato de glatiramer, beta interferon e agora utilizo o natalizumabe., Positivo: Só o natalizumabe foi bom pra mim não me deixando entrar em surto., Negativo: Acetato de glatiramer e beta interferon continuei tendo surto.</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o protocolo clínico de Esclerose múltipla e permite maior disponibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. o medicamento em questão é uma dessas opções aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, tenho um colega que tem fobia de agulha e foi diagnosticado com esclerose múltipla, nesse caso ele não conseguiu fazer uso dos medicamentos injetáveis, somente consegue de uso oral o tecfidera</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: tecfidera, Positivo: melhora nas atividades diárias, Negativo: vermelhidão na pele por meia hora somente, isso após duas horas de tomar o medicamento</p>
06/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: BETA INTERFERON, Positivo: AUSÊNCIA DE SURTOS, Negativo: MEDICAMENTO INTRAMUSCULAR UTILIZADO SEMANALMENTE COM EFEITOS COLATERAIS DA APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR.</p> <p>3ª - Não</p>
06/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, conheço paciente que se trata com o Fumarato de Dimetila, a eficácia é excelente e efeitos colaterais reduzidos. O remédio tem se mostrado essencial para boa qualidade de vida do paciente, porém o valor é muito alto e praticamente inacessível para a esmagadora maioria dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, “conheço paciente que se trata com o Fumarato de Dimetila, a eficácia é excelente e efeitos colaterais reduzidos. O remédio tem se mostrado essencial para boa qualidade de vida do paciente, porém o valor é muito alto e praticamente inacessível para a esmagadora maioria.”</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualemnte preciso utilizar o Fumarato de Dimetila</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif / Interferon beta, Positivo: Consegui estabilizar a doença, mas os efeitos colaterais estão difíceis de aguentar e não há mais lugar adequado para aplicar, Negativo: Nodulações dolorosas subcutaneas, necrose, ulcera, mialgias...</p>
07/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, conheço paciente que se trata com o Fumarato de Dimetila, a eficácia é excelente e efeitos colaterais reduzidos. O remédio tem se mostrado essencial para boa qualidade de vida do paciente, porém o valor é muito alto e praticamente inacessível para a esmagadora maioria.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A amiga da minha esposa se trata com o Fumarato de Dimetila. A eficácia é excelente e os efeitos colaterais reduzidos. O remédio tem se mostrado essencial para boa qualidade de vida do paciente, porém o valor é muito alto e praticamente inacessível para a esmagadora maioria</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Pois obtive resultado favorável com o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, Positivo: melhorei bastante., Negativo: aplicação que doi e estou ficando com varizes</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cortisona, Positivo: Melhorei rapidamente e sai da crise., Negativo: os efeitos da cortisona conhecidos.</p>
06/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma medicação imprescindível para muitos portadores de Esclerose Múltipla</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatirâmer (Copaxone) Natalizumab (Tysabri) Fingolimode (Gilenya), Positivo: Sem novas lesões, Negativo: Falha terapêutica, severa reação alérgica (pre-edema de glote), fadiga extrema, dores de cabeça, "choques" na cabeça e corpo</p>
07/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu preciso muito desse medicamento, e não tenho condições nenhuma se for p/ comprar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera., Positivo: Ótimo, não tenho reação nenhuma, e me sinto realuzada com o Tecfidera., Negativo: O anterior foi o Rebif, e sentia muitas reações.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: REBIF E O MANTIDAN DE 100mg, Positivo: O MANTIDAN. TIRA MINHA FADIGA., Negativo: O REBIF ME DAVA MUITAS REAÇÕES.</p>
04/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Começo uma paciente que está usando e os resultados tem sido ótimos. O que não aconteceu com o medicamento mais barato. Como esses medicamentos é caro, o mais cômodo para o governo dou desistir após uma tentativa. Esse não é o parâmetro usado para decidir os benefícios de um medicamento ou terapia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo com essa recomendação preliminar negativa, pois estou há 1 ano tomando o Tecfidera, fornecido pelo laboratório através de amostra grátis, e as reações foram mínimas, só no início do usa da nova medicação. O início do tratamento foi extremamente tranquila e com um ganho enorme na qualidade de vida, tendo em vista que deixei de levar agulhadas diárias do Copaxone, para a simplicidade de tomar 2 comprimidos diários do Tecfidera. Ficaria imensamente feliz se o Tecfidera aceito e distribuído pelo SUS, pois não sei até quando o laboratório irá fornecer a medicação e eu não gostaria de mudar de medicação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera 240mg, Positivo: Ganho na qualidade de vida, fácil adesão ao tratamento, praticidade ao transportar os medicamentos, simplicidade para utilizar o medicamento, o que contribui bastante para continuidade do tratamento e estagnação da doença, entre outros., Negativo: Nenhum. O calor e o rubor na face no início do tratamento foi totalmente suportável e passageiro.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone (Acetato de Glatiramer), Positivo: Naquela época, quando descobri a EM em 2008, foi bastante positivo em controlar a evolução da EM., Negativo: Forma e a frequência de utilizar a medicação (injeções diárias subcutâneas), obstáculos para transportar e armazenar a medicação, lesões no local da aplicação (derrames, inchaços e dor), e vários outros inconvenientes que começaram a dificultar a persistência no tratamento.</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço uma paciente que utiliza o Fumarato de dimetila (TECFIDERA) desde o inicio do seu tratamento e teve melhoras significativas desde o início do seu tratamento, não ocorrendo nenhuma crise após seu uso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço uma paciente que utiliza o Fumarato de dimetila (TECFIDERA) desde o inicio do seu tratamento e teve melhoras significativas desde o início do seu tratamento, não ocorrendo nenhuma crise após seu uso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso da medicação Fumarato de Dimetila e não apresentei nenhum surto após o uso dessa medicação ,não apresento reações adversas.A medicação de fácil uso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumaram de Dimetila, Positivo: Ausência de surtos e ausência de reações adversas., Negativo: Não tem nenhum ponto negativo,melhor dizendo ,o ponto negativo é essa medicação ainda não fazer parte do SUS.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Posuo uma amiga que depende deste medicamento, porém, pelo seu elevado custo ela não pode adquiri-lo. Segundo os médicos que acompanham seu caso, trata-se do medicamento mais indicado para o tratamento dessa doença.Sendo assim, acredito que esse remédio, por ser o mais indicado, deve ser distribuído pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Conheço paciente que se trata com o Fumarato de Dimetila, a eficácia é excelente e efeitos colaterais reduzidos. O remédio tem se mostrado essencial para boa qualidade de vida do paciente, porém o valor é muito alto e praticamente inacessível para a esmagadora maioria da população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, tenho um colega que tem fobia de agulha e foi diagnosticdo com esclerose multipla, nesse caso ele nao consegui fazer uso dos medicamentos injetaveis , somente consegue de uso oral o tecfidera</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: tecfidera, Positivo: melhora nas atividades diarias, Negativo: vermelhidao na pele por meia hora somente, isso apos duas horas de tomar o medicamento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amiga de paciente que se trata com o Fumarato de Dimetila. A eficácia é excelente e efeitos colaterais reduzidos. O remédio tem se mostrado essencial para boa qualidade de vida do paciente, porém o valor é muito alto e praticamente inacessível para a esmagadora maioria.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como médica Neurologista atuando desde 1989 no cuidado de pacientes com Esclerose Multipla e com grande experiência em imunomoduladores , considero que o fumarato de metila é uma medicação muito mais eficaz que as ditas de primeira linha e com excelente tolerabilidade e segurança para os pacientes e portanto uma medicação interessante para a primeira troca ou em casos de intolerância das drogas de primeira linha.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato de metila, Positivo: Eficacia superior aos medicamentos de primeira linha como acetato de glatiramer, betainterferon, tolerabilidade e posologia oral sem necessidade de agulhas. , Negativo: Fumarato de metila necessita de cuidados na monitorizacao de hemograma e contagem de linfócitos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Acetato de Glatiramer, betainterferon, natalizumabe, fingolimode, alentuzumabe, terifluonamida. , Positivo: Acetato de glatiramer - tolerabilidade e segurança Betainterferon - eficacia e segurança Natalizumabe - alta eficacia e comodidade posologia Fingolimode. - eficacia e posologia cômoda Alentuzumabe - alta eficacia e posologia cômoda Terifluonamida - eficacia, segurança e comodidade na posologia, Negativo: Glatiramer - injetável, reações alérgicas e eficacia moderada. Betainterferon - injetável, reações cutâneas a aplicação e eficacia moderada Natalizumabe - injetável, risco de infecções oportunistas e LEMP Fingolimode - risco cardíaco Alentuzumabe - injetável e risco de câncer de tireoide Terifluonamida - possível teratogenicidade.</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O fumarato é muito eficiente. Meu filho não teve mais surtos após o uso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera, Positivo: Obsta surtos. Sem efeitos colaterais., Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Interferons, Positivo: Não teve nenhum., Negativo: Todos. Dor de cabeça. febre. Agulhas insuportáveis.</p>
07/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A filha da minha amiga necessita deste medicamento para sobreviver</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse remédio promove uma qualidade de vida mais adequada aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera, Positivo: Menores efeitos colaterais, Negativo: Enjôos</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amigo de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (usuária há 14 meses). Além disso, ela possuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo relatos da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amiga de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (usuária há 14 meses). Além disso, ela possuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e os sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo relato da mesma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amigo de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (usuária há 14 meses). Além disso, ela possuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo relatos da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amiga de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (usuária há 14 meses). Além disso, ela possuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo relatos da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento muito eficiente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera , Positivo: Controle total da esclerose múltipla, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SOU AMIGA DE EX-USUARIA DE AVONEX, QUE O UTILIZOU DURANTE CERCA DE 1 ANO, DESENCADEANDO UM EPISODIO DE SURTO. DESDE ENTAO, ESTA INICIOU A UTILIZAÇÃO DE TECFIDERA E NAO APRESENTOU MAIS SURTOS (USUARIA HA 14 MESES). ALEM DISSO, ELA POSSUIA INTOLERANCIA A FORMA INTRAMUSCULAR DE APLICAÇÃO E AOS SINTOMAS CONTRALATERAIS SIGNIFICATIVOS, APOS O USO DO TECFIDERA, NAO DEMONSTRA MAIS SINTOMAS COLATERAIS QUE AFETAM A ROTINA DIARIA E A FORMA DE ADMINISTRAÇÃO É INDOLOR E PRÁTICA, SEGUNDO RELATOS DA MESMA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amiga de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (usuária há 14 meses). Além disso, ela possuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam a sua rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo os relatos da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Uma amiga tem utilizado o fumarato de dimetila e não tem apresentado intolerância ao medicamento, ao contrário, alguns sintomas da doença regrediram e a paciente disse que se sente melhor desde que iniciou o tratamento, mas infelizmente o valor do medicamento ainda dificulta muito a continuidade do tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considerando que a saúde é direito todos e dever do Estado, os pacientes e seus médicos tem o direito de ter todos os medicamentos conhecidos disponíveis para fazerem a melhor escolha no caso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com o betainterferona 1b e atualmente em uso do copaxone, Positivo: Nenhum efeito positivo para o betainterferona 1b e do copaxone apenas a aparente eficácia e redução de surtos., Negativo: Todos, dos no local das aplicações e o betainterferona 1b com a agravante de dores de cabeça, no corpo e mal estar constante.</p>
08/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amiga de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (usuária há 14 meses). Além disso, ela possuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo relatos da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amiga de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (usuária há 14 meses). Além disso, ela possuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo relatos da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amiga de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (usuária há 14 meses). Além disso, ela possuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo relatos da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amiga de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (usuária há 14 meses). Além disso, ela possuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo relatos da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amiga de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (usuária há 14 meses). Além disso, ela possuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo relatos da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Usei Interferon Beta mas abandonei o tratamento, pois não suportei os efeitos colaterais, mas tive diversos surtos de e.m. Faço uso do tecfidera a 1 ano, tolerância total, praticamente sem efeitos colaterais e não tive mais NENHUM surto desde então.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon Beta, Positivo: Não houve,, Negativo: Dores de cabeça, indisposição e surtos remissivos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon Beta, Positivo: Não houve,, Negativo: Dores de cabeça, indisposição e surtos remissivos.</p>
09/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amiga de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (usuária há 14 meses). Além disso, ela possuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo relatos da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amiga de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (usuária há 14 meses). Além disso, ela possuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo relatos da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amiga de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (usuária há 14 meses). Além disso, ela possuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo relatos da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amiga de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (usuária há 14 meses). Além disso, ela btpossuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo relatos da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Realizei tratamento injetável por 6 anos e tive inúmeros problemas, tais como lipodistrofia nos locais de aplicação, reações outras, dores e abandonei o tratamento pois fiquei com pavor a injeção, agulha.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Os efeitos são o mínimo possível, minha angustia com o tratamento da doença e desejo de abandono do tratamento acabou. Após algum tempo de uso, meu médico solicitou exames de sangue e todos estavam perfeitos., Negativo: Apenas rubor e vermelhidão esporadicamente, o que não me incomoda em nada.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatiramer - Copaxone, Positivo: não sei! Dor, pavor. Durante o tratamento tive alguns pequenos surtos, Negativo: Realizei tratamento injetável por 6 anos e tive inúmeros problemas, tais como lipodistrofia nos locais de aplicação, reações outras, dores e abandonei o tratamento pois fiquei com pavor a injeção, agulha.</p>
07/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um familiar que utiliza o medicamento e está super bem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um familiar que faz uso do medicamento e está super bem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um familiar que faz uso do medicamento e está super bem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um familiar que faz uso do medicamento e está super bem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A EM é uma doença crônica progressiva. Acredito que medicamentos comprovadamente eficazes em controlar a evolução da doença devem estar ao alcance dos pacientes. Não se trata de esperança e sim de necessidade de evitar uma população de doentes incapacitados. Deve se considerar que mesmo sendo uma medicação de alto custo, se torna mais barato prevenir a incapacidade, do que manter pessoas incapacitadas. Todos pagamos nossos impostos e temos o direito à saúde.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera - Fumarato de dimetila., Positivo: Em um ano de uso da medicação, não apareceram novas lesões da esclerose múltipla. (exames de ressonância magnética), Negativo: Nihil</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, acetato de glatiramer, gylenia., Positivo: Nihil, Negativo: Pelo menos 2 surtos ao ano, baixa imunidade acentuada, efeitos colaterais da medicação.</p>
07/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A EM é uma doença crônica progressiva. Acredito que medicamentos comprovadamente eficazes em controlar a evolução da doença devem estar ao alcance dos pacientes. Não se trata de esperança e sim de necessidade de evitar uma população de doentes incapacitados. Deve se considerar que mesmo sendo uma medicação de alto custo, se torna mais barato prevenir a incapacidade, do que manter pessoas incapacitadas. Todos pagamos nossos impostos e temos o direito à saúde.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera - Fumarato de dimetila., Positivo: Em um ano de uso da medicação, não apareceram novas lesões da esclerose múltipla. (exames de ressonância magnética), Negativo: Nihil</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, acetato de glatiramer, gylenia., Positivo: Nihil, Negativo: Pelo menos 2 surtos ao ano, baixa imunidade acentuada, efeitos colaterais da medicação.</p>
07/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha usa a medicação e seus exames de ressonância magnética demonstraram que não apareceram novas lesões.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera - fumarato dimetila, Positivo: Nenhuma lesão nova, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex, agetato glatiramer, gylenia, Positivo: nihil, Negativo: Surtos da doença, baixa imunidade, efeitos colaterais.</p>
07/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessidade de pessoas carentes ter acesso ao remédio</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou irmã de uma paciente que faz uso deste medicamento é se adaptou muito bem a ele. É sou a favor de que seja incorporado ao SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma paciente ex usuária do AVONEX, que utilizou por um ano, desencadeou um episódio de surto. Desde então, foi trocada a medicação para Tecfidera e não teve mais surtos(cerca de 14meses). Além disso ela possuía intolerância a medicação intramuscular e aos sintomas colaterais significativos. Não apresenta mais sintomas colaterais com o Tecfidera e a forma de aplicação é indolor e muito pratica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amiga de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (usuária há 14 meses). Além disso, ela possui intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo relatos da mesma. 2ª - Não 3ª - Não
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importante principalmente por facilitar a aderência ao tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço um paciente que se adaptou muito bem. 2ª - Não 3ª - Não
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessidade 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Glatirâmer, Positivo: Controle, Negativo: Locais

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acho importante ter alternativas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Diminuição do mal estar, tontura, Negativo: Ser intramuscular</p>
08/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fui usuária de AVONEX durante cerca de 1 ano e tive novo surto. Desde então utilizo Tecfidera e não tive mais surtos (já sou usuária há 14 meses). Além disso, eu possuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não tenho mais sintomas laterais que afetam minha rotina diária e a forma de administração é indolor e prática.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Administração de Fumarato de Dimetila VO. , Positivo: Ausência de novos surtos; forma de administração prática; tratamento eficaz; sintomas colaterais leves. , Negativo: Custo; não disponível no SUS.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AVONEX , Positivo: Na minha opinião não houve nenhum efeito positivo em relação ao uso. Apenas o fato de ser disponível no SUS. , Negativo: Surgimento de novo surto mesmo utilizando medicamento adequadamente; forma de administração dolorosa; efeitos colaterais que atrapalham a rotina; armazenamento em geladeira.</p>
05/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA; 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente portadora de EM em uso de primeira medicação, quero ter acesso à outras medicações caso haja falha nesse tratamento sendo ideal a adição de novos tratamentos ao rol de medicamentos do SUS para EM, mesmo que hajam efeitos colaterais adversos. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex , Positivo: Sem surto por um ano, Negativo: Nenhum
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço uma paciente que utiliza o Fumarato de dimetila (TECFIDERA) desde o início do seu tratamento e teve melhoras significativas desde o início do seu tratamento, não ocorrendo nenhuma crise após seu uso 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com BETAINTERFERONA 1A, Positivo: Não ter novos surtos da doença., Negativo: Efeito colateral que simula uma forte gripe.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/05/2017	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon, Positivo: Altera curso da doença, Negativo: Reação local ao medicamento bem como efeitos sistêmicos 3ª - Não
04/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Somente há poucos anos novos medicamentos para a Esclerose múltipla foram desenvolvidos. Desta forma acho completamente inaceitável que novos medicamentos não sejam recomendados. Esse medicamento em questão é administrado por via oral o que facilita o tratamento. No meu caso especificamente não há vantagem pois estou na fase secundária progressiva da doença. Mas a distribuição pelo SUS ajudaria muitos pacientes, não permitindo que a doença evolua tão rapidamente. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Quando do diagnóstico utilizei pulso terapia e ACTH. não havia medicamentos modificadores da doença., Positivo: A pulso terapia com o corticoesteroide abreviava o tempo do surto da doença, Negativo: No entanto causava todo efeito colateral que o tratamento com corticoides causa. Edema, agitação, insônia, nervosismo etc.
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA. 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Mais disposição., Negativo: Fraqueza muscular e espasmos. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon; betaferon; rebif; TMO., Positivo: Breve melhora e posterior recaída., Negativo: Sensação de piora.
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação que proporciona qualidade de vida ao portador de EM também lhe proporciona o direito constitucional à vida. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento possui efeitos colaterais absolutamente diminutos e que nao atrapalham a qualidade de vida do paciente, sem se falar na eficácia. com apenas 3 meses de uso do medicamento os resultados foram excelentes, com consideravel diminuição das áreas em atividade inflamatória.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, 240 mg, 56 cápsulas, Positivo: áreas de inflamação adormeceram/diminuíram consideravelmente em apenas 3 meses de uso. efeitos colaterais quase inexistentes. basicamente remanesce o rubor, que também nao é rotineiro e é leve., Negativo: unico efeito negativo é o rubor, mas que é tao leve e esporádico que nao atrapalha em nada a qualidade de vida.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Gylenia, Positivo: aparentemente, a eficácia era boa, mas o tempo de uso foi pequeno,, Negativo: apresentei episódios de taquicardia com o uso, por esse motivo tive que parar.</p>
04/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Cada casa deve ser analisado individualmente. A EM é uma doença conhecida como 1000 caras! O neuro do paciente que deverá analisar a situação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif, copaxone é atualmente Tysabri., Positivo: Rebif apenas negativo Copaxone segurou a fadiga um tempo.Tysabri ajudou na fadiga e também menores níveis de reações , Negativo: Rebif . Febre, dores no corpo; fraqueza Copaxone. Muita dor na aplicaçãoTysabri . Nada relevante</p>
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Tecfidera proporciona aos seus pacientes uma vida bem mais próxima da normalidade do que outros medicamentos, tem efeitos colaterais reduzidos quando comparado a outros medicamentos para Esclerose Múltipla, além de demonstrar eficácia significativa, logo ao inicio do tratamento. Além disso, o custo do medicamento é bastante alto, o que impede muitos pacientes de utilizarem o mesmo e seus benefícios.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera, Positivo: Efeitos colaterais em quantidades reduzidas e com intensidade muito menor, se comparado a outros medicamentos; Medicação oral, evita agulhadas e outras formas de utilização problemáticas; Redução significativa nos efeitos da Esclerose Múltipla e na frequência de surtos causados pela mesma, já visíveis com menos de um mês de tratamento. Todos essas vantagens contribuem muito para a saúde, tanto física quanto psicológica, e bem estar do paciente, proporcionando uma vida mais próxima do que se considera normal., Negativo: Quando comparado a outros medicamentos, não consigo ver efeitos negativos. Mas o medicamento ainda apresenta efeitos colaterais, mesmo que mais brandos do que outros medicamentos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aubagio, Positivo: Redução dos sintomas e dos surtos causados pela Esclerose múltipla; Via oral., Negativo: Efeitos colaterais muito severos.</p>
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E preciso liberar todos os caminhos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Interferona, Positivo: Certo controle das crises, Negativo: Efeitos colaterais fortes. Dores musculares. Dores de cabeça. Impossibilidade de executar as rotinas diarias</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho esclerosada há 20 anos e já utilizei dois outros medicamentos e há um ano estou utilizando Tecfidera fornecido como amostra mas não sei até quando o que me deixa preocupada pois não tenho condições de comprá-lo. Estou muito bem com esta medicação e desejo continuar o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido à necessidade do remédio para diversos pacientes, creio ser fundamental que este seja distribuído de forma gratuita.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio possui um valor muito acima do valor do salário mínimo brasileiro, sendo assim, incapacita alguns de aderir ao tratamento 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos dar tratamento eficaz aos nossos doentes. 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É importante ter um leque de opções que seja em prol do paciente. Sou desfavorável à alterações no protocolo que interfiram na decisão do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 22mgAvonex 33mg, Positivo: Rebif e avonex controlaram muito bem a evolução da doença., Negativo: Rebif me causou muita dor de cabeça e efeitos colaterais similares a uma gripe que não cessavam mesmo utilizando um medicamento.A frequência de uso também impactou muito na minha qualidade de vida.</p>
04/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço uma paciente que utiliza o Fumarato de dimetila (TECFIDERA) desde o início do seu tratamento e teve melhoras significativas desde o início do seu tratamento, não ocorrendo nenhuma crise após seu uso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: TECFIDERA, Positivo: Nenhuma crise após sua utilização; , Negativo: Rubor e enjoô.</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amigo de paciente que utiliza o medicamento e as melhoras são visíveis, a qualidade de vida dela aumentou muito. Antes ela reclamava dos efeitos colaterais dos outros medicamentos que são oferecidos pelo SUS, agora leva uma vida normal. o Fumarato de dimetila deve ser incorporado!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma familiar e uma amiga utilizam essa mediação e tem retornos ótimos no tratamento, conseguindo manter uma excelente qualidade de vida com baixíssimas contraindicações. Acompanho o tratamento de ambas e informando-me dos avanços acho absurda a recomendação da CONITEC.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço uma paciente que utiliza o Fumarato de dimetila (TECFIDERA) desde o inicio do seu tratamento e teve melhoras significativas desde o início do seu tratamento, não ocorrendo nenhuma crise após seu uso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço uma paciente que utiliza o Fumarato de dimetila (TECFIDERA) desde o inicio do seu tratamento e teve melhoras significativas desde o início do seu tratamento, não ocorrendo nenhuma crise após seu uso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço uma paciente que utiliza o Fumarato de dimetila (TECFIDERA) desde o início do seu tratamento e teve melhoras significativas desde o início do seu tratamento, não ocorrendo nenhuma crise após seu uso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, conheço paciente que se trata com o Fumarato de Dimetila, a eficácia é excelente e efeitos colaterais reduzidos. O remédio tem se mostrado essencial para boa qualidade de vida do paciente, porém o valor é muito alto e praticamente inacessível para a esmagadora maioria.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço paciente que se trata com o Fumarato de Dimetila, a eficácia é excelente e efeitos colaterais reduzidos. O remédio tem se mostrado essencial para boa qualidade de vida do paciente, porém o valor é muito alto e praticamente inacessível para a esmagadora maioria.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devemos testar em outros pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Medicamento é eficaz e não vejo motivo para a CONITEC não ser favorável à Proposta de incorporação do FUMARATO DE DIMETILA. No meu caso é um ótimo medicamento e não gostaria de voltar a usar o GLATIRÂMÉR.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: - GLATIRÂMÉR-FUMARATO DE DIMETILA, Positivo: O FUMARATO DE DIMETILA É FACIL DE SER INGERIDO, CAUSA ALGUMA REAÇÃO SOMENTE NO COMEÇO DO TRATAMENTO. DEPOIS ESSE DESCONFORTO DESAPARECE., Negativo: -NÃO GOSTEI DO GLATIRÂMÉR PELO FATO DE SER INJETÁVEL. A APLICAÇÃO É DOLORIDA, CAUSA HEMATOMA, SAI SANGUE DOS VASINHOS E VAI FORMANDO CAVIDADES NOS LUGARES ONDE É APLICADO.- FUMARATO DE DIMETILA- SÓ NO COMEÇO CAUSA SENSACÃO DE DESCONFORTO, DEPOIS ESSA SENSACÃO DESAPARECE E FICA TUDO NORMAL.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: - GLATIRÂMÉR- VITAMINA D- FUMARATO DE DIMETILA, Positivo: - GLATIRÂMÉR -NÃO FOI NADA BOM, TENHO MEDO ATÉ DE PENSAR EM VOLTAR A USAR, É HORRÍVEL.- VITAMINA D- TUDO BEM , NORMAL-FUMARATO DE DIMETILA - NADA A QUESTIONAR SOBRE O MEDICAMENTO, MUITO MELHOR QUE O GLATIRÂMÉR., Negativo: GLATIRÂMÉR- COMO JÁ DISSE NÃO GOSTEI DE USAR E CHEGUEI A SURTAR TOMANDO ESSE MEDICAMENTO- VITAMINA D- NADA DE NEGATIVO-FUMARATO DE GLATIRÂMÉR- INCOMODO SOMENTE NO COMEÇO, NADA A QUESTIONAR. É UM ÓTIMO MEDICAMENTO.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, conheço a paciente que se trata com o Fumarato de Dimetila, a eficácia é excelente e efeitos colaterais reduzidos. O remédio tem se mostrado essencial para boa qualidade de vida do paciente, porém o valor é muito alto e praticamente inacessível para a esmagadora maioria</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço uma paciente que utiliza o Fumarato de dimetila (TECFIDERA) desde o início do seu tratamento e teve melhoras significativas desde o início do seu tratamento, não ocorrendo nenhuma crise após seu uso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amiga de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (usuária há 14 meses). Além disso, ela possuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo relatos da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por ser um medicamento extremamente caro e necessário, o Estado deve disponibilizar a quem necessitar, cumprindo com seu dever de "devolver os impostos em forma de serviços e produtos à população".</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A partir do momento que é uma recomendação médica, não há motivos que o mesmo seja negado ao paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou a favor da disponibilidade de novos medicamentos para tratamento 2ª - Sim, como paciente, Qual: fingolimode, Positivo: menor taxa de surtos e redução da incapacidade, Negativo: nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: betaferon , copaxone, natalizumabe, Positivo: falha terapeutica em outros medicamentos, Negativo: nao foi alcançado o resultado esperado
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Cada paciente reage de uma forma, o que pode não ter dado certo para alguns pacientes pode ser bom para o outro 2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Apos a medicação nunca mais tive surtos, Negativo: Como e um medicamento injetável e tenho fobia, sempre que vou aplicar tenho uma queda de pressão e às vezes desmaio. Além disso, as pernas está cheia de vasos e roxa, com isso tenho que intercalar entre braços e nadegas. 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Desde o uso da medicação não houve alterações como com outras terapias, e reações adversas quase inexistentes,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif, Natalizumabe, Copaxone., Positivo: Rebif primeiro medicamento utilizado no tratamento, ponto inicial; Natalizumabe-segunda tentativa para o tratamento, pouco tempo de uso, Copaxone terceira tentativa, as mudanças ocorreram por ter apresentado surtos e ter que fazer pulsoterapia, Negativo: Rebif me causava muitas dores de cabeça e mal estar nos primeiros 6 meses; Natlizumabe-tive uma reação no corpo herpes zoster, Copaxone-onde aplicava a medicação ficava roxo, e tive surto no uso de cada um desses.</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex e Copaxone, Positivo: Os efeitos positivos do avonex é o fato de ser uma vez por semana e os do copaxone por não ter grandes efeitos colaterais, Negativo: Avonex causa reações semelhantes a gripe e o copaxone causa muitas dores no local da aplicação, inchaço, nódulos que não desaparecem, além do incômodo de ser uma injeção diária.</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessário demais para o paciente que vê sua vida se esvaír Sem nada puder fazer por falta do remédio</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A população tem o direito de receber estes medicamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA; 2ª - Não 3ª - Não
05/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA; 2ª - Não 3ª - Não
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Aumenta a opção terapêutica disponível para o Portador</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todos do protocolo , Positivo: Minimização dos sintomas, Negativo: Cefaléia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todos do protocolo, Positivo: Minimizarão dos surtosx , Negativo: Cefaleia</p>
13/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portadora de esclerose multipla remitente recorrente e tive falha de tratamento com o remedio intramuscular e reação alergica que me impossibilitou de utilizar p fingolimoide, segunda opção de tratamento no meu caso. O fumarato de dimetila foi minha terceira opção de tratamento e última opção no meu caso, e estou muito satisfeita com o resultado e surtido o efeito esperado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Não tive nenhum efeito colateral e me sinto saudavel! Esse remedio é a minha salvação, pois já é o terceiro medicamento e o primeiro sem falha do medicamento. A neurologista que me acompanha está satisfeita e me sinto disposta e com a doença sob controle, Negativo: Não tive efeitos colaterais, estou muito satisfeita. O único problema é nao ter o medicamentk em que me adaptei no SUS.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone e fingolimoide, Positivo: Tive falha de medicamento em ambos os casos, Negativo: O copaxone não surtiu o efeito esperado e o fingolimoide teve reação alérgica, impossibilitando a utilização</p>
13/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos demonstraram sua eficácia. A Conitec quer impedir o acesso de brasileiros a medicamentos de ponta para economizar \$\$\$\$ para o estado brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AvonexCopaxone, Positivo: Copaxone deixou-me sem surtos significativos por muito tempo., Negativo: Avonex tinha efeitos adversos bem difíceis de lidar</p>
13/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Não tenho base para a falar a respeito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os efeitos colaterais dos atuais medicamentos de primeira utilização para esclerose múltipla em muita das vezes, incapacita o paciente de uma boa qualidade de vida. Além de que o nível proteção dos medicamentos disponíveis e inferior ao fumarato de dimetila</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azatioprima, Rebif, Glatirame e fingolimode, Positivo: Fingolimode sem efeitos colaterais, melhora da qualidade de vida principalmente para viajar, Negativo: Rebif : sensação de gripe, péssimo transporte;Glatirame: o pior de todos, dor muscular fortíssima, nódulos após a aplicação. Péssimo transporte e uso diário (só para piorar a vida do paciente).</p>
14/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Interferon com muitos efeitos colaterais, Positivo: Manteve a doença estavel, Negativo: Via de administracao sub cutanea , com lesões e dores nos locais de aplicação</p>
13/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Me sinto bem e estacionou a doença, Negativo: Efeitos colaterais</p>
14/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio tem ajudado muitas pessoas que já fizeram uso dele.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 22 e 44, Positivo: Redução de surtos e lesões, Negativo: Não tive</p>
14/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Venho utilizando há mais de 1 ano e me sinto bem. Não tive surto. Não tive nenhum efeito ruim.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera. Estou tomando., Positivo: Primeiramente é comprimido. Não aguentava mais tomar injeção. Vocês sabem o que é tomar injeção toda semana. Pois asseguro a vocês que depois de anos estava com as pernas toda marcada e traumatizada com a injeção. Tecfidera me fez ficar bem animada ao tomar comprimido. E não tive nenhum surto neste período., Negativo: Nenhum, até agora</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon Avonex. É injeção., Positivo: Tive vários surtos tomando o Avonex., Negativo: Tive vários surtos tomando o Avonex. É Injeção. O que traumatiza o usuário. Vocês sabem o que é tomar um injeção por semana na perna. É traumatizante</p>
14/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente precisa ter alternativas para continuar seu tratamento. A prevenção e controle são as únicas alternativas que o paciente possui e com o tempo os medicamentos param de surtir efeito. Precisamos ter plano b, plano c, d...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azatioprina; solumedrol; interferon Beta; betaferon; natalizumabe, Positivo: Controle de surtos e redução de alguns dos sintomas da doença, Negativo: Azatioprina - infecções de garganta e urinária com frequênciaSolumedrol - inchaço, taquicardia, curta duração dos resultadosinterferon beta - dores, febre, fraqueza, parou de funcionar com 10 anos de usoBetaferon - pouca durabilidade dos resultadosNatalizumabe - dor de cabeça, riscos devido ao JC vírus positivo</p>
14/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Precisamos utilizar todo tratamento medicamentoso oferecido pela indústria farmacêutica</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Buscar qualidade no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que devemos estar abertos sempre a novos medicamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Manteve minha esclerose múltipla sob controle, Negativo: Enjoo e mau estar estomacal após primeiros dias</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Manteve minha esclerose múltipla sob controle por um curto período de tempo, Negativo: Dor no corpo, dor de cabeça, febre após primeiros usos</p>
09/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amiga de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (usuária há 14 meses). Além disso, ela possuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo relatos da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse novo medicamento parece ser melhor de administrar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Não apresentou contra indicação nenhuma., Negativo: tive um surto recentemente mas com intensidade bem menor.</p>
12/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou no medicamento a 3 meses, e minha qualidade de vida melhorou em 100%, e acredito que todos tem o direito disso</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Sem injeções, sem efeitos colaterais, Negativo: Nenhum que mereça ser mencionado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon, Positivo: nenhum, Negativo: 2 anos com dor de cabeça, muitas injeções, febres</p>
12/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como especialista em Esclerose Múltipla, tenho tudo bom resultados com o uso do DMF na prática.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dimetilfumarato, Positivo: Baixa taxa de efeitos colaterais Boa tolerância Controle adequado de surtos , Negativo: Intolerância gástrica, flush facial e queda de cabelo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferons, natalizumab, glatiramer, teriflunomida, Positivo: Interferons: sem efeitos colaterais que ameaçam a vida Glatiramer: seguro Natalizumab: boa eficácia Teriflunomida: VO , Negativo: Interferons: sintomas flu like, injetável, baixa eficácia Glatiramer: injeções diárias, dor local e edema, baixa eficácia Natalizumab: monitorização rigorosa, risco de LEMPTeriflunomida: baixa eficácia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Se entendi bem, a recomendação preliminar e não favorável e proposta de incorporação para o uso após a 1ª falha de tratamento, portanto, não podemos correr riscos. Discordo parcialmente, por não conhecer o real motivo desta recomendação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, Natalizumabe , Positivo: Betainterferona: Efeitos eram positivos.Natalizumabe: Controle está sendo positivo, Negativo: Betainterferona: dor intensa, na cabeça, e nos lugares da aplicações.Natalizumabe: Não apresenta nenhuma efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
12/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amiga de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (há 14 meses). Além disso, ela possuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso de tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam a rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo relatos da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: ., Negativo: .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fumarato de dimetilaAlentuzumabe, Positivo: ., Negativo: .</p>
12/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Alguns pacientes não estão melhorando com a medicação e o Conitec ppode melhorar a qualidade de vida pelo custo benefício e eficiencia !</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Apesar de ser medicamento a demandar maiores investigações, pode vir a beneficiar pacientes atuais com falhas terapêuticas a outras drogas dispensadas até então. O médico assistente e os pacientes disporão de maior arsenal terapêutico, pois, a cuidar da enfermidade, consideradas as características particulares de cada caso.Há também de ser considerado que o fármaco propicia menor risco de LEMP em relação ao natalizumab e que têm maior taxa de adesão ao tratamento, por ser medicação oral.No mais, sub censura, os testes concedem uma margem de segurança mínima, o que igualmente justifica a incorporação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatirâmer, betainterferona 1a (Avonex) e cloridrato de fingolimode., Positivo: Acetato de glatiramer: nenhum.Betainterferona 1a (Avonex): melhorou um pouco a parestesia e a progressão dá doença.Fingolimode: atualmente em uso, até então, impediu a progressão dá doença e por ser via de administração oral, contribuiu significativamente com a qualidade de vida., Negativo: Acetato de glatiramer: uso diário. Péssimo.Avonex: febre e efeitos gripais após administração. Aplicação parenteral que exige cuidados e é desagradável. Não gosto de agulhas.Fingolimode: até agora, nenhum.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos desse medicamento pra ficar bem. Ele é eX celeste pois não trás muitas reações adversas. E muito bom o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o tecfidera , Positivo: E em comprimido, não tem o desconforto em ser picada todos os dias, Negativo: As reações adversas que me causou foi enjôo, mas não é sempre.</p> <p>3ª - Não</p>
12/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Ausência de surtos da doença há dois anos., Negativo: Não encontrei.</p> <p>3ª - Não</p>
12/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha usava um medicamento injetavel (COPAXONE) e sofria muito com o tratamento, ficando com muitas marcas no corpo devido ao uso diario e outras recoes. Com o Fumarato de Dimetila ela tem uma qualidade de vida muito melhor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Acetato de Glatiramer (COPAXONE).Fumarato de Dimetila (TEC FIDERA), Positivo: Glatiramer - controle dos surtos.Fumarato de Dimetila - controle dos surtos, qualidade de vida, auto estima., Negativo: Glatiramer - marcas pelo corpo devido ao uso constante, reacoes alergicas.Fumarato de Dimetila - ate agora (3 meses de uso) nao identificamos nada.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Acetato de Glatiramer (COPAXONE).Fumarato de Dimetila (TEC FIDERA), Positivo: Glatiramer - controle dos surtos.Fumarato de Dimetila - controle dos surtos, qualidade de vida, auto estima., Negativo: Glatiramer - marcas pelo corpo devido ao uso constante, reacoes alergicas.Fumarato de Dimetila - ate agora (3 meses de uso) nao identificamos nada.</p>
13/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portadora de esclerose multipla remitente recorrente e tive falha de tratamento com o remedio intramuscular e reação alergica que me impossibilitou de utilizar p fingolimoide, segunda opção de tratamento no meu caso. O fumarato de dimetila foi minha terceira opção de tratamento e última opção no meu caso, e estou muito satisfeita com o resultado e surtido o efeito esperado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Não tive nenhum efeito colateral e me sinto saudavel! Esse remedio é a minha salvação, pois já é o terceiro medicamento e o primeiro sem falha do medicamento. A neurologista que me acompanha está satisfeita e me sinto disposta e com a doença sob controle, Negativo: Não tive efeitos colaterais, estou muito satisfeita. O único problema é nao ter o medicamentk em que me adaptei no SUS.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone e fingolimoide, Positivo: Tive falha de medicamento em ambos os casos, Negativo: O copaxone não surtiu o efeito esperado e o fingolimoide teve reação alérgica, impossibilitando a utilização</p>
14/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Tecfider é um opção segura para o tratamento das formsas RR de EM e, sendo uma medicação oral acarreta uma maior aderência do paciente ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tecfidera, Positivo: Pacientes aliviados por não precisarem injetar-se mais e portanto maior aderência ao tratamento.Efeitos colterais pouco significativos., Negativo: Rubor facial de caráter transitório</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferon Beta 1a 30, 22 e 44 mcg Interferon Beta e 1 b, acetato de glatirâmer, fingolimode, natalizumabe, Positivo: De um modo geral observamos boa resposta terapêutica. Em cada caso individual a evolução clínica revelava a necessidade de troca de medicação por falha terapêutica. Casos mais graves com carga lesional importante ee surtos frequentes não obtinham boa resposta com as DMT de 1ª linha. , Negativo: Interferon B 1a 22 e 44 mcg: quadro de mialgia, sensação febrilAcetato de glirâmer: lipodistrofia</p>
12/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois, considerando a facilidade em tomar o medicamento, afastando a necessidade de injeções (o que sabidamente é desagradável), o mesmo deve sim ser incorporado ao SUS. Ademais, desde que comecei a tomar o medicamento (jan/17) não tive mais qualquer surto, o que é, sim, uma grande e feliz notícia! Ainda, destaco que os efeitos colaterais que tive (e as vezes tenho), não passam de um rubor no rosto que duro meia hora, ou seja, não é nada demais! Sendo assim, discordo da CONITEC e sou favorável a incorporação da medicação ao SUS...fato que poderia muitas pessoas que não têm acesso a mesma!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tomo diariamente (2 vezes ao dia) Tecfidera 240mg, Positivo: Desde que comecei a tomar a medicação (jan/17) não tive outros surtos!!, Negativo: Não vejo nenhum efeito negativo! A única coisas que as vezes acontece, é que fico com um rubor no rosto que dura cerca de meia hora...mas, como qualquer medicamento, é um efeito que é previsto e, portanto, não considero como efeito negativo!</p> <p>3ª - Não</p>
16/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: X, Positivo: C, Negativo: X</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fumarato de Dimetila mostrou eficácia superior ao medicamento de referência clássico, sem efeitos adversos severos, com excelente segurança, boa tolerabilidade e segurança. Trata-se de tecnologia oral. Portanto, não faz nenhum sentido que tenhamos que prescrever um medicamento de maior risco, tal como Fingolimod ou Natalizumab antes de prescrever o Fumarato de Dimetila.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta-Interferonas, Glatirâmer, Fingolimod, Fumarato de Dimetila, Teriflunomida, Natalizumab, Alemtuzumab, Mitoxantrone e Transplante de Células Tronco, Positivo: Beta-Interferonas - alguma eficácia em pacientes com baixa atividade de doença Glatirâmer: alguma eficácia em pacientes com baixa atividade de doença Fingolimod: eficácia moderada e via oral Fumarato de Dimetila: eficácia moderada, excelente perfil de segurança e via oral Teriflunomida: eficácia para doentes com baixa atividade de doença, excelente segurança e via oral Natalizumab: elevada eficácia Alemtuzumab: elevada eficácia Mitoxantrone: retirada do mercado devido aos seus riscos Transplante de Células Tronco: altamente eficaz quando viável, Negativo: Beta-Interferonas - efeitos adversos difíceis de tolerar Glatirâmer: uso subcutâneo diário Fingolimod: risco cardiovascular Fumarato de Dimetila: diarreia e dor abdominal Teriflunomida: queda de cabelos Natalizumab: LEMP Alemtuzumab: distúrbios hematológicos Mitoxantrone: risco de insuficiência cardíaca Transplante de Células Tronco: mortalidade elevada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta-Interferonas, Glatirâmer, Fingolimod, Fumarato de Dimetila, Teriflunomida, Natalizumab, Alemtuzumab, Mitoxantrone e Transplante de Células Tronco, Positivo: Beta-Interferonas - alguma eficácia em pacientes com baixa atividade de doença Glatirâmer: alguma eficácia em pacientes com baixa atividade de doença Fingolimod: eficácia moderada e via oral Fumarato de Dimetila: eficácia moderada, excelente perfil de segurança e via oral Teriflunomida: eficácia para doentes com baixa atividade de doença, excelente segurança e via oral Natalizumab: elevada eficácia Alemtuzumab: elevada eficácia Mitoxantrone: retirada do mercado devido aos seus riscos Transplante de Células Tronco: altamente eficaz quando viável, Negativo: Beta-Interferonas - efeitos adversos difíceis de tolerar Glatirâmer: uso subcutâneo diário Fingolimod: risco cardiovascular Fumarato de Dimetila: diarreia e dor abdominal Teriflunomida: queda de cabelos Natalizumab: LEMP Alemtuzumab: distúrbios hematológicos Mitoxantrone: risco de insuficiência cardíaca Transplante de Células Tronco: mortalidade elevada</p>
16/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pacientes que usam o medicamento e tem ótima qualidade de vida. O medicamento funciona e tem pouquíssimos efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beta-interferona e Natalizumabe, Positivo: Beta-interferona: Nada a declarar Natalizumabe: Me permite ter uma vida normal, sem surtos e sem efeitos colaterais., Negativo: Beta-interferona: Inúmeros... Imcompatível com uma qualidade de vida. Natalizumabe: Risco de infecções como qualquer imunossupressor</p>
16/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que toda tentativa de uso é válida!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lemtrada, Pulsoterapia com Solu-Medrol, Rebif, Gilenya, Tysabri., Positivo: Melhora do paciente ao andar, falar, e fazer atividades do dia a dia independentes de alguém 24h em cima dos pacientes., Negativo: Reações adversas severas, funguemia sistêmica, queda do sistema imunológico.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o fumarato de dimetila tem demonstrado excelente controle dos surtos da esclerose múltipla e NAO tem os efeitos colaterais graves dos outros medicamentos disponibilizados pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: FUMERATO DE DIMETILA, Positivo: NAO HOUVE MAIS SURTOS COM O USO DO MEDICAMENTO., Negativo: OS DEMAIS MEDICAMENTOS TEM EFEITOS COLATERAIS GRAVES, DESDE A PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.</p> <p>3ª - Não</p>
16/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A contestação à aprovação de incorporação de dimetilfumarato (DMF), ou fumarato de dimetila, foi fundamentada essencialmente em comparação ao fingolimode, considerando-se custo, inclusive. Verifica-se em estudos, contudo, uma eficácia comparável entre os 2 fármacos, com superioridade de eficácia, e custo menor, em relação à plataforma básica: acetato de glatirâmer e betainterferonas. A recomendação não fez referência, inclusive, aos aspectos pertinentes à teriflunomida, que tem perfil de eficácia inferior tanto ao DMF, quando ao fingolimode. Teriflunomida, que é o único fármaco, até agora, receptor de exigência de prescrição em receituário grupo C, por parte da ANVISA - sem tecer comentários sobre possível adequação do fato, ou não.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O produto em pauta é o fumarato de dimetila (ou dimetilfumarato), e tenho experiência com este fármaco. Tenho, adicionalmente, experiência com todas as betainterferonas, com acetato de glatirâmer, azatioprina, fingolimode, teriflunomida, natalizumabe, e alentuzumabe., Positivo: Fumarato de Dimetila: procedimento de iniciação simples, eficácia, esquema posológico, via de administração;Betainterferonas: história de segurança estabelecida;Acetato de glatirâmer: história de segurança estabelecida e pobreza de efeitos colaterais;Fingolimode: eficácia, esquema posológico, via de administração;Teriflunomida: esquema posológico, via de administração;Natalizumabe: eficácia, esquema posológico;Alentuzumabe: eficácia, esquema posológico;, Negativo: Fumarato de Dimetila: ocasionais efeitos colaterais (menores);Betainterferonas: via de administração, esquema posológico (de um modo geral), gerenciamento menos simples (refrigeração, transporte, restrição em aeroportos), efeitos colaterais comuns (às vezes intensos), eficácia limitada;Acetato de glatirâmer: via de administração, esquema posológico, gerenciamento menos simples (refrigeração, transporte, restrição em aeroportos), eficácia limitadaFingolimode: iniciação (6 horas de observação) e preparação (exames e avaliação prévios) complicados;Teriflunomida: eficácia baixa, necessidade de wash-out forçado (gravidez imprevista);Natalizumabe: risco, ainda que baixo, de encefalopatia multifocal progressiva;Alentuzumabe: efeitos colaterais (hematológicos, renais, tireóide);</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Favor ver item 8.1, Positivo: Favor ver item 8.2, Negativo: Favor ver item 8.3</p>
16/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amiga de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de um ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou utilização de Tecfidera e não teve mais surtos(usuária há 14 meses). Além disso, ela possuía intolerância a forma intramuscular de aplicação e aos sintomas colaterais significativos. Após o uso de Tecfidera não demonstra mais sintomas colaterais que afetem a rotina diária e a formado administração é indolor e prática, segundo relatos da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É fundamental a disponibilidade de medicamentos para uso por via oral no tratamento da Esclerose Múltipla devido a ocorrência de intolerância a medicamentos injetáveis.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betainterferona 1bBetainterferona 1aGlatiramer, Positivo: Betainterferona 1b, betainterferona 1a e Glatiramer: eficácia parcial no controle da doença., Negativo: Betainterferona 1b: intolerânciaBetainterferona 1a: intolerânciaGlatiramer: intolerância</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O rol de medicamentos para o tratamento da EM após a 1ª falha de tratamento deve ser ampliado, especialmente em se tratando de medicamento de uso oral</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Há 1 ano e 5 meses estou em tratamento com Avonex, mas houve falha terapêutica com 1 ano de 4 meses de tratamento, sendo que com 1 ano de tratamento tive nova lesão no crânio. Terei que trocar o medicamento, Positivo: Nos primeiros 6 meses de tratamento me senti bem, Negativo: febre, dor no corpo e cabeça e cansaço, além da falha terapêutica</p>
15/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Como profissional da saúde, observo que o protocolo atual de tratamento da esclerose múltipla não permite a flexibilização no uso dos medicamentos. Algumas situações de vida real não se encaixam no protocolo. Pacientes são resistentes às medicações injetáveis e os medicamentos orais representam um grande avanço. Disto isto, existe um perfil ideal para tratamento com dimetilfumarato: pacientes jovens, com menos de 40 anos de idade, e com doença em estágio inicial. Nesse grupo, o medicamento realmente se mostra eficaz, com redução da taxa anual de surtos em torno de 50% e quando comparado ao acetato de glatiramer, observa um redução que varia entre 7 a 21%. O ideal seria a incorporação em primeira linha, mas considero que incorporação para a intolerância aos medicamentos injetáveis fundamental.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dimetilfumarato - Tecfidera, Positivo: Bom controle do quadro clínico, em pacientes que não toleravam mais as injeções e em pacientes virgens de tratamento. Medicação ideal para o tratamento conjunto da esclerose múltipla e psoríase (alguns pacientes apresentam ambas), pois a desaparecimento das lesões da psoríase e bom controle dos surtos. Não necessita de monitoração de primeira dose, como o fingolimode. Isso facilita a vida do paciente e do médico. Especialmente porque os hospitais do SUS não têm lugares adequados para realizar a primeira dose de fingolimode e o tratamento oral domiciliar com tecfidera é mais simples., Negativo: No curto prazo, metade dos pacientes tratados experimentam efeitos adversos gastrointestinais que são perfeitamente controláveis. No longo prazo é preciso monitorar de perto a contagem de linfócitos, pois o medicamento está relacionado à linfopenia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betinterferonas e Glatiramer - DMDs clássicos que quando usados precocemente controlam a evolução da EM em 50-60%. Entretanto, dificilmente, os pacientes se mantem com esse tratamento em longo prazo. Aproximadamente 30-50% dos pacientes apresentaram sinais de falha de tratamento após 5-7 anos de tratamento. Além disso, observa-se que após 10 anos, os pacientes não toleram mais as injeções, especialmente quando há o aparecimento de lipodistrofia. Teriflunomida - semelhante a betainterferona, em termos de eficácia e ideal para mulheres e homens com prole constituída. Natalizumabe - excelente medicação de segunda linha, para pacientes com doença em atividade e casos agressivos. Fingolimode - Não é tão eficaz como o natalizumabe, não podendo ser usados em pacientes com doença agressiva, mas é um excelente medicamento para a falha da betainterferona, sendo 50% mais eficaz. , Positivo: Betinterferonas e Glatiramer - DMDs clássicos que quando usados precocemente controlam a evolução da EM em 50-60%. Entretanto, dificilmente, os pacientes se mantem com esse tratamento em longo prazo. Aproximadamente 30-50% dos pacientes apresentaram sinais de falha de tratamento após 5-7 anos de tratamento. Além disso, observa-se que após 10 anos, os pacientes não toleram mais as injeções, especialmente quando há o aparecimento de lipodistrofia. Teriflunomida - semelhante a betainterferona, em termos de eficácia e ideal para mulheres e homens com prole constituída. Natalizumabe - excelente medicação de segunda linha, para pacientes com doença em atividade e casos agressivos. Fingolimode - Não é tão eficaz como o natalizumabe, não podendo ser usados em pacientes com doença agressiva, mas é um excelente medicamento para a falha da betainterferona, sendo 50% mais eficaz. , Negativo: DMDs (betainterferona e glatiramer) - intolerância às injeções e graves complicações (necrose tecidual) com as injeções; tuberculose com uso prolongado de betainterferona. Natalizumabe - reações alérgicas à infusão e leucoencefalopatia multifocal progressiva. Fingolimode - infecção herpética de repetição</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tecfidera, Positivo: Pouco efeito colateral, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferon, copaxone, natalizumabe, Positivo: Eficacia de alguns, limitada de outros, Negativo: Efeitos colaterais mais ou menos graves</p>
16/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon e Fingolimode , Positivo: Fingolimode sem efeitos colaterais, qualidade de vida. , Negativo: Interferon todos os efeitos colaterais possíveis.Quadros depressivos.</p>
16/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Natalizumabe e, Positivo: Diminuir surtos e atividade da doença, Negativo: Sono após a aplicação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Compaxone, Positivo: Reduziu surtos, Negativo: Não reduziu atividade da doença</p>
16/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ha estudos que comprovam a efetividade do medicamento.Também vários relatos de pacientes ...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação com eficiência comprovada, com perfil de efeito colateral mais tolerável.Com certeza será mais uma ótima opção para o tratamento dos doentes portadores de Esclerose Múltipla.Hoje temos poucas opções quando ocorre falha aos imunomoduladores ou intolerância.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tecfidera - Dimetil Fumarato, Positivo: Eficácia maior que os interferons, glatiramerMenos efeito colateralNão ser injetávelTransporte mais simples, Negativo: Risco de linfopenia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AvonexRebiffBetaferonCopaxoneFingolimodNatalizumab, Positivo: Avonex - uso apenas 1x/semanaRebiff - mais simples de obter no início como primeira linhaBetaferon - mais simples de obter no início como primeira linhaCopaxone - mais simples de obter no início como primeira linhaFingolimod - não ser injetável, eficácia maior que imunomoduladores, menos efeito colateralNatalizumab - maior eficacia dentre os medicamentos disponíveis hoje pelo SUS para tratar esclerose múltipla, aplicação 1x/mês, boa resposta, Negativo: Avonex - injetavel, menor eficaciaRebiff - injetavel, efeito flu-likeBetaferon - injetavel, efeito flu-likeCopaxone - injetavel, efeito no local da aplicação, uso diárioFingolimod - monitorização de primeira doseNatalizumab - risco de LEMP, monitorização de vírus JC</p>
16/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o fumarato de dimetila deveria ser uma opção ao fingolimode em pacientes com contraindicações a esse medicamento e ao natalizumabe</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: fumarato de dimetila, Positivo: boa tolerancia eficacia e alternativa segura aos pacientes com contraindicações ao fingolimode e natalizumabe, Negativo: o fumarato de dimetila apresenta inconveniente de flush e desconforto abdominal no início do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: fingolimodeacetato de glatiramerinterferons, Positivo: Fingolimode eficacia, segurança e tolerabilidade, Negativo: glatiramer e interferons baixa eficácia e tolerabilidade</p>
16/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amigo de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (usuária há 14 meses). Além disso, ela possuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo relatos da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Fumarato de Dimetila é opção terapêutica que visa ser uma excelente opção naqueles pacientes que não toleram medicação injetável e da mesma forma não necessitam por seu perfil clínico evolutivo fazer uso de fingolimode e natalizumabe que são drogas mais potentes, mas também com efeitos colaterais mais importantes. São pacientes específicos que ir~ao utilizar esta medicação, que na minha experiência clínica corresponde a 20% dos pacientes que acompanho.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferons, Glatiramer, fingolimode, Fumarato de dimetila, rituximabe, natalizumabe, alemtuzumabe, teriflunomida, azatioprina, Positivo: interferons: controle moderado dos surtos, na casa dos 30%Glatiramer: controle moderado dos surtos, na casa dos 30%NTZ: medicação potente com resposta clínica acima dos 50%Teriflunimida: perfil semelhante aos interferons, oral com melhora de adesão naqueles pacientes não aderentes a injetáveis ou fóbicos a estes produtos, para pacientes com evolução da doença moderada.Fingolimode: eficácia superior a 50%, oral fácil de administração e aderênciaFumarato de Dimetila:vide acima, Negativo: Interferons: hepatopatia, reações alérgicas, lesões no local de aplicação, depressão, infecções recorrentes e baixa eficáciaGlatiramer: reações alérgicas, lipodistrofia, hepatopatia, demora do início de ação, eficácia semelhante aos interferons.Teriflunomida: Eficácia baixa, semelhante aos interferons, transtorno gastrointestinal, queda cabelo.natalizumabe: risco de LEMP em pacientes JC positivosAlemtuzumabe: tiroidite, alterações renais S.Good PastureAzatioprina: em desuso por limitar o uso de medicamentos mais potentes e eficácia clínica não comprovada.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vamos ver pelo lado prático: é mais benéfico ao governo que invista em prevenção. Estamos vivendo um momento onde a Reforma da Previdência se faz necessária por conta da grande quantidade de pessoas se aposentando em idade produtiva e/ou aumento do uso dos benefícios previdenciários. A aprovação do Fumarato de Dimetila, pode ajudar uma pessoa a sair do quadro de inatividade, tornando-o útil à sociedade e produzindo, que no fim das contas, é o melhor para todos os lados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex; Copaxone; pulsoterapia. , Positivo: Diminuíram minhas lesões no cérebro., Negativo: Dores das injeções</p>
15/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Penso que cada portador da doença é um caso diferente e deve ser acompanhado e considerado sua sensibilidade ao medicamento de forma singular. Deve se ter muito cuidado, cautela com cada paciente e com cada reação ao medicamento, porém frente a evidencias científicas em determinadas circunstancias pode-se chegar por hora a essa conclusao.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço tratamento com betainterferon 1a(AVONEX) e quando estive internada por duas vezes com surto por causa da doença, fui tratada com metilprednisolona e depois até iniciar tratamento com avonex, por um período de tres meses, com corticoide, prednisona., Positivo: Quando em período de surto o tratamento indicado com metilprednisolona foi realmente muito util, logo depois o período antes de avonex com prednisona também ajudou bastante nos sintomas. Hoje estou há um ano fazendo uso do avonex- betainterferon e tem até o momento um efeito muito positivo em controlar a doença e no meu bem estar no dia a dia. Porque no meu cotidiano me sinto muito bem e sinto poucos sintomas, minha qualidade de vida está realmente muito boa., Negativo: Bom, só posso citar a dor em aplicar e também o incomodo de dores pós aplicação, como: tensão ou dor corporal, dor na perna, eventuais dores de cabeça.</p>
15/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nos pacienbntes com EMRR, o fumarato de dimetila mostrou eficácia comprovada, com diminuição da taxa anualizada de surtos quando comparado aos interferons, acetato de glatirâmer e teriflunomida (Hutchinson et al, Curr Med Research 2014), diminuição do nº de internações em 2 anos para tratamento com corticóides alem de maior aderência ao tratamento por ser uma medicação de uso oral. Uma revisão dos estudos CONFIRM e DEFINE (Expert Opinion Pharmacother; Harvdrova et al, 2013) destaca a indicação do fumarato de dimetila inclusive como 1ª linha de tratamento, apoiado pelo estudo de extensão ENDORSE.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Pacinete com maior adreência ao tratamento, melhora na qualidade de vida, boa resposta ao tratamento. Por ora não foi indicada a trocade medicação considerando falaha terapêutica., Negativo: Rubor facial passageiro, discreta queda dos linfócitos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferons B 1a 30, 22 e 44 mcg; Interferon B 1b; acetato de glatirâmer; fingolimode; natalizumabe, Positivo: As DMDs de 1ª linha alcançaram uma resposta terapêutica adequada em alguns pacientes porem foi necessário substituí-las por falha terapêurtica ou flat de aderência ao tratamento.O natalizumab mostrou uma rsposta superior aos DMD de 1ªl inha nos pacientes com alta carga lesional, e com atividade importante da doença aferida pelo nº de surtos ou aumento do n] das lesões à RM.O fingolimode mostrou boa resposta., Negativo: Os interferons B 1 a de 22 e 44 mcg acarretam sintomas flu-like que algumasas vezes foram motivo de troca de medicação por persistência dos sintomas. O acetato de glatirêmr acarretou lipodistrofia em poucos pacientes. O finfolimode acarretou linfopenia importante em poucos pacientes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Fumarato de dimetila é uma medicação segura com eficácia comprovada a partir de ensaios clínicos e estudos de vida real. A academia brasileira de neurologia divulgou uma recomendação de tratamento para a esclerose múltipla em 2016 e coloca o fumarato de dimetila como troca após a falha ao primeiro tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta interferona Acetato de glatiramer Natalizumabe Fingolimode Teriflunomida Fumarato de dimetila Alemtuzumabe, Positivo: Beta interferona e acetato de glatiramer - segurança de longo prazo Natalizumabe, alemtuzumabe e fingolimode - eficácia superior. Util na falha de tratamento ou na EM altamente ativa Teriflunomida - uso oral Fumarato de dimetila - eficácia e segurança visto que apesar de não ter ensaio clínico comparativo na prática o que se percebe é que é uma medicação mais eficaz que beta interferona e acetato de glatiramer. Além disto é uma medicação muito segura com baixo risco de efeitos colaterais severos., Negativo: Interferon, acetato de glatiramer - uso injetável frequente. Nos interferons os efeitos flu like e no acetato o efeito local na pele Natalizumabe - risco por JC vírus Fingolimode - bradicardia, infecções, edema macular Alemtuzumabe - efeitos auto imunes - tireoidite, purpura Teriflunomida - efeitos adversos leves como alopecia. Medicação classe X para gestação Fumarato de dimetila - efeitos adversos leves como gastrintestinais e rubor. Relato na literatura de JC vírus mas não foi comprovada sua relação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: já descrito acima, Positivo: já descrito acima, Negativo: já descrito acima</p>
15/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicação eficaz e de fácil administração</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Facilidade de administração e eficácia, Negativo: Efeitos gastrointestinais iniciais, mas temporários</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferon, acetato de glatiramer, fumarato de dimetila, natalizumabe, Positivo: Interferon e glatiramer - segurança Natalizumabe - eficácia Fumarato de dimetila - facilidade de administração e eficácia, Negativo: Interferon - reação flu like Glatiramer - reação no local da infusão Natalizumabe - risco de LMP Fumarato de dimetila - reações gastrointestinais no início do tratamento</p>
15/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Ainda não tenho muito conhecimento a respeito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beta interferona 1 (AVONEX), Positivo: Não apresentou mais surtos da doença., Negativo: Os efeitos colaterais que o medicamento causa. Mal estar, dor no corpo, etc.</p>
15/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Após 1 ano de uso foi detectada inexistência de novas lesões na revisão ocorrida em abril/2017</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera - fumarato de dimetila, Positivo: Tecfidera: A medicação é oral e os efeitos colaterais foram só iniciais e brandos, ausência de dores no estômago desde que administrado de estômago cheio e controle eficiente das lesões., Negativo: Tecfidera: vermelhidão no rosto na primeira semana e eventualmente em alguns momentos no decorrer do tratamento e dor de estômago de administrado em jejum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Controle mediano das lesões, Negativo: Injetável, refrigerado, o que dificultava o transporte, é muitas dores no corpo a calafrio nas primeiras 24 horas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho 4 pacientes em uso com boa resposta e é no mínimo mais uma opção de tratamento como mostram as evidências da literatura médica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o Fumarato, Positivo: Estabilidade de surtos de Esclerose Multipla , Negativo: Diarreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato dimetil, Positivo: Estabilidade de surtos , Negativo: Diarreia passageira e flush cutâneo</p>
15/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acredito que todo medicamento que seja para uma melhora do paciente é válida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 44, Positivo: Não tenho mais formigamento na perna direita., Negativo: Mais fadiga e dores de cabeça</p>
15/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona e fingolimode, Positivo: Betainterferona- retardou levemente o avanço da doençaFingolimode - sem crises desde o início e sem efeitos colaterais, Negativo: Betainterferona- efeitos colaterais e não foi muito eficiente já q tive crise no meio do tratamentoFingolimode - sem efeitos negativos</p>
14/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Eu me acertei com o remefio</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif , Positivo: Diminuição das crises, Negativo: Prostração , febre ,? Dor</p>
15/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tudo que for beneficiar o paciente de em deve ter acesso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: 09 anos sem surtos, Negativo: No dia seguinte sensação de gripe</p>
15/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos ter mais esta boa opção para o tratamento da esclerose múltipla, pois alguns pacientes não toleram determinadas terapias.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato de dimetila., Positivo: Uso oral, armazenamento em temperatura ambiente, boa tolerância e aderência. , Negativo: Acesso ao medicamento. Efeitos colaterais, embora sejam transitórios e bem tolerados.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betainterferonas, Glatirâmer, Fingolimode, Ocrelizumabe e Fumarato de dimetila., Positivo: Betainterferonas: segurança.Glatirâmer: segurança e efeitos colaterais.Fingolimode: uso oral, efeitos colaterais e eficácia.Ocrelizumabe: eficácia, segurança e efeitos colaterais.Fumarato de dimetila: uso oral, eficácia, efeitos colaterais transitórios e controlados., Negativo: Betainterferonas: efeitos colaterais, uso injetável, armazenamento refrigerado;Glatirâmer: reações nos locais de aplicação, injetável, armazenamento refrigerado;Fingolimode: monitoramento de primeira dose, eventuais riscos.Ocrelizumabe: Acesso.Fumarato de dimetila: Acesso, eventual efeitos colaterias, embora possível ser controlado.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eficácia superior aos dmd de primeira linha e com poucos efeitos colaterais</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: fumarato de dimetila, Positivo: redução da taxa de surtos, Negativo: gastrointestinais no início</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Natalizumabe , Fingolimode, Positivo: redução taxa de surtos, Negativo: risco de LEMP , risco de arritmia , alteração macular.</p>
15/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acompanho pacientes há 20 anos. Existem pacientes que não toleram mais medicações injetáveis ou por pânico de agulhas ou complicações nos sitios de aplicação como a lipoatrofia, necrose de pele, hematomas e/ou alergias. A opção para depois da primeira falha é válida depois dos estudos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato de dimetila 120 e 240 mg., Positivo: Comodidade na aplicação e armazenamento da medicação., Negativo: Efeitos colaterais leves como diarreia e rush cutaneo na primeira semana.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta interferona 1A 22 e 44 mcg SC e 30 IM. Beta interferona 1B SC. Acetato de Glatiramer, Teriflunomida 14 mg VO, Natalizumabe EV, Fingolimode. Alentuzumabe, Rituximabe., Positivo: Diminuição da frequência dos surtos e da incapacidade funcional., Negativo: Os injetáveis efeitos da aplicação. Os orais sem efeitos.</p>
15/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: beta-Interferon, fingolimode, Aubágio e agora Tecfidera, Positivo: Quase nenhum., Negativo: Beta interferon desenvolvi um problema na Tireóide; Fingolimode problema na mácula; aubágio apos um ano de uso surgiram novas lesões. Tecfidra até o momento nenhuma. Uso há um ano.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: beta-Interferon, fingolimode, Aubágio e agora Tecfidera, Positivo: quase nenhum, Negativo: Beta interferon desenvolvi um problema na Tireóide; Fingolimode problema na mácula; aubágio apos um ano de uso surgiram novas lesões. Tecfidra até o momento nenhuma. Uso há um ano.</p>
15/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Literatura mundial recomenda Tecfidera como medicamento de 1a linha para Esclerose Múltipla Tecfidera</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dimetil Fumarato, Positivo: Desde que estou usando não tive mais surtos, Negativo: Efeitos colaterais como rubor facial</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: Não senti efeitos colaterais, Negativo: Não evitou novos surtos e tampouco o aparecimento de novas lesões na Ressonância Magnética</p>
15/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif, avonex e copaxone, Positivo: Sem efeitos colaterais com Avonex e Rebif, Negativo: Reação alérgica ao Copaxone</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento em questão possui um baixo índice de reações adversas e praticidade no tratamento, sendo utilizado em vários países de primeiro mundo em combate à EM.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: FUMARATO DE DIMETILA (Tecfidera), Positivo: - Uso em cápsulas;- Não há contra-indicações;- Reações adversas pouco significativas, apenas um rubor nas primeiras semanas;- Não tive recidivas da doença até o momento., Negativo: - Algum rubor nas primeiras semanas de tratamento com a medicação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CLORIDRATO DE FINGOLIMODE (Gilenya) , Positivo: Gilênia: - Uso em cápsulas;- Apenas uma vez ao dia;- Não tive recidivas ao utilizar a medicação., Negativo: Gilênia: - Primeira dose do tratamento deve ser monitorada;- Aparecimento de pequeno edema na mácula do olho direito, o que levou à decisão da mudança da medicação pelo médico.</p>
09/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera que, Positivo: Não preciso tomar injeção constante, muito mais eficaz, trás bem estar melhor, menos efeito colaterais, bem mais eficaz do que os medicamentos do SUS, Negativo: Não tem no Sus, e Rubor na pele</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A doença já é tão dolorosa, não precisamos de mais 1</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon,hoje avonex, Positivo: Manteve estável, Negativo: Dolorosa e efeitos arrasadores</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon,avonex, Positivo: Manteve estável, Negativo: Efeitos colaterais,e dolorosa</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes com esclrose múltipla devem ter o direito a outras opções se as primeiras não deram certo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, Positivo: Usei e uso só esse e tem dado ótimo resultados, mas se não desse faria de tudo para tentar outros, Negativo: Nos primeiros meses a reação (dores no corpo e fadiga) é mais forte, com o passar do tempo melhora muito</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quanto maior for a oferta de medicação e tratamento, melhor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Ausência de surtos e excelente resultado do medicamento, Negativo: Não há</p>
09/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação é de primeira linha e pode ser a primeira medicação indicada na profilaxia dos surtos da EM</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato de dimetila 120 e 240 mg, Positivo: excelente controle dos surtos, efeitos colaterais leves e transitórios, Negativo: rubor e diarreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: interferons, acetato de glatiramer, fingolimode, natalizumabe, Positivo: todos são adequados para diminuir o numero dos surtos da EM, mas o fumarato pode ser considerado de primeira linha, Negativo: raros pacientes apresentam diarreia, rubor - transitórios</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta medicação e muito eficiente, e sem efeitos colaterais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon, Rebif, Positivo: Manteve minha doença em remissao, Negativo: Efeitos colaterais muito intensos, como fadiga, cefaleia e depressao</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon ha 44,natanuzunabe,compaxone, Positivo: Natanuzunabe bom resultados,interferon e copaxone nao obteve exito, Negativo: Nao houve melhoras no caso tive alguns surtos tendo que fazer infusao de corticoide,natanuzunabe foi eficaz nao tive surto,houve uma melhira no quadro geral</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AVONEX, Positivo: DIMINUIÇÃO DE SURTOS, Negativo: EFEITOS COLATERAIS</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Desde q faço uso do medicamento, há 4 anos, não tenho surto, Negativo: Injetável</p>
09/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento Fumarato de Dimetila tem mostrado resultados mais eficazes relativamente ao bem-estar do paciente e maior redução dos sintomas e efeitos colaterais se comparado aos demais. Além disso, possui menor custo de fornecimento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: betainterferona 1a 30mcg/0,5ml-6.000.000 UI., Positivo: Os efeitos positivos é que faço uso do betainterferona 1a 30mcg/0,5ml- 6.000.000 UI, já faz uns dois anos que uso nunca mais senti nenhum surto., Negativo: Eu só faço uso do medicamento citado acima. Às vezes eu sentia o corpo meio doido e parecendo sintomas de gripe, mas no dia seguinte passava.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera que, Positivo: Não preciso tomar injeção constante, muito mais eficaz, trás bem estar melhor, menos efeito colaterais, bem mais eficaz do que os medicamentos do SUS, Negativo: Não tem no Sus, e Rubor na pele</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Comecei o tratamento a 5 semanas com Betainterferona e estou me adaptando muito bem ao remédio, já senti melhora em problemas que o surto tinha causado em mim. Acredito que esse remédio é muito eficaz, porém, ainda não tenho confirmação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona , Positivo: Adaptação rápida, pouca dor, melhora dos surtos., Negativo: Me sinto cansada.</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este remedio é confiavel e pratico, sem muitod efeito colaterais</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Impede surgimento de novas lesoes, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A esclerose múltipla ainda não tem cura , porém existe tratamento e cientistas empenhados em novos tratamentos , melhor qualidade de vida e prevenir ou mesmo retardar as consequências incapacitantes desta doença, sendo de suma importância a variedade de oferta farmacológica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatiramer (Copaxone)Betainterferona 1b, Positivo: Não houveram efeitos positivos. , Negativo: Copaxone : efeito de quase morte (previsto em uma pequena porcentagem na bula).Betainterferona : cinco anos de aplicações doloridas Onde, nos três primeiros anos houve um controle da doença, abstenção dos surtos , havendo nos anos seguintes, falência terapêutica e locais de aplicação extremamente desgastados.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Cada organismo responde de uma forma o medicamento utilizado e o uso de Fumarato de Dimetila é uma outra opção menos sofrível para aqueles que são portadores de EM e padecem muito com os efeitos colaterais do Interferon oi outros medicamentos disponibilizado pelo Sus</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou tendo agora com o tecfidera, Positivo: A EM se manifestou em mim em novembro de 2015 e comecei a utilizar o betain-interferindo 1a de 30 mcg/0,5 ml - 6.000.000 UI uma vez por semana, cujos efeitos colaterais foram por demais torturante, com febre após a aplicação, muita fadiga, dores musculares e nos ossos, dores fortissima da nuca e estado depressivo, com incapacidade para trabalhar, falta de concentração, etc.Já o Tecfidera, irá completar 2 meses de uso, também há efeitos colaterais, mas muito menor, pois a fadiga é menor, não tenho mais dor na nuca, as dores musculares e menor, porém com um pouco de desequilíbrio e intestino ora preso, ora solto., Negativo: Vide resposta anterior</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vide resposta do item 8.2, Positivo: Vide resposta do item 8.2, Negativo: Vide resposta 8.2</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O fumarato de dimetila apresenta potência relativa maior que as betainterferonas e o glatirâmer no controle dos surtos, da progressão da incapacidade e na atividade da doença evidenciada por exame de ressonância magnética do encéfalo. Assim, o fumarato de dimetila poderia ser utilizado como tratamento inicial, com a vantagem de ser ministrado via oral.Por outro lado, o fumarato de dimetila apresenta um perfil de segurança melhor que o fingolimode, não sendo necessário monitoramento cardíaco da primeira dose e com boa tolerabilidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato de dimetila no tratamento da esclerose múltipla forma recorrente-remitente., Positivo: Fumarato de dimetila:Comodidade na administração por ser via oral;Boa tolerabilidade, com eventos adversos facilmente manejáveis;Poucas alterações hematológicas (leucopenia discreta eventualmente);Ausência de hepatotoxicidade;Ausência de cardiotoxicidade;Menor frequência de infecções quando comparado ao fingolimode e ao natalizumabe;Redução da taxa de surtos e da progressão equivalente ao fingolimode;Não necessidade de monitoramento da administração, ao contrário do fingolimode e do natalizumabe., Negativo: Fumarato de dimetila:Rash cutâneo nas primeiras administrações;Eritema pruriginoso após algumas administrações;Aceleração do trânsito intestinal, especialmente se ingerido com estômago vazio.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TeriflunomidaBetainterferona 1a 30 µg IMBetainterferona 1a 22 µg SCBetainterferona 1a 44 µg SCBetainterferona 1b 250 µg SCGlatirâmerFingolimodeNatalizumabeAlentuzumabe, Positivo: Teriflunomida: comodidade posológica, 1 cp VO/dia, poucos eventos adversos.Betainterferona 1a 30 µg IM: comodidade posológica, 1 injeção semanal; pouca formação de anticorpos neutralizantes; pode ser utilizado na síndrome clínica isolada (CIS) com risco de evolução para esclerose múltipla; medicamento seguro para pacientes com menos de 18 anos.Betainterferona 1a 22 µg SC: facilidade de uso (autoinjeter); pode ser utilizado na síndrome clínica isolada (CIS) com risco de evolução para esclerose múltiplamedicamento seguro para pacientes com menos de 18 anos.Betainterferona 1a 44 µg SC: facilidade de uso (autoinjeter); pode ser utilizado na síndrome clínica isolada (CIS) com risco de evolução para esclerose múltipla; medicamento seguro para pacientes com menos de 18 anos.Betainterferona 1b 250 µg SC: facilidade de uso (autoinjeter); pode ser utilizado na síndrome clínica isolada (CIS) com risco de evolução para esclerose múltipla; medicamento seguro para pacientes com menos de 18 anos.Glatirâmer: não há formação de anticorpos neutralizantes; não há necessidade de monitoramento hematológico ou da função hepática; medicamento seguro para pacientes com menos de 18 anos. Fingolimode: comodidade posológica (1 cápsula via oral/dia); potência relativa superior à teriflunomida, às betainterferonas e ao glatirâmer; redução significativa da taxa de surtos, da progressão da incapacidade e das lesões ativas vistas à imagem por ressonância magnética do encéfalo.Natalizumabe: comodidade posológica (1 infusão mensal); potência relativa superior à teriflunomida, às betainterferonas e ao glatirâmer; redução significativa da taxa de surtos, da progressão da incapacidade e das lesões ativas vistas à imagem por ressonância magnética do encéfalo; medicamento muito eficaz nas formas agressivas da doença.Alentuzumabe: comodidade posológica (5 infusões no 1º ano; 3 infusões 2º ano); potência relativa superior à teriflunomida, às betainterferonas, ao glatirâmer, ao fumarato de dimetila, ao fingolimode e ao natalizumabe; redução significativa da taxa de surtos, da progressão da incapacidade e das lesões ativas vistas à imagem por ressonância magnética do encéfalo; medicamento extremamente eficaz nas formas agressivas da doença., Negativo: Teriflunomida: eficácia restrita no controle da doença; necessidade de suspensão 2 anos antes da intenção de engravidar (risco de teratogenicidade).Betainterferona 1a 30 µg IM: reações adversas "flu-like"; formação de anticorpos neutralizantes, reduzindo a eficácia do medicamento; dor no local da injeção; necessidade de armazenamento sob refrigeração.Betainterferona 1a 22 µg SC: reações adversas "flu-like"; formação de anticorpos neutralizantes, reduzindo a eficácia do medicamento; dor no local da injeção; necessidade de armazenamento sob refrigeração.Betainterferona 1a 44 µg SC: reações adversas "flu-like"; formação de anticorpos neutralizantes, reduzindo a eficácia do medicamento; dor no local da injeção; necessidade de armazenamento sob refrigeração.Betainterferona 1b 250 µg SC: reações adversas "flu-like"; formação de anticorpos neutralizantes, reduzindo a eficácia do medicamento; dor no local da injeção; casos de necrose cutânea no local da injeção; necessidade de armazenamento sob refrigeração.Glatirâmer: dor no local da injeção; lipodistrofia nos locais das injeções.Fingolimode: necessidade de monitoramento cardíaco por 6h na primeira dose ou se houver interrupção do tratamento por mais de 2 semanas; leucopenia com aumento do risco de infecções; aumento de enzimas hepáticas, dos níveis dos triglicérides e do colesterol.Natalizumabe: necessidade de monitoramento das infusões; preocupação com risco de leucoencefalopatia multifocal progressiva pelo JC vírus.Alentuzumabe: necessidade de monitorar o paciente mensalmente (hemograma, função hepática) e trimestralmente (função tireoidiana), além de alertá-lo quanto ao risco elevado de infecções (70%), de hipotireoidismo (35%) e de complicações graves (trombocitopenia, D. Graves, S. Goodpasture) por até 48 meses após a última</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>infusão.</p> <p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só quem precisa desse medicamento sabe o drama que é pagar o preço que ele custa. É mais caro que o salário de todos da minha casa juntos. E a vida da minha irmã dependera dele pro resto da vida. Pensa pagar mais de 6 - 8 mil por mês num remédio? No Brasil?? Só a minoria milionária consegue!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex. 30 mcg, Positivo: Não tive mais surtos, Negativo: Aplicação injetável</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon, Positivo: Sem surtos , porém reação forte após injecao, Negativo: Reação após injecao</p>
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Empresa	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amiga de ex-usuária de AVONEX, que o utilizou durante cerca de 1 ano desencadeando um episódio de surto. Desde então, esta iniciou a utilização de Tecfidera e não teve mais surtos (usuária há 14 meses). Além disso, ela possuía intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativos. Após o uso do Tecfidera, não demonstra mais sintomas colaterais que afetam rotina diária e a forma de administração é indolor e prática, segundo relatos da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex., Positivo: Controle positivo da evolução da doença, que está estável com o tratamento., Negativo: Avonex - poucas queixas, mas um ponto negativo é ser injeção intramuscular. Dor de cabeça no dia seguinte ao remédio é outra queixa.</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, No momento estou com tratamento da beta interferona 1a, satisfeito, sem problema de intolerância ou eficiência, mas gostaria de dispor da disposição de novos medicamentos caso os médicos indicassem, inclusive o Furamato de dimetila.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tysabri, avonex Rebif , Positivo: Surtos controlados, Negativo: Febre, sintomas de gripe</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tomo remedio, Positivo: Melhora em surtos, Negativo: Dor de cabeça e sensação de gripe</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxine, rebif, natalizumabe, Positivo: Melhoras em surtos, Negativo: Dor de cabeça sensação de gripe</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1a 30mg, Positivo: Diminuiu os surtos que tinha com mais frequência., Negativo: Febre e calafrios.</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Xxxx</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nem todos os pacientes se dão bem ou veem resultados com os medicamentos que hoje estão sendo oferecidos pelo governo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex - Betainterferona 1A, Positivo: No segundo ano de utilização tive diminuição das crises. , Negativo: Demorou um ano para começar a surtir efeito no corpo.</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Natalizumabe, Positivo: Não tive surto, Negativo: Nenhum</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu uso e me sinto muito satisfeita e meu problema está controlado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: glatirâmer e betainterferona e agora o tecfidera., Positivo: glatirâmer (naoda positivo)betainterferona (nada positivo)Tecfidera ou fumerato de dimetila (positivo) problema estacionado e me sinto melhor sem sirto ou controle do que sentia silenciosamente., Negativo: glatirâmer - forte sor de cabeça..parei no ctibetainterferona - batimento cardiaco desacelerou - parei no cti</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: glatirâmer e betainterferona, Positivo: glatirâmer (naoda positivo)betainterferona (nada positivo)Tecfidera ou fumerato de dimetila (positivo) problema estacionado e me sinto melhor sem sirto ou controle do que sentia silenciosamente., Negativo: glatirâmer - forte dor de cabeça..parei no ctibetainterferona - batimento cardiaco desacelerou - parei no cti</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, EU ESTOU BEM COM ELE!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: AVONEX e TECFIDERA 240 mg (Fumarato de dimetila), Positivo: com o primeiro fiquei sem surto até os 3 anos e meio, e com o segundo estou muito bem até agora., Negativo: Reações do Avonex: frio, dor no corpo, dor de cabeça.Reações do Tecfidera: Vermelhidão e queimação no corpo.</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: REBIF 44REBIF 22AVONEX, Positivo: CONTROLE EVOLUTIVO DAS LESÕES, Negativo: REBIF 44 E REBIF 22: MAL ESTAR, FEBRE, DOR DE CABEÇA, DORES NO CORPO COM MUITA FREQUÊNCIA.AVONEX: MAL ESTAR, FEBRE, DOR DE CABEÇA, DORES NO CORPO COM MENOS FREQUÊNCIA.</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos de novas opções de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: betainterferon, Positivo: diminuição de lesões, Negativo: dor de cabeça e mal estar</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento já foi aprovado em diversos países, incluindo EUA, Inglaterra e Canadá.Custo inferior à outros medicamentos alternativos para tratamento da doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1a, Avonex., Positivo: A aplicação continua estabilizou a doença. Esclerose múltipla., Negativo: Um pouco de mal estar no dia seguinte à aplicação (semanal) no início do tratamento. Sintomas de gripe. Contornados em seguida, com medicamentos e procedimentos.</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon, Positivo: Melhora dos sintomas Estabilidade da doença calafrios, Negativo: CalafriosCefaleia</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Foi aprovado pela ANVISA. Uma única ocorrência não é determinante sobre tantas outras evidências inclusive fora do país.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon - AVONEX, Positivo: Não tive mais nenhum surto durante o uso. , Negativo: Os efeitos colaterais no dia seguinte à aplicação variam entre fadiga, dores e até febre.</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por que as pessoas tem o direito ao tratamento da doença, não importa qual a substancia que será utilizada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona - Avonex, Positivo: Utilizo há mais de 7 anos e desde que comecei o tratamento não tive mais surtos., Negativo: Nenhum.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Não entendo muito sobre a questão técnica da eficácia da medicação. Mas se for para contribuir no tratamento desta doença, que somente quem possui pode relatar o que é, acredito que a medicação deva ser fornecida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AvonexPulsoterapia com corticoidegabapentina, Positivo: avonex, desde o início do uso até o presente momento não tive mais surtoPulsoterapia, retornou o que os surtos afetaramGabapentina: Alívio da dor nas pernas e quimação continua., Negativo: Avonex, febre, tremores, sintomas de gripe (apenas no dia posterior ao uso)Pulsoterapia: tontura, desorientação, mau estar (até algumas semanas após o término)Gabapentina: nenhum</p>
09/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos de nós portadores de esclerose múltipla não respondemos aos tratamentos com os medicamentos disponíveis pelo SUS. Ficamos muitas vezes vulneráveis e evoluímos com lesões irreversíveis.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon, Positivo: Positivo apenas com a pulso terapia, Negativo: Função hepática e renal alteradas, mal estar físico.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon, Positivo: Nenhum, Negativo: Já descrito no item 8.3</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Reações , Negativo: Fadiga,mal estar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Nenhum, Negativo: Fadiga</p>
11/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Outros, Positivo: Ela n apresentou reação , Negativo: N se sentiu bem, enjoada</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou usando há 6 meses e estou me sentindo bem</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera Biogen, Positivo: Estou tendo vida normal.com o Tecfidera, Negativo: Nos primeiros dias fiquei um pouco vermelha. Mas só nos primeiros dias.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: O Avonex. Também dá Biogen., Positivo: Consegui viver., Negativo: O fato de ser injeção. Usei pelo SUS por muitos anos. Não aguento mais uma injeção por semana. Tive vários surtos.</p>
11/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação do Tecfidera, medicamento já aprovado pela ANVISA, amplia o leque terapêutico e permite maior oportunidades de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Melhoria da qualidade de vida, melhoria nos aspectos emocionais e psicológicos ., Negativo: Não identificados.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon 1b, Positivo: Medicamento amplamente utilizado., Negativo: Efeitos colaterais intoleráveis, vermelhidão, irritação no local e mal estar.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que os pacientes com esclerose múltipla têm o direito à um tratamento por via oral, sem grandes efeitos colaterais e com um melhor índice de eficácia que as medicações oferecidas hoje pelo Sus para o tratamento inicial da doença. Estas têm os inconvenientes de serem administradas por via parenteral e possuírem efeitos colaterais que afetam mais a rotina dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila , Positivo: Comodidade do uso por via oral (duas vezes ao dia), sem grandes efeitos colaterais., Negativo: Náuseas e dispepsia eventuais.</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas dependem dessa medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem pessoas que necessitam dessa medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes dependem da medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem q avançar com outros medicamentos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon, Positivo: Não tive mais surtos, Negativo: Fadiga, dor de estômago, dor de cabeça, dores articulares, sintomas de gripe,</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Estou fazendo o tratamento com esse medicamento , e estou me dando muito bem com ele , e concordo que ele é eficaz para o tratamento de esclerose múltipla!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex , Beta iteferona 1a, Positivo: Tive melhoras ao caminhar , equilíbrio e retardo em relação aos surtos., Negativo: Me causou depressão</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não , Positivo: Não , Negativo: Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessário campo de amostra maior</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Redução dos sintomas, não avançou as lesões cerebrais, , Negativo: Não houve efeito negativo</p>
11/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, É SIM NECESSÁRIO NOVAS OPÇÕES DE TRATAMENTO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AVONEX E COPAXONE., Positivo: COPAXONE NÃO ME TRAZ REAÇÕES, TIPO DORES MUSCULARES, CABEÇA ETC., Negativo: AVONEX ME TRAZIA REAÇÕES, TIPO DORES MUSCULARES.</p>
11/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do Tecfidera desde Agosto de 2016.Não tive nenhum sintoma negativo ao uso do mesmo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon beta-1a, Positivo: positivo nenhum, Negativo: Por ser um medicamento injetável,era bastante desconfortável a aplicação do mesmo.</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glatiramer e Natalizomabe, Positivo: Doença "estacionada", Negativo: Occoreram alguns surtos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A MEDICAÇÃO FUMARATO DE DIMETILA É UMA MEDICAÇÃO DE ALTA EFICACIA PARA O TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, ALÉM DE ÓTIMO PERFIL DE SEGURANÇA. JÁ É UTILIZADO E RECOMENDADO EM OUTROS PAÍSES COMO TRATAMENTO DE PRIMEIRA LINHA PARA PACIENTE COM ESSE DIAGNÓSTICO, COM BONS RESULTADOS A LONGO PRAZO EM RELAÇÃO A SURTO E PROGRESSÃO DE DOENÇA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FUMARATO DIMETILA- TECFIDERA - DOSE DE 240 MG 12/12H, Positivo: OS PACIENTES EM USO DESSA MEDICAÇÃO APRESENTAM BOA ADERÊNCIA POR SER MEDICAÇÃO DE USO ORAL. APRESENTA BAIXO INDICES DE EFEITOS COLATERAIS. OS PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO NÃO APRESENTARAM ATIVIDADE DE DOENÇA DURANTE O TEMPO DE ACOMPANHAMENTO, SEM SURTOS NOVOS E SEM LESOES NA RESSONANCIA, Negativo: PACIENTES APRESENTAM AUADRO DE DIARREIA NOS PRIMEIROS 30 DIAS DO USO DA MEDICAÇÃO, QUE É UM EFEITO ADVERSO BEM DESCRITO.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INTERFERON 1AINTERFERON 1B 44, 22AVONEXFINGOLIMODNATALIZUMABAUBAGIO, Positivo: OS INTERFERONS EM GERAL SÃO MEDICAMENTOS COM ALTO PERFIL DE SEGURANÇA, JÁ EM USO A MUITO TEMPO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA, COM BONS RESULTADOS EM CASOS LEVESNATALIZUMAB POSSUI OTIMA EFICACIA, PRINCIPALMENTE PARA CASOS MAIS REFRATARIOS, COM A FACILIDADE DE APLICAÇÃO 1X/MESAUBAGIO E FINGOLIMOG TEM A VANTAGEM DE SEREM MEDICAMENTOS DE USO ORAL, , Negativo: OS INTERFERON APRESENTAM A DESVATAGEM DE SEREM DE APLICAÇÃO PARENTERAL E CAUSAREM MUITOS EFEITOS FLU-LIKENATALIZUMAB PODE CAUSAR DOENÇA GRAVE PRINCIPALMENTE EM PACIENTE JC POSITIVOS E NAO DEVE SER UTILIZADO POR MAIS DE 2 ANOSFINGOLIMOG NAO DEVE SER UTILIZADO EM PACIENTE CARDIOAPTAS E NECESSITA DE APLICAÇÃO DA PRIMEIRA DOSE EM REGIME HOSPITALARAUBAGIO APRESENTA EFICACIA SEMELHANTE AOS INTERFERONS, POREM PODE SER TERATOGENICO, DEVENDO SER EVITADO EM PACIENTES EM IDADE ´FERTIL</p>
11/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos desse apoio do governo... Ainda é uma doença sem cura e que precisa de toda atenção e possibilidades.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metilprednisona na pulsoterapia., Positivo: Fui diagnosticada recentemente, ainda estou sob os efeitos do medicamento., Negativo: Fui diagnosticada recentemente, ainda estou sob os efeitos do medicamento.</p>
11/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou neurologia e já tive pacientes em uso de AVONEX, sem controle dos surtos, e frequentemente com intolerância à forma intramuscular de aplicação e aos sintomas contralaterais significativo. Alguns pacientes ficaram totalmente sem surtos apos substituir a medicacao por Tecfidera , que também tem também um melhor perfil de efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: interferon beta, glatiramer, alentezumab, natalizumab, gylenia, Tecfidera, , Positivo: controle de surto de forma variável entre pacientes , Negativo: interferon beta, glatiramer - sintomas flu-like, dor no local da aplicação, desenvolvimento de anticorpos contra as medicacoes</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em minha opinião, é muito mais eficaz uma prática preventiva do que corretiva. Melhor manter todos os esforços para combater a doença no presente momento. E num ponto de vista de cidadania, somos brasileiros pagamos nossos impostos, nada mais junto então que o estado cumprir com o seu dever, pois saúde é dever do Estado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: tecfidera capsulas, Positivo: positivo, pela facilidade de ingestão, Negativo: ate o momento nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: interferons, copaxone, mabithera, Positivo: mabithera, por ter amenizado ods surtos por quase 3 anos, Negativo: interferons, não aliviavam surtos, copaxone, por ser auto aplicavel, não suportei, com 2 meses de aplicação mabithera por ser infusão de quase 8 hrs, obrigando a uma internação</p>
10/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: AVONEX, Positivo: Diminuição de surtos , Negativo: Febre , dores</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex 30 mcg IM, Positivo: É só uma vez na semana, fácil aplicação e é modificador do curso da doença. , Negativo: Tem muitos efeitos colaterais, como mialgia, febre e cefaleia um dia após o uso. Também desenvolvi plaquetopenia e linfopenia desde começo da medicação (ha 1 mês)</p>
10/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: glatirâmer e betainterferona, Positivo: betainterferona nao houve efeitos positivos glatiramer apresenta menos efeitos colaterais , Negativo: betainterferona apresenta muitos efeitos colaterais durante o uso . glatiramer apresentou falha terapeutica principalmente relacionado a forma de administração .</p>
10/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: glatirâmer e betainterferona, Positivo: betainterferona nao houve efeitos positivos glatiramer apresenta menos efeitos colaterais , Negativo: betainterferona apresenta muitos efeitos colaterais durante o uso . glatiramer apresentou falha terapeutica principalmente relacionado a forma de administração .</p>
10/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma pessoa na familia que está em tratamento e está com ótima resposta. Tinha usado outro remédio anteriormente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera (Fumarato de Dimetila), Positivo: A paciente está sem efeitos colaterais, Negativo: A paciente fica um pouco vermelha na pele em alguns momentos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: não sei o nome, Positivo: desconheço,, Negativo: intolerância e efeitos colaterais</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É mais barato para o Governo prevenir do que pagar depois que um paciente ficar inválido.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois todos pagam impostos e tem direito a saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo brasileiro tem direito ao melhor tratamento possível. Esse medicamento é de última geração e segundo pesquisas tem alto grau de controle dos surtos da doença. Por ser muito caro, fica inacessível a maioria da população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, è uma nova droga, com a possibilidade de se fugir das agulhas, com proposta de melhores condições clinica em aumentar espaço entre as crises, apesar de apresentar serias complicações gástricas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferon B1b + Interferon B1a(Avonex + Rebiff) + Acetato de Guatiramer + Natalizumabe, Positivo: A melhora clinica e aumento do controle inter crises. porem sabemos que cada medicamento lançado, aumenta a expectativa de melhor controle das crises, por ser autoimune a esclerose, tem que seguir os caminhos traçado mais com pespectivas de melhoras a cada caso novo, este produto vem com esta esperança, Negativo: Interferons - múltiplas lesões de pele que caracterizo como a primeira rejeição, o controle do tempo e do espaço inter crises dando inicio a falha terapêutica, o que acontece sempre com todos os produtos + queda de cabelos + aumento da ansiedade e mudanças de humor, levando em conta que alguns se mostram eufóricos. e o medo da próxima crise, a insegurança.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferon B1b + Interferon B1a (Avonex + Rebiff) Acetato de guatiramer + Natalizumabe, Positivo: Natalizumabe - Melhora da força motora e da visão em espaço de tempo curtoInterferons - Tem e continua com seus espaços iniciais, muitos pacientes não precisaram de progressão, continua nas primeiras linhas, Negativo: O pior efeito trazido pelos pacientes é a palavra estou em nova crise, aumentar a dose não resolve, temos que mudar de medicamento.</p>
10/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Não tenho condições de avaliar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex e rebif , Positivo: Redução dos surtos, estabilização da doença, Negativo: efeitos colaterais, febre, dor no corpo.Avonex- dificuldade na aplicaçãoRebif - qtidade de doses por semana</p>
10/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O fumarato de dimetila é um medicamento de facil aderência ao tratamento de poucos efeitos colaterais,de eficacia comprovada, prescrito em toda comunidade neurologica internacional</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Poucos efeitos colaterais e de facil aderencia, Negativo: Náuseas e diarreias</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: InterferonsCopaxoneFingolimodeNatalizumabe, Positivo: Todos tem comprovados beneficios tanto do ponto de vista clinico como de neuroimagem, Negativo: O grande problema dos injetaveis `e a aderencia ao tratamento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer, Positivo: Não ter surto , Negativo: Nenhum.</p>
10/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acompanho tratamento com a tecdifera, sendo muito bem aceito, sem efeitos colaterais. Paciente sem crises com vida normal. Pelo alto custo, muitos são privados do tratamento com o mesmo, sendo que se distribuído pelo SUS, ajudará muitas pessoas a terem uma vida normal!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Qdo minha filha foi diagnosticada com esclerose, entrou com outra medicação e mesmo assim, continuo com crises, depois que passou a fazer uso do tecdifera, ela não apresentou mais crises e passou a ter uma vida normal, pois ele não deixa nenhum efeito colateral!!, Positivo: É fácil de ingerir, sem efeitos colaterais! Ótima medicação, Negativo: Não há efeitos negativos, com exceção do preço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Descrito acima, Positivo: Descrito acima, Negativo: Descrito acima</p>
10/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acompanho tratamento com a tecdifera, sendo muito bem aceito, sem efeitos colaterais. Paciente sem crises com vida normal. Pelo alto custo, muitos são privados do tratamento com o mesmo, sendo que se distribuído pelo SUS, ajudará muitas pessoas a terem uma vida normal!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Qdo minha filha foi diagnosticada com esclerose, entrou com medicação e mesmo assim, continuo com crises, depois que passou a fazer uso do tecdifera, ela não apresentou mais crises e passou a ter uma vida normal, pois ele não deixa nenhum efeito colateral!!, Positivo: É fácil de ingerir, sem efeitos colaterais! Ótima medicação, Negativo: Não há efeitos negativos, com exceção do preço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Acompanho minha filha, como descrito acima, Positivo: Não tem efeitos colaterais. A pessoa tem uma vida normal, Negativo: Apenas o preço da medicação, por isso, a liberação pelo SUS será de grande valia para muitos portadoras da doença</p>
10/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portador da EM. A medicina esta evoluindo e com isso precisamos aproveitar. Por que precisamos passar por surtos onde podem ser irreversivos. O que mais precisamos mostrar que não é fácil viver com dores, choques, ardências no corpo, perda de força e movimentos, ficar sego ou acabar fazendo as necessidades fisiológicas nas roupas. Sabemos que se aceito no SUS o valor do remédio baixa consideravelmente. Temos direito a saúde, temos direito a vida. Só quem e portador da EM sabe o que passamos e o sofrimento do nossos familiares.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: TECFIDERA , Positivo: Após a utilização do TECFIDERA minha doença estabilizou. Faço ressonâncias a cada 6 meses e não apareceu mais nenhuma mancha. Não tive mais ardências pelo corpo e nenhum surto. , Negativo: Para meu caso fui direcionado direto para o TECFIDERA. Pelas varias lesões no cérebro.</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É uma excelente alternativa terapêutica</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Natalizumabe, acetato de glatiramer, interferons , Positivo: Controle de Esclerose Múltipla, sendo a terapia de escolha individual para cada caso, Negativo: Reações adversas, intolerância a auto aplicação</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ser esclerosado, impotente, diante da destruição da sua bainha de mielina, neurônios que não se multiplicarão, e sim são destruídos, e sem saber se amanhã estará fazendo xixi ou cocô sem controle, cognição, andar, movimentos, e ainda se deparar com a escolha de especialistas que não vivem o fato na pele, mas tem o poder de determinar "você não precisa dessa oportunidade de cuidar-se, é pavoroso</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: beta interferona, Positivo: Acho que não piorarei, Negativo: várias sensações ruins que suportar por saber que posso estar controlando a evolução</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: alta dose de cortizona, Positivo: suponho que no surto, conteve, Negativo: Nada horrível, só o medo, xixi, cocô na roupa, tontura excessiva</p>
10/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, conheço uma amiga que tem uma irmã com esclerose múltipla e esse remédio é fundamental para o tratamento dela e por pagarmos muito impostos, todos temos direito a saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso contínuo do Fumarato de dimetila, assim como outros medicamentos para tratamento da Esclerose Múltipla, mostra-se imprescindível para os pacientes com a patologia. No entanto, seu alto custo inviabiliza o tratamento contínuo, daí a necessidade da incorporação no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Acetato de Glatiramer (Copaxone)., Positivo: Efetivo como imunomodulador no tratamento de Esclerose Múltipla., Negativo: Não são notados efeitos negativos significativos no uso do Acetato de Glatiramer.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Utilizo o medicamento há um ano e meio, e ele tem sido ótimo para controlar a minha doença (Esclerose Múltipla). Graças a ele, não tive nenhum outro surto além do primeiro. Faço o tratamento apenas com esse medicamento e estou em plena forma física e me sentindo muito bem! A grande dificuldade será para mim quando acabarem meus recursos, pois é um medicamento de alto custo (embora ainda mais barato do que outros que o SUS para essa doença). Para alguns casos da doença, o Tecfidera é muito mais recomendado que outros, motivo pelo qual ele tem liderado nos EUA. No Brasil ele também tem ganhado muito espaço por ser efetivo e bem-aceito. Peço encarecidamente que reconsiderem o caso e verifiquem como o remédio tem sido eficaz.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera., Positivo: Não tenho tido, há um ano e meio, nenhum problema de saúde relativo à esclerose múltipla. Me sinto ótima. Os sintomas iniciais que tive (diplopia, problemas de visão, dores musculares fortes e cansaço) nunca mais voltaram, graças ao Tecfidera. , Negativo: Não sinto nenhum efeito colateral.</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Melhora , Negativo: Dor ao aplicar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Melhora , Negativo: Dor ao aplicar</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, Positivo: Diminuiu a tontura, mal estar, Negativo: Fica dolorido a região por ser intramuscular, já tive febre e calafrios</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer, Positivo: Manutenção sem surtos desde que comecei a utilizar, Negativo: Caroços na pele</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente tem direito ao tratamento e aos novos tratamentos que estão surgindo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona e natalizumab, Positivo: Em ambos tratamentos não tive nenhum surto., Negativo: Betainterferona, continuou aparecendo novos focos na ressonância e as injeções 3 vezes por semana são desconfortáveis. Natalizumab, não encontrei nenhum ponto negativo.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Cada paciente tem organismo diferente. Pode ser ótimo para alguns.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo e qualquer cidadão tem direito a saúde... Esse valor já é previamente pago em forma de impostos a partir do Nascimento de todo cidadão brasileiro</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Algumas pessoas tem a versao a medicações injetaveis.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Beta interferon, e recentemente uso o fumarato de dimetila, Positivo: Avonex: reduziu os surtos da doença durante os 2 primeiros anos.Beta Interferon: Não teve nenhum efeito.Fumarato de Dimetila: Não ter tanta efetios colaterais como os injetaveis. Poder se locomover sem necessidade de refrigeração. , Negativo: Avonex: Sintomas Gripais Fortes, Reações colaterais intensas.Beta Interferon: Além dos efeitos colaterais, dor e manchas no local da aplicação e lipodistrofia.Fumarato: Reações Gastrointestinais recorrentes.</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não se deve diminuir acesso à inovações medicamentosa, especialmente com os pacientes que sofrem de um mal gravíssimo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebiff 44 (Interferona) / Tysabri (Natalizumab), Positivo: No caso do Tysabri, resposta biologica muito boa a partir da imunomodulaç.ao. Estancamento/diminuição da progressão de sintomas., Negativo: Rebiff 44. Efeitos colaterais intensos nos primeiros 3 meses, a partir do início do tratamento. Após 5 anos de tratamento, sintomas de incapacitação progrediram. Na minha opinião, não houve esetancamento da progressão da doença.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata - se do remédio mais utilizado no mundo para o tratamento da esclerose múltipla</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex , Positivo: Tratamento para portadores de Esclerose Múltipla controlando surtos, prevenindo aparecimento de lesões ativas, assim melhorando a qualidade de vida dos pacientes., Negativo: Reações no início do tratamento como dores no corpo, dores de cabeça, tontura..</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fulmarato de Dimetila (TECFIDERA), Positivo: Sem reacao do medicamento, eficacia em resposta de curto prazo para contra as ações da doença e modo pratico de ingestão. , Negativo: sem negatividade</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: REBIF , Positivo: nao vi positividade, Negativo: lesoes no local da aplicação, indisposição, fortes dores abdominais, cansaço.</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Estou no momento sem medicação por falta de opção</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Interferons, acetato de glatiramer, e tysabri, Positivo: O interferons não adaptou ao meu organismo, deixando a taxas do meu fígado altíssimo, passei a tomar acetato de glatiramer, tomei por 7 anos, já não fazia o efeito esperado, muitas lesões apareceram com o tempo, aí tomei o tysabry por um ano, mas meu teste de jc veio positivo, tive q parar, agora estou sem medicação , Negativo: O interferons não adaptou ao meu organismo, deixando a taxas do meu fígado altíssimo, passei a tomar acetato de glatiramer, tomei por 7 anos, já não fazia o efeito esperado, muitas lesões apareceram com o tempo, aí tomei o tysabry por um ano, mas meu teste de jc veio positivo, tive q parar, agora estou sem medicação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: O interferons não adaptou ao meu organismo, deixando a taxas do meu fígado altíssimo, passei a tomar acetato de glatiramer, tomei por 7 anos, já não fazia o efeito esperado, muitas lesões apareceram com o tempo, aí tomei o tysabry por um ano, mas meu teste de jc veio positivo, tive q parar, agora estou sem medicação , Positivo: O interferons não adaptou ao meu organismo, deixando a taxas do meu fígado altíssimo, passei a tomar acetato de glatiramer, tomei por 7 anos, já não fazia o efeito esperado, muitas lesões apareceram com o tempo, aí tomei o tysabry por um ano, mas meu teste de jc veio positivo, tive q parar, agora estou sem medicação , Negativo: O interferons não adaptou ao meu organismo, deixando a taxas do meu fígado altíssimo, passei a tomar acetato de glatiramer, tomei por 7 anos, já não fazia o efeito esperado, muitas lesões apareceram com o tempo, aí tomei o tysabry por um ano, mas meu teste de jc veio positivo, tive q parar, agora estou sem medicação</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O fumarato de Domitila é muito eficaz 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera, Positivo: Mais barato. Mais eficaz. Bloqueia surtos, Negativo: Não há 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex, Positivo: Não há, Negativo: Efeitos colaterais fortes . Não obsta surtos. Mais caro pro sus
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/05/2017	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acho que é necessário novos acompanhamentos e por mais tempo da evolução nos pacientes 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone e Rebif, Positivo: Melhora na fadiga e coordenação, Negativo: Inchaço na aplicação do local
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 22 e 44 - Beta Interferona AGilenyaTysabre, Positivo: Tenho maior controle da doença, assim posso ter uma melhor qualidade de vida., Negativo: Após o uso contínuo por alguns anos, tive falha terapêutica, obrigando o médico a modificar a medicação.
02/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA; 2ª - Não 3ª - Não
02/05/2017	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento com alta eficácia frente a vários trabalhos e ótima adesão por parte dos pacientes 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tecfidera , Positivo: Eficácia no controle da doença, Negativo: tecfidera alguma reação alérgica 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta interferona Acetato Glatiramer Fingolimode e Natalizumabe , Positivo: Eficácia com limitações , Negativo: Reações alérgicas

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex, Positivo: Tratamento de portadores de esclerose múltiplas para controlar surtos , Negativo: Como dores no corpo, dores de cabeça, tontura ...</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo. Por se tratar de medicamento via oral o meu dia-a-dia consegue se manter praticamente como o de uma pessoa que não precisa tomar o medicamento. Os efeitos colaterais são leves, não é necessário manter refrigerado. Qualidade de vida é poder continuar suas atividades, e não ter de interrompê-las por efeitos colaterais ou por limitações de aplicação do remédio.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de Dimetila - "Tecfidera", Positivo: Diminuição de sinal de neurite optica no meu olho esquerdo, diminuição de fadiga, estabilização do quadro, sem surto a cerca de um ano. , Negativo: o medicamento causou intestino solto ocasionalmente, assim como vermelhidão e sensação de calor pele, com frequencia maior. sensação de vermelhidão passa após cerca de 40 minutos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatiramer - "Copaxone" e Interferon beta 1a - "Avonex", Positivo: Acetato de Glatirâmer - não houve Interferon beta 1a - controlou surtos por um tempo, diminui sintomas após surto de EM , Negativo: Acetato de Glatirâmer - sensação de morte súbita, forte reação alérgica no local da injeções, que após 4 meses ainda persistiam. Pressão arterial alta, muita dor no local da aplicação. Mesmo com rodizio de locais de injeção, não havia tempo de o inchaço diminuir até a próxima injeção Interferon beta 1a - sintomas de gripe forte sempre que havia a aplicação. Sintomas passavam após 2 dias. Houve surto com intervalo de menos de 6 meses, tomando medicamento.</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Glatiramer, Positivo: Controle dos surtos , Negativo: Falha terapêutica após 4 anos de uso</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer, Positivo: Controle dos surtos , Negativo: Falha terapêutica após 4 anos de uso</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente de Esclerose Múltipla, preciso de opções para continuar o tratamento da doença, visto que outros não tiveram eficácia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon beta 1b, Positivo: Durante o período de uso deste, 2002 a 2012, a doença pouco evoluiu. Os surtos foram mais fracos e tiveram menos frequência aos que tive antes de usar esse remédio. , Negativo: Algumas vezes sentia sintomas de gripe (frio e calafrios) após a aplicação deste e utilizava 1 comprimido de paracetamol 300mcg 30 min. antes da aplicação da betaferon.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento importante para o tratamento da Esclerose Múltipla.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de Dimetila, Positivo: Não tenho crises, não tive efeitos colaterais na utilização., Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente acredito que todos os tipos de medicamentos devem estar disponíveis para os portares de E.M</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum, Positivo: Nunca utilizei esse medicamento, Negativo: Nunca utilizei esse medicamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glautirâmer e tysabri, Positivo: Copaxone sem efeitos colaterais e fácil aplicação, Negativo: Copaxone-aplicação diária muitas vezes em locais doloridos</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, se existe indicação deve ser uma opção</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Interferon, Positivo: Melhoría motora, Negativo: Alteração dá função hepática</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: natalizumab, Positivo: não houve, Negativo: disfunção hepática</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Tem que ser feito mais testes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avobex e Rebif, Positivo: Os medicamentos mantém o meu quadro clínico bom e previnem futuras lesões no sistema nervoso., Negativo: Sem comentários.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Estabilizou os espasmos e problemas de fala , Negativo: Causa fraqueza muscular, dolorido, deixa hematoma, problemas com equilíbrio nos dias após a aplicação.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Se o paciente apresenta intolerância a algum medicamento, é necessário que haja outro medicamento para atendê-lo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Rebif e Natalizumab, Positivo: O Natalizumab foi o único que surtiu bom efeito com relação a Esclerose Múltipla, visto que desde que comecei a tomá-lo, eu não tive mais nenhum surto. Se o vírus JC der positivo, eu tenho que mudar de medicação.Com isso, essa incorporação é necessária, porque não posso voltar para o REBIF nem para o COPAXONE., Negativo: Os efeitos do Rebif foi por haver inflamações e inchaço no local da aplicação da injeção do remédio. Eu tinha manchas rochas nos locais. O Copaxone intensificou minha depressão. Alíás eu tive euforia. Foi terrível. Com isso a neurologista decidiu mudar para o natalizumab.O negativo do natalizumab é que o vírus JC não pode dar negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Rebif e Natalizumab, Positivo: O Natalizumab foi o único que surtiu bom efeito com relação a Esclerose Múltipla, visto que desde que comecei a tomá-lo, eu não tive mais nenhum surto., Negativo: Os efeitos do Rebif foi por haver inflamações e inchaço no local da aplicação da injeção do remédio. Eu tinha manchas rochas nos locais. O Copaxone intensificou minha depressão. Alíás eu tive euforia. Foi terrível. Com isso a neurologista decidiu mudar para o natalizumab.O negativo do natalizumab é que o vírus JC não pode dar negativo.</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Temos que ter o maior número possível de opções.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon e Natalizumabe , Positivo: Natalizumabe : 4 anos sem surtos. , Negativo: Betaferon : não conseguiu conter meus surtos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pulsoterapia: bom para o período de surto, mas extremamente agressivo,com vários efeitos colaterais. Vitamina D altas doses: não mudou nada positivo no meu caso. , Positivo: -----, Negativo: Efeitos colaterais ou ineficacia.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não sei do que se trata</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone . Laboratório Teva. Avaliação de satisfação quanto ao uso e efeitos positivos e negativos, quanto cadastro de dados pessoais., Positivo: Controle de EM para diminuir efeitos e progressão da doença , Negativo: Ansiedade, fadiga após aplicação, obrigatoriedade de uma aplicação diária.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone. Acetato de glatiramer, Positivo: Controle de EM para diminuir efeitos e progressão da doença , Negativo: Ansiedade, fadiga após aplicação, obrigatoriedade de uma aplicação diária.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pedido de AJUDA <3 Queridos amigos, alunos, colegas...Meu irmão está precisando muito de um medicamento de alto custo e estamos tendo grandes dificuldades para consegui-lo. :(Precisamos que respondam esse questionário (bem rapidinho) para que tenhamos acesso ao medicamento.Obrigada! <3 É muito importante pra nós e pra outras tantas famílias com o mesmo problema.A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sim porq tem alguns q ja estão bem avançados.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Com avonex tenho poucos efeitos colaterais e uso sô uma vez na semana., Negativo: So usei o avonex</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente, reconheço a importância do medicamento acima listado para aumentar as possibilidades de uma sobrevida com qualidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Avonex e Gilenya, Positivo: O Gilenya é um comprimido ao dia. E causa poucos efeitos colaterais., Negativo: Copaxone- não segurou os surtos e é uma dose diária injetável. Avonex- fiquei com dores pelo corpo e moleza. E não segurou o avanço da doença.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: betainterferon, Positivo: esclerose múltipla está equilibrada, Negativo: reações fortes pós aplicação</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelo que fui informado, o medicamento possui muitos efeitos positivos, por paralisar desmielinações, com poucos efeitos colaterais e pode ser ministrado, via oral, sob a forma de um simples comprimido, e é bem mais fácil de conservar (não dependendo de refrigeração). Efeitos negativos: não tem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rebeef. Avonex. Natalizumabe., Positivo: Meu marido, portador de esclerose multipla nao reagiu bem a esses medicamentos. Continuou tendo surtos., Negativo: Surtos.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44 e Avonex, Positivo: Retardar a evolução dá EM, trazendo uma melhor qualidade de vida., Negativo: Primeiros meses dor de cabeça, febre e insônia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A recomendação preliminar deixa de levar em conta a gravidade da doença e os graves impactos potenciais na saúde de um paciente que tem sua doença controlada eficazmente com o Fumarato de dimetila mas que não consegue, sozinho, custear sua manutenção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nataizumab, acetato de Glátiramer , Positivo: Diminuição surtos, Negativo: Febre</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nataizumab acetato de Glátiramer , Positivo: Diminuição de surtos, Negativo: Febre</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Beta interferona, Positivo: Retardo na progressão da doença, Negativo: Efeitos hepáticos e renais</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento de alto custo e pouco acionado uma vez que não é a primeira escolha. Mas necessário para os casos de rejeição ou baixa adesão da primeira escolha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone , Positivo: Não considero ter ponto positivo , Negativo: Aplicação diária, dor, efeito colateral, por mais que seja pouco incomoda muito.</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: avonex betsibterferoba 30mcg de milhões, Positivo: tem sido útil no tratamento sem orofresssao doença já 8 anos, Negativo: ainda é por Injecaopoderia ja ser em comorimidos</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já tentei outras formas de tratamento para a esclerose e meu organismo não foi tolerante a nenhum deles. Passava muito mal por 2 dias com a aplicação da medicação injetável, muitas dores pelo corpo, febre alta, fadiga forte e dores de cabeça. Agora, com essa nova medicação, tenho um desconforto tolerável por apenas 30 min e observo uma redução nos sintomas d esclerose no meu corpo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de Dimetila, Positivo: Redução dos efeitos da esclerose em meu organismo como redução da fadiga, dos formigamentos e da dificuldade de marcha. Tenho mais disposição e observei melhora na minha capacidade de memorização., Negativo: Reação alérgica com vermelhidão e coceira pelo corpo, além de febre e enjoo temporário. A reação se manifesta em meu corpo depois de 2 horas que tomo a medicação e dura em torno de meia hora, passando em seguida</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Copaxone e Gilenya, Positivo: Honestamente não obtive nenhum efeito positivo, passava muito mal com essas medicações, Negativo: Febre alta, fadigas fortes, dores no corpo (principalmente nas articulações), dores de cabeça insuportáveis, falta de apetite.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Sim. Queremos trastuzumab é necessario e importante mas também é preciso o pertuzumab também.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Zoladex e arimidex, Positivo: Supostamente o controle da doença., Negativo: Dores articulações fadiga cansaço baixa imunidade processo de osteopenia acelerado menopausa precoce com todos os efeitos colaterais possíveis.</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na paciente que conheço os efeitos bons para deter a evolucao da dorça</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha amiga estão muito bem com o remédio</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dimetil Fumarato é uma terapia mais eficaz do que as oferecidas de 1ª linha (Interferons Beta e Acetato de Glatirâmer) pelo SUS, apresentando margem de eficácia de cerca de 46% ~ 49% na redução do número de surtos anuais dentro de um período de 02 anos. Em estudos randomizados apresentou uma taxa de cerca de 25% dos participantes em NEDA, ou seja, ausência de atividade de doença evidente. Demonstra facilidade de administração por ser uma medicação oral (em comprimidos), o que pode significar em maior adesão por parte dos pacientes ao tratamento contra a EM.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatirâmer (Copaxone)., Positivo: Por enquanto estou NEDA com o Copaxone., Negativo: Inchaço nos locais da aplicação da medicação.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera, Positivo: Medicamento de fácil uso, que não apresenta efeitos colaterais relevantes., Negativo: Pode gerar uma reação alérgica às vezes.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex , Positivo: O paciente não se adaptou ao uso desse remédio. , Negativo: Além de sério efeitos colaterais, como febre alta e tremedeira, o fato de ser injetável é um complicador principalmente quando é necessário transportá-lo em viagens. Além disso, o paciente apresentou surtos quando já estava usando este medicamento.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera, Positivo: Medicamento de fácil aplicação, não precisa ser conservado em local refrigerado, não apresenta efeitos colaterais relevantes., Negativo: Possível reação alérgica ocasionalmente.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex , Positivo: O paciente não se adaptou., Negativo: Além de ser injetável, o que é um complicador na aplicação e no transporte, principalmente em viagens, apresenta efeitos colaterais sério como febre e tremedeira.</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dimetil Fumarato é uma terapia mais eficaz do que as oferecidas de 1ª linha (Interferons Beta e Acetato de Glatirâmer) pelo SUS, apresentando margem de eficácia de cerca de 46% ~ 49% na redução do número de surtos anuais dentro de um período de 02 anos. Em estudos randomizados apresentou uma taxa de cerca de 25% dos participantes em NEDA, ou seja, ausência de atividade de doença evidente. Demonstra facilidade de administração por ser uma medicação oral (em comprimidos), o que pode significar em maior adesão por parte dos pacientes ao tratamento contra a EM.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon Beta e Acetato de Glatirâmer., Positivo: Até o presente momento estou NEDA com o Copaxone., Negativo: Interferon Beta 1a desencadeou reações colaterais imunogênicas exacerbadas (como febre alta, indisposição, fadiga, ausência de apetite, emagrecimento, fraqueza, sintomas gripais, queda acentuada de cabelo, e alterações hepáticas) diminuindo bastante a minha qualidade de vida.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o remédio fumarato de dimetila apresenta como efeitos positivos paralisia das desmielinações, tem poucos efeitos colaterais e sendo comprimido pode ser conservado fora da geladeira o que é positivo para o usuário</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera, Positivo: paralisia das desmielinizações, Negativo: não foram observados</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dimetil Fumarato é uma terapia mais eficaz do que as oferecidas de 1ª linha (Interferons Beta e Acetato de Glatirâmer) pelo SUS, apresentando margem de eficácia de cerca de 46% ~ 49% na redução do número de surtos anuais dentro de um período de 02 anos. Em estudos randomizados apresentou uma taxa de cerca de 25% dos participantes em NEDA, ou seja, ausência de atividade de doença evidente. Demonstra facilidade de administração por ser uma medicação oral (em comprimidos), o que pode significar em maior adesão por parte dos pacientes ao tratamento contra a EM.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Interferon Beta 1a e Acetato de Glatiramer., Positivo: Acetato de Glatiramer tem ajudado o paciente a ficar NEDA até o presente momento., Negativo: Interferon Beta 1a desencadeou reações colaterais imunogênicas exacerbadas (como febre alta, indisposição, fadiga, ausência de apetite, emagrecimento, fraqueza, sintomas gripais, queda acentuada de cabelo, e alterações hepáticas) diminuindo bastante a qualidade de vida deste.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/05/2017	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remédio que por ser administrado via oral, evita o deslocamento do paciente ao hospital no momento da necessidade, além de ampliar as opções de tratamento que são diferentes em cada caso. 2ª - Não 3ª - Não
02/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nós pacientes temos o direito de outras opções de tratamento! 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso Avonex, Positivo: Meu organismo agradeceu bem o tratamento, Negativo: Sintomas são desagradáveis! Muita fadiga muscular , resfriado passageiro m
02/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve-se buscar alternativas para uma doença tão agressiva 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, Positivo: Controle dá doença, Negativo: Febre, hematoma
02/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação do fumarato de dimetila é importante nos casos de falha terapêutica com as medicações de primeira escolha e também em alguns casos. Por exemplo quanto o Tysabri, medicamento imunossupressor, não deve ser continuado em casos de JC positivo pelo risco de leucoencefalopatia multifocal progressiva. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif e Tysabri., Positivo: Melhor controle da doença porém houve falha terapêutica com o Rebif., Negativo: Utilizei o Rebif por quatro anos e sempre tive efeitos colaterais, como dor de cabeça, dores nas articulações, calafrios, além de não ter controlado efetivamente a doença.Com o uso do Tysabri não tenho efeitos colaterais perceptíveis porém talvez tenha que mudar breve de medicação pois o JC é positivo.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex, Positivo: Estabiliza os sintomas da EM, Negativo: Efeitos colaterais como febre e dor no corpo.</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tomo betainterferona, Positivo: Tono a pouco tempo, ainda não consigo avaliar., Negativo: Cansaço, dores no corpo, febre, mal estar.</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque se o medicamento der falha terapêutica na primeira fase do tratamento a médica indicar o fumarato de Dimetila é porque ela sabe que o medicamento é o que vai resolver para o tratamento da esclerose múltipla</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer e gilenya, Positivo: Nenhum pois não deram certo pra mim o tratamento , Negativo: Necrose muita dor e falha terapêutica aumentando lesões na ressonância magnética no caso do gilenya eu tive muito efeitos colaterais e falha terapêutica</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer e Gilenya , Positivo: Nenhum muitos efeitos colaterais, Negativo: Dor na aplicação, necrose e falha terapêutica</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas precisam continuar a ter oportunidade e condições pra viver</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: EM USO SEMANAL DE BETA INTERFERONA 1a - AVONEX, Positivo: Antes do uso, três surtos em 06 meses. Após o 1º ano de uso, dois surtos e nos últimos anos 02 surtos em 03 anos. Sinto-me segura com a medicação, apesar de ser injetável e ter receio de agulha., Negativo: No início, muitas dores no corpo, enjoos, dor de cabeça.Nos últimos 02 anos, dor de cabeça, apenas em algumas vezes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que sempre exiate evolução dos medicamentos. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Inteefeeon beta 1a caneta injetável , Positivo: Não evolução da doença ou diminuição de surtos , Negativo: Mal estar generalizado no dia seguinte à aplicação.
02/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/05/2017	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Já estou na terceira medicação após falha terapêutica das anteriores 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer e betainterferona., Positivo: Com acetato de glatiramer não tive efeitos colaterais ruins, apesar de ter ocorrido falha terapêutica., Negativo: Betainterferona efeitos colaterais como fadiga e sintomas gripais-e surtos constantes-. Acetato- após um ano, surtos seguidos indicando falha terapêutica. Há um ano utilizo tysabri.
02/05/2017	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Não tenho conhecimento deste medicamento, seus benefícios ou males. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex- betainterferona, Positivo: À quase três anos em tratamento, sem nenhum surto ou avanço da doença., Negativo: Dores de cabeça e no corpo, embora bem menos que no início do tratamento.
02/05/2017	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Pois nunca utilizei o medicamento. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso de AVONEX, Positivo: Sem dores de cabeça e sem dormências nos braços, Negativo: Após tomar o remédio muitas dores no corpo
02/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remedio é eficaz e diminui surtos e é mais barato 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fumarato e dimetila, Positivo: Mais barato menos efeitos colaterais mais efetivo, Negativo: Não há 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex, Positivo: Não ha , Negativo: Efeitos colaterais fortes. Mais caro é não diminui surtos
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pacientes q não conseguiram se adaptar aos outros medicamentos, ficam sem saber o que fazer e a quem recorrer por falta de outro medicamento. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, avonex e tysabri, Positivo: Me ajudaram a controlar os surtos, Negativo: O avonex e o tysabri é uma dose para todos os pesos e tamanhos eu desmaiava com a medicação muito forte</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Após uso da medicação houve remissão completa dos sinais da doença</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila , Positivo: Desaparecimento total dos sinais da doença , Negativo: Enjoo inicial durou apenas duas semanas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex injetável, Positivo: No começo bons resultados estagnou a doença` , Negativo: Após 3 anos o efeito diminuiu</p>
02/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que quanto mais opções disponíveis, melhor para o paciente, para o tratamento da EM ao longo da vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1 A (Avonex), Positivo: Controle da EM, espaçamento temporal entre os surtos, manutenção dos sintomas já existentes sob controle, Negativo: Febre, dores no corpo (qdo dá aplicação), queda de cabelo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex - betainterferona, Positivo: Aparentemente o remédio impede de ter novos surtos.Uma vez que o corpo está acostumado, a reação do corpo com o medicamento é menor., Negativo: Reação que o medicamento causa no corpo é muito forte.Aplicação intramuscular também é um desafio.</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: 1 Copaxone.2 Tysbri., Positivo: 1. Sem surto por 3 anos.2. Sem surtos, 1 vez ao mês., Negativo: 1. Uso diário.2. Não encontrei nenhum até agora.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: 1 Copaxone.2 Tysbri., Positivo: 1. Sem surto por 3 anos.2. Sem surtos, 1 vez ao mês., Negativo: 1. Uso diário.2. Não encontrei nenhum até agora.</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Cada um.pode tentar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer agora tomo tyssabre, Positivo: Não tive, Negativo: Dor ardência tive infecção no.sangue</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beta interferona 1 a (avonex), Positivo: Acredito que a doença está estável e sem aumento na lesão., Negativo: Dor no corpo, febre, dor de cabeça, indisposição.</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, copaxone e Tysabri , Positivo: Copaxone passei muitos anos sem surtos e Tysabri também , Negativo: Avonex tive muita reação com suryis</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelo o que entendi o medicamento não foi aceito. Se eu entendi certo, eu discordo porque para nós pacientes é importante que tenhamos novos medicamentos. Eu usei o betaferon 1b por mais de 7 anos e ha 4 anos uso o Avonex. Meu sonho é o tomar o medicamento oral, não aguento mais injeção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaonterferon 1b e 1a, Positivo: O 1a (avonex), tem menos efeitos colaterais e só aplica uma vez por semana., Negativo: Os dois tem o defeito por ser injeção. Mas os efeitos colaterais do 1b são maiores e aplica dia sim dia não.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente dá recomendação preliminar, pois deveriam repensar em aderir o medicamento fumarato de dimetila no SUS, para a 1º falha de tratamento para esclerose múltipla, portanto haverá mais uma opção para esse tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AvonexBetainterferona 1BNatalizumabe 300mg, Positivo: Avonex: me auxiliou na visão, pois estava muito embasadaBetainterferona 1B: me auxiliou na dormência, pois não sentia meu dedos.Natalizumabe 300mg: me auxilia na volta dá minha vida social, pois com esse medicamento me sinto como antes, posso trabalhar, voltou meu equilíbrio e agora sim estou tendo minha vida normal., Negativo: Avonex: sentia muito calafrio é enxaqueca.Betainterferona 1B: sentia muito desequilíbrio e fraqueza.Natalizumabe 300 mg: só sinto dor de cabeça leve, quando falta 3 dias para tomar a medicação.</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sim, se a medicação não for efetiva no tratamento da doença, a mesma deve ser substituída.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex (beta interferona), Positivo: Doença estável (sem evolução) desde o início da utilização., Negativo: Dor na aplicação, efeitos colaterais (dores musculares e estado febril) ao dia seguinte a aplicação.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por ser um medicamento que sua aplicação é por via oral, não necessitando que o paciente se desloque até o hospital e pela diminuição dos efeitos colaterais gostaria que entrasse pra lista de medicamentos fornecidos pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex , Positivo: Controle de surtos , Negativo: Esfeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex , Positivo: Controle de surtos , Negativo: Efeitos colaterais</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Sem comentários, Negativo: Aplicação injetável</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Fumarato de Dimetila apresenta um excelente resultado é possui efeitos colaterais muito mais brandos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de Dimetila, Positivo: Efeitos colaterais mínimos. Com o remédio anterior me sentia muito mal., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beta interferona 1a , Positivo: Não houve. Tive aumento de lesões no tecido cerebral e efeitos colaterais durante todo o periosdo de tratamento., Negativo: Tive aumento de lesões no tecido cerebral e efeitos colaterais durante todo o periosdo de tratamento, como dores de cabeça, dores no corpo e mal estar.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, gilenia, e atualmente medicamento endovenoso 1x por mes (esqueci o nome), Positivo: Nao percebi efeito, Negativo: Percebo que pouco efeito positivo fazem</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera120mg, Positivo: Diminuição dos episódios de surtos de E.M., Negativo: Inicialmente, apenas nos primeiros 3 dias, uma pequena indisposição estomacal, mas adaptado completamente, a partir do 4o dia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tec-Fidera 120mg,, Positivo: Diminuição dos surtos de E.M., Negativo: Ainda, um pouco perceptível .Mas apenas, até o aumento da dose!</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do medicamento Avonex (beta interferona 1a) e já utilizei Metilprednisolona, Positivo: Avonex- Controle da Esclerose Múltipla (EM), prevenção de surtos, melhora da qualidade de vida dos portadores de EM.Metilprednisolona - Estabilização de quadro de surtos de EM, redução de lesões desmielinizantes, melhora de sintomas da doença., Negativo: Avonex - Poucas reações no início do tratamento.Metilprednisolona - Algumas reações quando utilizado nas pulsoterapias.</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considero que o paciente tem o direito, juntamente com seu médico, de escolha do melhor medicamento para tratar sua esclerose. Preferencialmente, um que não traga muito desconforto para o paciente. A saúde é um direito constitucional que deve ser garantido a todos pelo governo. No entanto, este não poderia limitar as possibilidades do paciente. Pois cada organismo tem uma reação diferente e com isso, deve existir alternativas para que o paciente encontre um medicamento que melhor lhe atende, e sem custo. Pois a maioria esmagadora do nosso país não possui renda, e nem preciso dizer o porque, para arcar com o custo altíssimo que são esses tipos de tratamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex - betainterferona 1A, Positivo: Não consigo visualizar nenhum efeito positivo, na minha opinião, para este medicamento., Negativo: No que tange aos efeitos negativos posso enumerar vários, tais como: febre, muita dor no corpo (não apenas nas primeiras 24 horas como também até dois dias após), demasiada ingestão de analgésicos para tentar minimizar a dor, dor na aplicação, diversos roxos espalhados nos locais de aplicação e, ainda sangramento no local da aplicação.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ., Positivo: ., Negativo: .</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A disponibilidade de medicamentos para esclerose deve crescer e assim oferecer ao paciente e profissional da saúde um leque maior de opção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Estabilização da doença e diminuição dos surtos. Vantagem na posologia de ser apenas 1x por semana, Negativo: Efeitos colaterais próprios do medicamento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor da liberação de uso dos novos medicamentos que já passaram por testes e aprovada a eficácia para quem não se adaptou ao tratamento de 1º linha. Quanto mais opções de medicamentos melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex-beta interferona 1a, Positivo: Poucos efeitos colaterais, Negativo: Ser aplicado com injeção</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoide, Positivo: Na veia, Negativo: Dor de cabeça Cansaço Dores</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessita incorporação imediata, levando em conta os seguintes itens: Preço alto do medicamento (EM em pessoas de baixa renda, podendo não haver condições de compra e morte sem tratamento) Doença pode desenvolver ao estado grave Incidência considerável Danos patológicos caso não seja administrada a medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Usei Rebif44 e tive surtos, com esse não estou tendo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: avonex, Positivo: sem surtos, Negativo: febre</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44, Positivo: nenhum, Negativo: febre e surtos</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um amigo próximo que fazia uso de outra medicação, anterior a essa, seus dias eram muito mais difíceis, era mais dependente da bengala e de outras pessoas para se locomover. Hoje, vejo uma melhora substancial no seu humor e na forma como ele está mais independente e sadio. Muito mais ativo. Creio que por ter dado resultados tão positivos, recomendo a incorporação do medicamento ao SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devemos ter o máximo de opções de medicamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, Positivo: Há 3 anos, não tenho surto da doença, Negativo: efeitos colaterais: febre, dor no corpo, enjoo, mal-estar geral</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso há 10 meses e só vi melhora fora não precisa uso injetáveis</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Beta-interferon e compaxone , Positivo: Tecfidera foi melhor com ele consigo andar, Negativo: Beta interfero tive 4 surtosCompaxone não conseguia adar mais que 200 metros e esses dois me faziam muitos ematoma por ser injetáveis fora um grande mal estar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Compaxone, Beta-interferon , Positivo: Nenhum, Negativo: Pior experiência com medicamentos da minha vida, só prepediaram a mobilidade</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Discordo parcialmente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas que sofrem dessa doença necessitam do medicamento e considerando o alto custo do medicamentos, muitas não terão condições financeira para adquiri-lo. Portanto, é necessário que o SUS o ofereça e o torne mais acessível a todos que precisam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fui diagnosticada com esclerose múltipla há alguns anos e faço uso do Avonex betainterferona 1a uma vez por semana. Tenho acompanhamento regularmente com o neurologista e não tenho tido surtos. Hoje os pacientes diagnosticados com esclerose múltipla remitente recorrente no Brasil, tem como opção para o tratamento as betainterferonas. Retirar uma medicação já existente no SUS e não fazer a inclusão de novos remédios, prejudica a saúde física e mental do paciente. Hoje, com o avanço da medicina, novas tecnologias são introduzidas no mercado, cabendo ao médico e ao paciente escolherem qual a melhor forma de tratamento de acordo com suas necessidades e o grau de comprometimento da EM.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nas crises fiz pulsoterapia na veia com corticoide e atualmente faço uso semanalmente do Avonex betainterferona 1a 30mcg/0,5ml solução injetável em caneta preenchida., Positivo: O Avonex mostrou-se eficaz no controle da EM, retardando a progressão da doença e desaparecendo a frequência dos surtos.Os corticosteroides servem para diminuir os processos inflamatórios no momento da crise. , Negativo: Como todo medicamento, o Avonex causa alguns efeitos colaterais, mas diminuem com o uso continuado.O corticoide é causa efeitos colaterais de difícil controle.</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AvonexRebifCopaxaneGilenya, Positivo: Todos foram eficazes por determinado tempo. Após perderem a eficácia foram sendo substituídos., Negativo: Para todos o efeito negativo foi a perda da eficácia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon beta 1a - 22mcg., Positivo: Mesmo não sendo a medicação indicada de início, meu organismo adaptou e permaneço com ela já faz quase 3 anos, sem surtos ou alterações., Negativo: Dor de cabeça; Dor no corpo tipo resfriado forte; Possível alteração dos hormônios da tireoide.</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O TECFDERA precisa ser incluído.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nao, Positivo: Forma de administração, Negativo: Em estudo</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fingolimode, Positivo: Sem surtos novos e sem novas lesões. , Negativo: Nenhum</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma amiga que faz o uso do medicamento há 2 anos e os resultados estão sendo positivos pois há quase 1 ano e meio ela não tem surto da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento com maior eficácia que os utilizados anteriormente para o tratamento da Esclerose Múltipla, de fácil conservação, administração e com poucos efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex , Rebif44, copaxone, tysabri, Gilenya, Mabtera, Positivo: Nenhum dos medicamentos mencionados na questão anterior, exceto o tysabri e o mabtera conseguiram conter o avanço da doença. Esses dois são de administração endovenosa e de fato conseguem conter os surtos. , Negativo: As injeções devem ser mantidas sob refrigeração, o que é motivo de grande preocupação nas épocas de chuva em que há queda de energia, por exemplo. Além disso, apes notam efeitos colaterais muito severos e desconfortáveis.</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o remédio é eficaz e diminui surtos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: fumarato de dimetila, Positivo: diminui surtos, Negativo: não há</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: avonex, Positivo: não ha, Negativo: não barra surtos</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio é excelente. Não deixa ter surtos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fumarato de dimitila, Positivo: Diminui sensivelmente os surtos., Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex, Positivo: Não tem., Negativo: Efeitos colaterais fortes demais. Não reprime surtos</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é eficaz, não há efeitos colaterais e barra os surtos, além de ser mais barato para o Sus.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fumarato de dimitila, Positivo: Barra surtos, não deixa ter efeitos colaterais fortes., Negativo: Não possui</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Interferons, Positivo: Não teve. Só dor. , Negativo: Muitas dores, cabeça dói muito. Cabeça pesada e mal estar</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glatiramer. Não tinha ponto a positivo, Positivo: Muita reação alérgica e necrose do tecido onde era aplicado o medicamento. Não teve pontos positivos. Foi terrível quando ela usava este medicamento., Negativo: Muita reação alérgica.e necrose onde foi aplicado o medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfedera. Está super bem . Sem nenhuma reação., Positivo: Está super bem. Sem nenhuma reação ao medicamento., Negativo: Não teve.</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por que entendo que esse tratamento deve ser oferecido pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não tive experiência pessoal com o medicamento, mas amigos próximos são pacientes e relataram a importância do acesso a esse medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não acho certo,Pelos simples fato de pagarmos imposto tão altos e não termos o simples cuidado do governo com saúde .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidors, Positivo: Não tive aumento nas lesões., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone., Positivo: Nenhum., Negativo: Aplicação.</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, TODA NOVA MEDICAÇÃO DEVE SER DISPONIBILIZADA PARA OS PACIENTES PARA EVITAR DESCONTROLE DA DOENÇA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif; Natalizumab e Fampyra., Positivo: Controle e melhora no quadro geral., Negativo: A ineficácia quando não controlava os surtos e internações hospitalares.</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque muitos cidadãos precisam da utilização continua desses medicamentos para manutenção de uma vida digna.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera, Positivo: Controle dos surtos, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Interferon, Positivo: Controle dos surtos, Negativo: Debilidade física para execução de tarefas rotineiras</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que tem que prevalecer o livre arbítrio</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Visto que o mesmo é um remédio de alto custo, a população deveria ter acesso sem a necessidade de medidas judiciais, como um direito do povo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Gylenia e Tysabri, Positivo: Controle da doença e dos sintomas., Negativo: Avonex: febre e dores no corpo. Gylenia: tonturas. Tysabri: tendência maior a infecções.</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Surtiu o efeito desejado, Negativo: Sensação de febre, gripe
03/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, ACREDITO QUE ESSA OPÇÃO DEVA SER ANALISADA CASO A CASO PELO MEDICO QUE ASSISTE O PACIENTE E NÃO UMA RECOMENDAÇÃO RÍGIDA PARA TODO E QUALQUER CASO. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: REBIF 44, Positivo: OFERECU GRANDE MELHORA COM RELAÇÃO A FADIGA. MINHA FILHA ESTA TENDO UMA VIDA INTENSA NOS ESTUDOS E ROTINA COMPATÍVEL COM A IDADE., Negativo: SOMENTE OS HEMATOMAS GERADOS POR CAUSA DA AGULHA E O ASPECTO GRIPAL TODA VEZ QUE INICIA UMA CAIXA DE INJEÇÃO.
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicamento apresenta muitos efeitos colaterais. E não é recomendado pelo meu neurologista. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1A, Positivo: Estabilizou, não tive mais surtos., Negativo: Dores no corpo e dor de cabeça.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/05/2017	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os custos do medicamento são altos e devem ser acessíveis à população que não pode arcar com o tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas que possuem esta doença tem que ter acesso ao medicamento. Não se pode privar o doente de seu tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
04/05/2017	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: No momento não sinto nada , Negativo: No momento não sinto nada mas já tive muitos como muita dor no corpo e estado febril
04/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente entendo as especificidades da doença, e portanto considero que cada paciente deve ter acesso a todas as opções de medicamentos disponíveis, pois só ele e seu médico podem testar, avaliar e definir qual será o medicamento indicado para o seu caso específico. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex e Fampyra, Positivo: Avonex: Ausência de surtosFampyra: Melhora significativa da marcha e fadiga, Negativo: Avonex: Efeitos colaterais do tipo gripeFampyra: Nenhum (a não ser o fato de não ser fornecido pelo SUS)
03/05/2017	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A verba orçamentária do Governo deve contribuir para a manutenção da saúde do cidadão brasileiro, diante a falha terapêutica com outras medicações como é o meu caso!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera., Positivo: TECFIDERA:As reações adversas são mínimas e a qualidade de vida melhorou muito., Negativo: TECFIDERA: não possui.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex e Copaxone., Positivo: AVONEX: não possui.COPAXONE: não possui., Negativo: AVONEX: dores de cabeça fortíssimas e novas lesões a nível cerebral e medular.COPAXONE: mal estar geral, dores nas pernas e locais de aplicação e novas lesões a nível cerebral e medular.</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifesta de de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: InterferonAcetato de glatiramerFingolimodeNatalizumabe, Positivo: A administração oral do fingolimode, Negativo: Evolução da doença com o uso de Interferon, Acetato de glatiramer e natalizumabe. Efeitos colaterais com uso de Interferon, Acetato de glatiramer e fingolimode.</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: GlâtiramerBetainterferona (Avonex), Positivo: O Glatiramer teve reação alérgica na pele. Com o uso do Avonex os surtos foram menos frequentes., Negativo: O AVONEX O QUE INCOMODA É A SENSACÃO DE ESTAR GRIPADA, AS VEZES DIARREIA.</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.A esclerose Múltipla se manifestade de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes.O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: interferon 1b copaxone, Positivo: ne um , Negativo: febre, calafrios, dores, depressão, fadiga, problemas cardíacos e problemas no fígado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: interferon 1be copaxone, Positivo: ne um, Negativo: febre, calafrios, dores, depressão, fadiga, problemas cardíacos e problemas no fígado</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha esposa ja foi medicada com Rebif e Copaxone e não surtiram o efeito desejado, e atualmente utiliza o Fumarato de dimetila através de amostras grátis fornecidas pelo médico. Até o momento este medicamento foi o que apresentou melhores resultados e menos efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha esposa ja foi medicada com Rebif e Copaxone e não surtiram o efeito desejado, e atualmente utiliza o Fumarato de dimetila através de amostras grátis fornecidas pelo médico. Até o momento este medicamento foi o que apresentou melhores resultados e menos efeitos colaterais., Positivo: Minha esposa ja foi medicada com Rebif e Copaxone e não surtiram o efeito desejado, e atualmente utiliza o Fumarato de dimetila através de amostras grátis fornecidas pelo médico. Até o momento este medicamento foi o que apresentou melhores resultados e menos efeitos colaterais., Negativo: Minha esposa ja foi medicada com Rebif e Copaxone e não surtiram o efeito desejado, e atualmente utiliza o Fumarato de dimetila através de amostras grátis fornecidas pelo médico. Até o momento este medicamento foi o que apresentou melhores resultados e menos efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha esposa ja foi medicada com Rebif e Copaxone e não surtiram o efeito desejado, e atualmente utiliza o Fumarato de dimetila através de amostras grátis fornecidas pelo médico. Até o momento este medicamento foi o que apresentou melhores resultados e menos efeitos colaterais., Positivo: Minha esposa ja foi medicada com Rebif e Copaxone e não surtiram o efeito desejado, e atualmente utiliza o Fumarato de dimetila através de amostras grátis fornecidas pelo médico. Até o momento este medicamento foi o que apresentou melhores resultados e menos efeitos colaterais., Negativo: Minha esposa ja foi medicada com Rebif e Copaxone e não surtiram o efeito desejado, e atualmente utiliza o Fumarato de dimetila através de amostras grátis fornecidas pelo médico. Até o momento este medicamento foi o que apresentou melhores resultados e menos efeitos colaterais.</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Interferindo, Copaxone, Natalizumabe , Positivo: Controlaram a EM por um tempo depois apresentaram falha clínica , Negativo: Falha clínica 3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferons, Copaxone, tissabri, Positivo: Controlaram por um tempo, Negativo: Falha clínica (surto)
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex e rebif 44 mcg, Positivo: Estacionou os surtos provocados pela doença, Negativo: Efeitos colaterais como dores de cabeça e do corpo
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/05/2017	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/05/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem pessoas que não se adaptam à certos tipos de medicamentos e isso deve ser avaliado caso a caso, cada qual em sua individualidade e particularidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila (Tecfidera), Positivo: Estava com sensibilidade diminuída do lado esquerdo e em poucos dias de utilização da medicação toda a sensibilidade voltou ao normal., Negativo: Muitos efeitos colaterais: flushing, queimação, prurido, diarreia, constipação, náusea, vômito, muitas dores e cólicas abdominais e estomacais, gases, corta o efeito do anticoncepcional, sintomas gripais, falta de apetite, emagrecimento rápido, queda de cabelo, sono, ondas de calor e de frio, dor nas costas, aperto do peito, falta de ar, desânimo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone (glatirâmer), Gylenia (Fingolimode)., Positivo: -, Negativo: Muitas reações, incluindo o quase morte.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, temos q ter mais opções de tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Não tive mais surto após o medicamento , Negativo: Após 4 anos usando Avonex toda semana, já estou com hematomas e sensibilidade nas pernas, nadegas e braços, onde revezo a aplicação. Após a aplicação não sou ninguém durante 24hs próstada, com febre, dores pelo corpo.</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o artesanal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2) Copiar e colar essa inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não há justificativa atual que não comprove a necessidade ímpar da inclusão do fumarato de dimetila na 1ª falha de tratamento de pacientes com a forma remitente-recorrente de EM ou com contra-indicações às demais drogas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato de dimetila., Positivo: - Baixo perfil de efeitos adversos sistêmicos graves- Boa tolerância pelos pacientes- Redução da necessidade de aplicações injetáveis de medicamento- Redução em taxa de recorrência de surtos na Esclerose Múltipla Remitente-Recorrente., Negativo: - Em minha prática clínica, nenhum efeito negativo em pacientes com pontuação na escala de EDSS baixa (<2-3).</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betaferon, Avonex, Copaxone, Alemtra, Fingolimod, Tecfidera, Tysabri. , Positivo: Os diferentes medicamentos possuem em literatura médica prévia documentada amplo reconhecimento de benefício em diferentes aspectos, fases e etapas de tratamento das formas recorrentes-remitentes de EM, conforme o perfil clínico de cada paciente. , Negativo: - Tysabri: alto risco para complicações em longo prazo em pacientes com sorologia positiva para vírus JC (risco para leucoencefalopatia multifocal progressiva). - Betaferon/Avonex: alto índice de sintomas flu-like que incapacitam o paciente em relação ao uso da medicação; medicação injetável; alto índice de pacientes não-responsivos à terapêutica. - Alemtra: tireoidopatias; síndrome de Goodpasture; púrpura trombocitopênica idiopática.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito este medicamento já deveria ser de acesso aos portadores de EM, uma vez que contribui para uma melhor qualidade de vida para esses pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes precisam de mais opções terapêuticas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 22 e Rebif 44, Positivo: Apenas o Rebiff 44 impediu o aumento das lesões desmielizantes., Negativo: Necrose muscular, dores nos lugares das aplicações e deformações nos lugares das aplicações. Perda da sensibilidade no local das injeções</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon natalizumab e fingolimode, Positivo: Betaferon e natalizumab - redução dos surtos, Negativo: Fingolimode - baixa imune MOLEZA e tontura</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1A, Positivo: Melhora de 60% na doença, Negativo: Dores de cabeça e caroços pelo corpo. .</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação deste medicamento ao SUS permitirá o acesso de pessoas que não tem condições financeiras de comprá-lo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria mais uma opção no tratamento da Esclerose múltipla em pacientes que não toleraram o tratamento com outra medicação ou que não houve controle da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex , Positivo: Eu não apresentei muitos efeitos colaterais., Negativo: Via de aplicação intramuscular.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/05/2017	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: NatalixumabInterferob 1 aCopaxoneGilenia, Positivo: O que mais obtive controle da doença foi com o interferob, Negativo: Efeitos colaterais 3ª - Sim, como paciente, Qual: X, Positivo: X, Negativo: X
03/05/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: betainteferona, Positivo: nunca mais tive um surto, Negativo: sintomas de gripe
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço paciente que teve melhora no tratamento com a medicação, que além de tudo é mais fácil de armazenar e de tomar, por ser um comprimido além de ter poucos efeitos colaterais. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento tem poucos efeitos colaterais e é eficaz .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, trata-se de uma medicação com comprovada eficácia e segurança além de estudos de impacto social e financeiro trazendo benefício aos pacientes portadores dessa grave e incapacitante doença em adultos jovens sendo alternativa terapêutica já que contamos com poucas medicações que tentam impedir a evolução para incapacidade nesses pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tecfidera , Positivo: uso oral com comodidade posológica melhora da fraqueza e parada da evolução da doença , Negativo: leve alteração gastro intestinal melhorada com ingestão com alimento tipo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tysabri betaferon copaxone rebif avonex teriflunomida mitoxantrose ciclofosfamida azatioprina , Positivo: também eficazes nas suas limitações e dependendo da sua via de administração , Negativo: efeitos relativos às aplicações e cuidados com infecções</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio é muito caro, acredito que deveria ser uma iniciativa do governo dar este para as pessoas que necessitam, principalmente por casos de pessoas que não têm condições de comprá-lo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sofri vários efeitos colaterais graves com o uso do acetato de glatiramer. Tive várias infecções respiratórias, micoses e depressão. Hoje estou me adaptando bem ao uso do Tecfidera</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Não sofri efeito colateral grave., Negativo: Ele afeta o estômago então é preciso ter cuidado no momento de ingerir o produto, utilizando simultaneamente alimentos que auxiliam na absorção do produto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: acetato de glatiramer, Positivo: não sofri efeitos colaterais graves. , Negativo: Sofri vários efeitos colaterais graves com o uso do acetato de glatiramer. Tive várias infecções respiratórias, micoses e depressão.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, PRECISAMOS TER MAIS OPÇÕES PARA TRATAMENTO, POIS CADA PACIENTE RESPONDE DIFERENTE AO TRATAMENTO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: - COPAXONE- ANONEX- GILENYA, Positivo: - COPAXONE : ESPERANÇA DE NÃO OCORRER SURTOS - AVONEX : ESPERANÇA DE NÃO OCORRER SURTOS - GILENYA : ESPERANÇA DE NÃO OCORRER SURTOS E MELHORAR A MEMÓRIA, Negativo: - COPAXONE : DOR NO CORPO, DOR DE CABEÇA, FEBRE, TREMOR NO CORPO, INDISPOSIÇÃO- AVONEX : DOR NO CORPO, DOR DE CABEÇA, FEBRE, TREMOR NO CORPO, INDISPOSIÇÃO- GILENYA : TONTURA E DOR DE CABEÇA</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, PRECISAMOS TER MAIS OPÇÕES PARA TRATAMENTO, POIS CADA PACIENTE RESPONDE DIFERENTE AO TRATAMENTO, APÓS 15 ANOS DE EXISTÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PODEMOS CONCLUIR QUE NOVAS TECNOLOGIAS PARA O TRATAMENTO SÃO SEMPRE BEM VINDAS E APRESENTAM BONS RESULTADOS E DEVE-SE CONSIDERAR QUE CADA PACIENTE REAGE DE UMA FORMA DIFERENTE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu estou utilizando a medicação ha um ano, e me sinto bem melhor</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não, Positivo: Nao, Negativo: Nao</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer, Positivo: ., Negativo: Dor no corpo. Necessidade de repouso pelo menos 2 horas antes e + 2 horas depois de cada aplicação, q eram diárias.</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um remédio que é tão bem aceito pela maior parte das pessoas portadoras de esclerose múltipla, não pode ser simplesmente trocado por por outro desconhecido.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, não tive experiência com este medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: betainterferona 1a (avonex), Positivo: difícil dizer se existem efeitos positivos., Negativo: febre, cores pelo corpo, insônia</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon 1a, Positivo: Diminuição dos surtos, Negativo: Efeito colateral, muito forte. Muitas dores</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO TOTALMENTE , POIS DE ACORDO COM A CONITEC , QUE FAZ A ANÁLISE SOMENTE DOS CUSTOS DA MEDICAÇÃO , QUE EM VERIFICAÇÃO, OBSERVA-SE QUE O CUSTO É MUITO PARECIDO COM AS OUTRAS MEDICAÇÕES UTILIZADAS. A MEDICAÇÃO Fumarato de Dimetila já é utilizada na Europa e Estados Unidos há mais de dois anos com amplo sucesso aos pacientes , com diminuição de efeitos colaterais de medicação e aumento dos níveis de índice de cura . Quanto aos efeitos colaterais relatados pela Conitec , são irrisórios comparados por exemplo ao uso de betainterferona 44 mg, o qual fui usuário de julho de 2015 até outubro de 2016, e usuário de Tecfidera desde outubro de 2016, via amostra de laboratório. Acredito que quem deve analisar a necessidade do paciente é o médico , analisando a evolução do paciente caso a caso. Quanto mais opções de medicação para o médico melhor, pois pode ter à disposição medicação para cada fase de enfrentamento da doença e que devemos avançar com tecnologia. As coisas evoluem.... Há medicações novas com mais eficiência do que as anteriores . Sou muito favorável ao uso de fumarato de dimetila, pois sou um caso prático de quem utiliza a medicação, e que faz com que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida com o uso de uma medicação mais leve.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz tratamento com betainterferona 44 mg de julho de 2015 à outubro de 2016.Desde outubro de 2016 realizo tratamento com Fumarato de Dimetila, com amplo sucesso no tratamento e estabilidade da doença, Positivo: Fumarato de Dimetila - Diminuição total dos efeitos que haviam com o tratamento anterior com betainterferona. Betainterferona é uma medicação muito agressiva, trazendo muitos efeitos colaterais, como dores no corpo , taquicardia, entre outros. Utilizando o Tecfidera há mais de seis meses, observou-se a estabilidade da doença Esclerose Múltipla em meu caso, Negativo: Betainterferona Betainterferona é uma medicação muito agressiva, trazendo muitos efeitos colaterais, como dores no corpo , taquicardia, entre outros..</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 44, Positivo: Uso de betainterferona como protocolo inicial do Sus . Agradeço por não precisar mais usar esta medicação, pois foi um ano de árduo uso com muitos efeitos colaterais, Negativo: Betainterferona Betainterferona é uma medicação muito agressiva, trazendo muitos efeitos colaterais, como dores no corpo , taquicardia, entre outros..</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha colega de trabalho utiliza este medicamento com bons resultados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha esposa faz uso dá medicação e graças a Deus e o remédio está obtendo resultados positivos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Bgggu</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ---</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: betainterferona 1A (Avonex) e cloridrato de fingolimode (gilenya), Positivo: -----, Negativo: -----</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na minha opinião, os portadores de esclerose múltipla precisam do tratamento que se adaptarem melhor, as vezes para uma pessoa não serve, mas para outra fez e fez muita diferença no tratamento. A esclerose em sí varia muito de pessoa, não há uma precisão de como é para todos, são sintomas muitos peculiares, e acho que tudo que aparecer para lutar com essa doenças e outras tem que ser muito estudado antes de tomar a decisão de tirar a forma de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: "Rebif (betainterferona-1a) 22 mcg" - "Rebif (betainterferona-1a) 44 mcg" e atualmente com Tysabri (Natalizumabe 300 mg), Positivo: Com o Rebif me ajudou a me tratar com 1 surto inicial que no inicio da doença eu tinha dificuldades para me equilibrar e faltava força para coisas simples, que era escrever, segurar um garfo, e a fadiga exagerada. Com Tysabri não tive surtos e me senti muito bem, é um ótimo medicamento., Negativo: Com o Rebif 22 eu tinha muita dor de cabeça, sensação de uma gripe forte isso até meu corpo se acostumar com o medicamento, com o Rebif 44 foi tranquilo pois meu corpo ja estava adaptado ao medicamento até eu ter um inicio de um surto, com perda de força, desequilíbrio e falha na minha visão direita, com Tysabri eu não tive nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: "Rebif (betainterferona-1a) 22 mcg" - "Rebif (betainterferona-1a) 44 mcg" e atualmente com Tysabri (Natalizumabe 300 mg), Positivo: Com o Rebif me ajudou a me tratar com 1 surto inicial que no inicio da doença eu tinha dificuldades para me equilibrar e faltava força para coisas simples, que era escrever, segurar um garfo, e a fadiga exagerada. Com Tysabri não tive surtos e me senti muito bem, é um ótimo medicamento., Negativo: Com o Rebif 22 eu tinha muita dor de cabeça, sensação de uma gripe forte isso até meu corpo se acostumar com o medicamento, com o Rebif 44 foi tranquilo pois meu corpo ja estava adaptado ao medicamento até eu ter um inicio de um surto, com perda de força, desequilíbrio e falha na minha visão direita, com Tysabri eu não tive nenhum efeito negativo.</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que sempre é melhor ter tecnologias disponíveis aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Copaxone e Gilenya, Positivo: Avonex e copaxone não foram eficientes para mim, já o gilenya tomo até hoje é graças a ele a progressão da minha doença parou., Negativo: Avonex e copaxone não foram eficientes para mim. O gilenya não tenho nenhum efeito negativo até o momento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com doenças graves precisam ter mais de uma opção de tratamento, assim como pacientes de doenças mais comuns.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente quanto maior a gama de terapias integradas e disponíveis pelo SUS maior as chances de encontrarmos uma forma de retardar ou estabilizar a doença que é incurável e progressiva.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Glatiramer, Positivo: Sem efeitos adversos sistêmicos, Negativo: Injeções diárias com muita dor local por vários dias, edema , lipodistrofia....</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>