

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Raltegravir como terapia inicial das pessoas vivendo com HIV\_Aids (1ª linha) - CONITEC

| Dt. contrib. | Contribuiu como       | Descrição da contribuição   |
|--------------|-----------------------|---|
| 30/05/2017   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Raltegravir é um excelente medicamento, com menos adversidades do que as classes de ITRNN e I.P.s. Uma alternativa para casos de comorbidades, com impacto muito menor em efeitos colaterais e excelente resposta terapêutica com muitos pacientes mantendo sua indetectabilidade virológica e excelente qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Raltegravir, já consagrado como terapia de resgate para inúmeros pacientes., Positivo: Manutenção de carga viral indetectável, boa adesão dos pacientes por baixíssimos efeitos adversos e comodidade de posologia., Negativo: Efeitos negativos ou maiores adversidades vemos com o efavirenz, como tonturas, alucinações, dificuldade de sono, etc...</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Efavirenz-- tonturas, insôniaLopinavir-- diarreia, dislipidemia, Positivo: Efeitos positivos -- opções, opções variadas para compor os esquemas de TARV para cada paciente, Negativo: Efeitos negativos-- acúmulo de toxicidade a longo prazo ( dislipidemia, parte metabólica, disfunção renal, desmineralização óssea, déficit de concentração, tonturas) . Destacamos que o raltegravir apresenta baixíssimo impacto nesses aspectos, que ocorrem mais comumente com outras classes terapêuticas. inibidores de integrase são medicamentos mais tranquilos nesses aspectos</p>  |
| 27/05/2017   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou infectoped e acho muito importante o Raltegravir está na recomendação de terapia inicial para crianças pela sua segurança a partir de 2 anos de idade, por ser bem tolerado e pela sua excelente ação sendo capaz de inectar a carga viral em pouco tempo o que contribui para a recuperação imunológica, que é de extrema importância para as crianças .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Raltegravir, Positivo: Bem toleradoQueda rápida da carga viral e aumento fo CD4, Negativo: Preciso da apresentação pediátrica para facilitar a adesão das crianças</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nevirapina, Efavirenz e lopinavir/ritonavir, Positivo: Queda da carga viral com recuperação do CD4 nos 3 medicamentos citados, Negativo: Em relação ao Efavirenz, já tive paciente com rash cutâneo e também pacientes com relato de tonturas. Em relação ao lopinavir/ritonavir, muitos pacientes com queixas de náuseas, vômitos e diarreia</p>   |
| 04/06/2017   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, SOU INFECTOLOGISTA E TRABALHO HA 25 ANOS COM PORTADORES DE HIV-AIDSFACO AMBULATORIO DE IDOSOS PORTADORES DE HIV, QUE POSSUEM INUMERAS COMORBIDADES E POLIFARMACIA; PORTANTO ALTISSIMO POTENCIAL DE INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA.O RALTEGRAVIR NOS ULTIMOS ANOS TEM SIDO USADO AMPLAMENTE NESTE PERFIL DE PACIENTE, COM MUITA EFICACIA E SEGURANÇAPOR ISTO E OUTRAS INUMERAS RAZOES, O RALTEGRVIR DEVE SER INCORPORADO NO ESQUEMA DE 1 LINHA NO BRASIL, ASSIM COMO O DOLUTEGRAVIR, PERMITINDO AO MEDICO ASSITENTE, DECIDIR QUAL DOS 2 INIBIDORES DE INTEGRASE SERIA A MELHOR ESCOLHA AO SEU PACEINTE</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RALTEGRAVIR E DOLUTEGRAVIR, Positivo: RALTEGRAVIR- EXCELENTE TOLERABILIDADE, SEGURANÇA, EFICACIA E EXCELENTE ADESAODOLETGARVIR - TOLERABILIDADE INFERIOR AO RALTEGRAVIR, MAIOR POTENCIAL DE INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA, EXCELENTE ADESAO E EFICACIA, Negativo: RALTEGRAVIR - NÃO VEJO PROBLEMAS NEGATIVOS RELEVANTES, O FATO DA POSOLOGIA SER 2 X AO DIA , EM NADA AFETOU A ADESA DOS PACEINTES EM DADOS DE VIDA REAL E NOS ESTUDOSDOLUTEGRAVIR - MAIOR INCIDENCIA DE EVENTOS NEUROPSIQUIATRICOS, PRINCIPALMENTE EM PACIENTES DE MAIS IDADE E MAIOR POTENCIAL DE INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ELVITEGRAVIRDARUNAVIRATAZNAVIREFAVIRENZETRAVIRINEMARAVIROQUEENFUVIRTIDETIPRANAVIR, Positivo: EFETIVIDADE, Negativo: TOLERABILIDADE E INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA</p> |

| Dt. contrib. | Contribuiu como       | Descrição da contribuição   |
|--------------|-----------------------|---|
| 01/06/2017   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A vantagem de poder ser utilizado em co infectados por tuberculose</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Em esquemas antiretrovirais em resgate de pacientes em falha terapeutica, Positivo: A boa tolerância do Raltegravir , Negativo: Não observei na minha casuística efeitos negativos do raltegravir</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Há mais de 30 anos trato pacientes ,HIV/Aids. Usos de AZT, DDI, DDC, nevirapina, tenofovir, etravirina, dolutegravir, lopinavir, atazanavir, fosanprenavir, T20, , Positivo: Todos antirretrovirais quando lançados buscaram em suas épocas, ter ganhos em eficácia no controle virológico, menores efeitos adversos para que pudessem ser tolerados e terem adesão máxima ao tratamento, Negativo: Citarei alguns. Azt predispõe a anemia. Tenofovir esta ligado à agressão renal. Lopinavirassociadoba diarreia. Atazanáveis icterícia, efavirenz Onirismo, entre outros.</p> |
| 01/06/2017   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A disponibilização de mais de 1 medicamento da mesma classe, vem a favorecer o sucesso da terapia, pois o ARV pode ser trocado por intolerância ou por uso de outras medicações incompatíveis, não tendo que mudar a classe da medicação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RaltegravirDolutegravir, Positivo: Raltegravir: bem estudado, poucos efeitos adversos, poucas contra-indicações, bem tolerado.Dolutegravir: posologia., Negativo: Raltegravir: NDNDolutegravir: menos estudado, mais interações medicamentosas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AZT, DDI, DDC, saquinavir, indinavir, ritonavir, 3TC, D4T, TDF, ATV, NFV, EFV, LPV, DRV, , Positivo: Aumento da sobrevida. , Negativo: Posologia, interações medicamentosas, efeitos adversos.</p>   |
| 31/05/2017   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todas as pessoas devem ter acesso ao tratamento mais conveniente contra o vírus HIV.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>   |
| 31/05/2017   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Sugiro que o raltegravir seja utilizado como primeira linha de tratamento do HIV em todos os casos em que o Dolutegravir esteja contra-indicado</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os ARVs, Positivo: Ótima resposta clínica e poucos efeitos adversos, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os ARVs, Positivo: Ótima resposta clínica e poucos efeitos adversos, Negativo: Não há</p>   |
| 12/06/2017   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Para início de terapia em mulheres na idade fértil ou em pacientes que façam uso de anticonvulsivantes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Raltegravir, Positivo: Boa tolerabilidade, segurança., Negativo: Administrado 2 vezes ao dia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dolutegravir, Positivo: Administrado em geral 1 vez ao dia, boa tolerabilidade., Negativo: Ainda não indicado p/gestantes, interações com os anticonvulsivantes, aumento da creatinina sérica.</p>   |
| 12/06/2017   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, tenho grande experiencia com o Raltegravir em resgate com darunavir,exelente resultado,bem tolerado</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os antivirais.Há mais de 20 anosa atendendo pacientes soropositivos no Setor publico, Positivo: Especificamente em relação ao Raltegravir,exelente tolerabilidade e eficacia., Negativo: Duas tomadas ao dia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os antivirais.Mais de 20 anos de Serviço Publico., Positivo: Em relação ao Raltegravir que é o motivo da consulta,eficaz e bem tolerado, Negativo: duas tomadas por dia</p>  |

| Dt. contrib. | Contribuiu como       | Descrição da contribuição   |
|--------------|-----------------------|---|
| 07/06/2017   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, segurança maior do raltegravir em relação a função renal, menor interação medicamentosa, possibilidade de resgate com dolutegravir em caso de falência. se iniciar com dolutegravir e falhar, perde toda classe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: raltegravir e dolutegravir, Positivo: raltegravir: droga segura com poucos efeitos adversos, menor interação medicamentosa, Negativo: posologia 2x dia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: quase todos os TARV, Positivo: sobrevida aos HIV+, Negativo: efeito metabólico, renal , ósseo</p>  |
| 07/06/2017   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Vejo como alternativas interessantes na indicação de RAL em tratamentos iniciais para pacientes diabéticos em uso de metformina e com controle adequado da doença metabólica, e uso de anticonvulsivantes fenobarbital, carbamazepina e oxycarbamazepina, com bom controle anticonvulsivo prévio ao início de ARVs.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RALTEGRAVIR, Positivo: MEDICAMENTO TEM ALTA POTENCIA VIROLOGICA, BOA TOLERABILIDADE E PEQUENO NUMERO DE PACIENTES COM INDICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO POR INTOLERANCIA., Negativo: DUAS DOSES DIÁRIAS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: -, Positivo: -, Negativo: -</p>   |
| 06/06/2017   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Concordo que o raltegravir deve ser usado com primeira alternativa quando o paciente tiver intolerância ao dolutegravir. Também acho que o raltegravir deve ser de escolha em casos de interações medicamentosas que impossibilitam o uso de dolutegravir</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: raltegravirdolutegravir, Positivo: todos os 2 tem boa tolerabilidade e eficácia. Dolutegravir com maior barreira genética e dose única diária, Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos os ARV aprovados pelo Programa Nacional, Positivo: ., Negativo: .</p>  |
| 06/06/2017   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, É importante ter uma opção para crianças e pacientes que tenha restrições ao dtg, por causa de doença ou interações medicamentosas. Ainda mais sendo medicamentos com alta barreira genética e com menos efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou farmacêutica de uma unidade de dispensação de antirretrovirais, fazemos acompanhamento dos pacientes e os mesmos alcançam mais rápido a carga viral indetectável e com menos efeitos colaterais. , Positivo: Carga viral indetectável mais rápida Menos efeitos colaterais , Negativo: Efeitos colaterais de alguns Arvs limitam muito a vida dos pacientes, como por exemplo tonturas, diarreias, icterícia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Como farmacêutica de uma unidade de dispensação de antirretrovirais a 11 anos tive experiência com vários tipos de Arvs , Positivo: Indetectar a carga viral em menor tempo possível Diminuir efeitos colaterais , Negativo: Efavirenz com efeito colateral a nível de SNC, icterícia pelo atv, anemia pelo azt, diarreias pelo lpv.</p> |
| 06/06/2017   | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Teremos mais uma opção de primeira linha para poder utilizar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Raltegravir, Positivo: Bem tolerado, boa adesão, poucas falhas (apesar de barreira genética mais baixa), poucos efeitos colaterais, Negativo: dose duas vezes ao dia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos os antirretrovirais, Positivo: boa barreira genética, Negativo: vários efeitos colaterais</p>   |

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição  |
|--------------|-----------------|--|
| 06/06/2017   | Paciente        | <p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: atazanavir,ritonavir, tenofovir, lamivudina, fosamprenavir, raltegravir, Positivo: Não saberia especificar medicamento a medicamento. Mas, obviamente eles foram essenciais na manutenção da infecção pelo HIV, Negativo: com o Atazanavir eu tive uma significativo aumento das bilirrubinas, o que me fez ter que trocar para o Fosamprenavir. A dislipdemia é outro fator negativo, o que me obriga a tomar remédios para manter os níveis de colesterol e triglicerídes aceitáveis. O fosamprenavir/ritonavir causavam dores na cavidade orofaringe, como dores de garganta. Mudei para o Raltegravir pois desenvolvi pre-diabetes e a metformina tem interação medicamentosa com o Dolutegravir.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: atazanavir,ritonavir, tenofovir, lamivudina, fosamprenavir, raltegravir, Positivo: Não saberia especificar medicamento a medicamento. Mas, obviamente eles foram essenciais na manutenção da infecção pelo HIV, Negativo: com o Atazanavir eu tive uma significativo aumento das bilirrubinas, o que me fez ter que trocar para o Fosamprenavir. A dislipdemia é outro fator negativo, o que me obriga a tomar remédios para manter os níveis de colesterol e triglicerídes aceitáveis. O fosamprenavir/ritonavir causavam dores na cavidade orofaringe, como dores de garganta. Mudei para o Raltegravir pois desenvolvi pre-diabetes e a metformina tem interação medicamentosa com o Dolutegravir.</p> |