

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Pastilha de nicotina 2mg para cessação do tabagismo - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, pelas solicitações dos responsáveis pela programa de controle do tbagismo é muito aceito as gomas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nicotina adesivo transdérmico 7, 14 e 21 mg, Positivo: Os medicamentos ajudaram a diminuir a necessidade de fumar que os pacientes apresentavam., Negativo: Alguns pacientes apresentaram alergia ao adesivo.</p>
11/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo com a retirada visto que o adesivo apresenta melhor adesão ao tratamento devido ao modo de uso ser 1x ao dia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pastilha de Nicotina 2mg, Positivo: Redução da ansiedade, diminuição da abstinência, Negativo: Não foram relatados pelos pacientes em uso, efeitos nocivos.</p> <p>3ª - Não</p>
11/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nenhum , Positivo: Fácil de manuseio e adequado para levar na bolsa., Negativo: A goma os pacientes disseram que são muito duras e amargas.</p> <p>3ª - Não</p>
12/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ADESIVO DE NICOTINA, Positivo: REDUÇÃO NA QUANTIDADE DE CIGARROS FUMADOS DURANTE O DIA, COM PROGRESSO DURANTE O GRUPO DE TABAGISMO, Negativo: DIFICULDADE COM OS PACIENTES QUE IMPORTANTE DEPENDÊNCIA DO CIGARRO.</p> <p>3ª - Não</p>
12/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos de todo arsenal terapêutico no controle desta grave doença. Pacientes com próteses dentárias não podem usar gomas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pastilha de nicotina, Positivo: Sucesso na cessação do tabagismo, Negativo: Nada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adesivo nicotina, goma nicotina, bupropiona, vareniclina, Positivo: Todos são eficazes e necessários no tratamento desta grave doença!, Negativo: Poucos frente aos benefícios de ajudarem na cessação do tabagismo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/06/2018	Secretaria Municipal de Saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nada a comentar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adesivo, Pastilha de nicotina e Bupropiona., Positivo: Pastilha de Nicotina: Evita a crise de abstinência que é um processo doloroso durante o acompanhamento, sendo crucial no processo para parar de fumar. Adesivo: Inibi o desejo de fumar, diminuindo assim o indice de nicotina no organismo e o desmame do cigarro. Bupropiona: Tira a ansiedade. , Negativo: Com os resultados alcançados não há efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adesivo, Pastilha de nicotina e Bupropiona., Positivo: Pastilha de Nicotina: Evita a crise de abstinência que é um processo doloroso durante o acompanhamento, sendo crucial no processo para parar de fumar. Adesivo: Inibi o desejo de fumar, diminuindo assim o indice de nicotina no organismo e o desmame do cigarro. Bupropiona: Tira a ansiedade. , Negativo: Objetivo alcançados sem efeitos negativos.</p>
12/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A referida medicação é extremamente positiva para os momentos de grande fissura do cliente em tratamento para a cessação do tabagismo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pastilha de nicotina, goma de nicotina, adesivos de nicotina., Positivo: Diminuição, e cessação do habito de fumar., Negativo: Não houveram.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso de medicina alternativa (reflexologia e acupuntura) , Positivo: Mais uma oferta para o cliente, favorecendo assim sua permanência no tratamento. Relaxa, tranquiliza, reduz o desejo de fumar, acompanhado com a TRN aumenta a eficácia do tratamento. , Negativo: Não houveram.</p>
12/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, SEGUNDO RELATO DOS PACIENTES É INSUPOORTÁVEL O GOSTO DA PASTILHA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: GRUPO DE TABAGISMO . ADESIVO, BUP, Positivo: ADSIVO- BOA ADESÃO BUP- BOA ADESÃO GOMA-POUCA ADESÃO, Negativo: BUP- ACELERA OS BATIMENTOS CARDIACOS SEGUNDO RELATO DOS PACIENTES</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ADSIVO- BOA ADESÃO BUP- BOA ADESÃO . ADESIVO, BUP, Positivo: ADSIVO- BOA ADESÃO BUP- BOA ADESÃO . , Negativo: GOMA -POUCA ADESÃO</p>
12/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Indico para pacientes que no teste de fagertron não tem indicação de reposição de nicotiva através de adesivos, recomendando usar duas por dia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos:adesivos, gomas, pastilhas e bupropiona, Positivo: BUPROPIONA; recomendável como ultima hipótese , pessoas mais ansiosas que não conseguem parar de fumar , diminuem a vontade de fumar e associada a teoria comportamental param de fumar. ADESIVOS: indicado para pessoas que tem alta dependencia fisica, serve como placebo para uns enquanto tem adesivos não fumam... e quando param com os adesivos continuam bem GOMAS OU PASTILHAS: servem para pessoas ansiosas e que necessitam colocar algo na boca, Negativo: adesivos: alergia Não vejo outros efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: goma de nicotina, Positivo: Goma ; ajudar nos efeitos de abstinência ajudando no momento da fissura , Negativo: boca seca dor articulação tempero mandibular</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adesivo de reposição de nicotina Bupropiona Valericlina , Positivo: ajudar nos efeitos de abstinencia a nicotina , Negativo: insônia</p>
12/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Deve-se manter o fornecimento da goma e da pastilha. A pastilha é uma opção na TRN, principalmente como combinação nos casos de contra indicações da Goma. Terapias combinadas apresentam uma maior sucesso na prevenção da recaída.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Goma e Pastilha, Positivo: Tanto a Goma quanto a Pastilha são efetivas na cessação do tabagismo e importantes como formas de combinação. Sendo sua indicação dependente da avaliação individual de cada paciente. , Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TRN (adesivos, pastilhas, goma) e Bupropiona, Positivo: Todos são efetivos no tratamento do tabagismo e prevenção da recaída quando associados à abordagem cognitiva comportamental., Negativo: Desconheço</p>
06/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Há muito tempo já não temos a pastilha no Brasil</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adesivos de nicotinaGoma de nicotina Bupropiona, Positivo: Adesivos de nicotina: comodidade de uso e maior adesão ao tratamentoBupropiona: comodidade de uso boa, mas há algumas contraindicações e risco de eventos adversos Goma de nicotina: menor comodidade do uso e, portanto a adesão é pior. Mas é importante como coadjuvante ao tratamento com os outros medicamentos, para ser utilizada quando a fissura é incontrolável, Negativo: Goma: gosto ruim, ritual demorado e esforço para a mastigaçãoAdesivos: muito confortáveisBupropiona: há algumas contraindicações e riscos</p>
12/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, è um medicacamento fundamental para o tratamento do fumante, especialmente em pacientes internados/acamados</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Psatilha, goma e bupropiona, Positivo: Alívio em crises de abstinência, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
08/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A pastilha tem auxiliado os usuários que desejam parar de fumar, não considero justo a retirada de uma ferramenta de auxilio por a nenhum motivo que não seja a comprovação da ineficácia do mesmo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bupropiona, adesivo de nicotina, pastilha de nicotina., Positivo: bupropiona auxilia na ansiedade que por sua vez aumenta o desejo de fumaradesivo de nicotina tem um papel de saciador do desejo da nicotina uma vez que libera no decorrer das 24 horas/dia pequenas quantidades de nicotina no sistema circulatório.pastilha de nicotina usada da forma correta(mastigação intensa nos 30 primeiros minutos diminui a vontade de fumar alem de entreter o usuário que tendo algo a boca esquece por um tempo a vontade de fumar., Negativo: Bupropiona as vezes causa efeitos colaterais como: dor de cabeça, insônia e mal estar.adesivo de nicotina: processo alérgico dérmico pastilha de nicotina: gosto ruim de fumo na boca, ardência na boca.</p> <p>3ª - Não</p>
07/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, NÃO ACEITAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE PACIENTES COM AS PASTILHAS DE NICOTINA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Como psicólogo e referencia de saúde mental do município vejo na pratica a falta de adesão do paciente ao uso de pastilhas e gomas de nicotina, gerando um gasto desnecessário.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com Bupropiona, adesivos, gomas de mascar e pastilhas., Positivo: O bupropiona trabalha a ansiedade do indivíduo, os adesivos a necessidade física de nicotina e até mesmo a ansiedade., Negativo: Não vi.</p> <p>3ª - Não</p>
07/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pastilha, Goma e Adesivo, Positivo: Pastilha e Adesivo: Auxílio no poecesso de cessação do tabaco, Negativo: Goma: Dificuldade na utilização por parte dos pacientes</p> <p>3ª - Não</p>
07/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Trabalho diretamente com o Programa de combate ao Tabagismo e pastilha nunca foi utilizada pelos pacientes. Acredito que se a exclusão da pastilha abrir espaço para maior oferta dos outros medicamentos do programa será em interessante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bupropiona, adesivos e goma de mascar de nicotina, Positivo: Efeitos positivos na cessação do tabagismo, Negativo: -</p>
07/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Grupos de apoio nas unidades básicas de saúde para cessação tabágica e dispensação e orientação no uso de adesivos de nicotina, bupropiona, pastilhas e goma, Positivo: O tratamento com adesivos de nicotina e bupropiona associados aumentaram o índice de cessação, isso em consonância com os grupos de apoio e as sessões de manutenção., Negativo: a bupropiona não foi bem tolerada em pacientes com dificuldade para dormir, os adesivos foram bem tolerados, mas os pacientes relataram coceira que durou poucos dias. Os médicos não prescreveram a goma e as pastilhas durante a execução do programa no município.</p> <p>3ª - Não</p>
08/06/2018	Secretaria Municipal de Saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bupropiona, adesivos de nicotina e goma de mascar, Positivo: Auxiliam na diminuição da vontade de fumar, Negativo: Após a cessação do uso dos medicamentos, os sinais e sintomas como a vontade de fumar reaparecem</p> <p>3ª - Não</p>
11/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Tenho experiencia como profissional de saúde e os usuários tiveram melhor tolerância usando a pastilha do que a goma de mascar principalmente pacientes que usam prótese dentária tem baixa dependencia e poderiam usar a pastilha</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adesivo , bubropiona , goma de mascar e pastilha, Positivo: de acordo com relatos dos usuários são bem tolerados os adesivos, burpopiona e pastilhas, Negativo: vários usuários tem intolerância a goma de mascar</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: adesivo de nicotina e buprobiona, Positivo: o adesivo tem auxiliado os tabagistas a diminuir os sintomas da abstinência e juntamente com a bubpropiona auxilia no controle da ansiedade, aumentando os resultados positivos do programa de controle do tabagismo., Negativo: o adesivo tem trazido insônia para alguns participantes do grupo de tabagismo.</p>
11/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, SOU UMA DAS FARMACÊUTICA RESPONSÁVEIS NO MUNICÍPIO PELO PNCT. AO LONGO DE MAIS DE 6 ANOS NO PROGRAMA, PERCEBEMOS QUE A ADESÃO AOS DIVERSOS TRATAMENTOS SE DIFERENCIAVA MUITO UNS DOS OUTROS, E COM GRANDE PECULIARIDADE, NOTAMOS A NÃO ADESÃO DE MAIS DE 90% DOS USUÁRIOS DE PASTILHAS. AO SEREM QUESTIONADOS, OS PACIENTES CITAVAM GRANDE DESCONFORTO DO TGI, RELATAVAM NÃO SUPORTAR O SABOR RESIDUAL DEIXADO PELA PASTILHA E OUTROS EFEITOS COLATERAIS. SENDO ASSIM, HÁ CERCA DE 5 ANOS JÁ NÃO UTILIZAMOS A PASTILHA ENTRE NOSSAS OPÇÕES DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO, SEM PREJUÍZO DA TAXA DE CESSAÇÃO.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PASTILHA DE NICOTINA 2MG E 4MG., Positivo: ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO À PASTILHA, OBSERVAMOS POUCOS EFEITOS POSITIVOS NOS PACIENTES EM DECORRÊNCIA DA NÃO ADESÃO AO TRATAMENTO. QUANDO RELATADOS EFEITOS POSITIVOS, OS PACIENTES CITAVAM DIMINUIÇÃO DA FISSURA., Negativo: OS PACIENTES CITAVAM GRANDE DESCONFORTO DO TGI, RELATAVAM NÃO SUPORTAR O SABOR RESIDUAL DEIXADO PELA PASTILHA, ENTRE OUTROS EFEITOS COLATERAIS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ADESIVOS DE NICOTINA 7MG, 14MG E 21MG;GOMA DE NICOTINA 2MG;BUPROPIONA 150MG., Positivo: PACIENTES RELATARAM:DIMINUIÇÃO DA FISSURA, MELHORA DA CAPACIDADE RESPIRATÓRIA, MELHORA DA CAPACIDADE OLFATIVA, CESSAÇÃO DO TABAGISMO., Negativo: PACIENTES RELATARAM:ADESIVOS: RARAS REAÇÕES ADVERSAS CUTÂNEASGOMA: IRRITAÇÃO DA MUCOSA BUCALBUPROPIONA: INSÔNIA, MUDANÇA DE PERCEPÇÃO DE SABOR</p>
09/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo com a exclusão da pastilha, mas a manutenção da goma 2 mg que é um apoio muito grande para quem quer para de fumar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não tive contato com a pastilha, a Goma sim., Positivo: A goma associada ao uso de adesivo ajuda muito nos sintomas de abstinência, dá um conforto as pessoas que desejam parar de fumar., Negativo: Muitos pacientes apostam só na medicação para parar de fumar, e não é só isso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adesivos de 21, 14 e 7 mg, Positivo: Apoio e ajuda para quem deseja para de fumar, com os sintomas da abstinência., Negativo: As pessoas pensam que existe milagre, e apostam tudo no medicamento. na verdade elas precisam apostar nelas mesmas, para parar de fumar</p>
10/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Trabalhei em um município de Minas Gerais e a pastilha de nicotina nunca foi solicitada para aquisição por médicos, outros profissionais de saúde e pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adesivos de nicotina. , Positivo: Ajuda a reduzir as crises de abstinências, com a redução gradual da nicotina, de modo a colaborar com a cessação do tabagismo. , Negativo: Alguns pacientes não querem parar de utilizar o adesivo. E se pararmos, têm recaída.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, alguns pacientes relatam que tem sido bom</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bupropiona, adesivo de nicotina, Positivo: Melhor adesão ao grupo de tratamento, Negativo: Não visualizei-os</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bupropiona, adesivo de nicotina, Positivo: Melhor adesão ao tratamento, Negativo: Não visualizei-os</p>
12/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho contato com um grupo de auxílio a cessação do tabagismo e a pastilha tem contribuído com o tratamento dos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um dos únicos recursos disponíveis no SUS no tratamento antitabaco</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pastilha SUS, Positivo: Ajuda na dependência física, Negativo: A goma de mascar era melhor</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adesivo transdérmico de nicotina e bupropiona, Positivo: Diminuir a ansiedade, Negativo: A associação com terapia em grupo é mais eficaz</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: As pastilhas em conjunto com Bupropiona., Positivo: Com a reposição da nicotina, o usuário inicia a redução de danos e posteriormente falcitando a cessação do fumo., Negativo: Tontura.</p> <p>3ª - Não</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para pacientes que tem alguma impossibilidade de utilizar o adesivo de nicotina, a goma de mascar tem muita utilidade, além dos fumantes esporádicos, em que a goma ajuda muito o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adesivo de nicotinaGoma de nicotinaBupropiona, Positivo: Cessação do tabagismo em muitos pacientes, junto com o grupo de tabagismo na unidade de saúde., Negativo: Nenhum. Depende apenas da adesão do paciente e da abordagem profissional.Alguns raros casos de alergia ao adesivo.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho muito importante a oferta da goma e da pastilha ao paciente com controle ,pois auxilia muito.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com os adesivos,gomas , pastilhas e bupropiona, Positivo: Diminuição um pouco os efeitos da abstinência no começo do tratamento que é avaliado a cada paciente, Negativo: Não tive efeitos negativos,pois procuro fazer um boa anamnese e selecionar o medicamento mais indicado para cada paciente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Auriculoterapia, Positivo: Ajuda bastante a diminuir a ansiedade, Negativo: Pode ocorrer quando o paciente não é bem orientado e acha que o tratamento é eterno.</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nicotina adesivo , Positivo: Diminuir a ansiedade , Negativo: Não observei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nicotina adesivo, Positivo: Diminuir a ansiedade, Negativo: Não observei efeitos negativos</p>
12/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Ouve se relatos de pacientes que a mastigação que era demorada, a pastilha dura, gerava um cansaço e dor na musculatura da regio da ATM (Articulação temporo mandibular). Causando um outro problema ao paciente.No nosso municipio não aderimos o uso por ouvir esses relatos em capacitações do PCNT.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adesivos de Nicotina 21, 14 e 7 mg Bupropiona 150 mg , Positivo: O uso correto dos adesivos e atendimento com Abordagem Cognitivo Comportamental individual ou coletiva os resultados sempre são positivos, tanto na cessação total ou parcial do vicio. O tratamento com o uso da Bupropiona é eficaz no controle dos sintomas de abstinência e combate a ansiedade no paciente., Negativo: Não tivemos.</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adesivo de nicotina, Positivo: houve diminuição progressiva do uso do cigarro pelos pacientes, Negativo: Agitação, insônia, boca amarga</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sabemos que a terapia de reposição de nicotina com Pastilha de Nicotina, ajuda em muitos casos no Tratamento de Tabagismo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Goma de mascar de Nicotina e Pastilha de Nicotina, Positivo: Utilizados em momentos de fissura., Negativo: Os pacientes reclamam do sabor da goma de mascar de nicotina.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Goma de mascar de nicotina, pastilha de nicotina e adesivo de nicotina, Positivo: Goma e pastilha são Utilizados em momentos de fissura, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A pastilha é muito favorável em casos de alergias ao adesivo. E não são poucos os pacientes que apresentam alergia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiência com adesivos, pastilha é goma de nicotina. Além das práticas alternativas como auriculoterapia., Positivo: O adesivo de nicotina dá muita segurança ao paciente e diminui a fissura pelo cigarro. A pastilha é o adesivo e bem tolerado e além do uso em alérgicos ao adesivo, pode ser usado como SOS durante a diminuição dos adesivos. A auriculoterapia é bem aceita e por ser um método natural., Negativo: Não observei efeitos negativos, a não ser a alegria de contato aos adesivos de alguns pacientes e aí optamos pela pastilha ou goma com muito sucesso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a bupropiona., Positivo: A bupropiona ajuda aos fumantes com alto grau de dependência e com outras dependências associadas., Negativo: Não obtive efeitos negativos suficientes para suspender a medicação.</p>
14/06/2018	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A comissão de tabagismo da SBPT recebeu com surpresa a notícia da consulta pública da CONITEC sobre a exclusão da pastilha de nicotina 2,0mg para cessação do tabagismo. Justo, agora, em meio à construção do Protocolo Clínico e Diretrizes terapêuticas-Dependência à nicotina, organizado pelo INCA, em que várias instituições e seus expertos participam da sua elaboração, inclusive 6 membros da SBPT estão incluídos nesta equipe de trabalho, o que muito nos honra.Somos favoráveis ao uso de todas as formas de apresentação da Terapia de Reposição Nicotínica baseados em evidência científica robusta que nos norteia no trato destes pacientes na vida real, conforme as Diretrizes para a cessação do tabagismo da SBPT de 2008, http://www.jornaldepneumologia.com.br/PDF/2008_34_10_14_portugues.pdf</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vários dos nossos pneumologistas utilizam na rotina do tratamento do fumante as várias formas de apresentação da Terapia de reposição nicotínica (TRN) tanto isoladamente como em combinação. Inclusive há evidência de que a combinação medicamentosa do adesivo com outra forma de TRN ou com bupropiona ou vareniclina pode elevar a chance do indivíduo parar de fumar, especialmente se o mesmo não conseguiu de parar ao utilizar a monoterapia., Positivo: As duas formas de apresentação da TRN: liberação lenta (adesivos transdérmicos) e liberação rápida (goma, inalador, spray nasal e pastilhas) apresentam eficácia equivalente e elevam a chance do indivíduo parar de fumar em pelo menos duas vezes. Atualmente, estão disponíveis no Brasil apenas os adesivos e as gomas; as pastilhas se encontram em falta no Mercado brasileiro. A facilidade de modificar as dosagens permite ao médico individualizar as prescrições de acordo com as necessidades dos pacientes. Isso torna a TRN uma boa e segura opção terapêutica., Negativo: A terapia de reposição de nicotina é segura e não são descritos efeitos colaterais graves.&#8232; Goma/pastilha: aftas, salivação, soluços, dispepsia, irritação faríngea, dor na articulação temporomandibular, cefaléia, náuseas.&#8232; Adesivo: reações cutâneas locais (prurido, eritema), insônia, hipersalivação, náuseas e vômitos.&#8232; Precaução no uso em pacientes com Coronariopatia ou arritmias graves. Cautela no uso: diabetes, hipertireoidismo e feocromocitoma (estímulo adrenérgico).&#8232; Os efeitos colaterais são suplantados pelos efeitos benéficos.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todas as formas de apresentação da terapia de reposição nicotínica (TRN) são eficazes e elevam em cerca de duas vezes a chance do indivíduo parar de fumar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já utilizei todas as formas de apresentação da TRN, Positivo: A TRN é eficaz em ajudar o tabagista a parar de fumar seja em uso isolado ou em combinação medicamentosa, Negativo: Os efeitos colaterais são</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já utilizei também a Bupropiona e a vareniclina, também, tanto isoladamente como em associação com a TRN., Positivo: Há evidência científica robusta de que os medicamentos de escolha(TRN, bupropiona, vareniclina) para o tratamento do fumante são eficazes e elevam a chance do indivíduo parar de fumar em 2-3 vezes., Negativo: TRN: Goma/pastilha: aftas, salivac&#807;a&#771;o, soluc&#807;os, dispepsia, irritac&#807;a&#771;o fari&#769;ngea, dor na articulac&#807;a&#771;o temporomandibular, dentes amolecidos, cefale&#769;ia, na&#769;useas. Adesivo: reac&#807;o&#771;es cuta&#770;neas locais (prurido, eritema), infiltra&#807;a&#771;o da derme, bolhas, inso&#770;nia, hipersalivac&#807;a&#771;o, na&#769;useas e vo&#770;mitos. Bupropiona: inso&#770;nia, cefale&#769;ia, boca seca, tonturas, aumento da PA. arritmias cardi&#769;acas, enxaqueca, na&#769;useas, vo&#770;mitos, constipac&#807;a&#771;o, dor abdominal, convulso&#771;es, anorexia, anemia, trombocitopenia, leucopenia, equimoses, hipoprolactinemia, urtica&#769;ria, etc. Vareniclina: Efeitos mais comuns (> 10%): aumento do apetite, sonole&#770;ncia, tontura, mudanc&#807;a no paladar, vo&#770;mitos, constipac&#807;a&#771;o, diarre&#769;ia, distensa&#771;o abdominal, desconforto estomacal, flatule&#770;ncia, boca seca, fadiga, dispne&#769;ia e rinorre&#769;ia. Os benefícios de se para de fumar e consequente redução de riscos para a saúde suplantam os efeitos colaterais.</p>
14/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois, como profissional de saúde, temos mais opções no combate ao tabagismo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos fornecidos pela SMS-RJ (adesivos, gomas e pastilhas), Positivo: Eu acompanho os ex-fumantes, seus relatos condizem na eficácia dos produtos citados., Negativo: Pacientes dizem que sabor não é agradável.</p> <p>3ª - Não</p>
14/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Nos grupos realizados em nossa UBS não tivemos adesão a pastilha. Porém a goma de mascar foi muito bem aceita e contribuiu bastante segundo os usuários. Acho que o Ministério deveria investir em gomas de mascar e excluir então a pastilha.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sempre acompanhei os usuários dos grupos, ouvindo experiências com a medicação. também como Psicóloga, no consultório., Positivo: o bup e os adesivos sempre foram usados e tem feedback positivo dos usuários. porém a goma de mascar é colocada por eles como um auxílio bastante positivo na exclusão do cigarro. Porém, sempre tivemos falta deste produto para usá-lo nos grupos., Negativo: não percebi nem um efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No grupo antitabagico do HU USP, a goma ou pastilha de nicotina é fundamental para os pacientes em fase de tratamento, junto com o patch de nicotina. 35% dos nossos pacientes associam a nicotina na forma oral ao adesivo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: adesivo de nicotina, bupropiona, vareniclina e a goma ou pastilha de nicotina, Positivo: para os pacientes que diminuiriam com o uso do adesivo, associar a pastilha na hora da fissura ajuda a chegar a cessação, Negativo: o gosto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TRNbupropionavareniclina, Positivo: depende de cada caso, Negativo: pastilha o gostoadesivo pruridobupropiona insonia</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: pastilha de nicotina 2mg, Positivo: cessação do tabagismo, Negativo: Agitação</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É ótimo ajuda muito o paciente na fase de abstinência.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pastilha de nicotina e goma, Positivo: Ajuda na fase de abstinência , Negativo: Fica mais difícil deixar o hábito de fumar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pastilha de nicotina. Goma de nicotina. Bupropiona. Vareniclina. , Positivo: Ajuda o paciente a parar de fumar, Negativo: Dificulta o tratamento.</p>
12/06/2018	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É totalmente descabida esta proposta, a AMB defende o uso de todas as formas de reposição de nicotina disponíveis no mercado brasileiro, pois tem eficácia comprovada, baseada em evidências científicas, conforme as diretrizes para clínicas para o tratamento do tabagismo aprovadas pela AMB/ANS de 2009, http://diretrizes.amb.org.br/ans/tabagismo.pdf</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim, são medicamentos que auxiliam na cessação do tabagismo, tanto em uso monoterápico quanto combinado ou associado. As formas de reposição de nicotina disponíveis no Brasil são custo-efetivas, quais sejam os adesivos de nicotina, as gomas de mascar e as pastilhas de nicotina, sendo que estas últimas, temos informações de que o laboratório farmacêutico não as está colocando no mercado., Positivo: Todos os medicamentos no protocolo clínico do tratamento do tabagismo duplicam, pelo menos, as chances de cessação do tabagismo, podendo ser utilizados em uso combinado, p.ex., adesivos + gomas de mascar; ou em uso associado com a bupropiona e a vareniclina, ainda não disponível no SUS., Negativo: Os efeitos colaterais do uso da goma suplantam os riscos de continuar fumando, e os médicos são orientados neste sentido pelas diretrizes atualmente existentes, p.ex., casos de oclusão parcial ou total da ATM, ulcerações e gengivostomatites importantes quando seu uso não está indicado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a bupropiona, a vareniclina e as formas de reposição de nicotina disponíveis no Brasil, quais sejam os adesivos de nicotina, as gomas de mascar e as pastilhas de nicotina, sendo que estas últimas, temos informações de que o laboratório farmacêutico não as está colocando no mercado., Positivo: Todos os medicamentos no protocolo clínico do tratamento do tabagismo duplicam, pelo menos, as chances de cessação do tabagismo, podendo ser utilizados em uso combinado, p.ex., adesivos + gomas de mascar; ou em uso associado com a bupropiona e a vareniclina, ainda não disponível no SUS., Negativo: Os efeitos colaterais do uso da goma suplantam os riscos de continuar fumando, e os médicos são orientados neste sentido pelas diretrizes atualmente existentes.</p>
13/06/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bupropiona 150mg , Positivo: houve redução considerável no nível de ansiedade, Negativo: náuseas durante tratamento com medicação.</p> <p>3ª - Não</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adesivos transdérmicos de nicotina e Bupropiona , Positivo: redução e cessação do tabaco, Negativo: Aumento da pressão arterial relacionado ao uso do adesivo, as já um efeito colateral.</p> <p>3ª - Não</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Gomas e pastilhas de Nicotina são importantes no tratamento do Tabagismo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com gomas de mascar., Positivo: A goma de mascar diminuiu a fissura do paciente ao interromper o hábito tabagístico., Negativo: Mal hálito e dores na articulação temporomandibular.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adesivos de Nicotina e Vareniclina, Positivo: A cessação do tabagismo, Negativo: com os adesivos de Nicotina: reações cutâneas.Com Vareniclina: insônia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A única medicação para gestantes, nutrízes e pessoas com alergia ao adesivo!!!!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Goma de mascar, Positivo: ideal para gestantes, nutrízes, e pessoas com reação alérgica ao adesivo., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adesivo de Nicotina, Positivo: Auxilia no tratamento para parar de fumar, Negativo: Adesivo: não indicado para gestantes e nutrízes.</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, AS diretrizes com a maior força de evidência demonstram a validade da reposição de nicotina por este método. Não vejo porque abolir.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: isolado ou associado com Bupropiona, Positivo: colabora efetivamente no tratamento da cessação tabágica., Negativo: suplantam os malefícios do tabaco.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bupropiona e Vareniclina, Positivo: facilitam o processo de tratamento para a cessação tabágica., Negativo: suplantam os efeitos da manutenção do tabagismo</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pela minha experiência, a pastilha e a goma de nicotina são produtos que auxiliam no sucesso da cessação do tabagismo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adesivos de nicotina, Positivo: Auxílio na cessação do tabagismo, Negativo: Não observei efeito negativo</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 1.Há evidências científicas de que a TRN contribui para a cessação do tabagismo.2. As diversas formas de TRN apresentam eficácia na cessação do tabagismo3. A goma de nicotina é eficaz na cessação do tabagismo4. A TRN pode combinar formas com ação rápida (goma de mascar) com formas de ação lenta (adesivos transdérmicos)5. A TRN quando associada a outros medicamentos, tais como a bupropiona, aumenta a chance de parar de fumar</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: COORDENADOR AMBULATORIO DE TRATAMENTO DE TABAGISMO HÁ 14 ANOS, Positivo: 1. As diversas formas de TRN apresentam eficácia na cessação do tabagismo?2. A goma de nicotina é eficaz na cessação do tabagismo3. A TRN pode combinar formas com ação rápida (goma de mascar) com formas de ação lenta (adesivos transdérmicos)5. A TRN quando associada a outros medicamentos, tais como a bupropiona, aumenta a chance de parar de fumar, Negativo: NÁUSEAS EM ALGUNS CASOS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BUPROPIONA COMPRIMIDO/NICOTINA ADESIVO/VARENICLINA COMPRIMIDO, Positivo: EFICÁCIA DE AMBOS EM TRATAMENTO DO TABAGISMO PODENDO SER COMBINADOS COM GOMA DE MASCAR OU CHICLETE DE NICOTINA, Negativo: BUPROPIONA - ELEVÇÃO DA PAVARENICLINA - NAUSEAS/ADESIVOS DE NICOTINA - PRURIDO CUTANEO LOCAL</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Parcialmente, pois a gestante tabagista somente pode fazer uso da mesma para o tratamento da cessação do Tabagismo, como orienta a SMS/RJ.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Principalmente pela existencia de um grupo de trabalho com expertise no tratamento do tabagismo construindo um protocolo clínico baseado nas melhores evidências, inclusive com membros da CONITEC na comissão, então, é injustificável este procedimento da DAF e da CONITEC</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adesivo de nicotina e goma,, Positivo: A maioria dos pacientes tratados com a medicação relatam diminuição dos efeitos da síndrome de abstinência, auxiliando assim, no processo de desconstrução do hábito., Negativo: Efeitos colaterais pertinentes aos produtos.</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Adesivos e pastilhas são fundamentais no tratamento. Pacientes com alergia de contato, pacientes obsessivos, além de pacientes com transtornos Psiquiátricos, se beneficiam bastante em fase de fissura ou quando não podem se submeter ao tratamento através do adesivo. Sozinha ou associado ao tratamento com adesivos, Bup ou Adesivos, faz diferença no processo de parar de fumar ou se manter sem o cigarro. Então, porque excluir a Pastilha do tratamento?</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adesivos, Bup, pastilhas e Goma. , Positivo: Diminuição imediata da fissura; diminui a dependência Comportamental. , Negativo: Não há efeitos negativos relatados pelos pacientes atendidos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adesivo, goma, pastilha, Bupropiona. , Positivo: Bup: atua no sistema de reforço do cérebro, tanto como antidepressivo, como inibidor da vontade de fumar. Associado a Adesivos e principalmente Pastilha, potencializa os efeitos de diminuição da vontade de fumar. Pastilha: dá conta da dependência química. Pacientes que tem dificuldade para tomar remédios, faz do adesivo a primeira opção para o tratamento, associado ou não com Pastilhas. Adesivo: , Negativo: Não foram relatados.</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pois é um dos meios de ajuda aos pacientes para deixar de fumar</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: os adesivos a goma e a auriculoterapia, Positivo: ajuda os pacientes em abandonar este vício do tabaco, Negativo: não ouviu</p> <p>3ª - Não</p>
14/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: adesivos de nicotina BUP, Positivo: todos tiveram efeitos positivos e negativos nos pacientes, pois depende da força de vontade e do estado psicológico de cada um., Negativo: alguns pacientes não conseguiram parar de fumar.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/06/2018	Secretaria Municipal de Saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A reposição de nicotina é um sucesso no tratamento de fumantes e mais de uma forma de reposição deve ser mantida no tratamento oferecido pelo SUS, até para atender os diversos tipos de fumantes, com características diferentes de consumo/dependência de cigarro/nicotina.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Gomas de nicotina de 2mg desde 2004 e Pastilhas de nicotina de 4mg de setembro de 2010 a março de 2013., Positivo: Esses tipos de reposição de nicotina beneficiam os fumantes em tratamento para deixar de fumar nos momentos de fissura ou síndrome de abstinência. Servem especialmente para determinados tipos de fumante: os que tem alergia a adesivos; fumantes que não fumam o dia todo, mas em situações específicas, como por exemplo eventos sociais ou com bebida alcoólica; eventualmente podem ser indicados para gestantes ou pacientes com algum risco de reposição de nicotina constante, visto que a permanência da nicotina no organismo é menor. , Negativo: Alguns reclamaram do sabor forte da Pastilha na dosagem de 4mg que foi a que recebemos na época em que era fornecida pelo MS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outras formas de reposição de nicotina como os Adesivos de 21, 14 e 7 mg e Bupropiona de 150 mg. Abordagem cognitivo comportamental para fumantes e com apoio de Auriculoterapia., Positivo: Os Adesivos são os mais utilizados, reduzem sintomas de abstinência e trazem bastante segurança aos pacientes. A Bupropiona também tem sucesso, mas é menos usada aqui pois depende de maior envolvimento de médicos no acompanhamento e as contraindicações são maiores, sobretudo com bebida alcoólica. Auriculo reduz ansiedade, compulsão e fome. , Negativo: O efeito negativo mais comum dos adesivos é alergia na pele, mas uma minoria precisa suspender seu uso.</p>