

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Peptídeos natriuréticos tipo B (BNP e NT-ProBNP) para diagnóstico de insuficiência cardíaca - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, discordo! 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Insulinas, Negativo: Não tive
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cateterismo angioplastia colocação de stent, Positivo: Controle de trombose prevenção de infarto, Negativo: Altamente invasivos e demandam longo tempo de recuperação
23/07/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, importância de ter um exame auxiliar diagnóstico da Insuficiência Cardíaca, o que representa uma grande conquista para os pacientes e simplificação do manejo da doença no sistema de saúde. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esses biomarcadores são importantes para discriminar o diagnóstico de insuficiência cardíaca nas emergências, além de guardar papel prognóstico para esses pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: É muito boa pois ajuda muito em casos de dúvidas diagnósticas. , Positivo: Avaliação da causa de dispnéia na sala de emergência, facilitando o manejo correto do paciente. , Negativo: O preço</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Tudo que vem para ser com prevenção é excelente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu ja realizei o cateterismo., Positivo: Foi tudo dentro do protocolo, Negativo: Como sou diabetico o contraste que fazem parte do protocolo afeta diretamente a partee renal e nós diabeticos ficamos quse um mês com a glicemias alteradas.</p>
19/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BNP Triage, Positivo: Facil e rápida execução da determinação, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, exame de muita aplicabilidade clínica para conclusões diagnósticas e inicio de tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: NT pró-BNP, Positivo: exame simples com alta especificidade no diagnóstico diferencial de dispnéia, Negativo: não considero haver pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ecocardiograma, ergoespiometria, Positivo: O Ecocardiograma é muito útil e prático para quantificar as disfunções miocárdicas.A ergoespiometria apresenta muito boa especificidade e sensibilidade em definir etiologias de disfunções em territórios diversos, seja cardiocirculatório, pulmonar ou periférico, Negativo: O Ecocardiograma depende de agenda, equipamento e profissional treinado em seu manuseio.A ergoespiometria é exame complexo, demorado e de alto custo.</p>
11/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A Insuficiência cardíaca é condição clínica grave e muito prevalente, mas cujos sintomas iniciais de fadiga, redução da capacidade física para esforços e edema maleolar, são inespecíficos, principalmente nos idosos, e há elevado número de casos não diagnosticados ou diagnosticados muito tardiamente. A incorporação da dosagem do BNP na atenção primária representaria importante apoio para o diagnóstico mais preciso desta síndrome clínica, com impacto nos cuidados à saúde.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dosagem de NT-Pró-BNP, Positivo: O maior impacto positivo do emprego rotineiro da dosagem de níveis séricos de NT-Pró-BNP é a possibilidade de excluir-se o diagnóstico de insuficiência cardíaca na população de paciente com probabilidade intermediária à baixa para presença da doença, como os idosos com dispnea aos esforços e edema pedal. , Negativo: O uso indiscriminado para pacientes com alto risco da doença, ou com diagnóstico já firmado, ou para outros objetivos clínicos como prognóstico podem não agregar informação clínica útil e encarecer o cuidado à saúde.</p> <p>3ª - Não</p>