

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Sofosbuvir e Velpatasvir para Hepatite C - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sofosbuvir, Positivo: praticamente sem efeitos colatras, Negativo: demora para receber do ministério da saúde</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dacatasvir e 3D, Positivo: praticamente sem efeitos colaterais, Negativo: demora para receber do ministério da saúde</p>
15/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considerando que o teste com à medicação obteve efeito de melhora em 50%dos pacientes e estagnação da doença em outros 50%, penso que a eficácia deve ser tratada como SUCESSO.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considerando que o teste do remédio obteve o efeito de melhora em 50% dos pacientes de AME e estabilização da doença nos outros 50%, a eficácia deve ser tratada como sucesso já que a doença é progressiva e a expectativa de vida pode ser aumentada sensivelmente com o tratamento. 50% de esperança de melhora ou até mesmo de impedimento do avanço da doença deveria ser tratado como um tratamento 100% eficaz para quem tem atrofia muscular espinhal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todos cidadãos tem o direito de tratamentos para cura de suas doenças e as melhores e é isto que representa a inclusão desta madicação!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Viekira pack., Positivo: Preciso fazer exames de 90 dias pos tto para confirmar cura!, Negativo: Nem um</p>
15/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Novo medicamento pangenotipos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon convencional e Ribavirina. Interferon peguilado e Ribavirina Sofosbuvir e Simeprevir , Positivo: Cura com Simeprevir e sofosbuvir em 2014 sem efeitos colaterais , Negativo: Efeitos colaterais terríveis com Ribavirina e interferon. Anemia, psoríase, dores terríveis Não podia trabalhar. Deixei minha profissão de dentista por 15 anos devido aos tratamentos com estes medicamentos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon convencional três vezes por semana Ribavirina Interferon peguilado uma vez por semana Ribavirina Sofosbuvir -84 dias Simeprevir -84 dias , Positivo: Simeprevir RVSSOFOSBUVIR RVS INTERFERON E RIBAVIRINA NADA DE POSITIVO , Negativo: Interferon. Efeitos colaterais graves internada varias vezes . Tratamento suspenso Ribavirina anemia e prurido . Recebi Trabsfusoes de “papas “de hemácia . Tratamento suspenso</p>
15/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Um medicamento que serve para todos os genótipos, grau de fibrose e com eficácia de mais de 95%, e ainda mais barato que os tratamentos atuais, certamente devem fazer parte do arsenal terapêutica contra a Hepatite C</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon 3 milhões + Ribavirina Interferon Peguilado 2a + Ribavirina Interferon Peguilado 2b + ribavirina Sofosbuvir + Daclatsvir + Ribavirina, Positivo: Com os tratamentos a base de interferon as terapias foram falhas e apresentaram reações adversas variadas. Já com a combinação Sofosbuvir + Daclatsvir além de não sentir reação adversas obtive a RVS., Negativo: Com as terapias incluindo interferon:- desânimo, cansaço, cefaléias e dores musculares foram constantes e as principais.</p>
15/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Essa associação dos dois medicamentos tem um resultado de cura de quase 100%</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro mais o tratamento foi a mais de 10 anos, Positivo: Tive praticamente a cura da hepatite, Negativo: quase nenhum</p>
15/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Qualidade de prescrição, benefícios aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, daclastavir, simeprevir, 3D, Positivo: Grande taxa de erradicação e cura, poucos efeitos colaterais, Negativo: Interações medicamentosas, grande número de comprimidos.</p>
15/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sovaldi Dalinzka Viekira Simeprevir Interferon, Positivo: Sovaldi eficácia comodidade posológica, Negativo: Vieira número maior de cmp</p>
15/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, COM CERTEZA DISCORDO DA CONITEC.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor totalmente porque muitas pessoas precisam e será fundamental para salvar vidas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2018	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, foi apontado e sugerido à comissão de hepatites do Departamento de IST, Aids e Hepatites que concordou que esse medicamento seja utilizado no resgate de pacientes experimentados com os atuais DAAs que fazem parte do arsenal do atual PCDT que não obtiveram RVS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon 3 milhões + Ribavirina - 48 semanas Interferon Peguilado 2 a e 2b - 24 semanas com cada apresentação Sofosbuvir + Daclatasvir + Ribavirina por 24 semanas, Positivo: Com Interferon todos os Ttos não obtiveram RVS e apresentaram RAMs Com Sofosbuvir + Daclatasvir + Ribavirina foi obtida RVS e não houve RAMs, Negativo: Ttos com interferon: Cefaléia constante, fadiga, desânimo e dores musculares foram as mais frequentes. Com Sofosbuvir + Daclatasvir nada sentido</p>
15/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considerando que o teste do remédio obteve o efeito de melhora em 50% dos pacientes de AME e estabilização da doença nos outros 50%, a eficácia deve ser tratada como sucesso já que a doença é progressiva e a expectativa de vida pode ser aumentada sensivelmente com o tratamento. 50% de esperança de melhora ou até mesmo de impedimento do avanço da doença deveria ser tratado como um tratamento 100% eficaz para quem tem atrofia muscular espinhal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A decisão irá ajudar no tratamento dos pacientes com as doenças em questão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou um paciente curado da Hepatite C e o meu tratamento foi o antigo, com 48 semanas e era chamado de terapia tripla, muito demorado e doloroso por sinal. Hoje estou ótimo de saúde e sei o quanto é angustiante ter uma doença poderosa como essa e não poder ter acesso ao tratamento correto. Com diversos estudos que apontam essas drogas com mais de 90 % de cura em quase todos os genótipos, é urgentemente necessário a aprovação da incorporação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Telaprevir, Ribavirina e Interfeon. Terapia tripla, diversos efeitos colaterais, 48 semanas., Positivo: Efeito positivo sempre é o resultado final, se o vírus se mantem não detectável 6 meses após a última dose ministrada, espetacular, sensação de livramento sem nome, mas do contrário, sem efeitos positivos., Negativo: Efeitos colaterais sem dúvida. Eram muitos. Febre, dor de cabeça, tontura, náuseas, anemia, perda de peso, etc.</p>
15/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considerando que o teste do remédio obteve o efeito de melhora em 50% dos pacientes de AME e estabilização da doença nos outros 50%, a eficácia deve ser tratada como sucesso já que a doença é progressiva e a expectativa de vida pode ser aumentada sensivelmente com o tratamento. 50% de esperança de melhora ou até mesmo de impedimento do avanço da doença deveria ser tratado como um tratamento 100% eficaz para quem tem atrofia muscular espinhal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considerando que o teste do remédio obteve o efeito de melhora em 50% dos paciente a de AME e estabilização da doença nos outros 50%, a eficácia deve ser tratada como sucesso já que a doença é progressiva e a expectativa de vida pode ser aumentada sensivelmente com o tratamento. 50% de esperança de melhora ou até mesmo de impedimento do avanço da doença deveria ser tratado como um tratamento 100% eficaz pra quem tem atrofia muscular espinhal. Nesse país tem-se dinheiro pra tudo de interesse pessoal dos nossos políticos mas, disponibilizar dinheiro para um tratamento que prolonga a vida de um doente, infelizmente é tratado como desperdício de dinheiro.eficaz para quem tem atrofia muscular espinhal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos do zipiranza no sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Estou esperando pelo medicamento há mais de 6 meses.Sou genótipo 3, Fibrose 3 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Não só pacientes de 1 a 6 anos ,mas todos merece o tratamento 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Se os relatórios preliminares indicam até 99% de cura em 12 semanas parece-me excelente sua utilização... 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Quanto mais medicamentos forem usados, mais rápida será a erradicação da doença.Estou na espera do meu tratamento. Já foi dada entrada no processo para a liberação. Sou portadora do vírus da hepatite C com genótipo 1a. Graças a Deus, sem danos no fígado.Inclusive, muito feliz por ter agora acesso ao tratamento, pois anteriormente, por ter fígado sem danos, não tinha esse direito. 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Qualquer medicação de combate a doenças crônicas deve ser implementado 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Drogas com capacidade de tratamento pangénomico de fácil aderência, alta eficácia (acima de 95%) e praticamente sem efeitos colaterais, e com uso de curto período em comparação com tratamentos anteriores. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Peg-interferon + ribavirina, Positivo: Poucos efeitos positivos. , Negativo: Ribavirina: anemia importante Peg-interferon: sintomas de mal estar, dores articulares Ambos com dificuldade de aderência por parte do paciente e restrição do perfil clínico que pode utilizar estas drogas. Tempo prolongado de tratamento.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Devido ao alto custo e por ser imprescindível ao portador da AME ter uma expectativa de vida, o governo deve ter essa medicação a população urgentemente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha mãe espera pelo medicamento há 6 (seis) meses.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é extremamente caro! A maioria das famílias não dispõe de condições para comprar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, E de extrema importância o tratamento correto e acompanhando as famílias e principalmente pacientes crianças podemos ver nitidamente a melhora da qualidade de vida deles com o medicamento, e quanto mais cedo terem diagnóstico e tratamento correto mais chances tem de crescer uma criança saudável, já tive problemas de saúde onde também precisei tomar medicamento de Alto custo sei que foi de extrema importância durante a fase que passava e este era fornecido pela rede do SUS, como toda patologia requer tratamento e este medicamento e mais indicado espero que libere o mais rápido possível pois as crianças não podem perder a chance de viver.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Índice elevado de RVS e por ser pangênótico e panfibrótico facilitará em muito a adesão dos pacientes assim como a erradicação a médio prazo da Hepatite C no país.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Peg-Interferon , Ribavirina, Telaprevir , Boceprevir, Sofosbuvir, Daclatasvir, Simeprevir, Ombitasvir/Veruprevir/Ritonavir + Dasabuvir., Positivo: Elevado índice de resposta aos DAAs atualmente disponíveis com boa tolerância. , Negativo: Baixo índice de RVS com PegINF + Ribavirina e grande índice de efeitos adversos. Boa tolerância aos DAAs porém ainda com percentual razoável de ausência de resposta bem como baixa resposta a determinados genótipos obrigando a variação de DAAs empregados e necessidade de retratamento aos não respondedores, com poucas opções nestas condições. Considere-se a necessidade de associação de Ribavirina aos pacientes F3 e F4 (cirróticos) com aumentado risco de anemia fruto da pancitopenia comum nos doentes com fibrose avançada. A suspensão da Ribavirina nestas situações reduz a taxa de resposta nestes que são os pacientes mais graves.Redução dos gastos públicos com tratamento de cirróticos graves não legíveis para o Transplante Hepático, nem como os gastos com o Transplante e doentes transplantados. Acrescente-se a redução do risco de Carcinoma Hepatocelular com o tratamento e a melhor estratégia de negociação dos órgãos públicos junto à indústria farmacêutica pelo maior número de tratamentos adquiridos, que irão atender a todos os genótipos e a todos os pacientes desde F0 a F4.</p>
16/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Segundo as experiências sobre essa medicação, é o melhor tratamento disponível .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Meu tratamento foi com o viekira paço, conhecido como 3D., Positivo: Quase nenhum efeito colateral e com um mês de tratamento já negativou!!! , Negativo: Não teve nenhum efeito negativo.</p>
16/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Remédios mais baratos, com efeitos colaterais mais brandos e índice de cura superior.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Excelente opção pangênótica de fácil adesão.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir-velpatasvir, Positivo: Cura com RVS, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SofosbuvirDaclatasvirSimeprevirRibavirina, Positivo: Sofosbuvir ótima aceitação e taxa de RVS em combinação Daclatasvir ótima aceitação e taxa de RVS em combinação Simeprevir ótima aceitação e taxa de RVS em combinação Ribavirina boa aceitação e taxa de RVS em combinação , Negativo: Sofosbuvir sem problemasDaclatasvir sem problemas Simeprevir sem problemasRibavirina leve anemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu fui tratado com hepatite c Sofosbuvir 400g e Declatavir, e consegui negativar, embora demorei quase 8 meses para conseguir o medicamento, assim quanto mais fácil o acesso melhor para tratar os que necessitam.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir 400g e Declatavir, Positivo: Não tive qualquer reação ou sintomas que viesse a comprometer a minha vida. Tratamento tranquilo sem efeitos colaterais., Negativo: Somente a demora em conseguir o medicamento em BELO HORIZONTE, pelo governo estadual de minas gerais. QUASE 8 MESES.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ribavirina e interferon, Positivo: Somente pontos negativos., Negativo: muitas dores, pelo corpo e dor de cabeça, cansaço, não bom o tratamento. E ainda não conseguir a negatificação.</p>
16/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É ótimo que o governo contribua com os medicamentos necessários para a vida de alguém, ainda mais doenças degenerativas, que são necessários para sempre o medicamento!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O mais rápido possível a autorização para adquirir e a dispensação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Unico medicamento existente para tratamento de Amiotrofia Muscular Espinhal</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Spiranza, Positivo: Melhora a capacidade respiratoria, meçhora o controle da deglutição da saliva, ganhos motores de trono, membros superiores e inferiores, Negativo: Não foi observado nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu acho q o remédio precisa ser liberado no SUS!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Precisamos lutar e usar nossa fé para buscarmos a vida de quem amamos ,de todos aqueles que vivem lutando constantemente pela sua medicação.sou a favor da medicação para o tratamento de todos que precisam</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Qualquer tratamento que cure, ou pelo menos melhore a qualidade de vida do infectado é bem vinda.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon alpha 3.000.000 UI Ribavirina, Positivo: Os dois foram bons a seu modo tanto que baixou bastante a carga viral, porém não foi negativado., Negativo: A ribavirina não fez tanto efeito somente o interferon me causava estresse.</p>
16/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Qualquer tratamento que cure, ou pelo menos melhore a qualidade de vida do infectado é bem vinda.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon alpha 3.000.000 UI Ribavirina, Positivo: Os dois foram bons a seu modo tanto que baixou bastante a carga viral, porém não foi negativado., Negativo: A ribavirina não fez tanto efeito somente o interferon me causava estresse.</p>
14/09/2018	Sociedade médica	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Enquanto sociedade Médica para Estudos do Fígado que visa bem estar dos pacientes com vírus hepatite C através da cura da doença com tratamentos eficazes, cientificamente comprovados, de tecnologia avançada, com facilidade posologia, segurança de uso, tempo reduzido de tratamento, mínimos efeitos colaterais, achamos de extrema valia a incorporação do sofosbuvir/velpatasvir pela Conitec e PCDT</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sofosbuvir/ velpatasvir, Positivo: posologia, facilidade de aderencia, excelente reposta com cura com vírus, tempo de tratamento, facilidade de uso, Negativo: cefaléia nas primeiras doses</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sofosbuvir + daclatasvirsofosbuvir + simeprevirViekirainterferon peguiladoribavirina, Positivo: Sofosbuvir+ daclatasvir : tempo tratamento, posologia fácil, menos efeitos adversos, cura 95% dos pacientessofosbuvir + simeprevir: tempo tratamento, posologia fácil, menos efeitos adversos, cura 95% dos pacientesviekira: tempo tratamento, alta taxa de RVSinterferon peguilado: ação imunomoduladora, redução fibrose, Negativo: sofosbuvir + daclatasvir: algumas taxas de recidivasofosbuvir + simeprevir: taxas de resistencia e recidiva vírusviekira: posologia mais complexa, interações medicamentosas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Constam do texto da própria Conitec oito estudos e ensaios clínicos que mostram sem sombra de dúvidas a eficácia surpreendente da combinação SOFOSBUVIR / VELPATASVIR na possibilidade de cura em tratamentos de somente 12 semanas e uma única pílula ao dia, praticamente sem efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ribavirina e Interferon, Positivo: Negativei no primeiro mês, mas reapareceu no 3º mês de tratamento, Negativo: Perda excessiva de peso, palidez mórbida, dores no corpo, indisposição.</p>
14/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Não faz nenhum sentido deixar de usar uma droga muito superior e com custo inferior as que são usadas atualmente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sofosbuvir + velpatasvir em uso pontual de poucos pacientes.Experiência muito grande da literatura internacional., Positivo: Alta eficácia e ausência de toxicidade.Custo mais acessível., Negativo: Não há efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sofosbuvir + daclatasvir, Positivo: Alto índice de cura (com os produtos originais) e baixa toxicidade.Não há estudos com produtos genéricos., Negativo: Menos ativo e mais caro do que o produto em Consulta Pública.Não há estudos com o sofosbuvir genérico que se pretende usar no Brasil.</p>
14/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, MEU FILHO FEZ TRATAMENTO COM REMEDIOS ANTIGOS POR 1 ANO E NÃO OBTEVE RESULTADO. TEVE MUITOS EFEITOS COLATERIAIS TAMBEM.DEPOIS REPETIU O TRATAMENTO COM OS REMEDIOS NOVOS E EM 3 MESES FICOU CURADO, SEM PRATICAMENTE NENHUM EFEITO COLATERAL.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RIBAVIRINA+ INTERFERON (POR 1 ANO, SEM RESULTADO)INELIZMENTE NÃO ME LEMBRO OS NOMES DOS 2 ULTIMOS REMEDIOS QUE MEU FILHO TOMOU E FICOU CURADO EM 3 MESES SEM EFEITOS COLATERAIS., Positivo: O SEGUNDO TRATAMENTO QUE MEU FILHO FEZ COM OS REMEDIOS NOVOS, SEM NENHUM EFEITO COLATERAL ELE FICOU CURADO., Negativo: O PRIMEIRO TRATAMENTO COM RIBAVIRINA + INTERFERON, MEU FILHO TEVE MUITOS EFEITOS COLATERIAS E NO ULTIMO MES TEVE QUE INTERROMPER O TRATAMENTO PORQUE SUAS PLAQUETAS ESTAVAM MUITO BAIXAS.</p>
14/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo totalmente pois esta medicação é um avanço em relação as medicamentos anteriores. Tomar um único comprimido ao dia por apenas 12 semanas e quase sem efeitos colaterais facilita a aderência ao tratamento, servir para todos os genótipos do vírus elimina a necessidade do teste de genotipagem do HCV. Elevada possibilidade de cura mesmo em pacientes difíceis de tratar quase elimina a possibilidade de fazer um retratamento.Também permitirá que médicos não especialistas mediante treinamento prévio possam tratar os casos mais simples, deixando os casos mais complexos para os especialistas, facilitando assim a meta de eliminar a Hepatite C até 2030 no Brasil.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho propriedade em fazer esta contribuição, pois fui portador do vírus da Hepatite C durante 25 anos e em 2016 utilizei este medicamento mais moderno, o sofosbuvir e somente com ele finalmente consegui a cura, pois o tratamento anterior com interferon não teve êxito, portanto posso dizer o quanto é importante o uso de medicamentos mais modernos para o tratamento da Hepatite C., Positivo: Tomar apenas um comprimido por dia de sofosbuvir junto com um de daclatasvir, praticamente sem efeitos colaterais e conseguir a cura depois de um tratamento anterior fracassado., Negativo: Os efeitos colaterais do sofosbuvir foram mínimos, apenas uma leve náusea e tontura que praticamente sumiram no decorrer do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: No tratamento anterior fracassado utilizei o interferon peguilado e o telaprevir., Positivo: Praticamente nenhum., Negativo: Foram os piores possíveis, mais de um ano passando mal o tempo todo. Alguns dos efeitos colaterais foram anemia, baixa imunidade, calafrios, náusea, tontura, sensação de gripe, olhos e boca ressecados, alergia e mal estar geral.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente a todo cidadão, devendo os poderes públicos fornecer assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitarem, cumprindo fielmente o que foi imposto pela Constituição da República e pela Lei nº. 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tratamento unificado facilita ao paciente e aos médicos, bem como, acredito, ao SUS quanto a estoques.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir, Daclastavir, Ribavirina e antes Interferon peguilado. Curei no segundo tratamento com Sofosbuvir/Daclastavir/Ribavirina em 12 semanas, Positivo: Poucos efeitos colaterais durante o tratamento e negatizou o vírus. Após 6 meses do tratamento continua negativo., Negativo: Doenças de pele apareceram após o tratamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon Peguilado e Ribavirina, Positivo: Não curou, não teve efeitos positivos, Negativo: Alguns efeitos colaterais fortes, como dores e sintomas de gripa, muito cansaço</p>
14/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Daclastavir e SOFOSBUVIR, Positivo: Cura da Hepatite C, Negativo: Principalmente irretabilidade durante o tratamento</p>
14/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SOFOSBUVIR, Positivo: AUSÊNCIA DE PARAEFEITOS NEGATIVOU O HVC EM 30 DIAS, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: INTERFERON, Positivo: NENHUM, Negativo: PANCITOPENIA DERMATOSSESANEMIA SEVERA</p>
14/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho pacientes aguardando ansiosamente e esperançosamente para sua cura do vírus de hepatite C</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, simeprevir, daclatasvir, Positivo: Todos os pacientes que tratei até hoje estão curados com os novos DAAS. Os que trataram com interferon peguilados alguns não curaram e estão esperando pelos novos medicamentos, que são uma grande esperança., Negativo: Nenhum efeito negativo até agora.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferon convencional, pegui interferon, Ribavirina, Olysio, etc., Positivo: Os remédios para tratamento para Hepatite C anteriores aos DAAS tinham muitos efeitos negativos e principalmente menos chance de cura, levando a resistência e a piora da doença., Negativo: Não negatização do vírus, anemia, fadiga, etc</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nusinersena (Spinraza®), Positivo: Houve melhora nos movimentos, Negativo: Desconheço os efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diferença entre Estimativa de Casos de AME I e Estimativa de Casos Diagnosticados de AME IVERHAART et al., 2017 faz referência a vários estudos que indicam predominância de AME em caucasianos e asiáticos. A tabela 4 (Carrier frequencies for SMA per ethnicity) na pg 11 mostra que caucasianos têm a probabilidade de serem acometidos de AME na proporção de 2,2 para 1 em relação ao negros. No Brasil a proporção de negros (afro descendentes) é de 54,9 % (IBGE-2016) o que implica numa redução do número de casos de AME de 1 por 8.500 nascimentos (citado no relatório do SUS) para casos de AME de 1 por 13.100 nascimentos. BELTERA et al., 2018, Na tabela 3 (Expected vs Self-Identified Cases) da pg 173, nos EUA para uma população de abrangência de 23.748.337 (Vinte três milhões setecentos quarenta oito mil e trezentos trinta sete habitantes) em diversos estados para uma expectativa de todos os tipos de casos de AME de 2158, foram identificados (diagnosticados) 1280. Desses há uma probabilidade de 58 % serem de AME I, ou seja, 742 casos diagnosticados de AME I. Entretanto este número pode ser alterado com base tabela 1 (Demographics) da pg 170 onde percentagem de AME I diagnosticados foi de 53% em relação aos diagnosticados com AME. No Brasil nascem 3.058.783 por ano. Considerando as observações dos artigos de VERHAART et al., 2017 e BELTERA et al., 2018 o número de acometidos com AME I, no Brasil por ano pode ser considerado $(3.058.783 / 13100 \times 0,53)$ de 124 nascimentos por ano acometidos de AME I. Esse número é bem diferente dos 209 nascimentos do primeiro ano citado na tabela 11 do relatório do SUS. Como BELTERA et al., 2018 encontrou a percentagem de diagnosticados de 59,3%, em relação a expectativa de todos os tipos de casos de AME, é possível inferir que no Brasil, devido a carência de informação por parte de grande parte da população e da dificuldade de estrutura para o diagnóstico de uma doença rara como a AME, o percentual de diagnósticos seja muito inferior a 59,3%. Mesmo considerando esse percentual aplicável o número de diagnosticados por ano no Brasil seria 74 $(124 \times 0,593)$. Conclusão: Os cálculos das Tabelas 11 e 12 do relatório do SUS estão completamente equivocados e devem ser refeitos. Dessa forma, o Impacto orçamentário para incorporação de nusinersena para AME tipo I será um valor compatível com a realidade e não um sofisma matemático, de modo a ser perfeitamente aceitável e ser incorporado no SUS. Além disso, o relatório deveria levantar o percentual de diagnosticados que viriam a demandar o tratamento pelo SUS, uma vez que maior parte dos diagnosticados serão de classe média esclarecida e fariam o tratamento em seus planos de saúde, diminuindo muito a estimativa do Impacto orçamentário para incorporação de nusinersena para AME tipo I no SUS. Referências BELTERA L., COOK S.F., CRAWFORD T.O., JARECKI J., JONES C.C., KISSELE J.T., SCHROTH M., and HOBBY K. An overview of the Cure SMA membership database: Highlights of key demographic and clinical characteristics of SMA members. Journal of Neuromuscular Diseases 5 (2018) 167–176 VERHAART I.E., ROBERTSON A., WILSON I.J., AARTSMA-RUS A., CAMERON S., JONES C.C., et al. Prevalence, incidence and carrier frequency of 5q-linked spinal muscular atrophy -a literature review. Orphanet J Rare Dis. 2017.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação permite parar a evolução da doença que é degenerativa e progressiva. O governo consegue por um custo bem menor. As crianças com AME tem o cognitivo preservado e são muito inteligentes, e merecem ter acesso a única medicação que lhes permite ganhar força.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, FIZ O TRATAMENTO COM O SOFOSBUVIR E DACLATASVIR MAIS RIBAVIRINA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SOFOSBUVIR, Positivo: EXAME NEGATIVADO HÁ DOIS ANOS, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: INTERFERON, RIBAVIRINA E BOCEPREVIR, Positivo: NENHUM, Negativo: ANEMIA, DORES MUSCULARES, CANSAÇO, NÁUSEAS, INSÔNIA, ARRITMIA CARDÍACA, DIABETES</p>
14/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tudo que for para melhorar a qualidade de vida das pessoas que passam por algum problema de saúde deve sim ser incluído para o tratamento deles.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha explicação foi: Considerando que o teste do remédio obteve o efeito de melhora em 50% dos pacientes de AME e estabilização da doença nos outros 50%, a eficácia deve ser tratada como sucesso já que a doença é progressiva e a expectativa de vida pode ser aumentada sensivelmente com o tratamento. 50% de esperança de melhora ou até mesmo de impedimento do avanço da doença deveria ser tratado como um tratamento 100% eficaz para quem tem atrofia muscular espinhal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SOF/VEL, Positivo: Raros efeitos colaterais, que, quando ocorrem, são toleráveis, Negativo: Eventualmente, diarreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Peg-IfnRBV, Positivo: Difícil dizer, esquema terapêutico ruim, Negativo: Muitos efeitos colaterais/ Baixa taxa de erradicação</p>
14/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir e daclatasvirVeruprevir, ritonavir, dasabuvir, ombistavir , Positivo: 1- boa eficácia 2- boa eficácia , Negativo: 1- resultados variam com genotipo 2- posologia pode diminuir aderência ao tratamento</p>
14/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Existem pessoas infectadas com varios genotipos da Hepatite C enexistindo no mercado medicamento similar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: HARVONI Sofosbuvir E declastavir, Positivo: Curou minha esposa em 84 dias, sem efeitos coaterais, Negativo: Não observado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Harvoni, Positivo: Cura total da enfermidade, Negativo: Não observado</p>
14/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, TEMOS UM CASO EU MUNICIPIO VISINHO, NECESSITA MUITO DESSE MEDICAMENTO, MUITO SOFRIMENTO PRO PACIENTE E FAMILIA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A eficácia do remédio deve ser tratada como sucesso, já que a doença é progressiva.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, pan genotipico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ambos, Positivo: pan genotipico, Negativo: não serve para resgate</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ambos, Positivo: pan genotipico, Negativo: -----</p>
14/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Diminuirá custos , pois pangenetipico Facilidade posologia Alta resposta</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Peg interferon, ribavirina, sofosbuvir, daclastavir , telaprevir , Positivo: Sofosbuvir e daclastavir com melhores respostas e poucos efeitos adversos , Negativo: Peg interferon e ribavirina com múltiplos efeitos adversos e resposta terapêutica reduzida</p>
14/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Drogas com capacidade de tratamento pangenomico de fácil aderência, alta eficácia (acima de 95%) e praticamente sem efeitos colaterais, e com uso de curto período em comparação com tratamentos anteriores.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Peg-interferon + ribavirina, Positivo: Poucos efeitos positivos. , Negativo: Ribavirina: anemia importante Peg-interferon: sintomas de mal estar, dores articulares Ambos com dificuldade de aderência por parte do paciente e restrição do perfil clínico que pode utilizar estas drogas. Tempo prolongado de tratamento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Investir na saúde das crianças e adolescentes vale a pena</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Oi mães, tenho um sobrinho de 12 anos, portador de uma doença degenerativa chamada AME. Uma doença cruel e sem cura e que progride com o passar do tempo.A cada dia a situação dele piora, mas foi descoberto nos EUA um medicamento que paralisa a doença ou melhora a situação do paciente.A questão é que só de paralisar já significa VIDA porque deixa de piorar.Diante desse fato, venho pedir a ajuda de vocês para contestar o parecer feito no sentido contrário à liberação do medicamento pelo SUS.Vou enviar o passo a passo e conto com a ajuda de vocês! &#9829;Entrem no site conitec.gov.br/consultas-publicas e contestem o estudo feito para liberar o remédio que trata a doença do Dudu (AME) pelo SUS.Depois de acessar o site clique em Experiência ou Opinião:Entre com as informações solicitadas e respondam os questionamentos. No item 6 marque "Discordo totalmente da recomendação preliminar" e no 7 comente o motivo de discordar.Minha explicação foi:"Considerando que o teste do remédio obteve o efeito de melhora em 50% dos pacientes de AME e estabilização da doença nos outros 50%, a eficácia deve ser tratada como sucesso já que a doença é progressiva e a expectativa de vida pode ser aumentada sensivelmente com o tratamento. 50% de esperança de melhora ou até mesmo de impedimento do avanço da doença deveria ser tratado como um tratamento 100% eficaz para quem tem atrofia muscular espinhal."</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Pacientes com hepatite C que falharam aos DAAs</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, daclastavir e simeprevir, Positivo: Poucos efeitos colaterais, alta índice de cura., Negativo: Simeprevir, não pode ser usado em coinfestado . Sofosbuvir e daclastavir: alguns casos de falha terapeutica, principalme te genótipo 3</p>
14/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Viekira Pak., Positivo: Tudo indica que me curei sem qualquer efeito colateral de uma doença que me levaria a morte., Negativo: Nenhum.</p>
14/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considerando que o teste do remédio obteve o efeito de melhora em 50% dos pacientes de AME e estabilização da doença nos outros 50%, a eficácia deve ser tratada como sucesso já que a doença é progressiva e a expectativa de vida pode ser aumentada sensivelmente com o tratamento. 50% de esperança de melhora ou até mesmo de impedimento do avanço da doença deveria ser tratado como um tratamento 100% eficaz para quem tem atrofia muscular espinhal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considerando que o teste do remédio obteve o efeito de melhora em 50% dos pacientes de AME e estabilização da doença nos outros 50%, a eficácia deve ser tratada como sucesso já que a doença é progressiva e a expectativa de vida pode ser aumentada sensivelmente com o tratamento. 50% de esperança de melhora ou até mesmo de impedimento do avanço da doença deveria ser tratado como um tratamento 100% eficaz para quem tem atrofia muscular espinhal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considerando que o teste do remédio obteve o efeito de melhora em 50% dos pacientes de AME e estabilização da doença nos outros 50%, a eficácia deve ser tratada como sucesso já que a doença é progressiva e a expectativa de vida pode ser aumentada sensivelmente com o tratamento. 50% de esperança de melhora ou até mesmo de impedimento do avanço da doença deveria ser tratado como um tratamento 100% eficaz para quem tem atrofia muscular espinhal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considerando que o teste do remédio obteve o efeito de melhora em 50% dos pacientes de AME e estabilização da doença nos outros 50%, a eficácia deve ser tratada como sucesso já que a doença é progressiva e a expectativa de vida pode ser aumentada sensivelmente com o tratamento. 50% de esperança de melhora ou até mesmo de impedimento do avanço da doença deveria ser tratado como um tratamento 100% eficaz para quem tem atrofia muscular espinhal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Favorável à adoção de novos medicamentos/combinção uma vez que causam menos efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sofosbuvir, Positivo: Sofosbuvir/simeprevir houve a cura da doença., Negativo: A combinação sofosbuvir/simeprevir causou efeitos colaterais que afetaram o sistema circulatório, a pele e o cabelo da paciente.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Interferon + ribavirina; sofosbuvir + simeprevir, Positivo: Tratamento com interferon/ribavirina não teve o efeito positivo esperado, pois a doença retornou após três meses. Com o uso do sofosbuvir/simeprevir houve a cura da hepatite C., Negativo: Interferon e a ribavirina não mataram a minha mãe por um milagre, porque a medicação afetou todo o organismo dela. A combinação sofosbuvir/simeprevir causou bem menos efeitos colaterais, mas afetou muito o sistema circulatório e causou muitos danos à pele e ao cabelo.</p>
14/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, fui cobaia para certificar o SOFOSBUVIR</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SOFOSBUVIR, Positivo: Ja fiz 2 tratamentos : o antigo com ribavirina e não consegui a cura.e o novo fiz como cobaia e consegui me curar. , Negativo: Com o antigo tratamento tive muitos efeitos colaterais.E com o tratamento novo, quase não tive efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ribavirina , interferon, telaprevir e mais algumas outras drogas., Positivo: COM OS NOVOS MEDICAMENTOS, FOI MUITO MAIS EFICAZ, COM BEM MENOS EFEITOS COLATERAL., Negativo: COM OS MEDICAMENTOS ANTIGOS RIBAVIRINA INTERFERON FOI BEM DIFICIL, COM MUITAS EFEITOS COLATERAIS</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon e ribavirina, Positivo: Indicado para cura da hepatite C., Negativo: Fraqueza, mal estar, baixa imunidade.</p>
14/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicação pangenotípica, com boa resposta em pacientes cirróticos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, Positivo: Facilidade de administração pela posologia, administração oral e poucos efeitos colaterais., Negativo: Sem efeitos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos do novo protocolo., Positivo: Resposta virológica acima de 85%, Negativo: Interferon preguiçoso: anemia, leucopenia, plaquetopenia, queda de cabelo, febre, rash, distúrbios psiquiátricos e tireoidianos. Ribavirina: anemia</p>
14/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considerando que o medicamento teve melhora de 50% na AME</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considerando que o medicamento melhorou 50% dos pacientes com Ame</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicamento pangenotipo que tomasse somente um comprimido dia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tive experiência com interferon e com sofosbuvir daclatavir e ribavirina, Positivo: Interferon não teve efeitos positivos, sofosbuvir e daclatavir são muito bons, fiquei curado e sem efeitos colaterais., Negativo: Interferon só teve efeitos negativos. Ribavirina tinha anemia.</p>
16/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Sou médica neurologista infantil do HCPA e do HCC de Porto Alegre. Gostaria de parabenizar a equipe que elaborou este parecer pelo belíssimo trabalho. Escrevo para contribuir com minha humilde opinião, que é a de quem tem pacientes com atrofia muscular espinhal e convive, mesmo que de forma indireta, com a tragédia que é esta doença em suas formas mais graves. Entendo que, até o momento, temos poucos estudos, que apenas cerca da metade dos pacientes com AME tipo 1 apresenta melhora com a medicação e que esta é caríssima. Porém, entendo também que, para alguns pacientes, a espera por novas evidências poderá ser a perda da única chance que possuem de melhora clínica e/ou aumento da sobrevida. Para esses pacientes a medicação poderá chegar tarde demais. Sugiro que nusinersena seja liberada, nesse momento, para os casos mais urgentes, em que há comprovação de eficácia nos estudos clínicos disponíveis, como: bebês com AME tipo 1 pré-sintomáticos; bebês com AME tipo 1 que não estejam em suporte ventilatório contínuo ou que tenham precisado deste suporte recentemente (até 2 anos de idade, por exemplo). - AME tipo 2: priorizar aqueles com doença não avançada, que provavelmente terão melhores resultados (até 5 anos, por exemplo); - AME tipo 3: apenas aqueles com piora recente indicando risco de perda da marcha (comprovada de forma objetiva através de escalas padronizadas de avaliação da força muscular); Os estudos mostram que os resultados com a nusinersena não são imediatos, que os benefícios podem ser evidentes somente após 6-12m. Sugiro que o tratamento seja suspenso naqueles em que não foi observado benefício após 1 ano de tratamento. Acredito que dessa forma são seremos irresponsáveis de deslocar recursos altíssimos do SUS para pacientes que não se beneficiarão com a terapia, mas também não seremos insensíveis a estes pacientes que depositam nesse tratamento a esperança de uma vida melhor. Muito obrigada pela atenção. Dra. Michele M. Becker CRM 27292</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir associado ao daclatasvir., Positivo: Com a associação descrita acima os pacientes que fizeram uso desde início de 2017, nenhum caso houve recidiva da hepatite viral tipo C., Negativo: O único ponto negativo é a demora de chegada dos medicamentos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferon peguilado e ribavirina, Positivo: Pouco negativaram., Negativo: Recidiva da doença.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sabendo que o teste com a medicação obteve efeito de melhora em 50% dos pacientes com AME e estagnação do desenvolvimento da doença em outras 50%, a eficácia deve ser tratada como SUCESSO já que é uma doença progressiva e caso a medicação seja ministrada, a expectativa de vida pode ser aumentada consideravelmente ; 50% de melhora ou estagnação da doença, deve ser considerado EFICAZ para quem tem Atrofia Muscular Espinhal ! Nós vivemos em um País onde vemos tantos absurdos no gasto com dinheiro público, são BILHÕES jogados no ralo como foi o caso da construção de estádios para a copa do Mundo em Estados que sequer existe time de futebol, sem contar os escândalos de corrupção como a operação LAVA JATO ... Então porque não investir na saúde de nossas crianças e adolescentes?? Portanto, é com indignação que grande parte da sociedade recebe os cortes de gastos no setor de saúde, onde quem mais precisava era beneficiado... dêem à essas crianças uma chance, talvez para o profissional que deu o parecer negativo, seja apenas mais um trabalho mas, por favor, fiquem ao menos UM DIA junto de algumas crianças portadoras de AME e vejam o bem que vocês podem fazer recomendando a medicação como FAVORÁVEL ... é necessário mudar a decisão, voltar atrás para beneficiar, de fato, quem precisa; o parecer deve ser favorável a continuar fornecendo o Medicamento, pois assim, estaremos de fato cumprindo o que determina a CR/88: Acesso a saúde a Todos e de forma solidária, sendo direito de todos e dever do Estado, observando o princípio da dignidade da pessoa humana. É por isto que se pede alteração no parecer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os estudos mostram a eficácia surpreendente dessa combinação, assim eh realmente importante a incorporacao desse tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ribavarina e Interferon Perguilato, Positivo: Sem efeitos positivos apenas efeitos negativos, Negativo: Quase uma quimioterapia, causando grave anemia, enjoos e ausencia de apetite, prostacao absoluta</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acompanho uma criança com ame vejo a dificuldade que eles passam com ela e o auto preço da medicação eles não têm condições de comprar e essa medicação faria toda diferença na vida dela e de tantas outras crianças pois todos temos direito a vida por isso peço que vocês incorporem o spinraza no sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Cura de 99% de genotipso 1 a 6 da Hepatite C. comprovado em testes clinicos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: BOCEPREVIR. INTERFERON. RIBAVARINA, Positivo: CURA DA HEPATITE C APOS 12 MESES TRATAMENTO.. CARGA VIRAL NEGATIVADA APOS 4 ANOS FINAL TRATAMENTO., Negativo: MIALGIA, ANEMIA, LEUCOPENIA, PLAQUETOPENIA.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque eu tenho um sobrinho que se chama Levi Alves Braga, e ja esta na 5° dose, e desde então tem tido ganhos favoráveis como: a sustentação do tronco, movimentação dos braços e pernas, e fala, seus dentes ja estão nascendo e a cada dia tem evoluído de forma graciosa, a medicação tem sido um avanço para sua evolução.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Spiranza, Positivo: Lévi tem dito muitos ganhos em seus movimentos, cada dia é um novo ganho, seu troco, seus braços e pernas tem ganho força a cada dia e a cada dose., Negativo: Spiranza não teve efeitos negativos, somente positivos até o momento.</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, a incorporação sofosbuvir / velpatasvir no PCDT vai de encontro a terapia bem sucedida oferecida no mundo todo, conforme demonstram guidelines da EASL (Associação Europeia Estudos do Fígado), AASLD (Associação Americana estudos do Fígado), ALEH (Associação Latino americana para Estudos do Fígado) , com excelentes taxas de RVS , uso de tecnologia de ponta com facilidade posológica, tempo tratamento menor e conseqüente melhor aderência do paciente. Esses fatores combinados conseguem melhorar a fibrose hepática e reduzir significativamente o número de complicações da doença como cirrose hepática, hepatocarcinoma, além de redução do número de pacientes com necessidade de transplante hepático. Isso faz com que custo/ benefício a médio e longo prazo seja bem significativo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sofosbuvir/ velpatasvir/voxilaprevir, Positivo: exelente taxa de RVS em pacientes já experimentados com DAA`s e não respondedores terapia inicial, Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DAA`s interferon peguilado, Positivo: DAA`s tempo tratamento, posologia fácil, menos efeitos adversos, cura 95% dos pacientes interferon : ação antifibrotica, Negativo: DAA"s : simeprevir com taxa de não resposta em torno 5%</p>
14/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Por constar do texto da própria Conitec oito estudos e ensaios clínicos, que listamos a seguir, os quais mostram sem sombra de dúvidas a eficácia surpreendente da combinação SOFOSBUVIR / VELPATASVIR (nome comercial Epclusa®) na possibilidade de cura em tratamentos de somente 12 semanas e uma única pílula ao dia, praticamente sem efeitos colaterais</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: interferon , Positivo: nenhum, Negativo: Efeitos colaterais violehtos</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, daclatasvir, simeprevir e 3 D. , Positivo: Como todos os DAAS, resultados fantásticos no tratamento do HCV. Precisamos ampliar essa tecnologia desse protocolo. Uma alternativa espetacular para os pacientes. Precisamos de um " olhar constante" para esse nosso protocolo. Visto que nesse momento estamos sem estoque de remédios anteriormente fornecidos. Por favor , tratamento exemplar precisamos manter, Negativo: O único efeito de dificuldade seria a quantidade do 3D, com o eplclusa facilitará a adesão ao tratamento.</p>
14/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Me curei da hepatite c com sofosbuvir e semprevir e gostaria que todas as pessoas pudessem ter essa graça já que a porcentagem de cura e de 99%</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir, Positivo: Me curei, Negativo: nao tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Semiprevir, Positivo: meu curei, Negativo: nao tive</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, NA MINHA OPINIÃO A MEDICAÇÃO DEVE SER FORNECIDA PELO SUS PARA TODOS OS PACIENTES PORTADORES DE AME TIPO 1.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: NUSINERSEN SPINRAZA. TENHO UM PACIENTE AME TIPO 1 QUE TEM 6 ANOS, SEM TRAQUEO, FALA BEM. JÁ TOMOU 7 DOSES DE NUSINERSENA E RESPONDEU MUITO BEM AO TRATAMENTO., Positivo: MELHORA NA QUALIDADE VOCAL, MELHORA NA PRONÚNCIA DE PALAVRAS, ARTICULAÇÃO MAIS PRECISA, MELHORA DO TONUS DOS ORGAOS FONOAORTICULATÓRIOS, MOBILIDADE E AMPLITUDE. MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E INTERRUPÇÃO DA PROGRESSÃO DA DOENÇA., Negativo: NENHUM.</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Daclastavir e Sofosbuvir, Positivo: Finalmente consegui a cura com essa medicacao., Negativo: Pouco efeitos colaterais, ja tinha passado por dois tratamentos de interferons com efeitos colaterias terriveis, essas novas drogas sao milagorasas! Sao muitos eficientes no Tratamento.</p>
17/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para melhoria de vida de Eduarda Córdova Rech</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 21988196191</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon ribavirina telaprevir, Positivo: Nenhum, Negativo: Sofrimento fisico e psicológico 24hs por dia durante um ano</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esquema fácil para explicar ao paciente, melhorando a aderência. Além disso, por ser pangentotipico e para todos os graus de fibrose, diminui a necessidade de realização de vários exames e o número de consultas para o paciente antes de conseguir ter acesso à medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pego interferon+ribaviroba, telaprevir, boceprevir, sofosbuvir, daclatasvir, simeprevir, viekira, Positivo: Pego interferon+ribaviriba, telaprevir, boceprevir, sofosbuvir, daclatasvir, simeprevir, viekira; medicações livres de efeitos colaterais e com ótima taxa de cura, Negativo: Sofosbuvir, daclatasvir e simeprevir, viekira: precisa saber fenótipo, fibrose para fazer a melhor escolha para cada paciente. Viekira: necessidade de varias tomadas ao dia. Com todas essas medicações necessita-se avaliar indicação em ribavirina para cirroticos, que muitas vezes não toleram essa medicação.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, EFICÁCIA E CONFORTO PARA O PACIENTE EM PRIMEIRO LUGAR.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: NA PRIMEIRA EXPERIÊNCIA TRATAMENTO DE 6 MESES COM INTERFERON E RIBAVIRINA - RESULTADO : RECIDIVANTE.NA SEGUNDA EXPERIENCIA TRATAMENTO DE 3 MESES COM SOFOSBUVIR E INTERFERON . RESULTADO : NEGATIVADO, Positivo: NO SEGUNDO TRATAMENTO OS EFEITOS COLATERAIS FORAM SENSIVELMENTE AMENIZADOS E TOTALMENTE ABSORVIDOS , ALÉM DE UMA DURAÇÃO BASTANTE RELEVANTE. PORÉM AS APLICAÇÕES SEMANAIS DE INTEFERON ERAM POUCO CONFORTÁVEIS., Negativo: INTERFERON E RIBAVIRINA : FADIGA , CANSAÇO, INANIÇÃO, PERDA DE PESO E ENJOO.</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acredito que os pacientes devem se beneficiar com está nova medicação. Pois como mostram os estudos ela é bastante eficaz no tratamento do vírus. Tem poucos efeitos colaterais ao paciente, o tempo de tratamento é curto e a dose de tomada diária é baixa tudo isso facilita a adesão do usuário.Se a idéia é erradicar a hepatite precisamos de medicações que facilitem a vida do usuário. Avaliar custo/benefício, estudos realizados com as medicações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Atuo com pacientes portadores de hepatites desde 2009, portanto já vi os sofrimentos do interferon/peguinterferon, boceprevir/telaprevir e a alegria da cura com os novos DAAS 9Sofosbuvir/Daclatasvir/Simeprevir/Combo da Abvie., Positivo: Os novos DAAS só trouxeram beneficios aos usuários, reduziu-se o tempo de uso da medicação, a quantidade de comprimidos tomados e a redução significativa dos esfeitos colaterais, além da alta taxa de RVS., Negativo: Na era Interferon até is inibidores de protease os efeitos colaterais eram muitos, tinha fatores que não permitiam que o paciente tratasse a hepatite. Além de uma taxa de RVS muito baixa.</p>
18/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A associação sofosbuvir + velpatasvir é altamente eficaz no tto da hepatite C, tem posologia simples e tempo de tratamento de poucas semanas , o que aumenta a aderência dos pacientes. Outra grande vantagem, o fato de ser indicado para todos os genótipos e para todos os graus de fibrose.Essa combinação deveria ser padronizada no SUS, deveriam entregar nos postos de saúde.Também acho que um estudo sério de custo-eficácia deveria ser feito para mostrar claramente que é melhor tratar com algo que funcione e seja simples de usar do que ficar usando terapias de difícil aderência e resultado marginal, por que custa 5-10% menos que o preço da alternativa de 1a linha, sem contar que o poder de persuasão do governo para reduzir preços é enorme. Por fim, devemos buscar sempre o melhor para as pessoas, sem conflitos de interesse de qualquer natureza.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ribavirina + interferon peguilado., Positivo: Resposta virológica sustentada presente em médio em 50% dos pacientes., Negativo: Muitos efeitos colaterais graves e debilitantes (anemia, infecções etc).</p>
18/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir e velpatasvir, Positivo: Fácil de usar, não precisa de genotipagem e tem minimos efeitos adversos e interações medicamentosas., Negativo: Interação com Efavirenz</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: 3D, Positivo: Bons resultados, Negativo: Muitas interações medicamentosas</p>
18/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicação de alta eficácia,ótima adesão ao tratamento(único comprimido ao dia),mínimos efeitos adversos,pangenotipico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, Positivo: Medicação de alta eficácia,ótima adesão ao tratamento(único comprimido ao dia),mínimos efeitos adversos,pangenotipico., Negativo: nao identifiquei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: daclastavir,interferon,ribavirina, Positivo: Medicação de alta eficácia,ótima adesão ao tratamento(único comprimido ao dia),mínimos efeitos adversos: Daclastavir, Negativo: interferon e ribavirina: muitos efeitos adversos e longo tratamento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, Positivo: Cura acima de 90 %, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferon peguilado, Positivo: Unica opção para cura do pcte, Negativo: Efeitos colaterais e tempo de tto longo (1 ano de tto)
18/09/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/09/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SOFOSBUVIR, Positivo: ALTA TX DE CURA, Negativo: NENHUM 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INTERFERON, Positivo: CURA 50% DOS PACTES, Negativo: MUITOS EFEITOS COLATERAIS E TEMPO LONGO DE TTO
18/09/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SOFOSBUVIR, Positivo: CURA DE QUASE 100% DOS PACIENTES, Negativo: NENHUM 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INTERFERON, Positivo: UNICA OPÇÃO, Negativo: RESSECAMENTO DE PELE, CONFUSÃO MENTAL, AGITAÇÃO
18/09/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Necessário para erradicação dessa doença no Brasil 2ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir, Positivo: Terminei o uso agora em setembro do sofosbuvir associado ao declastavir.. Ainda sem avaliação de resultado, Negativo: Pequena indisposição e enjôo suportáveis 3ª - Sim, como paciente, Qual: Declastavir, Positivo: Ainda sem resultado por ter terminado esse mês, Negativo: Enjôo e indisposição
18/09/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ribavirina e Interferon Peglado, Positivo: Controlou a taxa do vírus por alguns anos, Negativo: Perdi 18 quilos durante os 8 meses de tratamento, perdi os cabelos, entrei em depressão profunda!
16/09/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/09/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Já fiz processo ,ganhei mais não recebi o medicamento ainda. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A cura abrangendo a todos os genotipos 1a 6 e as recindivas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Só com daclatavir e sofosbuvir, Positivo: Menos efeitos colaterais que o interferon, Negativo: Não e o mais indicado para genotipo 3</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Daclatavir e sofosbuvir Três meses de tratamento., Positivo: Menos efeitos colaterais que o tratamento usado anteriormente., Negativo: Como sou genotipo 3 este não era o tratamento mais indicado ou deveria ser tomado por seis meses mas não se consegue .só via judicial por isso pode-se ter recindiva.</p>
17/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Ampliação da possibilidade de cura para todos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir daclastavir, Positivo: Nao tive efeitos colaterais e fiquei curado, Negativo: Nao tive efeito negativo. Mas o tratamento era apenas pra cirrose tipo 3</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A incorporação desse esquema de tratamento é uma excelente ferramenta para o programa de eliminação por ser pangênótico e panfibrótico permitindo tratar todos os perfis de pacientes de forma simples, eficaz e segura, recomendada pelas principais diretrizes internacionais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferon / Peguilado / Boceprevir / Telaprevir / Sofosbuvir / Simeprevir / Daclatasvir / 3D, Positivo: Interferon / Peguilado - não desenvolvia resistência Boceprevir / Telaprevir - na época se obtinha melhores taxas de cura Sofosbuvir / Simeprevir / Daclatasvir - Novas gerações de DAAS com menor efeito adverso e altas taxas de cura nunca visto em terapias anteriores. 3D - uma indicação mais segura para disfunção renal na época. , Negativo: 3D - falha terapêutica com resistência de difícil resgate. Necessidade de associação com ribavirina o que aumentava efeitos adversos em alguns cenários. Perfil de interação medicamento ruim. Simeprevir - falha em cirrótico child A e necessidade de associação com ribavirina o que aumentava efeitos adversos. Daclatasvir - falha com tempo de terapia curto. E sem terapia de resgate aprovada no Brasil até o momento.</p>
17/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, Positivo: Cura dos pacientes , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbovir. Daclatasvir. Simeprevir, Positivo: São eficazes quando bem indicados, Negativo: Não são pangentipicos e com interações medicamentosas</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É de suma importância a inclusão de um medicamento pangentipico , simples, de fácil tolerância e posologia alem de alta eficacia para tratar/curar pacientes e erradicar o vírus.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, Positivo: Aumento na taxa de cura, boa tolerabilidade, baixo índice de eventos adversos, Negativo: Uma farmacodermia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: InterferonribavirinaBoceprevirTelaprevirDaclatasvirSimeprevirSofosbuvir, Positivo: Interferon e ribavirina - cura, ainda q baixa taxa Interferon e ribavirina e Telaprevir/Boceprevir - discreto aumento na taxa de curaDaclatasvir, Sofosbuvir e Simeprevir - alta eficácia com gde aumento na taxa de cura e posologia fácil com poucos eventos adversos , Negativo: Interferon e ribavirina - muitos efeitos adversos e baixa taxa de curaInterferon e ribavirina com Tela/Boceprevir - mantendo muitos eventos adversos, acentuando anemia e rash cutâneo e muitos comprimidos Daclatasvir, Sofusbuvir e Simeprevir - genotipo-dependente e tempo de tratamento prolongado</p>
18/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir, Ribavirina e Daclatasvir , Positivo: Já havia feito 2 tratamentos utilizando o interferon e não havia negativado. Graças ao remédio fui curada, Negativo: Não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ribavirina e Interferon, Positivo: Controle da Carga viral, Negativo: Passava muito mal, fresse, enjoos, anemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ribavirina e Interferon, Positivo: Consegui ficar indetectável, mas com muitos efeitos colaterais durante o tratamento, Negativo: Muitos efeitos colaterais: mialgias, muitas dores, perda de peso, alterações na visão, problemas emocionais, dentre outros</p>
24/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Fui tratado a 10 anos atrás com interferon, mas a doença voltou fortemente no ano passado a ponto de ser necessário transplante hepático. Fiz novo tratamento com as drogas disponíveis e apesar de o vírus ter zerado, estou ainda no período de quarentena aguardando uma resposta positiva nos novos exames. Qualquer nova droga mais eficaz é uma nova esperança para os portadores da doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir, Positivo: O vírus foi zerado no primeiro exame, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon e ribavirina, Positivo: Em um primeiro tratamento o vírus diminuiu a um ponto de não ser detectado, mas após um período voltou, Negativo: Dor de cabeça, enjôos e não podia engravidar minha esposa devido a possibilidade de má formação do feto pelo uso da ribavirina</p>
18/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Daclatasvir , ribavirina, interferon, 3D , Positivo: Daclatasvir e 3D mostraram maior praticidade para o uso pelos pacientes, melhor resposta na erradicação do hcv comparado com terapia anteriormente disponível e menos efeitos colaterais. , Negativo: Ribavirina e interferon podem causar anemia e plaquetopenia severas, Causando muitas vezes a desistência do paciente ou necessidade de suspender o tratamento devido aos riscos à saúde. Daclatasvir , utilizado com sofosbuvir, associado a efeitos colaterais como astenia, irritabilidade. Dificuldade para tratamento de paciente com insuficiência renal. Casos de falha do tratamento em pacientes genotipo 3. O 3D só tem aplicabilidade para genotipo 1. Casos de descompensação de paciente cirrótico child A e icterícia.</p>
21/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, daclatasvir, 3D, simeprevir, Positivo: Sofosbuvir, daclatasvir e simeprevir: Segurança, tolerabilidade, boa aceitação, facilidade no manejo, baixo efeito colateral, poucos comprimidos diários, tempo de tratamento, Negativo: Ausência de co formulação</p>
22/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esta medicação é imprescindível para os pacientes com Hepatite C, o que obviamente implica que todos os pacientes tenham acesso gratuito e fácil, com a maior brevidade.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir, Positivo: A cura rápida e sem sequelas , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Daclatasvir, Positivo: A cura rápida (3 meses) e sem sequelas, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, ESTUDOS INTERNACIONAIS DOCUMENTAM CLARAMENTE A ALTA EFICÁCIA DA MEDICAÇÃO. ALÉM DISSO, GENERICO DE LABORATORIOS OUTROS SERÁ UMA PERDA PARA OS PACIENTES.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SOFOSBUVIR, DACLATASVIR, INTERFERON PEGUILADO, RIBAVIRINA, Positivo: SOFOSBUVIR E DACLATASVIR TEM ALTAS TAXAS DE RVS, ALEM DE EF COLATERAIS MINIMOS.INTERFERON PEGUILADO- PRIMEIRA TENTATIVA DE TTO DA VHC, Negativo: SOFOSBUVIR E DACLATASVIR- SEM EFEITOS NEGATIVOSINTERFERON - TRATAMENTO COM DIVERSOS EFEITOS COLATERAIS, LONGO E BAIXA RESPOSTA</p>
20/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Devido facilidade posológica e tratamento amplo e simplificado</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sovaldi, Positivo: Boa resposta terapêutica, sem efeitos colaterais, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pegasys, Victrelis, , Positivo: Única opção disponível, Negativo: Efeitos colaterais</p>
24/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Portadora da Hepatite C.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ribavirina, , Positivo: Alcancei a cura do vírus, porém à custa de muito sofrimento., Negativo: Baixa resistência do organismo, depressão acentuada, queda de cabelo, feridas nos órgãos genitais e na boca.</p>
20/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todo o esforço para erradicação da Hepatite C é pouco frente aos danos que ela causa ao paciente e aos gastos que leva ao Estado frente as complicações dos casos não tratados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ribavirina, alfa interferon e interferon peguilado, Positivo: Não houve efeito positivo nenhum tendo em vista que não consegui a negatificação do virus., Negativo: O principal é a não negatificação do virus, tendo em vista que fiz os tratamentos exatamente conforme preconizado, não faço uso de bebida alcóolica, não sou usuaria de drogas e eles nao funcionaram.</p>
24/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, FACILIA A ADESÃO AO TRATAMENTO DOS PACIENTES</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INTERFERON PEGUILADO, RIBAVIRINA, TELAPREVIR, BOCEPREVIR, SOFOSBUVIR, DACLATASVIR, SIMEPREVIR, 3D., Positivo: DAAS: MENOS EFEITOS COLATERAIS E TEMPO DE TRATAMENTO., Negativo: INTERFERON PEGUILADO, RIBAVIRINA E IPS: EFEITOS COLATERAIS MODERADOS A GRAVES, DIFICIL MANEJO DOS PACIENTES CIRROTICOS, LONGA DURAÇÃO DO TEMPO DE TRATAMENTO.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esta associação de acordo com os estudos Astral 1,2 e 3 , confere taxas de 98% de cura com 12 semanas em pacientes portadores de VHC com GT1-6 ;95% de cura em pacientes coinfectados (VIH/VHC) segundo o estudo Astral 5;94% de cura em pacientes com cirrose descompensada segundo o estudo Astral 4;97% de cura comprovada segundo dados de vida real</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SOFOSBUVIR, Positivo: Resposta Virologica Sustentada Comodidade Posologica Adesão ao Tratamento Redução do Tempo de Tratamento, Negativo: Cefaleia, Fadiga, , Prurido e Redução do Apetite</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: 1)INTERFERON CONVENCIONAL2)INTERFERON PEGUILADO3) RIBAVIRINA4) TELAPREVIR5) BOCEPREVIR6) SOFOSBUVIR7) DACLATAVIR8)) SIMEPREVIR, Positivo: INTERFERON CONVENCIONAL/ PEGUILADO - 20% a 40% de RVS, ajuste posologico de acordo com o peso do paciente RIBAVIRINA-redução da dose com o advento dos DAAs e, conseqüentemente melhora das taxas de anemia TELAPREVIR E BOCEPREVIR: aumento das taxas de RVS para 70% Demais DAAs SOFO/SIME/DACLA)- elevada taxa de RVS e Redução do Tempo de Tratamento, Negativo: IFN CONVENCIONAL/ PEGUILADO - descontinuidade pelo surgimento de hematomas no local da aplicação, tempo prolongado de tratamento, depressão, fraqueza, ansiedade, falta de concentração, insônia, irritabilidade, risco de suicídio RIBAVIRINA-hemólise importante em pacientes cirróticos. perda de apetite, insônia, depressão, queda de cabelos, irritabilidade TELAPREVIR-desconforto anal , prurido importante, fotossensibilizad e BOCEPREVIR- dificuldade de adesão pelo tempo prolongado de tratamento Demais DAAs (SOFO/SIME/DACLA)- cefaleia leve e alguns casos de resistência viral mediante o tipo de genótipo do indivíduo, impossibilidade de uso por interação medicamentosa,</p>
24/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sofosbuvir 400mg e Velpatasvir 100mg, Positivo: Não teve efeito colateral, com resultado rápido. , Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Não</p>
24/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir 400mg e Velpatasvir 100mg, Positivo: Resultado rápido sem efeitos colaterais. Muito eficaz!, Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Prezados Senhores, A OMS apresentou uma visão de um mundo sem hepatite C até 2030. Para tanto é necessário ampliar as taxas de diagnóstico, reforçar o vínculo do usuário com o sistema de saúde e empregar um tratamento seguro, eficaz e indicado para a grande maioria dos pacientes. Além do grande número de indivíduos já diagnosticados no Brasil, estima-se que ainda 500.000 pessoas ainda não foram identificadas. Devido a esta magnitude, é importante entender que a tarefa de identificar e tratar essa população não poderá ficar restrita aos centros terciários e especialistas. Nesse sentido gostaríamos de congratular a Conitec pela recomendação inicial unânime da incorporação do SOF/VEL no Sistema Único de Saúde no Brasil. Essa combinação comprovou em diversos estudos de vida real as mesmas altas taxas de cura da hepatite C apresentadas nos estudos de registro e está recomendada nas principais diretrizes de tratamento internacionais. Esse esquema reúne uma série de características de um esquema ideal: 1) Regime de um único comprimido diário; 2) Duração fixa de 12 semanas; 3) Mesmo esquema independente de genotipagem ou grau de fibrose. Outro ponto importante é a utilização de Ribavirina, que somente é necessária em pacientes com cirrose descompensada que, de toda forma, seguiriam necessitando encaminhamento para os centros terciários. Essas características são importantes pois ajudam a minimizar as chances de erro prescritivo, auxiliam na melhor adesão do paciente, abrem a oportunidade para que novos tratadores, incluindo não especialistas, o que poderá contribuir no esforço de cumprir a meta da OMS de eliminação do HCV. Por fim, essa decisão preliminar da Conitec, embasada de forma técnica e isenta, promovendo a recomendação desta nova e custo-efetiva tecnologia ao Sistema Único de Saúde, aproxima o Brasil de sua intenção de eliminar a Hepatite C, em linha com o plano definido pela OMS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SOFOSBUVIR E VELPATASVIR, Positivo: CURA DA HEPATITE C, Negativo: NÃO HOUVE</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Daclatasvir, Simeprevir, Sofosbuvir/Velpatasvir, 3D, Positivo: Cura da doença, Negativo: Interações medicamentosas. Escolha do esquema é diferente para cada paciente, dependendo do genótipo e grau de fibrose hepática.</p>
23/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sofosbuvir, Positivo: pouco efeito adversos, Negativo: sem efeito</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, Positivo: bom medicamento, Negativo: nada a declarar</p>
19/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, a associação do sofosbuvir com velpatasvir de acordo com as experiências demonstrou alta efetividade de negatificação do vírus com nada de efeitos colaterais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: com o interferon + ribavirina em 2005 sem resposta de cura após o tratamento, e agora em 2018 foi negativado com o medicamento Viekira Pack, conhecido como 3D tratamento de 12 semanas., Positivo: com o interferon + ribavirina nenhum efeito positivo; já com a nova medicação citada acima o efeito positivo foi a negatificação do vírus. , Negativo: com a nova medicação quase sem nenhum efeito colateral, apenas um pouco de ansia e cansaço. Já com o intérferon + ribavirina teve muitos efeitos colaterais como febre alta, muita dor no corpo, síndrome de pânico e depressão, alteração no hemograma entre outros.</p>
17/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esse medicamento poderá salvar muitas vidas. Isso deve estar em primeiro lugar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: sofosbuvir e daclatasvir, Positivo: Curou a doença, Negativo: Raros: dores de cabeça e falta de apetite.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Se existe a grande possibilidade de cura os medicamentos dever ser incorporados e distribuídos aos portadores, chega de sofrimento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Simeprevir e Sofosbuvir, Positivo: Não tive efeitos colaterais nenhum, após 3 meses de tratamento obtive a cura, desde 45 dias do início do tratamento, mante-se a cura !Estou curada há quase 2 anos, Negativo: Nenhum</p>
18/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É muito importante que tenhamos tratamento pangênotípico para hepatite C para facilitar o acompanhamento de pacientes e obter cura na grande maioria dos casos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Daclatasvir, simeprevir, boceprevir, telaprevir, interferon, ribavirina, Positivo: Alguns já saíram de linha. Efeitos positivos é a obtenção da resposta virológica sustentada. , Negativo: Efeitos negativos do simeprevir não pode ser usado em cirróticos descompensados, assim como o interferon. A ribavirina tem que ser usada em baixas doses nesses pacientes, visto que, pode levar a um quadro de anemia. Um efeito negativo é que quase alguns são exclusivamente para determinados genótipos do HCV.</p>
18/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, De acordo com uma amiga que enfrentou a doença, é um medicamento importante para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tratamento com elevada eficácia terapêutica, chegando a índices de 100% de cura, de simples administração, pangênotípico. Um chance de erradicação do vírus C da hepatite.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir/ daclatasvir, sofosbuvir e simeprevir, boceprevir ou telaprevir com peginterferon e ribavirina, além dos tratamentos iniciais com interferon alfa e ribavirina, Positivo: O tratamento da hepatite C com os antivirais peginterferon e ribavirina foi, na época, um grande avanço, pois exibiam melhores índices de cura que a ribavirina com interferon, que foram os pioneiros, em torno de 40% a 60% dos casos, dependendo de vários fatores, como estágio da doença, sexo, genótipo, peso, porém, na época era única chance. Com o advento dos inibidores de proteases uma melhora da RVS, p 70% a 80%, mas com uma dificuldade p Administração p grande número de medicamentos, eventos adversos, interações medicamentosas, Negativo: Os tratamentos com interferon e ribavirina, peginterferon e ribavirina e os inibidores de proteases com peginterferon e ribavirina promoviam muito eventos adversos, levando os pacientes a internações, hemotransfusões, associações com outras drogas, como: filgrastina e eritropoetina, além das interações medicamentosa, o longo período de uso, queda de cabelo, fadiga, perda de peso.</p>
19/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Um tratamento com 1 pilula diaria em 12 semanas com efeitos colaterais quase nulos , seria importantíssimo para os portadores de hepatite c , bem como aumentaria a adesão ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DA HEPATITE C; DROGA PANGENOTÍPICA, DROGA ÚNICA, NÃO NECESSITA DE ASSOCIAÇÃO COM OUTRAS DROGAS, EXCELENTE RESULTADOS, POUQUÍSSIMOS EFEITOS ADVERSOS, INDICADO PARA TODOS OS GRAUS DE FIBROSE, INCLUSIVE CIRRÓTICOS DESCOMPENSADOS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PEG INTERFERON; RIBAVIRINA, BOCEPREVIR, TELAPREVIR, SOFOSBUVIR, SIMEPREVIR, DACLATASVIR, 3 D., Positivo: SOFOSBUVIR, DACLATASVIR, SIMEPREVIR, RIBAVIRINA, 3D, BONS RESULTADOS, POUCOS PARAEFEITOS, Negativo: NECESSIDADE DE COMBINAÇÃO DE DROGAS, LONGO TEMPO DE TRATAMENTO, RESULTADOS SUB ÓTIMOS</p>
19/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: interferon peguilado e IP de primeira geração, Positivo: era terapia indicada à época, Negativo: Interação medicamentosa, disfunção renal, tempo de tratamento, índice de RVS</p>
19/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou favorável ao uso do sofosbuvir associado ao ledispavir conforme Relatório 363 - Ledipasvir associado a sofosbuvir para o tratamento de pacientes adultos com hepatite C crônica infectados por vírus de genótipo e por ter menor tempo de tratamento para os pacientes com apenas 1 comprimido ao dia e com baixa reação e resolução rápida para a cura.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir, Positivo: Cura sem efeitos colaterais., Negativo: Não existem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon e ribavirina, Positivo: Inexistentes, Negativo: Ineficácia e efeitos colaterais terríveis.</p>
19/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus deve conter esse medicamento por que tem crianças portadoras da AME, uma vida pela frente...Temos q fazer a diferença ajudando esses anjinhos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sofosbuvir e daclatasvir, Positivo: houve resposta ao tratamento, Negativo: resposta abaixo do ideal em alguns casos como cirrose e genótipo 3</p>
20/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SOFOSBUVIR, Positivo: Sofosbuvir - Medicamento de alta taxa de cura, sendo que possui poucos efeitos colaterais; , Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sOFOSBUVIR, Positivo: Pouco efeito colateral; alta taxa de cura; , Negativo: Nada a declarar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Direito a vida todos tem, independentemente do custo. Se o medicamento já teve vários casos comprovando sua eficiência é obrigação do governo libera o mais rápido possível. Varias crianças estão sofrendo por falta desse medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Irá curar com mais propriedade/qualidade/ e porcentagem a Hepatite C de pacientes compensados/ descompensada/ HIV, etc.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sofosbuvir e Simeprevir, Positivo: Cura da Hepatite C, tratamento tranquilo e rápido., Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sofosbuvir e Simeprevir por 12 semanas, minha mãe era F4, Positivo: Cura da Hepatite C, tratamento rápido e tranquilo., Negativo: Não houve.</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todos sempre temos que ser a favor da vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu concordo com a recomendação da CONITEC</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento é fundamental na vida de quem precisa e o Spiranza é mais um. muito útil para vida de quem precisa. Vários casos já foram comprovados a eficiência desse medicamento, portanto libere sim esse medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para que uma família possa viver em paz a saúde é fundamental. Essas mães que tem seus filhos doente de AME sofrem muito com a situação dos filhos. Se existe um medicamento que possa da uma qualidade de vida para essas crianças então tem que ser liberado sim. Não importa o custo. Libera sim o SPIRANZA pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo, pois corro risco de morte por não ter essa medicação disponível no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir, Positivo: Nenhum efeito colateral, fácil administração da medição., Negativo: Tive recidiva. Somente o sofosbuvir e simeprevir não foram capazes de negativar a doença devido meu genótipo. Preciso urgentemente da combinação de sofosbuvir e velpastavir. Sou transplantada há 1 ano e corro risco de perder o enxerto devido a progressão rápida da hepatite C.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon e ribavirina., Positivo: Nenhum , Negativo: Vários efeitos colaterais, tratamento longo e doloroso , e ineficaz. Não fui curada.</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É necessário iniciar a distribuição URGENTE do medicamento, o diagnostico precoce, aumentou onumero de infectados e está trazendo pânico para os pacientes!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: harvoni, Positivo: sem efeitos colaterais segundo meus pacientes, Negativo: ansiedade panico medo do futuro com a demora dos medicamentos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: harvoni, Positivo: tratamento sem efeitos colaterais, Negativo: nenhum</p>
17/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Vai ser muito melhor para os pacientes e para o próprio governo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, Positivo: Mínimos ou ausentes efeitos adversos, fácil administração. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Daclatasvir/Interferon peguilado/Ribavirina , Positivo: Daclatasvir - fácil administração e mínimos efeitos adversos. , Negativo: Interferon peguilado : efeitos adversos como depressão, infecções e ruim administração. Ribavirina: anemia sintomática, dispepsia e muitos comprimidos para serem administrados.</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Saúde é um direito de todos, o governo tem a obrigação de pagar, pois se pagamos os impostos é pelo direito a saúde, educação. Existem países que pagam esse medicamento, então já está mais do que comprovado a eficácia desse medicamento. Spiranza no SUS sim.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Viekira Pak, Positivo: Em apenas 12 semanas de tratamento negativei o vírus com quase zero efeitos colaterais, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É fundamental termos mais opções de tratamento. Meu marido tratou-se com SOF/DACLA, porém teve recidiva viral e resistência ao Daclatasvir. Para retratar tivemos que importar o Eplusa por não ter esta opção pelo nosso sistema de saúde. A inclusão de SOF/VEL vai oferecer mais possibilidades de cura a um custo menor para o governo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todos, Positivo: Ainda em tratamento, aguardando o resultado. Facilidade por ser comprimido único. Positivo por ser uma opção ao Daclatasvir ao qual meu marido adquiriu resistência., Negativo: Problema da aquisição do medicamento (importação, burocracia, custo). Sem aspectos negativos com relação ao medicamento ou efeitos colaterais significativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: 1º tratamento: interferon / ribaviina 2º tratamento interferon peguilado / ribavirina 3º tratamento: sofosbuvir / daclatasvir/ ribavirina: 12 semanas 4º tratamento: sofosbuvir / daclatasvir/ ribavirina: 24 semanas 5º tratamento: sofosbuvir/ velpatasvir / simeprevir/ ribavirina (em andamento), Positivo: A parte positiva de todos os medicamentos DAA foi a ausência de efeitos colaterais significativos e que conseguiram negativar o vírus durante o tratamento. O problema é que não se manteve. , Negativo: Daclatasvir: ocasionou resistência. Simeprevir: interação medicamentosa com o imunossupressor Tacrolimos. Altera os níveis e é necessário acompanhamento e ajustes. Mas não inviabilizou o tratamento.</p>
16/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Apesar de ser diagnosticada com o vírus HCV em 2010, até agora não consegui nenhum tipo de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, fui paciente e tratei com sofosbuvir, alcançando ótimo resultado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: sofosbuvir, Positivo: resultado rápido , não havendo efeitos negativos, Negativo: com sofosbuvir não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ribaverina, Positivo: não houve efeito positivo com ribaverina, Negativo: com ribaverina houve vários efeitos negativos, emagrecimento, falta de apetite, nervosismo, depressão.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir e declatasvir, Positivo: nenhum, Negativo: sou não respondedora ao tratamento feito. não negatvei com Sofosbuvir e declatasvir</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir e declatasvir, Positivo: nenhum, Negativo: não negatvei com Sofosbuvir e declatasvir.aguardo retratamento.</p>
17/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, De alguma forma devemos ajudar, e se o resultado é positivo, temos que tentar!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Muito importante para as crianças terem com AME terem uma qualidade vida ..Muitas vidas sonhos se foram por conta do spiraza ser um valor que ninguém pode comprar então libera .sus as crianças querem viver</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Esse remédio é fundamental para vida de varias pessoas,ele é a cura para muitos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, sou médico e gostaria de ter a liberdade de receitar o medicamento que melhor sirva para o meu paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tenho tido contato com todos os DAAs disponíveis , incluindo sofosbuvir e Velpatasvir adquirido por importação, Positivo: A alta resposta virológica e quase sem efeitos adversos , Negativo: possibilidade dos DAAs de resistência viral</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os DAAs disponíveis, sofosbuvir,daclatasvir,simeprevir, interferon peglado , ribavirina, velpatasvir, Positivo: sofosbuvir melhora aderência e alta resposta virológicadaclatasvir melhora aderência e alta resposta virológicasimeprevir melhora aderência e alta resposta virológicavelpatasvir -- melhor resposta em vírus com resistência a N5A, Negativo: interferon baixa resposta e alta possibilidade de efeitos adversos</p>
17/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir e daclatasvir , Positivo: Alta eficácia, poucos efeitos colaterais , Negativo: Nenhum efeito importante</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Valorização da vida de tantas crianças que não possuem condições de comprar o remédio, para se ter um vida melhor .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Principalmente para pacientes que tiveram a eficácia dos tratamentos anteriores frustrada, e como ampliação das possibilidades de tratamento com menores chances de efeitos colaterais indesejados, a proposta vem suprir uma demanda represada no país.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sofosbuvir e declatasvir, Positivo: houve uma melhora considerável no quadro geral da paciente, com redução dos sintomas que tornavam seu dia a dia dependente (fraqueza, sonolência, perda de memória recente, enjôos e diarreias), Negativo: os efeitos colaterais durante e depois do tratamento incluíram principalmente a depressão, dificuldade de concentração, e após 6 meses houve uma multiplicação muito rápida de sua contagem viral, chegando a estados agudos dos sintomas como nunca havia acontecido antes do tratamento - o que gerou a necessidade de manutenção com outros medicamentos, tais como omeprazol 20 mg, BCCA, Gamax, oxalato de escitalopram 10 mg, Equilid 50mg</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir , Positivo: Curei Hepatite C genótipo 3 , com cirrose F4, Negativo: Ainda alguns efeitos colaterais durante o tratamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Daclastavir e Ribavirina, Positivo: Curei Hepatite C genótipo 3 , com cirrose F4, Negativo: Ainda alguns efeitos colaterais durante o tratamento</p>
17/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com base em estudos realizados em outros países</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Mais uma opção para o paciente com genótipo I</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os DAAS, Positivo: Eficacia, ausencia de efeituos colaterais, tratamento de curta duração com alta RVS. , Negativo: Problemas com demora na liberação dos tratamento devido a burocracia entre os entes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com base na bula na medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, Positivo: Ótima taxa de resposta , Negativo: Nenhum</p>
17/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tratamento pan genótipo, esquema posológico confortável favorecendo a adesão, efeitos colaterais relatados reduzidos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir 400 mg., Positivo: - Comodidade posológica, apenas 01 cp ao dia;- Poucos ou nenhum efeitos colaterais (nos esquemas sem RBV)- RVS em pouco tempo de tratamento., Negativo: Não houve relato de efeitos negativos nos esquemas compostos com Sofosbuvir sem RBV.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: -Sofosbuvir 400mg-Daclatasvir de 30 e 60mg;- Simeprevir 150mg - - Interferon - 3D, Positivo: Sofosbuvir compõe esquemas no atual tratamento da hepatite C juntamente com outras DAAs como Daclatasvir (30/60MG) ou Simeprevir 150mg (este menos utilizado) com ou sem RBV.SOF + DACTratamento pan genótipo, esquema posológico confortável favorecendo a adesão, poucos efeitos colaterais sendo muito bem tolerado pela maioria dos pacientes. Esses efeitos almento na associação com RBV.SOF + SIMGenótipos 2 e 3 sendo que 2 não foi contemplado pelo PCDT, foi então, opção para genótipo 3, pouco utilizado., Negativo: -Sofosbuvir 400mg e Daclatasvir de 30 e 60mg - leve cefaleia no início do tratamento- RBV - Cefaléia, tristeza (depressão), emagrecimento, irritabilidade, anemia, falta de apetite, cansaço.- Simeprevir 150mg - Fotossensibilidade - Queda acentuada de cabelos, emagrecimento, fraqueza, falta de apetite, náusea, irritabilidade.</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O remédio é de util serventia para a doença especifica .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Este esquema, muito eficaz e pangentotipico vai facilitar o tratamento da Hepatite C Crônica. Sem duvida!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o sofosbuvir., Positivo: Eficácia estabelecida em pacientes coinfectados HIV/HCV. Não necessário ajuste na dose para insuficiência renal discreta a moderada e nem em casos de insuficiência hepática., Negativo: Rifampicina e Herva de São João podem alterar a concentração do Sofosbuvir.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir e Daclatasvir. , Positivo: Daclatasvir: apenas 1 tablete por dia., Negativo: Daclatasvir: precisa de ajuste qdo usado com inibidores ou indutores do sistema CYP 3A4. CO-administração com Amiodarona não recomendada!</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Prezados Senhores, A OMS apresentou uma visão de um mundo sem hepatite C até 2030. Para tanto é necessário ampliar as taxas de diagnóstico, reforçar o vínculo do usuário com o sistema de saúde e empregar um tratamento seguro, eficaz e indicado para a grande maioria dos pacientes. Além do grande número de indivíduos já diagnosticados no Brasil, estima-se que ainda 500.000 pessoas ainda não foram identificadas. Devido a esta magnitude, é importante entender que a tarefa de identificar e tratar essa população não poderá ficar restrita aos centros terciários e especialistas. Nesse sentido gostaríamos de congratular a Conitec pela recomendação inicial unânime da incorporação do SOF/VEL no Sistema Único de Saúde no Brasil. Essa combinação comprovou em diversos estudos de vida real as mesmas altas taxas de cura da hepatite C apresentadas nos estudos de registro e está recomendada nas principais diretrizes de tratamento internacionais. Esse esquema reúne uma série de características de um esquema ideal: 1) Regime de um único comprimido diário; 2) Duração fixa de 12 semanas; 3) Mesmo esquema independente de genotipagem ou grau de fibrose. Outro ponto importante é a utilização de Ribavirina, que somente é necessária em pacientes com cirrose descompensada que, de toda forma, seguiriam necessitando encaminhamento para os centros terciários. Essas características são importantes pois ajudam a minimizar as chances de erro prescritivo, auxiliam na melhor adesão do paciente, abrem a oportunidade para que novos tratadores, incluindo não especialistas, o que poderá contribuir no esforço de cumprir a meta da OMS de eliminação do HCV. Por fim, essa decisão preliminar da Conitec, embasada de forma técnica e isenta, promovendo a recomendação desta nova e custo-efetiva tecnologia ao Sistema Único de Saúde, aproxima o Brasil de sua intenção de eliminar a Hepatite C, em linha com o plano definido pela OMS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SOFOSBUVIR E VELPATASVIR, Positivo: CURA DA HEPATITE C, Negativo: NÃO HOUVE</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIMEPREVIR, DACLATASVIR, SOF/LEDIPASVIR, 3D, Positivo: Cura da infecção, Negativo: Interações. Especificidade do esquema conforme genotipagem do HCV e gravidade da fibrose hepática.</p>
17/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicação simples de tratar todos os pacientes. Pelo que li na internet esta em todos os protocolos internacionais de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou portador do genótipo 3a, o médico me receitou sofosbuvir associado com dectastavir. Faz três meses que os medicamentos foram solicitados ao SUS, e até agora não chegaram.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tempo menor de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ribaverina e Interferon, Positivo: A cura., Negativo: Todos os péssimos efeitos colaterais até o final do tratamento (48 semanas).</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Melhor forma de tratar</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sofosbuvir, Positivo: poucos efeitos colaterais e alta chance de cura, Negativo: interação medicamentosa</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: interferon, ribavirina, telaprevir, boceprevir, Positivo: chance de cura para os pacientes, Negativo: muitos efeitos colaterais deixavam os pacientes debilitados e em estado crítico</p>
17/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sistema único de saúde deve fornecer o SPIZANZA para o paciente sendo este o único medicamento aprovado para uso que possibilita VIDA para as crianças.não se deve considerar o impacto orçamentário, pois vida não tem preço e todo brasileiro por lei TEM direito a tratamento pelo SUS e este tem por obrigação fazer o melhor para o povo. No exterior o tratamento é feito pelo governo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, tratamento extremamente importante, indispensável neste cenário da hepatite C</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, Positivo: droga extremamente eficaz, com cura da hepatite C, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Daclatasvir, simeprevir e 3D, Positivo: cura da hepatite C com altas taxas de resposta, baixíssimos efeitos colaterais., Negativo: nenhum</p>
17/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A cura abrangendo a todos os genotipos 1a 6 e as recindivas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Só com daclatavir e sofobusvir, Positivo: Menos efeitos colaterais que o interferon, Negativo: Não e o mais indicado para genotipo 3</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Daclatavir e sofobusvir Três meses de tratamento., Positivo: Menos efeitos colaterais que o tratamento usado anteriormente., Negativo: Como sou genotipo 3 este não era o tratamento mais indicado ou deveria ser tomado por seis meses mas não se consegue .só via judicial por isso pode-se ter recindiva.</p>
17/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, facilidade e eficacia para o tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: daclatasvir, sofosbuvir, Positivo: acompanhamento do paciente com alta taxa de resposta para cura, Negativo: efeitos colaterais semelhantes, sob controle médico</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: alfainterferona e ribavirina, Positivo: Não havia outros medicamentos na época, era a única solução embora com percentual de cura baixo, Negativo: efeitos colaterais intensos, hematológicos, pele, humor e outros que necessitavam de readequação de dosagem ou suspensão do tratamento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/09/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, SÃO SÓ CRIANÇAS A ESPERA DE UM MEDICAMENTO PARA SOBREVIVER. ESPERO QUE SEJA LIBERADO! 2ª - Não 3ª - Não
17/09/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/09/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O teste do tratamento obteve o efeito de melhora de 50%, que bastante significativo. 2ª - Não 3ª - Não
17/09/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: interferon 80,100,120,180 mcgribavirina boceprevir telaprevir sofosbuvir simeprevir daclatasvir e ombitasvir, Positivo: poucas curas, Negativo: Muitos efeitos colaterais 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: nterferon 80,100,120,180 mcgribavirina boceprevir telaprevir sofosbuvir simeprevir daclatasvir e ombitasvir, Positivo: cura com daclata e sofosbuvir, Negativo: Poucos efeitos colaterais