

Contribuições da Consulta Pública - PCDT - Imunossupressão de transplante hepático em pediatria - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
19/10/2018	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	os maiores diferenciais do prograf de liberação lenta seriam maior aderência, menor toxicidade, menor labilidade de nível sérico, maior durabilidade de uso e menor taxa de rejeição crônica	
19/10/2018	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, O Prograf de liberação lenta deveria estar disponível para todos os pacientes com transplante de órgãos sólidos	Em combinação com in de m tor de tomada única diária, o Prograf de liberação lenta é um dos melhores esquemas imunossupressores para o paciente com consequente melhor adesão ao tratamento, menor taxa de rejeições, maior sobrevida de paciente e enxerto e menor custo a longo prazo já que estes pacientes não entrarão em lista novamente na condição de sensibilizados	
19/10/2018	Sociedade médica	Boa	Sim, O tacrolimo de liberação lenta deveria estar disponível para todos os pacientes transplantados de órgãos sólidos, ou, ao menos para aqueles que em tomadas de 1mg 12/12h atingem valor sérico de base maior que o desejado, portanto com potencial toxicidade	O valor do tacrolimo de liberação lenta já bem conhecido e estabelecido maior aderência, menor taxa de rejeição, menor variabilidade do nível sérico, maior sobrevida do enxerto e menor custo com tratamentos de rejeição ou de re-transplantes sensibilizados	
19/10/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
29/10/2018	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/10/2018	Interessado no tema	Muito boa	Não		
05/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito ruim	Não		