

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Sacubitril-Valsartana para insuficiência cardíaca crônica sintomática - NYHA classe II-IV - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: entresto procoralan, Positivo: ficou mais disposta c menos falta de ar e nao deu mais a pneumonia decorrente da agua acumulada nos pulmões pelo coração inchado , Negativo: nao encontrei pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: entresto procoralan, Positivo: se sente mais disposta parou de dar água no pulmão que era muito frequente por causa do.coracao inchado, Negativo: nao encotrei</p>
28/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remédio de alto custo e deveria ter no Sus</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, concor, glinfage, As e furosemida , Positivo: Me ajuda respirar e ter uma vida " normal ", Negativo: Da um pouco de tontura e enjôo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro, Positivo: Melhorava um pouco, Negativo: Resultado era péssimo</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Entresto é maravilhoso</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24mg/26mg, Positivo: Entresto é maravilhoso,depois que comecei a tomar me sinto muito melhor pena que é um medicamento muito caro e sou aposentada com o minimo, Negativo: Não tive efeitos negativos só o preço mesmo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, cardiovilol, enalapril, Positivo: No começo foi bom tomei durante 4 anos , Negativo: Depois não fazia efeitos mais</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remédio muito importante pra quem tem problema cardíaco, pois fortalece a musculatura do coração. em</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Fortaleceu a musculatura do coração., Negativo: Nenhum efeito colateral</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Furosemida, Positivo: Ajuda na circulação do sangue, Negativo: Nenhum</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril-valsartana, Positivo: Acentuada melhora da classe funcional., Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, Losartana potássica, Positivo: Melhora da tolerância ao esforço , Negativo: Hiperpotassemia, hipotensão, etc</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: ., Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lisinopril, Positivo: X, Negativo: X</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Geralmente quem necessita são idosos, que sobrevivem de aposentadorias ou pensões, que a cada ano que passa, perde poder aquisitivo perante os pífios reajustes comparados com os aumentos de medicamentos e serviços básicos como taxas de energia e água.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Em avaliação somente Entresto 24/26mg, Positivo: Manter vida estável., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Monocordil 50 mg, Vastarel 35 mg, e Concor 5 mg., Positivo: Através destes medicamentos, eu como cardiopata, consigo levar uma vida estável. Sem eles e o Entresto, seria inevitável procedimentos invasivos, que com certeza, correria sério risco de não suportar e vir a óbito., Negativo: Nenhum.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é de alto custo para a camada menos favorecida da sociedade.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103, Positivo: Melhora na disposição no dia a dia Melhor noite de sono, Negativo: Não observado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: FurosemidaCarvedilolCaptoprilEspironolactona, Positivo: Melhoria na noite sono, Negativo: Boca secaTosseVontade de urinar várias vezes</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicacao com grande evidencia de reducao de morbimortalidade e superior as medicacoes disponiveis atualmente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Reducao de internacap, melhora de sintomas, , Negativo: Falta de disponibilidade no sus</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com o uso deste medicamento houve melhoras significativas em meu bem estar. Ao meu coração e controle de minha pressão arterial.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhoras no coração e pressão arterial., Negativo: Não ocorreram.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Positivo: Nao ocorreu melhoras., Negativo: Tinha que tomar diversas vezes e sempre aumentando dosagens.</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Teve resultado significativo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Boa, Positivo: Menos cansaço, mais disposição, Negativo: Agonia no rosto e mais sede</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho este medicamento de extrema necessidade, assim como os de hipertensão.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril/Valsartana 24/26mg e 49/51mg, Positivo: Os pés não incham mais e não tenho falta de ar , Negativo: Queda de pressão</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é inovador. Possui resultados assegurados. Apesar de ter custo alto. A longo prazo. Reduz a necessidade de outros medicamentos ou internação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso de entresto. , Positivo: Para tratamento de ic em pacientes pós infarte. Teve recuperação em curto prazo. Inclusive no controle de hipertensão como fatpr de risco, Negativo: Cefaleia. Irritacoes gastricas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xarelto, Positivo: Boa recuperação em alguns pacientes, Negativo: Acompanhamento periódico e custos com exames</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho este medicamento de extrema necessidade, assim como os de hipertensão.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril/Valsartana 24/26mg e 49/51mg, Positivo: Os pés não incham mais e não tenho falta de ar , Negativo: Queda de pressão</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preciso do remédio e tenho dificuldades financeiras para compra lo., sou aposentado por doença crônica. Trata-se de medicação necessária para melhorar minha qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Minha experiência está sendo sacubitril/valsartana., Positivo: Com está medicação diminuiu o cansaço e não tenho dores no peito. , Negativo: Até o momento não senti efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto usuária hidroclodiazita concor , Positivo: Arritmia pressão alta e retenção de líquido , Negativo: Entresto valor alto</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro, Positivo: Faz bem ao coração , Negativo: Dar tonteira e sono</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Tive uma tromboembolia pulmonar após cirurgia de revascularização cardíaca. Fui tratada com outra medicação por 6 meses mas ao final ainda tinha líquido nos pulmões. Mudei para ENTRESTO por 3 meses e me curei., Negativo: Apenas um pouco de enjoo, mas tomava 10 medicamentos ao dia, 9 além do Entresto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: XARELTO., Positivo: O cansaço e as dores que sentia diminuíram consideravelmente. , Negativo: Nenhum.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria uma ótima opção, para a rede sus ,para o paciente q faz tratamento com esse médica entresto.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o valsartana, e também com o entreato ,o paciente com ritimia cardica. A melhora do paciente foi bem notada como respiração menos ofegante , e a melhor qualidade de vida ., Positivo: Valsartana melhorou m a pressão arterial e os batimentos cardíacos. entresto melhorou positivamente os batimentos cardíacos ,a respiração e a pressão arterial também ., Negativo: Nesses dois medicamentos não houve nem um ponto negativo ,há não ser seu preço pois os dois são muito caros , pra um paciente q nessecita de cuidados e medicação caras q não são fornecidas pelo a rede pública .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Valsartana , entresto ,xarelto, Clenil, sekizok e ECT., Positivo: Valsartana e entresto foram todos positivos., Negativo: Apenas os preços de todas as medicações ,em relação ao paciente descrito acima são muito caros todos pra uma pessoa q apenas recebe um benefício e necessita destes medicamentos .</p>
05/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há evidência robusta na redução de mortalidade e morbidade comEssa droga nesse perfil de pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril-valsartana, Positivo: Melhora clínica significativa, redução de reinternamentod e redução de morte súbita , Negativo: Alguns casos apresentaram hipotensão e piora da função renal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betabloqueador, inibidores da ECA, bloqueadores da angiotensina,diuréticos, digital, antagonista da aldosterona, reabilitação, ressinchronizador, ivabradina, Positivo: Cada classe tem suas oeculiaridades, Negativo: Cada classe tem duas peculiaridades</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Após administração o paciente apresentou melhoras da PA e nós batimentos cardíacos. , Negativo: Durante o uso não apresentou nenhuma reação.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caverdilo 12.25, Positivo: Melhoras nós batimentos cardíacos e na PA., Negativo: Nenhuma reação.</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remedio e muito eficaz no que propõe, porém e muito caro, poucas pessoas tem acesso e muitas precisam</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como negar aos pacientes de insuficiência cardíaca crônica uma chance a vida? Um remédio de alto custo mas com grandes chances de não só melhorar a qualidade de vida mas também diminuir internações</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/36mg ,49/51 mg e 97/103 mg, Positivo: Minhas arritmias e fadiga diminuíram., Negativo: Não teve até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aldactone, selosok, Positivo: Ajudaram na monha recuperação da fração de ejecao., Negativo: Não teve até o momento</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Graças ao Entresto meu pai está tendo várias da normal após ter sofrido um infarto gravíssimo, Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como já informei ,observando os pacientes que têm condições de adquirir esta associação de drogas se beneficiam muito .diminuicao da dispneia ,melhora significativa aos esforços ,diminuição do número de ds compensações e internações hospitalares,então se houver dispensação destas medicações aos pacientes,um universo respeitável de pacientes se beneficiarão e terão um qualidade de vida muito melhor</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com esta,associacao,sacubitril e valsartana, Positivo: Acima descritos, Negativo: Hipotensão ,principalmente quando associado a uma dose “exagerada” de diuréticos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta bloq,cardiotonicos ,diureticos , Positivo: Melhora da força contrátil do VE,melhora do débito cardíaco ,diminuição da retenção hídrica ,etc, Negativo: Redução significativa da FC. ,bloqueios,câimbras ,erc</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97 mg/103 mg, Positivo: Elimina efeitos da doença, Negativo: Não registrei</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lasix, Positivo: Reduz a retenção de água, Negativo: Não observei</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora significativa no meu quadro grave de insuficiência cardíaca, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Marca Pasdo, Positivo: Melhora significativa, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicamento e muito caro no é umilhante ter que ganhar medicamento mas a nossa aposentadoria também é ridícula</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Etresconao, Positivo: Não estou com muito cansasso, Negativo: Não tenho muito que informar pois fis tres semana de tratamento de pneumonia sem ater coração com 27/ por cento de batidas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cardevilol e outrs, Positivo: Nenhum efeito , Negativo: Dor de cabeça dezinteria etc</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto Concor e furosemida , Positivo: Me Deu outra qualidade de vida me sinto bem melhor depois que comecei o tratamento com o entresto., Negativo: Tontura e pressão baixa</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto,Furosemida,Concor. , Positivo: Me Deu outra qualidade de vida me sinto bem melhor depois que comecei o tratamento com o entresto., Negativo: Tontura e pressão baixa.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ja tomo esse medicamento a 1 ano apos o uso dee xonsehui conyrolar meu tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Varios , Positivo: Controle de hipert nsao e artmias, Negativo: O unico efwito negtivo e o preco por ser remedio de ultim geracao lara o tratamento cardiologico</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atenlol, emnalapril, Positivo: Nao fazia efeito esperado, Negativo: Onresultado nao era satisfatorio</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preço muito alto</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, Positivo: Não tive , Negativo: Não tive</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sou a favor da distribuição gratuita pelo SUS sistesistema único de saúde no meu caso tenho que tomar o entresto 97/103 duas vezes ão dia como sou aposentado e recebo um salário mínimo tenho que pedir ajuda para familiares pra comprar porque custa caro e não tenho condições</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Todos os medicamentos que existe por exemplo o carvedilol 25 mg duas vezes ão dia, Positivo: Tomei e ainda tomo o carvedilol 25 mg duas vezes ão dia e não foi suficiente pra desinchar o coração foi somente através do entresto 97/103 duas vezes ão dia Que estou melhor, Negativo: Os efeitos são ótimos graças a esse medicamento entresto 97/103 duas vezes ão dia Que tive melhora</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana caverdilol 25 mg duas vezes ão dia clonazepam 2 mg varfarina furosemida todos esses remédios eu continuo tomando, Positivo: Todos causa efeitos positivos, Negativo: Nenhum dos remédios causa efeitos negativos</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estando em uso de entresto, a mais de um ano minhas internações estão com espaçamento maior sendo de 6 meses uma vez que antes era de 2 em 2 meses .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 94/103, Positivo: Os acima supra citados. , Negativo: Não teve.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril 20 mg, Positivo: Não tivemos muito sucesso. , Negativo: Esse medicamento não consegui manter os níveis de pressão arterial e saturação.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na função cardíaca, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Naprix, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento Entresto tem feito muito bem a minha saúde.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Redução de internamentos e sintomas como falta de ar, fraqueza, cansaço e inchaço., Negativo: Queda de cabelo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Maleato de Enalapril, Positivo: Estabilização dos sintomas como taquicardia e episódios de arritmia., Negativo: Tonturas.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou a qualidade de vida, não sinto mais tanto cansaço, falta de ar, perda do apetite, e melhorou também a qualidade do sono., Negativo: Apenas o custo elevado.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Concor e furosemida , Positivo: Controlava a pressão, mas não os sintomas da insuficiência cardíaca , Negativo: Continuava com dificuldades respiratórias, falta de ar, cansaço excessivo, falta de apetite, insônia, não conseguia caminhar distâncias maiores.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhorei muito em minha insuficiência cardíaca nao</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não me recordo, Positivo: Entresto melhorou muito minha insuficiência cardíaca e diminuiu bem minha pressão arterial, Negativo: Não me recordo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não me recordo, Positivo: Não me recordo, Negativo: Não me recordo</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na fração de ejeção , Negativo: Tontura ao se levantar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Indapamida, Positivo: Não teve melhora , Negativo: Não teve melhora</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque Entresto proporciona economia para o governo- Reduz a hospitalização em 49%- Estudo Pioneer. Pacientes permanecem menos tempo HOSPITALIZADOS.Pacientes utilizando IECAS, permanecem mais tempo HOSPITALIZADOS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECAS, Brás, diuréticos, Entresto, nitratos., Positivo: Entresto reduz a morte súbita, pacientes ficam mais tempo fora do hospital., Negativo: IECAS nao reduzem a morte súbita. IECAS apresentam muita tosse seca, angioedema, efeitos colaterais graves.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há evidência robusta na redução de mortalidade e morbidade comEssa droga nesse perfil de pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril-valsartana, Positivo: Melhora clínica significativa, redução de reinternamentod e redução de morte súbita , Negativo: Alguns casos apresentaram hipotensão e piora da função renal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betabloqueador, inibidores da ECA, bloqueadores da angiotensina,diuréticos, digital, antagonista da aldosterona, reabilitação, ressinchronizador, ivabradina, Positivo: Cada classe tem suas oeculiaridades, Negativo: Cada classe tem duas peculiaridades</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse remédio melhorou muito a qualidade e condição de vida do meu pai!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sacubitril/valsartana , Positivo: Estabilização do quadro de cardiopática crônica , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe sofre de insuficiência cardíaca e toma o entresto e teve boa aceitação. O problema colocam um remédio bom, porém sem condições do pobre adquirir de tão caro que ele é e o pior o SUS deveria fornecer gratuitamente. Comentário meu, assim são para todos os remédios, o que adianta tanta pesquisa para produzir bons medicamentos mas não proporcionar aos necessitados?</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto que minha mãe faz uso hoje aliados a outros remédios de menor custo como o apresolina e outros mais caros como o precolaram., Positivo: Minha mãe tem levado uma vida limitada em algumas situações, porém quanto a medicação por ter concentração de potássio ela tem que fazer regimes para não ter outros problemas, mas em relação ao coração apesar da limitação tem sido muito bom para ela., Negativo: Aumento do potássio e ter cuidados com os rins.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Procolaram, apresolina, Concor, entre outros. Minha mãe hoje tem marcapasso., Positivo: Várias combinações, algumas somente para manter pressão arterial estável, mas segundo os médicos sem atuação no problema., Negativo: Alguns medicamentos trazem problemas de estômago, não agem diretamente na insuficiência cardíaca e em relação ao marcapasso a limitação para fazer suas atividades.</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, parente com problema no coração e remédio o ajudou</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: entresto, Positivo: reanimou , Negativo: tira a fome o que para o obeso ajuda</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: losartana , Positivo: presssao , Negativo: nao consigo opinar</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou aposentado, dificuldades para manter o orçamento mensal!!! Faço uso contínuo e preciso subsídio do remédio .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho pacientes em uso do Entresto e os resultados são excelentes. A recuperacoi da função ventricular é surpreendente. A qualidade de vida e a melhora clínica supera as expectativas. O sintoma de cansaço desaparece. O benefício é notável</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, BETABLOQUEADOR CARDIOSELETIVO, SACUBITRIL VALSARTANA,ANTAGONISTA MINERALOCORTICOIDE., Positivo: Melhora do quadro clínico e da qualidade de vida, aumento da função ventricular, Negativo: O custo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, BRA, BETABLEQUEADOR. SACUBITRIL VALSARTANA., Positivo: Descrito acima, Negativo: O custo.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento e muito eficiente e vai economizar ao governo muita internação. Faço uso. Quando estou com este medicamento em dia não fico hospitalizada</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho 3 cateteres . Angioplastia faço controle cardiologico. Uso Micardis concardio sustrate procoralan e quando posso ENTRESTO 97/103, Positivo: Me sinto menos cansada consigo caminhar sem falta de ar. Nao tenho dor no braço e nem aperto (angústia) no coração. Nem tosse entre outros que não sei como explicar. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Micardis concardio procoralan sustrate e outros. , Positivo: Melhoras temporarias., Negativo: Nenhum</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe esta super bem com essa medicação</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Minha mãe está super bem não tendo mais nenhum infarto já que antes ela teve 2 infartos em 1 mês e 15 dias, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Caso o motivo seja economia para o governo, isso reflete negativamente, pois os estudos mostram que os pacientes se hospitalizam menos com Entresto verso iecas, logo, o governo economiza muito mais. Estudos PIONEER e PARADIGM mostram isso. Minha pratica reflete esses dados dos estudos, pacientes se hospitalizam menos com uso de Entresto.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECAS, diuréticos, nitratos, Entresto, beta bloqueadores., Positivo: Estudos PIONNER e PARADIGM mostram a superioridade de Entresto frente aos iecas na redução hospitalização e mortalidade. Entresto reduz a morte súbita.Beta bloqueadores, reduz a morte súbita e hospitalização., Negativo: IECAS não tem estudos na redução morte súbita.Pacientes se hospitalizam com mais frequência frente aos pacientes que utilizam Entrsto e beta bloqueadores.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Evolução no paciente cardíaca , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varios, Positivo: Melhora significativa no desempenho , Negativo: Não tive</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remédio que auxiliou muito o tratamento cardíaco da minha mãe, sem contar que é muito caro, e a população deve receber esse benefício.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 49/51mg, Positivo: Minha mãe obteve melhora imediata fazendo uso do entresto 49/51mg. Antes tinha muito cansaço, falta de ar, arretmia, e com o uso do entresto, os batimentos cardíacos melhoraram 70%, sem contar que substituímos alguns comprimidos por um só. Isso é maravilhoso!!, Negativo: Nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entresto</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Melhora devida, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concor, Positivo: Melhora de vida, Negativo: Nenhum</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque o medicamento é vital para o controle da doença do meu pai que é cardíaco crônico e os medicamentos que estão no mercado não dão efeito desejado. Meu pai tem fraqueza muscular e acúmulo de água no pulmão quando não consegue o remédio pelos órgãos competentes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 49 mg/51 mg comprimidos 2 x ao dia. , Positivo: Meu pai utilizou e percebeu o Desinchaço nos membros inferiores, fim da falta de ar, melhora da arritmia, normalização do tamanho do coração conforme exames específicos., Negativo: Nenhum, mas foi meu pai que utilizou.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Melato de enalapril., Positivo: Por um período a doença do meu pai esteve sobre controle, mas com o passar do tempo a doença progrediu e a cardiologista do meu pai se vou obrigada a utilizar esse novo medicamento . , Negativo: Evolução da cardiopatia passou de grave para crônica.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Aumento de fração de ejeção Mais energiaConseguí voltar a trabalhar de forma remunerada, Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Mais energia, aumento de fração de ejeção , Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, discodo porque esse medicamento é vital para meu controle da doença sou cardiaco cronico e os medicamentos existente no mercado não mais estavam sortindo eveito desejado.tinha muita falta de ar e fraquesa muscular, já estava acumulando agua no meu corpo(inchaço) com entresto obtivo melhoras significativas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO 49mg/51mg - COMPRIMIDOS - 2 VEZES AO DIA, Positivo: desinchaço nos membros inferiores, fim da falta de ar, melhora da arritmia, diminuição do tamanho do coração conforme exames especificos, entre outras..., Negativo: não obtive nenhum efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: maleato de enalapril , Positivo: por um bom periodo a doença esteve sob controle, entretanto com passar dos anos a doença começou a progredir, onde minha cardiologista se viu obrigada a utilizar esse novo medicamento., Negativo: conforme descrevi no quadros anteriores, ouve uma evolução da minha cardiopatria minha cardiopatia passou de grave para crônica.</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso contínuo deste medicamento e as vezes não posso comprar, pois é muito caro. E preciso muito dele.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com todas as miligramas do entrestos, Positivo: Tomo o de 97/103mg e acho que melhorou, Negativo: Acho que não senti</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento de resposta imediata, porém muito para a maioria dos doentes de insuficiência cardíaca, mesmo com o desconto que o laboratório nos dá, as vezes fica inviável comprá-lo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Positivo: A resposta foi positiva e utilizo até hoje., Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Usava Captopril, qdo o cardiologista me recomendou o uso do Entresto, Positivo: A resposta desse medicamento foi imediata, andava com muito cansaço, depois do medicamento o cansaço diminuiu bastante., Negativo: Não houve.</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um ótimo medicamento, mas com um custo muito elevado para o padrão de salário do brasileiro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto. , Positivo: Sem a taquicardia. Coração trabalha compassado., Negativo: No momento, apenas o preço muito alto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto ., Positivo: Sem taquicardia. O coração trabalha compassadamente., Negativo: No momento , apenas o alto custo para o padrao do assalariado brasileiro.</p>
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento melhora muito a condição de vida do doente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na condição fisica..redução do mal estar, Negativo: Sem efeitos negativos experienciados.</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por um medicamento caro, fica quase impossível a aquisição de pessoas carentes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51, eliquis 5mg, amiodarona 200mg., Positivo: São ótimos no controle, Negativo: Não tive ainda</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro, Positivo: Ficou a desejar, Negativo: Ficou a desejar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento salvou a vida do meu esposo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou a falta de ar devido ao acúmulo de água no pulmão, Negativo: O alto custo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Atacant, Positivo: Bom preço , Negativo: Não melhorou a insuficientes cardíaca</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como remédio para pressão deveria ser gratuito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entretanto 49/51, Positivo: Melhorou a cansaço e falta de ar., Negativo: O preço.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entretanto 24/26, Positivo: Melhorou um pouco os sintomas., Negativo: O preço.</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apesar da melhora do prognóstico, após o advento de medicações como os betabloqueadores, iecas e inibidores da aldosterona, o sacubitril/valsartana tem se mostrado, na prática clínica, um medicamento com importante melhora sintomas e da qualidade de vida dos pacientes com insuficiência cardíaca, reduzindo o tempo de internação e com grandes possibilidades de melhora ainda maior do prognóstico dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora dos sintomas, antecipando as altas hospitalares e e melhorando a qualidade de vida., Negativo: Até o momento não constatei efeitos que limitassem o uso , yenso hacio boa aderência ao tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, betabloqueadores, ARA Lo, inibidores da aldosterona , digitalicos e ivabradina., Positivo: Melhora dos sintomas da qualidade de vida, e melhora do prognóstico ., Negativo: IECAS tosse seca e beta bloqueadors bradicardia</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois após a administração do medicamento melhorou muito a minha qualidade de vida. SOu aposentado e este medicamento EntrestRO é muito caro. E nós como cidadãos temos direitos e esse deve ser um medicamento gratuito e fornecido para os portadores de. insuficiência cardíaca sem dúvidas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Me sintô mais disposto a realizar as atividades diárias e básicas do dia a dia., Negativo: Só benefícios o problema é o valor.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora minha condição de vida., Negativo: Somente benefícios porém é caro para um. aposentado.</p>
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Melhora significativa no quadro de insuficiência cardíaca., Negativo: Não encontramos até o momento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concardio, Positivo: Melhora razoável para o quadro, Negativo: Piora do quadro de asma do paciente</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Representa um avanço importante no tratamento insuficiência cardíaca congestiva</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril, Positivo: Melhora substancial da capacidade física , Negativo: Sem comentários até o presente momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omapatrilato, Positivo: Melhora desempenhoCardíaco , Negativo: Chance de angioedema , edema de glote</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Giovananlo, Positivo: Melhorou a pressao, Negativo: Nao teve</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os remédios independente do valor deveria ter no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já tive experiência com entresto, Positivo: Me manter vivo por mais tempo, Negativo: Tive que parar de tomar por um componente que faz mal para o rim</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hoje tomo o eliquis, Positivo: Todos os dias é um ponto positivo, Negativo: Nenhum</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O custo é relativamente mais alto, contudo comprovadamente reduz internações (que em muitos casos chegam a terapia intensiva, de alto custo), o que a médio-longo prazo pode na verdade desonerar o sistema público e a ocupação hospitalar, além do benefício na redução da mortalidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartana, Positivo: Melhora da classe funcional, da vitalidade, qualidade de vida e redução da frequência das internações, melhora da fração de ejeção , Negativo: Hipotensão não severa</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, Losartana, Ramipril, Lisinopril, Candesartana, Ibesartana, Captopril, Positivo: Melhora sintomática, controle da hipertensão, redução da progressão da IC, Negativo: Tosse seca no caso dos IECAs, angioedema, piora da função renal</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Caso o paciente faz uso desse medicamento e acompanhamento médico nada melhor seria a sua distribuição gratuita pelo SUS. Fiz cirurgia cardíaca e faço uso de 17 remédios diários, um desses foi o Entresto recomendado por meu cardiologista e pude ter melhoras em sintomas que possuía e diminui dois tipos de medicamentos. Porém seu preço é alto pra nós aposentados que dependo de comprar outros remédios não me fornecidos pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: A quase seis meses faço uso do Entresto comecei com o de 49/51, porém minha pressão como abaixou meu cardiologista desde outubro me receitou o de 24/26, Positivo: Tinha muitas câimbras nas pernas e dores nas mamas, fazia uso de captropil e do aldactone, meu cardiologista pediu que parecem com esses dois medicamentos e passei a usar o Entresto que me tirou as câibras, Negativo: Apenas a miligrama teve de ser modificada devido a baixa na pressão</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo, tendo em vista o benefício em médio e longo prazo de sobrevida e redução de internação, além de melhora de qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BRA/ IECA/ Espironolactona/ CaRVEDILOL, Positivo: MELHORA DE CLASSE FUNCIONAL, MORTLIDADE E SINTOMAS PARA TODOS., Negativo: caRVEDILOL - EVENTUALMENTE CAUSA BRADICARDIA INTENSA.IECA - EVENTUALMENTE CAUSA TOSSEBRA - EVENTUALMENTE CAUSA HIPOTENSÃOESPIRONOLACTONA - EVENTUALMENTE ELEVA O POTASSIO</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação comprovadamente de grande eficácia e importância quando adequadamente indicada, considero omissão de saúde à sociedade privar os pacientes que dependem do SUS de tal medicamento!!!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril / Valsartana, Positivo: Melhora da qualidade de vida, classe funcional da insuficiência cardíaca, melhora do remodelamento cardíaco, menores índices de reinternação..., Negativo: Alguns casos de hipotensão relacionado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril entre outros , Positivo: Medicacao importante e com acesso no sus , Negativo: Comprovadamente inferior em estudos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remedio faz bem e quem toma melhora</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhore muito meu quadro de insuficiência cardíaca</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Diminuição do cansaço , Negativo: Um pouco de diarreia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Digoxina Procoralan , Positivo: Não teve, Negativo: Continuava cansada</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora na angina e disposição., Negativo: Não observados</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nao me recordo, Positivo: Nao lembro , Negativo: Não lembro</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bom resultado na insuficiência cardiaca. Todos devem ter acesso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Diovan e Ictus., Positivo: Melhora na função cardiaca., Negativo: Até agora nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Giovane e Ictus., Positivo: Controle da pressão e proteção contra extrssistoles complexas., Negativo: Tive piora do bloqueio AV com Ictus.</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo Paradigm mostrou redução expressiva de mortalidade e rehospitalização a despeito da terapia padrão otimizada</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Melhora clínica funcional Redução de hospitalização , Negativo: Possibilidade de hipotensão - porém melhorada com ajuste de dose</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Positivo: Redução de edemas e melhora da classe funcional , Negativo: Glicosúria</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Entresto tem estudo com confirmação da melhora dos pacientes em relação ao uso do Enalapril</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Paciente obteve melhora na qualidade de vida, melhora da dispneia aos esforços , Negativo: O Enalapril não apresentou melhora tão significativa na qualidade de vida do paciente quanto o uso do Entresto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, Positivo: O Enalapril não apresentou melhora tão significativa na qualidade de vida do paciente quanto o uso do Entresto , Negativo: O Enalapril não apresentou melhora tão significativa na qualidade de vida do paciente quanto o uso do Entresto</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como não disponibilizar no SUS uma droga que reduziu em 20 % a moralidade quando comparada ao Enalapril que é oferecido no SUS, além de reduzir muito também hospitalizações, ou seja, redução de gastos públicos, realmente não dá pra entender.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Valsartan/sacubitril, Positivo: Redução de sintomas, mortalidade e hospitalizações por ICC., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, BRA, beta bloqueador, espironolactona, ivabradina, Positivo: ., Negativo: .</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento imprescindível é muito caro, mesmo com desconto do fabricante</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora sensível no estado de saúde, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Selozok, Positivo: Anterior ao Entresto não havia melhora sensível no estado. De saúde, Negativo: Os sintomas da arritmia cardíaca não diminuía</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora significativa na insuficiência cardíaca, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai faz uso desta medicação...Porém ele é aposentado recebe um salário mínimo...Gasta em média 500,00 p mês..</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, muitas pessoas precisam dessa medicação e não tem condições de comprar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97_103mg, Positivo: melhorou todos os sintomas da doença, Negativo: não tem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: melhorou todos os sintomas da doença, Negativo: sem efeitos negativos</p>
05/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, os idosos tem direito a tratamento gratuito e os cardiopatas não! porquê?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sim, porque fica muito passado o uso do medicamento para quem não tem uma renda</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril/Valsartana 24mg/26mg, Positivo: Esta sendo muito bom para mim Já vejo uma melhora muito grande no meu dia a dia., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Positivo: Mim sentia muito cansada., Negativo: Não foi o suficiente para minha melhora.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Pois com o uso do medicamento para mim vejo que melhorou muito meu dia a dia</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24mg/26mg sacubitril/valsartana, Positivo: Melhorou Muito minha saúde, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Positivo: Melhorou no início do tratamento mais agora sem melhora, Negativo: Nenhuma</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se é necessário ao tratamento conforme prescrição médica, é obrigação do Estado prover os medicamentos necessários e indispensáveis ao tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Causa um bem estar maior , Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora o bem estar, qualidade de vida, Negativo: Custo</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto é Valsartana, Positivo: me senti bem melhor tomam do o Entresto, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: losartana, Positivo: melhorei bem com o mrdicamento, Negativo: não tenho efeitos negativos</p>
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Melhorou completamente, Negativo: Os outros medicamentos causavam cansaso</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Losartana atenolou , Positivo: Controlou a pressão , Negativo: Cansaso,sem forças palpitações</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sem comentários</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO , Positivo: Me mantém estável , Negativo: Inchaço e ganho de peso</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Implante de CDI; uso de diversos medicamentos como DIVELOL, ATLANSIL,CRESTOR,PROCORALAN, Positivo: Me mantém estavel, Negativo: Complicação renal inchaço e ganho de peso</p>
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A pessoa que acompanho teve grandes melhoras no quadro clínico diminuindo o número de internações e melhorando a qualidade de vida, porém os custos com o remédio ainda são altos para o nosso padrão de vida .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Valsarta , Positivo: Diminuição da parte afetada a pela cardimegalia, aumento da injeção de infração, redução de todos os sintomas da doença, é diminuição do número de internações. , Negativo: Custo caro</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concor, aldaquitone, caverdilol, Positivo: Mais baratos , Negativo: Não tiveram o mesmo efeito</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio é muito pra pra insuficiência cardíaca crônica meu marido melhorou 70% em menos de uma Não, diminui as interações</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caverdilol, enalpril, entresto, digoxina, espironalactona, furosemida..., Positivo: Caverdilol? Enalpril, digoxina, espironalactona e furosemida melhorou por um tempo mais o entresto teve um resultado melhor . , Negativo: Caverdilol? Enalpril, digoxina, espironalactona e furosemida depois de um tempo fez levar meu marido pra uti e quase fazer hemodiálise.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caverdilol, enalpril, entresto, digoxina, espironalactona, furosemida..., Positivo: Em comparação ao entresto quase nenhum, Negativo: Arritmia, falta de ar, retenção de líquidos....</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora significativa na insuficiência cardíaca, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/12/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Galvusmed, Positivo: Entresto _ infinitamente melhor me sinto melhor que o galvusmed, Negativo: Entresto até agora nada contra em relação. Ao galvusmed tinha fraqueza 3ª - Sim, como paciente, Qual: Galvusmed, Positivo: Esta melhorando , Negativo: Fraqueza
06/12/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esse remédio me deu uma qualidade de vida. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Diuréticos, Positivo: Tem menos cansaço, Negativo: Fraqueza 3ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro, Positivo: Passava mal .sou asmático., Negativo: Não podia tomar .sou asmático
06/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: entresto, Positivo: o paciente teve sua pressão arterial controlada, Negativo: boca seca 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: entresto, Positivo: o paciente obteve sucesso, Negativo: boca seca
06/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Reduz mortalidade e custo é insignificante em decorrência de outras doenças com HIV , câncer imunossupressores etc etc 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubutril / valsartana com reversibilidade de maioria dos casos e melhora clínica , Positivo: Melhora clínica diminuição do número de medicações dia e diminuição de necessidade de internações destes pacientes , Negativo: Custody 200 reais mês ! 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril , espironolactona , digoxina , carbedilol , losartana ! Nitroglicerina , adrenalina , vasopressina , procoralan, Positivo: Controle regulares da icc, Negativo: Dificuldade de infesta de diversos medicamentos
06/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento é muito caro 2ª - Sim, como paciente, Qual: Caverdilol, Positivo: Positivo, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Nada a declarar , Positivo: Nada a declarar , Negativo: Nada a declarar
06/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes que utilizam do composto tem uma notável melhora na qualidade de vida com o uso, não ocorrendo o mesmo com outros medicamentos. Eu sou um deles. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: SELOZOK. , Positivo: Controle de batimento cardíacos,, Negativo: Efeito de sonolência, dificuldade respiratória, principalmente a noite, cansaço com maior frequência, afetou estímulo sexual.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O ENTRESTO COMPROVOU SUPERIORIDADE NO TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA E MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO , Positivo: MELHORA DOS SINTOMAS, DIMINUIÇÃO DE INTERNAÇÕES E DE MORTE SUBITA, AUMENTO DA FRAÇÃO DE EJEÇÃO ETC. , Negativo: PREÇO AO CONSUMIDOR</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BETA BLOQUEADOR, DIURETICOS , ECA , BRA ., Positivo: MELHORA PARCIAL DOS SINTOMAS , REDUÇÃO DE MORTE . , Negativo: DESCOMPENSAÇÃO DO QUADRO , MORTE SÚBITA, MAIOR ÍNDICE DE HOSPITALIZAÇÃO POR EFEITOS COLATERAIS DOS MEDICAMENTOS, ABANDONO DE PRESCRIÇÃO</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é bom, visto estudos paradigm e pioneer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril , Positivo: Melhora dos sintomas , Negativo: Tosse</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51, Positivo: A minha insuficiência cardíaca foi controlada, Negativo: Não senti.</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou significativamente minha função cardíaca, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É super eficiente para meu problema cardíaco</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: M, Positivo: M, Negativo: M</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pq eu tive melhora da minha doença cm essa medicação + ele custa mto caro</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Concor, aldactone e carvedilol, Positivo: Entresto: parei de me internar a minha injeção de fração melhorou e nunca + tive crise cm apenas 2 dias de uso eu já sentir uma melhora inexplicável , Negativo: Cm entresto eu n tive resposta negativa so positiva</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concor, aldactone, carvedilol, Positivo: Baratos, Negativo: Não tiveram o o mesmo efeito</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Medicamento e muito bom, porem caro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com Entresto 24/26, Positivo: Com este medicamento, melhorei muito mesmo sem falta de Ar e o Cansaço diminuiu muito., Negativo: Tinha muita falta de ar e cansaco constante</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Elanapril , Positivo: Com Entresto eu fiquei bem melhor, cansaço e falta de ar desapareceu., Negativo: Nao ttive negativo somente positivo com o entresto</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Muito bom</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Divalol 25 mg, Positivo: Melhor para insuficiência cardíaca não , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Divalol, Positivo: Melhora , Negativo: Não tem</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Pq e muito caro e muitos não tem condições de comprar e o remédio é muito eficiente e necessário para o paciente cardíaco.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Minha mãe iria ter que fazer uma cirurgia para trocar a válvula do coração q estava funcionando 37% E ai começou a fazer o tratamento com o Entresto e agora esta 62% . E não será necessário a cirurgia., Negativo: Muito caro e difícil de achar</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103, Positivo: Garantia de sobrevivencia futura, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aprovel 150, Positivo: Idem ao anterior, Negativo: Nenhum</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Enfrento, selozok, xarelto, rosuvastatina, espironolactona, digoxina, furosemida. , Positivo: Remédios receitados para minha cardiomeopatia e tem atendido. , Negativo: Não acusou nenhum efeito negativo até o momento.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na respiração, não canso mais depois que comecei as a usar, Negativo: O preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, caverdilol , Positivo: Conforto na respiração mas não totalmente, Negativo: Baixa no libido</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio necessário de alto custo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na ocorrência de taquicardia , normalização da pressão , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Não tive reação nenhuma , Negativo: Nada</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Prefiro não comentar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Intresto e Valsartan, Positivo: Me deixou com batimentos mais tranquilos. , Negativo: Meio tonta no começo, enjoo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Intrasto, Positivo: Me deixou mais tranquila com os batimentos cardíacos. , Negativo: No começo enjoo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é de uso contínuo para a pessoa portadora de insuficiência cardíaca, com alto custo, porque não existe genérico.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Minha mãe estava internada com insuficiência cardíaca congestiva grave, já tendo usado todos os demais medicamentos possíveis. O médico recebeu uma amostra grátis desse medicamento e prescreveu para ela. Na mesma semana que ela começou a tomar, já teve melhora e alta médica. Esse medicamento mudou a vida da minha mãe para melhor, com ótima qualidade de vida., Negativo: O efeito negativo é o preço, pois são necessárias mais de 2 caixas por mês, ao custo de R\$95,00 por caixa.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, esse remédio foi a melhor cpisa que já fizeram pelos cardiacos, porem seu custo é elevado o que dificulta o tratamento pelos aposentados e ou baixa renda</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto/ eliquis, Positivo: esses medicamentos salvaram a minha vida, porem dependo de outras pessoas para comprarem para mim, visto que não ganho para isso, Negativo: não tenho o que declarar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: xarelto, Positivo: ajuda mas não como o Entresto, Negativo: ele não melhou minha qualidade de vida como o Entresto</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Obtive melhora FE de 23 para 38. Em 10 meses de uso do Entresto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51, Positivo: Obtive melhora FE de 23 para 38. Em 10 meses de uso do Entresto. , Negativo: Valor muito elevado</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sendo um medicamento eficiente, o mesmo irá diminuir atendimentos cardiacos de emergencia em hospitais.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97mg, Positivo: Não senti nenhum sintoma de contra indicação, Negativo: Elevação dos leucócitos na urina, na troca do medicamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartan, Aradois, Entresto, Positivo: Entresto Não tive reações adversas, Negativo: Aumento de leucócitos na urina com Losartan</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entrego 24/26 mg, Positivo: Esse remédios fez o batimento cardíaco da minha ficar controlado. Ela tinha pulsação de 130 batimentos por minuto, ela tem 85 anos. Depois do remédio, a pulsação dela baixou pra 55, Negativo: Sonolência</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação Sacubitril valsartana apresenta forte evidência de redução de mortalidade e internação em IC fração de ejeção reduzida (20%). è nivel de evidencia IB nos guidelines americano e europeu, e na pratica clinica promove melhora importante para estes pacientes graves, alem de redução de desfechos duros.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril valsartana, Positivo: melhor clinica importanteredução da taxa de reinternaçãoredução de morte subita e mortalidade geral, Negativo: observar hipotensão e hipercalemia. Ajustar demais medicações adjuvantes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: espoironolactona, beta-bloqueadro, BRA ou iECA, Positivo: Remodelamento reverso, Negativo: hipercalemia, hipotensão</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio de custo alto para uso contínuo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou o cansasso físico., Negativo: Tontura, e pressão arterial muito baixa.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concor, aldactone., Positivo: Melhorou os sintomas da insuficiência cardíaca de modo geral., Negativo: Pressão baixa e tontura.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque o custo do medicamento é alto para a população de baixa renda.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: No momento é o único medicamento para o tratamento da insuficiência cardíaca crônica. , Negativo: Até o momento não apresentou nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, poime operei coloquei uma valvula metalica tenho insuficiencia cardiaca e tinha liquido nos pulmoes depois que comessei a tomar entrsto nunca mais tive esse problema nem presisei ser internado ja faz um ano e meio</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: tira o liquido dos pulmoes e da forca ao coracao, Negativo: nem um</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: losatana, Positivo: ENTRESTO TIRA O LIQUIDO DOS PULMOES E DA FORCA AO CORACAO, Negativo: losatana nao tir liquido dos pulmoes</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Existe evidência de redução de mortalidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Valdartana- sacubitril, Positivo: Os pacientes em uso mostraram melhor controle clínico e redução de internação , Negativo: Hipotensao</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECABLOQUEADORES AT1BetabloqueadoresDiuréticos Digitálicos, Positivo: Todos trazem melhora e podem ser suficientes para controle da insuficiência cardíaca .Entretanto, alguns pctes necessitam de terapêutica adicional , Negativo: Hipotensão , tosse seca, bradicardia, Intoxicação digitalica</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diminui mortalidade e Internamentos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , digoxina, aldactone, furosemda e enalapril , beta bloqueadores cardioseletivos, Positivo: Betabloqueadores diminuem mortalidade e fração de ejeção Digoxina reduz sintomas, inibidores de Eca melhora função , digoxina e diuréticos não melhoram sintomas congestivos mas não ganhe na mortalidade ou melhora da fração de ejeção , Negativo: Entresto preço IECA tosse , baixa pressão , aumenta potássio Digoxina intoxicações, alterações elétricas Diuréticos espoliam Na, K Aldactone aumentam potássio , não devem serem usados em pacientes renais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Digoxina. ICA. Aldactone, diuréticos , betabloqueadores cardioseletivos, Positivo: Todos melhoram sintomas , Negativo: Digoxina intoxicações, alterações elétricas , vômitos IECA retenção de potássio e tosse e alergias Aldactone aumenta potássio, mamas e não devem serem usados em renais Diuréticos perda de sódio e potássio</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sofro de Miocardiopatia periparto cuja sequela foi insuficiência cardíaca de grau III, por um ano não me adaptei ao tratamento convencional sofrendo variados efeitos colaterais! Iniciei o entresto antes mesmo da comercialização e minha fração de ejeção melhorou em saída de 30 para 40, portanto melhora de mais de 20%, faço parte de um grupo de mães com mesma sequela e maioria melhorou com o uso do medicamento, apenas uma não se adaptou mantendo o tratamento tradicional!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na fração de ejeção ventricular esquerda superior a 20% passando de 32 para 40., Negativo: Vertigem postural, contudo sentida com a menos intensidade quando fazia uso do tratamento convencional.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, acertil e Losartana!, Positivo: Não houve efeitos positivos, a FEVE não melhorou., Negativo: A losartana causou tonturas constantes. Enalapril causou tosse incontrolável e foi logo substituído pelo acertil que apenas amenizou a tosse!</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, todos os portadores de doença cardíaca principalmente insuficiência cardíaca necessitam do medicamento Entresto, o preço é de alto custo, portanto, o seu fornecimento através da rede pública ajudaria bastante.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ácido acetil salicílico, lasix, Positivo: todos melhoraram o meu estado de saúde, sou portador de insuficiência cardíaca e principalmente com o Entresto melhorou bastante., Negativo: não ocorreu efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ácido acetil salicílico, lasix e entresto , Positivo: melhoram bastante o meu quadro de insuficiência cardíaca, Negativo: não ocorreram efeitos negativos</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque sofro de insuficiência cardíaca grau IV e estou tomando este remédio e estou me sentindo muito melhor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Há quase dois anos estou tomando o Entresto., Positivo: Me sinto melhor, já consigo deitar na cama para dormir, a tosse diminuiu bastante, estou menos cansado., Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro dos medicamentos, Positivo: Não sei, Negativo: Não sei</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento tem um custo muito alto e é indispensável para o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Ele é o único que controla minha pressão arterial e meu funcionamento cardíaco. Já infartou e fez cirurgia de revascularização cardíaca (fiz cinco pontes)., Negativo: Nada de negativo com relação ao medicamento a não ser o preço. 205,70 com desconto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Sacubitril 97mg/valsartana 103mg Via oral, Negativo: Somente o preço.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de alto custo para pessoas que necessitam do mesmo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: 1 maleato de enalapril2 sacubitril/salvartana, Positivo: 1 Melhora do quadro da doença2 Melhora substancial dos sintomas da doença, Negativo: 2 efeito colateral acentuado de queda da pressão arterial.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entrego 49/51, Positivo: Minha fração de ereção aumentou, Negativo: Queda da.pressao arterial</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entrego e.carvedilol, Positivo: Manteve o que estava, Negativo: Não obtive muito sucesso</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho obtido muitas melhorias com o medicamento, acredito que ajudará outras pessoas com o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhoria nas dores no peito, falta de ar, tontura e inchaço., Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inalapril, Positivo: Desconheço., Negativo: Muita tontura.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio alto custo continuo e muito importante para população.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Controle dos batimentos cardíacos. Disposição física., Negativo: Até o momento nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuaria de entresto e minha qualidade vida aumentou desde que comecei a usar, o medicamento melhora a dispnea e a qualidade de vida do paciente bem como crises de hipotenciao arterial.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103, Positivo: Melhor qualidade de vida melhor controle de crises de dispneia e de edema de pulmao e tb retencao hidrica, Negativo: Nao tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Maleato de enalapril, Positivo: Efeitos positivos de controle da doenca, Negativo: Muitos efeitos colaterais, hipotenciao arterial, mal estar to tura, e tb aumento do potassio, nao consegui tomar a dose alvo e tive que diminuir o uso para somente a noite que nao é o idela para controle da doenca.</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Me desculpa mas não entendi a pergunta acima.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou tendo com o entresto e o concardio. , Positivo: Estou tendo bons resultados. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou minha disposicao e respiracao, Negativo: Nao tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Benecar, Positivo: Nao dava resultado, Negativo: Nap dava resultado</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ENTRESTO , Positivo: Diminuição do inchaço das pernas, acabou a falta de ar, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos (PARADIGM) realizados são absolutamente incisivos em relação à diminuição de mortalidade, morbidade e internações, fazendo com que os pacientes portadores de IC tenham excelentes desfechos de uma forma sólida e comprovado através de ensaio clínico.Sou coordenador de um ambulatório que trata desses pacientes de forma gratuita e com doações, tive acesso ao medicamento em questão, que mostrou-se absolutamente eficiente no que se propunha, sendo inclusive utilizado em pacientes de maior gravidade.Como não há medicação que sequer seja parelha nos dados de diminuição de desfechos, creio que seja absurdo que os pacientes do sus não tenham acesso ao produto.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SACUBITRIL + VALSARTANA, Positivo: Clara melhora clínica de pacientes em descompensação de insuficiência cardíaca com FÉ deprimida., Negativo: Não houveram</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SACUBITRIL + VALSARTANA, ENALAPRIL, CAPTOPRIL, RAMIPRIL, LOSARTANA, CANDESARTANA, SUCCINATO DE METOPROLOL, CARVEDILOL, NEBIVOLOL, BISOPROLOL, ESPIRONOLACTONA, HIDRALAZINA + NITRATO, IVABRADINA, Positivo: Todas as medicações descritas agem no intuito de diminuição da mortalidade e de internações no paciente com IC, Negativo: Bradicardia, hipotensão, hipercalcemia, disfunção renal.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Remédio Entresto, Positivo: Não senti efeitos colaterais , Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos (PARADIGM) realizados são absolutamente incisivos em relação à diminuição de mortalidade, morbidade e internações, fazendo com que os pacientes portadores de IC tenham excelentes desfechos de uma forma sólida e comprovado através de ensaio clínico.Sou coordenador de um ambulatório que trata desses pacientes de forma gratuita e com doações, tive acesso ao medicamento em questão, que mostrou-se absolutamente eficiente no que se propunha, sendo inclusive utilizado em pacientes de maior gravidade.Como não há medicação que sequer seja parelha nos dados de diminuição de desfechos, creio que seja absurdo que os pacientes do sus não tenham acesso ao produto.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SACUBITRIL + VALSARTANA, Positivo: Clara melhora clínica de pacientes em descompensação de insuficiência cardíaca com FÉ deprimida., Negativo: Não houveram</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SACUBITRIL + VALSARTANA, ENALAPRIL, CAPTOPRIL, RAMIPRIL, LOSARTANA, CANDESARTANA, SUCCINATO DE METOPROLOL, CARVEDILOL, NEBIVOLOL, BISOPROLOL, ESPIRONOLACTONA, HIDRALAZINA + NITRATO, IVABRADINA, Positivo: Todas as medicações descritas agem no intuito de diminuição da mortalidade e de internações no paciente com IC, Negativo: Bradicardia, hipotensão, hipercalcemia, disfunção renal.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamentos que ajudam pessoas precisam ser incorporado sim, visto que, a maioria não consegue ter acesso a medicamentos com alto custo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Rosuvastina, Positivo: Redução de placas de arterona, Negativo: Dores nas pernas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Valsartana 320, Positivo: Quase nenhum, Negativo: Dores no corpo e pressão desregulada</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Faz bem para a saúde delicada dele, Negativo: Ele está trêmulo, não sei se é desse medicamento ou dos outros</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ancoron,levotiroxina sodica,lasix,motilium,aldactone,rusovas,a as,ezomeprazol,, Positivo: Mediante tantos remédios não sei quais os efeitos positivos, Negativo: Não sei também devido a grande quantidade de remedios</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Muito bom</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Divalol 25 mg, Positivo: Melhor para insuficiência cardíaca não , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Divalol, Positivo: Melhora , Negativo: Não tem</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicamento de ótima eficácia, com resultado de melhora rápida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Medicamento com efeito positivo que age rápido no organismo., Negativo: não tem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É importante a incorporação de tal medicamento no rol dos medicamentos fornecidos pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ensertro, Positivo: Controle da pressão arterial , Negativo: Não identificado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Maleato de enalapril, Positivo: Controle da pressão arterial , Negativo: Não mais estava gerando os resultados esperados</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessária atualização dos medicamentos fornecidos pelo SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Uso inicial (2 meses), Negativo: Uso inicial</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários, Positivo: Ineficácia, Negativo: Ineficácia</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio muito caro. Tenho dificuldade para comprar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou minha insuficiência cardíaca , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entretanto 24/26 mg, Positivo: Melhorou a capacidade cardíaca do meu pai, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe faz uso desse medicamento e ele melhorou a qualidade de vida dela pelo no sus seria de muita ajuda a ela que é pensionista com um salário mínimo faz uso de outros medicamentos caros e paga aluguel.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sacubitril/vasartana, Positivo: Melhorou a qualidade de vida , mais disposição pra andar menos fadiga., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Losartana , Positivo: Controlava a pressão, Negativo: Deixava com fadiga</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação é muito boa, de alto valor e deveria ser acessível para todos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, ICC., Positivo: Tratamento vem dando certo, a ICC está estabilizada., Negativo: Não há efeitos negativos. A única questão é que o medicamento é caro e deveria estar acessível para todos, disponibilizado pelo governo.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ýfgghhj, Positivo: Xfvbbnh, Negativo: Sdghjjj</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dfghn, Positivo: Dfhj, Negativo: Fghjj</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É UM MEDICAMENTO NECESSÁRIO, MUITO BOM, PORÉM MUITO CARO</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: QUASE NÃO SINTO CANSAÇO NEM FALTA DE AR, MELHOROU MINHA DISPOSIÇÃO, Negativo: VALOR MUITO ALTO</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora nas condições de sobrevivência após infarto do miocárdio, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Positivo: Nenhum, Negativo: Não observado</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entresto tem dado um ótimo resultado ao meu tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Entresto melhorou minha circulação sanguínea pois não estava conseguindo nem ereção com ele houve uma melhora considerável., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xarelto, Positivo: Ainda pouco eficaz, Negativo: Falta de ereção</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento se torna muito caro pra pacientes de baixa renda. Além disso, nós pacientes fazemos uso de outros medicamentos de uso contínuo que também requerem custo e a alimentação que deve ser rigorosamente controlada. A compra desse medicamento se torna inviável para quem tem renda mensal de um salário mínimo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: O cardiologista indicou esse medicamento pra insuficiência cardíaca crônica que possuo. Sou paciente Cardiopata gravíssima., Negativo: Muito caro.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Brasart 160mg, Positivo: Era bem mais barato em relação ao Entresto., Negativo: Não estava surtindo efeito desejado no tratamento da insuficiência cardíaca e estava causando edema em MMII</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Com este medicamento o paciente tem uma melhora circunstancial nos índices</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Diovan, Positivo: Melhora na frequência da pressão arterial, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Estou vivo, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para o meu tratamento esta sendo muito bom</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto e eliquis, Positivo: Em conjunto melhoraram significativamente o quadro clínico como a qualidade de vida, em termos de andar, função respiratória e disposição., Negativo: Só observamos efeitos positivos desde o início do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concor, Carvedilol, enalapril, propranolol, furosemida, espironolactona, amiodarona, atorvastatina, Positivo: Foram mudanças atrás de estabilizar devido ao agravamento da doença, Negativo: Não estava controlando a pressão e o batimento cardíaco</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sendo um usuário do medicamento, não posso concordar, uma vez que como usuário deste remédio há 1 ano e 7 meses. O mesmo foi passado pelo meu cardiologista, após uma consulta prévia se tinha condições de comprar ao preço de R\$ 199,75, com um desconto de 35% dado pelo laboratório. se fosse me oferecido hoje não aceitaria, devido ao meu poder aquisitivo. Estou há 2 anos sem reajuste e a previsão é só para 2020 (funcionário público Ministério da Educação) Já contribuo com o SUS, em média 900 reais, mais 827 de plano de saúde, haja salário para manter a saúde. Seria uma forma de o SUS me devolver uma pequena parte da minha contribuição.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SÃO VARIOS: ENTRESTO 97/103 Mg, CLOPIM, SINVASTATINA (farmácia popular), AAS, Selozok e outros, Positivo: Após o infarte, os medicamentos tem me mantido com a saúde estável, continuo a trabalhar, estou me sentindo bem, sendo os efeitos de todos essenciais para uma saúde estável até a presente data., Negativo: OS EFEITOS NEGATIVOS SÃO OS EFEITOS COLATERAIS QUE TODOS OS REMÉDIOS TEM. NO FUTURO E POR SER DE USO CONTINUO PODE SER QUE O MEU ORGANISMO VENHA INTERFERIR NA MINHA VIDA.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CONFORME RESPONDIDO NO ITEM 7, 8, 8.2 E 8,3, Positivo: TODOS TEM CONTRIBUÍDO PARA MANTER A MINHA SAÚDE, CONFORME RESPONDIDO NOS ITENS ANTERIORES. , Negativo: A PARTE NEGATIVOS SERIA SE EU NÃO TIVESSE CONDIÇÕES DE COMPRAR OS MEDICAMENTOS, MESMO SENDO GENÉRICO.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Antes de iniciar o tratamneto com ENTRESTO, não conseguia fazer minhas atividades devido à falta de disposição. Tudo me deixava canssado. Mudei de residencia porque tinha que subir escadas. Até o banho era difícil. Hoje me sinto bem disposto e reiniciei minhas caminhadas matinais. Realmente o medicamento me troxe excelentes benefícios. Como aposentado tenho feito o possível para manter o medicamento, mesmo com a ajuda do laboratório que tem sido primordial, tenho desconto na compra.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26, Positivo: Descritos nos comentários acima, Negativo: Especificamente para melhorar a Fração de ejeção, não tive esperiencias anteriores. mas como sou portador de Hepatite C, alguns medicamentos me trouxeram transtornos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Há 19 anos fui submetido a cirurgia cardíaca (Reconstrução geométrica do ventrículo esquerdo + Revascularização do miocárdio) tomo medicamentos de uso contínuo desde aquela época. , Positivo: Tomei Ancoron por muito tempo., Negativo: Depois o ancoron foi substituido porque comecei a apresentar alterações nas enzimas do fígado.</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento de alto custo que precisa ter disponivel no sus. Minha avó é aposentada com salario minino e necessita de toma-lo pro resto da vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sacubitril Valsartana, Positivo: Salvou a vida da minha avó, que estava com insufiencia cardiaca gravíssima já sem opção de tratamento., Negativo: Nenhum!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não me recordo o nome pois nenhum outro fez efeito., Positivo: Não tiveram., Negativo: Não fizeram efeito na doença dela.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicacao muito cara. E uso 2.caixa por mes</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Controle.para insuficiência cardiaca, Negativo: Não observei nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora considerável , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cocardio, Positivo: Melhora considerável , Negativo: Nenhuma</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo por se tratar de um medicamento de uso contínuo e caro, como eu aposentado por invalidez a várias pessoas que dependem do salário que não é muito para fazer exames, comer, vestir, 200 reais a mais no mês tiraria muitas pessoas do sufoco. E como pagamos vários impostos nada mais justo que o governo nos beneficiar com este medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51mg, Positivo: Bom estou usando o entresto a 1 ano, e eu tenho sentido menos falta de ar e cansaço., Negativo: Não notei efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Selokem, enalapril, ancorom, espironolactona é aas, Positivo: Controle de batimentos, pressão e força do coração., Negativo: Selokem e enalapril Estagnaram não fazem mais efeito no meu caso. Os outros contínuo tomando e tenho só efeito negativo com o ass que às vezes me dá queimação.</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Sim. Foi o único remédio que a cardiologista indicou e que está surgindo efeito no tratamento da minha mãe, Negativo: Preço. O valor é muito alto para o padrão dos aposentados.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não tenho em mãos o nome dos remédios, Positivo: Não tenho em mãos o nome dos medicamentos, Negativo: Não tenho em mãos os nomes dos medicamentos. Mas só sei que minha mãe continuava com dor no peito. Ela tem ponte de safena e mamaría.</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remédio de uso contínuo, com custo muito alto, meu esposo depende deste medicamento, gostaria muito se fosse fornecido pelo governo ou prefeitura, desde já agradeço e espero ser atendida em minha reivindicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto e Concor, Positivo: Atua bem pra vida das pessoas com insuficiência cardíaca, Negativo: Não observei nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto - sacubitril /valsartana. Concor - hemifuramato de bisoprolol, Positivo: Disposição para viver bem não, Negativo: Não constatamos</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuário desse medicamento e o custo é elevado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Estou tomando a 1 ano e a minha disposição melhorou. Além disso pelos testes efetuados pela laboratórios no exterior, a expectativa de vida desses pacientes aumentou em mais de 20%, Negativo: Não notei nenhum. Apenas o preço que é bem mais caro do que o medicamento que eu tomava antes.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rosucor, Somalgin Cardio, Carvedilol, Positivo: Acredito que deva ter, pois tomo por recomendação médica, Negativo: Não sei. Se tivesse o médico não recomendaria.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Endestro é um medicamento caro, como tenho 88 anos e recebo pouco na minha aposentadoria. Desta forma, se o Endestro for gratuito seria muito bem vindo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Endestro e Eliquis -, Positivo: Melhorou o mal estar, proporcionou qualidade de vida., Negativo: Nenhuma contra indicação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Endestro, Eliquis, Ancoron, Positivo: Bem estar e qualidade de vida, Negativo: Não apresentou nenhuma contraindicação</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Evita que eu passe mal e melhora um pouco meu condimento fisico, Negativo: Ser muito caro</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Usei por seis meses não senti diferença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Não apresenta mais fadiga,falta de ar ,pode caminhar normal,melhorou significativamente o quafro de insuficiência cardíaca , Negativo: Tosse</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto.Remédio que auxilia para melhores quadros a insuficiência cardíaca , Positivo: Paciente tem melhores condições de vida , Negativo: Não tive</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu pai tomava outros remédios pra pressão, mas não resolvia,depois que o médico dele recomendou trocar por Entresto, a pressão dele mudou controlou ,e o coração dele também tá num batimento mas normal</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o Entresto , Positivo: Bom meu pai ,vivia com a pressão aucilando uma hora alta outra hora baixa ,ele falava que coração dele tava sem forças com muita insuficiência cardíaca foi quando o médico falou do Entresto e tudo melhorou na vida do meu pai , Negativo: Efeito negativo é por ele ser muito um remédio muito caro</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Selozok mesmo meu toma diariamente, 3 por dia mas também é caro,o custo fica muito alto , Positivo: O selozok pro meu pai foi ótimo o coração dele agora tá com os batimentos mais controlado , Negativo: A única coisa ruim é custo que é alto, muitos não consigam comprar por ser caro todo mês gasto o salário do meu pai só no remédio pra ele</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu pai tomava outros remédios pra pressão, mas não resolvia,depois que o médico dele recomendou trocar por Entresto, a pressão dele mudou controlou ,e o coração dele também tá num batimento mas normal</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o Entresto , Positivo: Bom meu pai ,vivia com a pressão aucilando uma hora alta outra hora baixa ,ele falava que coração dele tava sem forças com muita insuficiência cardíaca foi quando o médico falou do Entresto e tudo melhorou na vida do meu pai , Negativo: Efeito negativo é por ele ser muito um remédio muito caro</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Selozok mesmo meu toma diariamente, 3 por dia mas também é caro,o custo fica muito alto , Positivo: O selozok pro meu pai foi ótimo o coração dele agora tá com os batimentos mais controlado , Negativo: A única coisa ruim é custo que é alto, muitos não consigam comprar por ser caro todo mês gasto o salário do meu pai só no remédio pra ele</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sacubitril/valsartana realmente funciona como medicamento, trazendo efetiva melhora no quadro de pessoas com insuficiência cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nenhum , Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Usei medicamentos por 6 meses não observei melhora. 2ª - Não 3ª - Não
06/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENALAPRIL//CONCOR//ALDACTONE//LOSARTANA//VALSARTANA//DIGOXINA//, Positivo: MELHORA TOLERANCIA AO ESFORÇO E FRAÇÃO DE EJEÇÃO, Negativo: NAO SAO TOOS OS PACIENTES QUE RESPONDEM 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LOSARTANA//ENALAPRIL//VALSARTANA//LOSARTANA//ALDACTONE, Positivo: MELHORA SINTOMAS E FRAÇÃO DE EJEÇÃO, Negativo: ALGUNS PACIENTES NAO RESPONDEM
05/12/2018	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou significativamente os sintomas causados pela insuficiência cardíaca. , Negativo: Tosse 3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol entresto, Positivo: Melhorou quadro de falta de ar,caminhar sem canseira e outros , Negativo: Não tive
05/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por se tratar de uma oportunidade de salvar vidas. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril/Valsartana 49/51mg, Positivo: Estou em recente tratamento., Negativo: Estou em recente tratamento. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana 50mg / Bensilato de Anlodipino 5mg / Furosemida 40mg / caverdilol 25mg / Espironolactona 25mg / Sinvastatina 20mg / Somalgin Cardio 100mg., Positivo: Melhora no cansaço. , Negativo: Minimo de esforco fisico sinto cansaço.
05/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trabalho no SUS e prescrevo para alguns pacientes que fazem todo o esforço para comprar.A redução de internação é significativa quando se prescreve a droga.A melhora clínica é o diferencial. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril Valsartana-Entresto , Positivo: Melhora clínica,melhora da fração de ejeção, redução do número de internação, E baseado em estudos,comprovadamente redução de morte súbita. , Negativo: Alguns pacientes melhoraram muito,mas pelo custo acabaram não mantendo a droga com piora clínica e reinternação .O ponto negativo é o custo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, antagonista de mineralocorticoide,betabloqueador, Positivo: As drogas se complementam,exceto o enalapril que deve ser suspenso para a introdução da nova droga.O enalapril é bom ,mas o entresto melhor, Negativo: O IECA pode causar tosse,mas podemos usar um BRA .
05/12/2018	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Estou fazendo uso do medicamento ENTRESTO, e me sentindo melhor 2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: Melhora nos batimentos e menos cansaço, Negativo: Are o momento não tive 3ª - Não
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma pessoa que recebe 1 salário mínimo, não consegue ter qualidade de vida comprando um medicamento tão caro.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Tem excelente benefício no tratamento de insuficiência cardíaca., Negativo: Muito caro.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento melhora muito a qualidade de vida de nós portadores de icc.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Diminui a falta de ar. , Negativo: Não tem pelo sus e é de alto custo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Valsartana, Selozok, alodipina, espironalactona, espartana, etc., Positivo: Tem de graça. , Negativo: Não reduz a falta de ar como com o uso do entresto.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento de auto custo para mim e provavelmente 90% da população.O governo, conforme a constituição federal, tem o dever de fornecer esse medicamento às pessoas que necessitam!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97 mg/103mg, Positivo: Fortalecimento do músculo do coração, e assim sentindo menos falta de ar e melhor qualidade de vida., Negativo: Não sinto nenhum efeito negativo com o medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bamifix 300mg, Positivo: Auxiliou na falta de ar, Negativo: Efeito pouco desejado, sendo necessário o entresto para melhor resultado do tratamento!</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente com ICC e venho fazendo uso do Entresto 24/26 há uns 8 meses sendo que eu senti uma melhora significativa, porém é um medicamento muito caro para mim, uma vez que sou aposentada por invalidez por conta dessa doença. Portanto, creio que será muito importante a incorporação do sacubitril/valsartana no SUS, pois estará favorecendo muitas pessoas nesta situação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26 mg, Positivo: Estou fazendo uso do Entresto 24/26 há uns 8 meses e estou me sentindo muito melhor, sem cansaço físico e nem congestão, me sinto mais animada e bem disposta. , Negativo: Sentia muito cansaço físico, congestão, falta de apetite e desânimo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu uso marcapasso resincronizador, faço uso de carvedilol, furosemida, espironolactona, hidroclorotiazida, amiodarona e xarelto , Positivo: Depois de colocar o marcapasso, cessaram as intervenções hospitalares., Negativo: Mesmo fazendo uso de todos os medicamentos eu ainda sentia muito cansaço físico e congestão, falta de apetite e desânimo.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso entresto gostaria q fosse gratuito</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Senti uma grande melhora no cansaço, Negativo: Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Sem cansaço, Negativo: Sem efeito negativo</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concor , Positivo: ., Negativo: .</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou minha insuficiência cardíaca., Negativo: Não tive durante o tratamento efeito negativo. (Apenas 2 meses de tratamento).</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xarelto, Selosok, Furosemida, Carvedilol, Aldactone, Procoralan, Carnitina, Lasix.Procedimentos: Cateterismos, Ressonância magnética, Ecocardiograma., Positivo: Exames ajudaram a identificar a doença. Os remédios me ajudaram na insuficiência respiratória e a estabilizar podendo assim, continuar o tratamento fora do hospital. , Negativo: Não identifiquei problemas negativos.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Antes de iniciar essa medicação tentei diversas outras que não obtiveram efeito desejável, com o entresto minha qualidade de vida voltou, melhorei minha condição de saúde, acabou o mal estar e as visitas frequentes a unidades de pronto atendimento. , Negativo: Ainda não encontrei</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pq esse medicamento é muito caro e tem pessoas que não tem condições de comprar e ele é tão bom minha filha melhorou tomando ele é no sus seria bom para,muitas pessoas</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com entresto 24/26mg, Positivo: Ele não fez mal só ajudou minha filha corre até melhor , Negativo: Não teve efeito negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Capítopril 12,5, Positivo: Ele é bom mas não fazia tanto efeito positivos como o entresto , Negativo: Ela tinha dores de cabeça e o medicamento não melhorava seus batimentos cardíacos</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação Sacubitril/Valsartana tem que ser incorporado aos medicamento do SUS , pois seu custo é muito alto para eu manter o medicamento todo mês e através desse medicamento eu obtive mais qualidades de vida, desempenho na área respiratória e cardíaca, eliminando o que mais me atrapalhava o cansaço, chieira, falta de ar , dor nas pernas....</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Produto bom para ICC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora dispneia , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ieca, Positivo: Melhora, Negativo: Nenhum</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhorou em muito minha pressão arterial e reduziu dores nas pernas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: Refução da pressão arterial e dores nas pernas., Negativo: Até agora nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro mais o nome., Positivo: Redução pressão., Negativo: Pouca eficácia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou médica Cardiologista e tenho tido excelente benefícios com à medicação, reduzindo internação e melhorando qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Saccubitril/valsartana , Positivo: Melhora importante dos sintomas , melhora na qualidade de vida ,diminui reinternação e quando iniciado na fase hospitalar conseguimos alta precoce ., Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Digoxina ,lvabradina,carvedilol , Positivo: Houve melhora relativa dos sintomas , Negativo: Bradicardia, broncoespasmo, hipotensão</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai estava muito mal, não conseguia dormir, comer, nem lavar o cabelo, quatro dias após iniciar o tratamento com Entresto ele já melhorou.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sacubitril Valsartana, Positivo: Melhora significativa no cansaço e o sintoma de afogamento desapareceu, Negativo: O preço, impossibilidade de material o tratamento a longo prazo</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento importante pra manutenção da saúde dos usuários</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Ajuda na manutenção da vida., Negativo: Não vejo nenhum efeito</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação tem resultado satisfatório para melhoria clínica do paciente com insuficiência cardíaca</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sarcubitril/valsartana , Positivo: Melhora da dispnéia, ortopneia, congestão, edema periférico, remodelamento cardíaco, capacidade funcional. , Negativo: Principal efeito negativo foi hipotensão na fase inicial do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Redução dos sintomas de insuficiência cardíaca, melhora do remodelamento cardíaco. , Negativo: Hipotensão na fase inicial</p>
05/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de substância que notadamente tem melhorado a qualidade diária de vida dos pacientes consequentemente proporcionado maior sobrevida</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Resposta rápida ao tratamento da função cardíaca, melhora na disposição física (dentro dos limites da doença) , Negativo: Pequena vertigem de postura comum dos demais tratamentos cardíacos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EnalaprilLosartana, Positivo: Apenas manteve a doença estável, não houve melhora nem piora., Negativo: Muita tosse e muita tontura. Dia a dia se tornava desconfortável</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: MELHORA MINHAS CONDIÇÕES FISICAS., Negativo: ABAIXA MINHA PRESSÃO</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CARVEDILOL, Positivo: ME DEIXA MAIS ANIMADA, Negativo: NÃO TENHO</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: VARIOS, Positivo: MELHORA ACENTUADA DA INSUFICIÊNCIA CARDIACA CONGESTIVA, Negativo: JÁ VINHAM USANDO ESSES PRODUTOS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, BRA, BETA BLOQUEADORES, ESPIROLACTONA, DIURETICOS, Positivo: MELHORA FUNÇÃO CARDIACA E CLINICA COM USO DO ENTRESTO, Negativo: NÃO TIVE EFEITOS NEGATIVOS C/ ENTRESTO, COMEÇANDO CONFORME O RPOTOCOLO</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento tem ajudado a diminuir sintomas e número de internações de pacientes, porém o valor é muito alto. A sua distribuição poderá ajudar muito mais pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: sacubitril /valsartaba, Positivo: diminui os sintomas, Negativo: pressão baixa</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: inalapril, Positivo: inalapril ajuda em manter a pressão baixa , Negativo: Não se mostra tão eficiente quanto o medicamento em questão</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai faz uso desta medicação...Porém ele é aposentado recebe um salário mínimo...Gasta em média 500,00 p mês.. .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento controla traz resultados satisfatórios para insuficiência cardíaca e como consequência controla a pressão arterial. Meu pai não foi mais hospitalizado após o início do tratamento. O único ponto negativo é o preço, não estando ao alcance das pessoas que precisam dele.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51 mg, Positivo: Estabiliza minha cardiopatia miito bem, Negativo: Ainda não os percebi</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ancoron, enalapril, diaqua, concor, Positivo: Segundo meu medico à medicação é necessaria pra meu problema cardiaco, Negativo: As vezes tenho muita sonolencia</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No momento, medicação fundamental no tratamento da ICFER. Evidências científicas robustas. Comprovação no mundo real.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartana, Positivo: Melhora impactante da classe funcional.Melhora da fração de ejeção., Negativo: Hipotensão arterial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, BRA, betabloqueador, Nitrato/Hidralazina, Ivabradina, Positivo: Redução de mortalidade, melhora da qualidade de vida, Negativo: Tosse, bradicardia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação já tem comprovada eficácia na melhora do prognóstico dos pacientes, devolvendo a qualidade de vida a eles e diminuindo internações que sobrecarregam hospitais</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril / Valsartana, Positivo: Melhoras de sintomas Menos internações Melhora de sobrevida, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECAs Espironolactona Betabloqueadores, Positivo: Semelhantes, Negativo: Hipotensão, bradicardia, recorrência de sintomas</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Caso o medicamento não seja disponibilizado pelo SUS, NÃO teremos como dar continuidade no tratamento com ENTRESTO 24/26 mg por seu PREÇO ser bastante ELEVADO.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO 24/26 mg, Positivo: A avaliação quem faz é o cardiologista. Por enquanto, com o uso do ENTRESTO 24/26 não posso avaliar especificamente, porque, faço uso concomitante de outros medicamentos para insuficiência cardíaca. Ao menos posso afirmar que não senti tontura ao tomar o remédio!, Negativo: O preço deste medicamento ENTRESTO é bastante caro, mesmo com o desconto do vale mais saúde!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: VASTAREL 35 mg HIDRION 40/100 mg ESPIRONOLACTONA 25mg DIGOXINA 25 mg CAVERDILOL 6,25 mg ENALAPRIL 10mg (NÃO FAÇO MAIS USO deste medicamento!), Positivo: Baixa a pressão arterial e alguns dos medicamentos são diuréticos. Emagreci 15 kg, Negativo: Apenas Enalapril 10mg causava-me tontura sempre ao tomá-lo. NÃO tomo mais este medicamento!!!</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto (sacubitril + valsartana), Positivo: Melhora da função miocárdica, Negativo: Hipotensão 23%</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina, Positivo: melhora dos níveis tensionais e de glicemia, Negativo: hipoglicemia com empaglifozina</p>
07/12/2018	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Entresto, está incluindo é recomendado nas diretrizes Americanas, Europeia e Brasileira. Reduz significativamente a mortalidade cardiovascular, hospitalizações e reinternações por Insuficiência Cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto e Ieca, Positivo: Entresto: Melhora significativa dos sintomas, melhora na qualidade de vida e redução de hospitalização., Negativo: Ieca: Frequente internações e tosse como efeito adverso.</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, esta medicação, comprovada cientificamente, é um importante instrumento no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca, uma das maiores causas de mortalidade no mundo, não havendo outra que a substitua em suas características.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inumeráveis!, Positivo: Devido ao grande número de medicamentos, utilizados em meu arsenal terapêutico, seria impossível descrever todos aqui., Negativo: Impossível!</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BETA BLOQUEADORES DIVERSOS; INIBIDOR DA ALDOSTERONA; IECAs; BRAS; DIURETICOS DIVERSOS;, Positivo: Os de bula, Negativo: Os de bula</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque faço uso da medicação e estou tendo uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Caverdilol 25 mg, Positivo: Razoável., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora visível no quadro do paciente cardíaco, Negativo: Kvscgscgshssso hj</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sinvastatina, Positivo: #jjgfvhgvghvghvfdghcgucch, Negativo: #.....nnnnnImmmmmhhhhhhhhhhgffff</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Pressao baixa parou a tosse totalmente, Negativo: Nao teve. Uso 6 meses</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anlodipino aradois espartana idapamida, Positivo: Baixou pressao, Negativo: Alergia respiratória. Muita tosse dia e noite</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio ajudaria muitas pessoas que não tem condições financeirasde comprar esta medicação</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhoria nas condições cardíacas do paciente, Negativo: Não apresentou</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concor, Positivo: Melhora do paciente respiração , Negativo: Sonolência</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concor, Positivo: Melhora respiração , Negativo: Sonolência</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da arritmica cardiaca, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não me lembro o nome, Positivo: Não fez efeito desejado, Negativo: Preço</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso o medicamento e so me fez bem tenho insuficiencia cardiaca</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Uma melhora muito boa, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A insuficiência cardíaca é uma doença crônica e progressiva que causa grande perda de qualidade e quantidade de vida. A medicação disponível atualmente é insuficiente frente às necessidades dos pacientes. O sacubitril/valsartana é medicação aprovada pela ANVISA para uso por tais pacientes e demonstrou grande efetividade em estudos clínicos. Apesar do custo, seu uso está absolutamente justificado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos., Positivo: Melhora clínica importante de pacientes que já não encontravam remissão de sintomas com uso do esquema anterior., Negativo: Hipotensão arterial.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, espirolactona, carvedilol, bisoprolol, ramipril, captopril, lisinopril, metoprolol, digoxina, dobutamina, milrinone, furosemida. bumetamida, etc., Positivo: Espaço insuficiente para tal. Sugiro consultar diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia que descreve com exatidão todos estes benefícios., Negativo: Medicação é insuficiente para permitir remissão permanente dos sintomas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor do medicamento no Sus pois sou aposentado, ganho pouco, tenho que pagar um absurdo de convênio. É compro o medicamento com muito sacrifício.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Me sinto melhor depois que passei a tomar o medicamento , Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ass, carvedilol, , Positivo: Tratamento, Negativo: Com o tempo já não estava com a mesma eficacia</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio extremamente caro e importante para minha vida, comprometendo grande parte de meus rendimentos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vários outros, Positivo: O Entresto melhorou significativamente meu bem estar, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entreato 49/51, Positivo: Melhor condicionamento físico Evitou internações frequentes, Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diovan, Positivo: Nada a declarar, Negativo: Não houve melhora no quadro</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Ele será muito bom se for um medicamento pelo sus</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Concor, Positivo: Mmmmm, Negativo: Mmmmm</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mmm, Positivo: Mmmmm, Negativo: Mmmm</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Me senti vivo, Negativo: Só no bolso e caro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Vivo, Negativo: Caro</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso contínuo, sou aposentado e compromete muito minha renda</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente e faço uso da medicação</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Caverdilol, entresto, aldacotone, Positivo: Todos me fizeram bem pois sai de um quadro de risco por conta de insuficiência cardíaca para uma situação controlada, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Valsartana , Positivo: Nenhum, Negativo: Baixou minha pressão e não fiz mais uso</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido ao uso do medicamento meu irmão está vivo. Problema é que ele é uma medicação um pouco cara.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venzer, Vasopril, Entresto, Positivo: Melhorou a vida do meu irmão e mãe ., Negativo: Medicacao cara</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Losartana , Positivo: Baixava a pressão , Negativo: Com o passar do tempo não funciona mais</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51 mg, Positivo: Estabiliza minha cardiopatia muito bem, Negativo: Ainda não os percebi</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ancoron, enalapril, diaqua, concor, Positivo: Segundo meu medico à medicação é necessaria pra meu problema cardiaco, Negativo: As vezes tenho muita sonolencia</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Acabou com a falta de ar proveniente de água no pulmão consequência da insuficiência cardíaca e constante internações do paciente.Desde que começou a tomar o medicamento o paciente não precisou mais ser internado. 1 ano e 3 meses tomando o medicamento., Negativo: Apenas o custo como negativo. Pois o paciente não teve nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Digoxina, Positivo: Não estava mais fazendo efeito positivo. Paciente tinha internações recorrentes l, Negativo: Recorrentes internações</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Indicação deve ser para pacientes que não estão respondendo favoravelmente ao uso de outros bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos para o tratamento da insuficiência cardíaca, incluindo sacubitril/valsartana, Positivo: Resposta favorável no tratamento superior ao uso de inibidor de enzima de conversão da angiotensina e antagonista de receptor., Negativo: Hipotensão arterial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos para o tratamento da insuficiência cardíacainibidor de enzima de conversão da angiotensina, antagonista de receptor da angiotensina, antagonista mineralocorticóide, beta-bloqueador, digitálico, Positivo: Têm pacientes que não respondem adequadamente ao tratamento com inibidor de enzima de conversão da angiotensina e antagonista de receptor., Negativo: Hipotensão, piora da função renal</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Positivo: Melhora do cansaço, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Varios, Positivo: Melhora do quadro, Negativo: Necessário uso de varios os conjuntamente</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A literatura é amplamente favorável ao uso deste farmaco. Na evolução clínica de pacientes em uso de sacubitril notamos efeitos farmacológicos que respaldam a melhora evolutiva e o melhor prognóstico ao paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril, Positivo: Efeitos são fantásticos com melhora clínica em qualidade e quantidade de vida ao paciente , Negativo: Hipotensão eventualmente no início de tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diuréticos, betabloqueadores, inibidores de Eça, Bra, Positivo: Todos são amplamente utilizados e com muito bons efeitos. O sacubitril acrescentou qualidade e melhora evidente aos fármacos já consagrados à literatura médica , Negativo: Inerentes à cada paciente em específico, alguns causam brinco-de-passarinho, hipotensão arterial...</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Redução de morte cardiaca, Negativo: Hipotensao</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ieca e bra , Positivo: Menos eficazes, Negativo: Hipotensao</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os evidentes benefícios orientam ao uso do sacubitril valsartana na patologia descrita, com redução de internações e conseqüente redução de custos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com sacubitril valsartana em pacientes portadores de ICC crônica sintomática, Positivo: Melhora significativa da dispnéia, com aumento da capacidade física, e grande melhora da qualidade de vida., Negativo: Leve náusea no início do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECAs, BRAs, diuréticos, beta bloqueador, Positivo: Melhora da dispnéia, da congestão pulmonar, redução da frequência cardíaca., Negativo: IECAs-tosse, hipotensão arterial sintomática, Diuréticos-hiponatremia, desidratação, Beta bloqueador -bradicardia</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não podemos ser contra ao uso de uma medicação que demonstrou reduzir mortalidade por todas as causas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso de IECA (Enalapril) para tratamento de IC CF II a IV temos bons resultados; Uso de Beta bloqueadores (carvedilol, bisoprolol, Metoprolol) no tratamento da IC também tem demonstrado sucesso;, Positivo: IECA - melhora remodelamento cardíaco e diminui mortalidade; BB - diminui mortalidade , Negativo: IECA - contra indicados em pacientes gestantes, hipercalcemia grave, Lesão Renal Aguda, podem causar tosse, angioedema... BB - podem causar bradicardias e são contraindicados em pacientes com bloqueios AV de segundo e terceiro grau além de pacientes com IC descompensada congestos com PÁS < 90mmHg</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de uso contínuo e de custo incompatível para grande parte dos pacientes que precisam utilizá-lo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Graças a esse medicamento obtive um resultado excepcional. , Negativo: Não houve efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente, (usuário) desse medicamento, que me faz bem. Mesmo cadastrado no sistema do Vale Mais Saúde, pra poder comprar com desconto, não estou conseguindo dar um prosseguimento contínuo ao tratamento, sempre dou um tempo para poder me capitalizar pra fazer nova aquisição do medicamento. Ele sendo distribuído pelo SUS, poderei dar prosseguimento ao tratamento ininterruptamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho usado a medicação para muitos e muitos pacientes com ICC de várias etiologias com resultados excelentes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto/Carvedilol/bisoprolol/espironolactona/ECABRAS, Positivo: Entresto-medicação que quando bem usada apresenta resultados excelentes na ICC, associação dos demais já é clássica na ICC., Negativo: Cuidado com o efeito hipotensivo do Entresto.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nitratos e Hidralazina/diuréticos , Positivo: Alternativos a medicação "padrão" , Negativo: Taquicardia, hipotensão</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Creio que todos os clientes do SUS devam ter acesso aos medicamentos necessários a seu tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: sacubitril/valsartana, Positivo: faço uso continuo do entresto e ele tem melhorado minha condição de saúde., Negativo: para mim nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Naprix, Positivo: apenas no início do tratamento, Negativo: ao longo do tempo não estava sendo eficaz</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É o melhor tratamento para insuficiência cardíaca, totalmente aprovado pelas diretrizes europeia e americana.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, carvedilol, metoprolol, bisoprolol, espironolactona, hidralazina. A , Positivo: Entresto - peptídeos natriureticos(ação do Sacubitril), os demais medicamentos melhoram a contratilidade por mecanismos variados., Negativo: Hipotensão, bradicardia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos citados acima. , Positivo: Idem 8.2, Negativo: Idem 8.3</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ja é indicacao em diversas diretrizes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana - entresto, Positivo: Melhora da classe funcional e qualidade de vida do paciente, Negativo: HipotensãoAlto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EnalaprilCarvedilolFurosemidaEspironolactona, Positivo: Melhora clinica e melhora da função sistolica, Negativo: Limitação em pacientes com comorbidades</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do medicamento, onde passo muitas dificuldades para comprar o remédio devido o custo ser muito alto, sobrevivo com um salário mínimo, e dependendo desse medicamento para viver.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Brilinta, entresto, Positivo: Tomo entresto atualmente, pois meu coração funciona apenas 28%, dependo desse medicamento, pois estou na fila do SUS para fazer transplante de coração., Negativo: Meu coração não reagiu a esses medicamentos, mas tomo atualmente até fazer o transplante, o entresto 93/102</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Brilinta, entresto, sevastatina, diocxina, Positivo: Contribuem para que eu tenha uma vida pouca ativa, até fazer o transplante de coração., Negativo: Até o momento estou conseguindo ter uma vida pouca ativa com os medicamentos.</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento que realmente faz a diferença na qualidade de vida e na evolução da doença; benefícios comprovaria, menor taxa de internação hospitalar</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora dos sintomas, melhor capacidade funcional , Negativo: Ainda não observei nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol , Positivo: Melhora sobrevida , Negativo: Nao melhora 100%</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É UMA MEDICAÇÃO DE RESULTADO COMPROVADO E TEM PROMOVIDO QUALIDADE DE VIDA A MUITAS PESSOAS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SACUBITRIL+VALSARTANA, Positivo: MELHORA DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO, Negativo: NÃO SENTIDO PELO MEU PACIENTE</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: FUROSEMIDA, Positivo: DIURÉTICO, Negativo: HIPOTENSÃO</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sacubitril/valsartana tem indicação classe I para tratamento de insuficiência cardíaca classes II-IV nas diretrizes brasileiras, europeias e americanas. A incorporação desta medicação ao arsenal de tratamento do SUS poderia fornecer benefícios adicionais ao tratamento dos pacientes com IC com fração de ejeção rebaixada frente às drogas disponíveis na rede pública. Neste sentido, sugiro que ela seja disponibilizada para os pacientes com IC classe II-IV.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Aqueles descritos nos estudos clínicos, Negativo: Aqueles descritos nos estudos clínicos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta-bloqueadores, Inibidores da ECA, Bloqueadores do receptor da angiotensina II, antagonistas da aldosterona, hidralazina+nitrato, diuréticos, digitálicos, ivabradina., Positivo: Aqueles descritos nos estudos clínicos, Negativo: Aqueles descritos nos estudos clínicos</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Entresto é uma mudança de paradigma no tratamento da IC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora dos sinais e sintomas em menor tempo e diminuição considerável de reinternações, Negativo: Monitorização mais frequente da pressão arterial.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, Valsartana. diuréticos, Positivo: Pouca potência e efeitos colaterais consideráveis, Negativo: Tosse, não contole da IC e maior número de reinternações</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque melhora a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora nos batimentos cardíacos e na falta de ar, Negativo: Não percebi nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários, Positivo: Muitos, Negativo: Não lembro</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora clínica acentuada, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora clínica acentuada, Negativo: Preço</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, OS RESULTADOS DO USO DAS DROGAS EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA SÃO BASTANTE POSITIVOS E DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA SEREM IGNORADOS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO EM TODAS AS DOSES NELHORANDO NÃO APENAS O QUADRO CLÍNICO MAS A QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE., Positivo: Melhora da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, da dispneia e equivalentes anginosos, controle pressóricos adequado, reversão do uso de drogas vasoativas com maior rapidez, redução do tempo de internação e do número de ré-internação., Negativo: Dificuldade de ajuste de dose em pacientes hipotensos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Espironolactona, digoxina, betabloqueador, Positivo: Controle do quadro de IC E REDUÇÃO DA PROGRESSÃO DA DOENÇA. Todos com impacto inferior ao ENTRESTO, Negativo: Digoxina, facilmente tóxico especialmente em idosos. Betabloqueadores risco de bloqueio da condução AV, especialmente em pacientes com bradicardia ou distúrbio de condução (que são a maioria dos pacientes com IC), hiperpotassemia.</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se do maior avanço dos últimos anos no tratamento da insuficiência cardíaca</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora dos sintomas, da contração do coração e aumento da sobrevida, Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol, enalapril, Alda tiñe etc, Positivo: A associação desses medicamentos não alcançou o resultado do entresto em todo o mundo, Negativo: Todos geram hipotensão</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se do maior avanço dos últimos anos no tratamento da insuficiência cardíaca</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora dos sintomas, da contração do coração e aumento da sobrevida, Negativo: Hipotensao</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol, enalapril, Alda tiñe etc, Positivo: A associação desses medicamentos não alcançou o resultado do entresto em todo o mundo, Negativo: Todos geram hipotensao</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos mostram uma terapêutica de resgate para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e evitando mortalidade e co-morbidades.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da dos sintomas de dispnéia e fadiga e da auto-estima. Melhora da congestão pulmonar e do edema de mmii, , Negativo: Hiperpotassemia deve ser monitorada de perto.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores da eca e da angiotensina 2. Beta-bloqueadores e diuréticos. , Positivo: Melhora dos sintomas de insuficiência cardíaca. , Negativo: Hiperpotassemia e hipotensão.</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartana , Positivo: Melhora importante da ICC, rebaixando da Classe III e IV para classe II em 60 dias de tratamento.; , Negativo: Custo elevado para o paciente carente financeiramente comprar .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta-bloqueadores, IECA, ARA, etc. , Positivo: Melhora parcial da ICC , Negativo: Tosse, Bradicardia, etc</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O benefício da droga, diminui internação, mortalidade. Com poucos efeitos colaterais Conseguimos um melhor tratamento que irá dar qualidade de vida aos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/ valsartana, Positivo: Melhora sintomática de insuficiência cardíaca , melhora função renal . Paciente relatou melhora da qualidade de vida , Negativo: Meus pacientes toleraram a medicação sem efeito colateral</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril , espirolactona , carvedilol ,, Positivo: Melhorou insuficiência cardíaca , Negativo: Muitos pacientes não toleraram enalapril por tosse , espirolactona muitas vezes fez subir muito o potássio e causou ginecomastia. Não tive problemas com carvedilol</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelo impacto na melhora clinica, funcional e diminuição de internação nos pacientes com Insuficiência Cardíaca</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, losartana, valsartana, aldactone, furosemida, Positivo: Melhora parcial do cansaço e edema, Negativo: Permanência de reinternações, assim pouco melhora da classe funcional</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação em questão tem importante relevância na melhora de qualidade de vida e proteção cardiovascular a médio e longo prazo, aumentando sobrevida em pacientes que são de alto risco para morte súbita. Tudo isso comprovado por estudo clínico muito bem conduzido , com grande número de pacientes e de reconhecimento mundial.Tenho experiência própria em avaliar melhora clínica dos pacientes para os quais prescrevi o medicamento, e fico triste em não poder favorecer muitos outros que não tem condições de arcar com os custos do medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: A medicação em questão tem importante relevância na melhora de qualidade de vida e proteção cardiovascular a médio e longo prazo, aumentando sobrevida em pacientes que são de alto risco para morte súbita. Tudo isso comprovado por estudo clínico muito bem conduzido , com grande número de pacientes e de reconhecimento mundial.Tenho experiência própria em avaliar melhora clínica dos pacientes para os quais prescrevi o medicamento, Negativo: O custo ainda é elevado para pacientes que dependem do SUS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betabloqueadores, IECA, BRA e Inibidor de Aldosterona, Positivo: Todos eles tem comprovado efeito em melhora clinica e redução de mortalidade cardiovascular., Negativo: Apesar destes outros medicamentos exibirem benefícios clinicos e de mortalidade, nenhum deles age como o Entresto, que atua em um mecanismo adicional de benefício , melhorando ainda mais os efeitos clínicos</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento em uso por alguns pacientes que acompanho com ótimo resultado, menor número de internações e menor uso de terapias endovenosas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto todas as apresentações, Positivo: melhora dos sintomas da insuficiência cardíaca, menor número de internações ao longo do ano, maior qualidade de vida ao paciente, menor afastamento das atividades laborativas, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECAs, BRAs, digoxina, e Betabloqueadores, Positivo: todos contribuem para melhora da insuficiência cardíaca, Negativo: paciente mantém as internações anuais (3-4), ajuste de dose, uso de diuréticos endovenosos de forma frequente.</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Muito bom, Positivo: Todos os aspectos, Negativo: Nem um</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Esta sendo muito bom para meu problema de coração , Negativo: muito caro</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preciso tomar o medicamento,mas e muito caro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: anapril, Positivo: Comecei me tratar a um ano., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Me senti bem melhor c o uso do entresto, Negativo: Falta nas farmacias</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Qualidade de vida, Negativo: Até o momento nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim, Positivo: Qualidade de vida, Negativo: Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou minha disposição depois que passei a fazer uso do Entresto Parei de sentir falta de ar, Negativo: Não percebi para o Entresto</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concor 10 mg - Procoralan 7,5 - Digoxina 0,25, Positivo: Melhorou meu estado de saúde, de. Modo geral, no que diz respeito ao problema cardíaco, Negativo: Não me lembro de nenhum efeito negativo ao utilizar este medicamento ou outro recomendado pelo médico que cuida da minha saúde.</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse remédio contribui muito para a melhora da insuficiência cardíaca e seu valor é alto e seria bom que as pessoas tivessem ele gratuitamente. Uma vez que seu uso diário faz a diferença na vida. Eu o tomei a 6 meses e meu coração estava com 28 % de fração. Hoje pelo último ecocardiograma já foi para 49 %, graças ao uso do entresto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Consigo fazer minhas atividades diárias e cuidar do meu filho. Adquiri o problema devido a um remédio usado na quimioterapia que fiz e agravou com a gravidez a insuficiência cardíaca. Passei a tomar o entresto após o nascimento do bebê., Negativo: Entresto não teve efeito negativo em mim até o momento. Após o uso contínuo melhorei muito.</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do entresto e, comprar está se tornando cada vez mais difícil em consequência do alto custo. E, mais complicado ainda porque é um medicamento que me fez muito bem, com novas esperanças.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51mg, Positivo: Melhora significativa do meu quadro de saúde., Negativo: Ele baixa um pouco minha pressão arterial.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Preço e acessibilidade pelo SUS., Negativo: Era o único disponível. Não saberia dizer se positivo ou negativo.</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é eficiente pois, acompanho minha mãe e a mesma está bem mas, como o custo é muito alto, seria importante se o governo também incorporasse.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Os batimentos cardíacos normalizaram e diminuiu o cansaço., Negativo: Não verificamos até o momento.</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou Utilizando o produto com sucesso, a associação não apresenta nenhum efeito secundário ou colateral comigo, por todos estes meses de uso contínuo. O produto é muito bom para mim e também o poderá ser a muitos outros que por fator econômico poderá não esteja fazendo uso contínuo. É disponível gratuitamente o poderá.!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Naprix, Positivo: Controle sintomático da insuficiência cardíaca, Negativo: Sentia muita secura na boca com produto napriix</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É de extrema importância a gratuidade de um medicamento como este. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Ajustou o problema da insuficiência cardíaca..., Negativo: Nenhum. Somente o preço... 3ª - Não
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E um ótimo medicamento e ajudaria muitos pacientes com baixa renda inclusive eu 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 40/51, Positivo: Melhorou muito minha qualidade de vida, Negativo: Ou melhor o preço é muito alto. 3ª - Não
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51, Positivo: Meu cansaço desapareceu, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Procoralan, Positivo: No começo foi razoável mais logo me fez mal., Negativo: Torneira...inchaço
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concardio , Positivo: Estabilidade do quadro, Negativo: Deixou de ser eficiente para o quadro
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ótimo medicamento porém preço nada acessível 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 24/26mg, Positivo: Melhora da insuficiência cardíaca , Negativo: Nenhum 3ª - Não
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um ótimo medicamento mas é caro e se for distribuído gratuitamente poderá ajudar todos com igualdade 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou minha condição cardíaca. , Negativo: Não tem 3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, furosemida, bisoprolol, espironolactona, Positivo: O enalapril e o furosemida foram substituídos pelo entresto. Os demais continuo tomando com o entresto e anticoagulante. Esse mix melhorou muito a ejeção de sangue e diminuiu a insuficiência cardíaca, Negativo: Não tem
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse remédio deveria sim entrar pelo SUS, ajudaria muitas pessoas que não pode pagar, pois o custo dele é alto. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49mg/51mg, Positivo: Alivia o cansaço, deixa a pressão regulada., Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Caverdilol , Positivo: Complementa o entresto, Negativo: Nenhum
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Qualidade de vida, Negativo: O preço 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação muito cara que pode perfeitamente de adquirido pela farmácia de alto custo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora de 90% da Insuficiência cardíaca , Negativo: Nada consta 3ª - Não
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, muito caro 2ª - Sim, como paciente, Qual: boa noute de sono, Positivo: boa respiração, Negativo: falta de ar e edemas 3ª - Não
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora do paciente, Negativo: Nenhum 3ª - Não
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuario do medicamento e tive meu quadri clinico melhirado apos o uso. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na capacidade do coração , Negativo: Nenhum 3ª - Não
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Muito bom pra mim, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Xarelton, Positivo: Muito bom , Negativo: Nenhum
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E um medicamento muito importante. Traz benefícios extremos aos usuários.Tenho marido e cunhado com doença cardíaca e que tiveram ótimos resultados com o uso desse medicamento 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Por ora somente esse., Positivo: Só um médico pode responder.Eu como leiga, só posso da melhora no estado clínico dos pacientes., Negativo: Não posso avaliar 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Experiência, Positivo: Em ambos pacientes foi registrado pelos médicos assistentes vuma excelente recuperação em curto tempo não , Negativo: Não foi observado
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento entresto está sendo de grande ajuda no meu tratamento de insuficiência cardíaca.Porém é caro, considerando q preciso tomar comprimido de manhã e outro a noite, são duas caixas ao mês. E ainda só vem nas caixas 28 unidades, q na verdade penso q teria de ser 30, para dar o exato mês todo. E não da... e ainda tomo 2 por dia. Fica pior ainda...Então acho sim, q o governo deveria fornecer.... E eu só estou tomando a tres meses certinho, prq meu médico, de rede pública tbm, q me forneceu amostras grátis q ganha de representante. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto. , Positivo: Assim... senti melhora na fadiga q sentia.Os gremorsinhos q sentia no peito parou.E as fisgadas q sentia tbm parou.E as vzs, de vez enquanto sentia dor no peito, do lado esquerdo.Tbm não tenho sentido., Negativo: Negativos não senti nada, até agora. 3ª - Sim, como paciente, Qual: O bisoprol., Positivo: Com ele, sentia todos esses sintomas e hj não sinto.Mudaram mg, aumentando ela. E não foi aquele melhora toda a estou tendo com o entresto. , Negativo: Não estava obtendo boa melhora.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: À paciente reagiu bem ao tratamento , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro no momento, Positivo: Melhora rápida do paciente , Negativo: Preço</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento importante que tem que ter na rede pública. Tantos impostos pagos para termos reembolsos tão escassos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A droga comprovadamente reduz mortalidade em 20% além de reduzir o risco de uma reinternação em mais de 20% o que reduz imensamente custos na saúde como melhor prognóstico e qualidade d vida do paciente. Tenho usado a medicação em consultório com resultados clínicos realmentw espetaculares e isso no sus seria algo que reduziria custos e melhoraria a expectativa de vida na IC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartan - tenho usado frequentemente a medicação em pacientes no consultório e em pacientes internados por insuficiência cardíaca , Positivo: Sacubitril / valsartanMelhora da capacidade físicaRedução de risco de internações Melhora da autonomiaRedução de risco de disfunção renal e hipercalcemiaMelhora na sensação de “bem estar” dos pacientes, Negativo: Apresenta um baixo risco de hipotensão sintomática</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores de enzima de conversão de angiotensina e bloqueadores de receptores de angiotensina - ambos são opções com resultados onferiores aos do sacubitril / valsartan, Positivo: Ambos citados melhoram de forma menor a capacidade física e a autonomia do paciente , Negativo: Ambos tem risco de hipotensão, disfunção renal e hipercalemia</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é oneroso, portanto as pessoas de baixa renda não podem adquiri-lo. Minha mãe é pensionistas, se não fosse os filhos, ficaria sem o medicamento. O Entresto está fazendo muito bem a ela. Faz-se necessário este medicamento ser incorporado ao o SUS .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha mãe toma Nebivolol, Entresto, digoxina e furosemida. Antes de tomar Entresto, tomava Losartana. , Positivo: Com o uso do Entresto, a pressão arterial está praticamente normal. E o grau de insuficiência cardíaca, diminuiu de 4 para 2. O cansaço diminuiu, aumentando sua qualidade de vida., Negativo: Verificar através de exames os níveis de creatinina, sódio e potássio.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha mãe estava tomando Nebivolol, digoxina e furosemida. Agora além destes, toma também o Entresto, Positivo: Os efeitos positivos, é que ao fazer uso destes medicamentos da forma prescrita pelo médico, há uma melhora do cansaço e retenção de líquidos, Negativo: Os efeitos negativos são a baixa de creatinina, sódio e potássio</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso a medicação e tenho um efeito muito bom, precisamos de mais medicação deste nível pelo SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26 e 49/51, Positivo: Estabilizou minha deficiência cardíaca , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu pai toma e teve uma melhora de 100 % na insuficiente cardíaca</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora significativa da insuficiência cardíaca , Negativo: O preço Alto custo pro idoso</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Diminuiu a insuficiência cardíaca , Negativo: O preço da medicação valor</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes atendidos pelo SUS tem necessidade da medicação, mas não tem condições de custear o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103:mg, Positivo: Melhorou bastante meu condicionamento menos cansaço e menor fadiga., Negativo: Sem queixas da medicação.</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora total no quadro do paciente, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu participei de um experimento com a medicação e após o uso me sentir outra pessoa.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: A medição me deixa sem cansaço, com motivação para viver, Negativo: Não tenho nenhum ponto negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Divalol, Positivo: Melhorou minha respiração, Negativo: Não tenho</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, os aideticos tem direito a. tratamento gratuito e os cardiopatas não! porquê?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 103/97, Positivo: Me senti muito melhor sem falta de ar sem cansaço, Negativo: Efeitos negativos só foi ficar sem o medicamento por não poder pagar por ele</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol InalaprilEspirilactona, Positivo: Tds pois não posso viver sem, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento em questão é recomendado pelo meu cardiologista como preponderante para minimizar o risco de morte em funcao da minha insuficiência cardíaca sintomática. Porem, seu custo é elevado, o que tem dificultado a compra por minha parte. Sendo ele, segundo os estudos apresentados, 20% mais eficaz no tratamento do que o Maleato de Enalapril. Dedta forma, este medicamento, utilizado de forma constante, ppde me manter vivo para acompanhar o crescimento dos meus filhos, bem como e talvez mais importante para o governo federal, poderá reduzir os custos com hospitalizacao e quem sabe impedir um futuro transplante de coração.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto., Positivo: Melhora no funcionamento e fração de ejecao do coração. Diminicao de 0,02% do diâmetro cardíaco em 3 meses., Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Maleato de Enalapril., Positivo: Melhora na fração de ejeção e fluxo sanguíneo., Negativo: Não tive.</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: melhorou bastante o funcionamento do coração, Negativo: Não observei nenhum, só mesmo o preço</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento de custo muito alto, devido isso acredito que seja de suma importância que o SUS possa disponibilizar de forma gratuita.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou em uso do Entresto de 97mg/103mg, Positivo: Diminuição do cansaço e podendo estar dormindo., Negativo: Na falta do medicamento descrito o sentimento de desfalecimento é contínuo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana de 50mg, Positivo: Não estava cessando os sintomas da doença, mesmo já usando a dose mais alta., Negativo: Os mesmos citados acima.</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existe a indicação da medicação e ela é cara.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora estado geral, Negativo: Tenho miocardiopatia hipertrofica e o entresto foi utilizado por ser mais eficaz que o diovan... Nao consegui me adaptar a ele por causar tontura mas, nao tomaria tambem pelo custo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diovan 80, Positivo: Mantem o ritmo cardiaco, Negativo: Entresto: tontura</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entretanto CarvedilolFurosumidaEsperilactonaAncoronMarcel, Positivo: Todos os medicamentos culminaram para a melhora da insuficiência cardíaca e arretima cardíacas., Negativo: O valor dos medicamentos são altos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ., Positivo: ., Negativo: .</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fiz tratamento com o Entresto e foi muito bom pra mim.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Foi eficiente , Negativo: Não houve negativo</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Minha mãe foi diagnosticada com problema na valva mitral e começou a utilizar o medicamento , após 6 meses de uso o quadro dela regrediu., Negativo: O alto custo e não disponibilidade na rede pública</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente, faço uso do Entresto e tive melhora substancial apos uso do mesmo. Fração de ejeção do ventrículo, meu caso esquerdo, teve melhora considerável.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o Entresto, Positivo: Melhorou a fração de ejeção do ventrículo. No meu caso ventriculo esquerdo, Negativo: Ainda não tive nenhum efeito negativo com uso do mesmo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Passei por uma revascularização ha cerca de 15 anos, com implantação de 03 pontes safena/mamária., Positivo: melhora substancial da respiração, possibilitou recuperação física, embora limitada., Negativo: Ainda nao tive nenhuma experiencia negativa.</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora do rendimento cardíaco após ser vítima de infarto., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol., Positivo: Melhora do rendimento cardíaco., Negativo: Arritmia e inchaço do músculo cardíaco.</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já utilizei VB esse medicamento com excelentes resultados</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Melhorou meu quadro de insuficiência, Negativo: Se o paciente tiver complicações renais pode agravar esse quadro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Digoxina, Positivo: Não percebi melhoras, Negativo: Não houve</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Entresto foi o melhor remédio que o médico da mi ha mãe receitou para ela.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto., Positivo: Depois que minha mãe começou a toma o entresto ela se sente outra pessoa fora que muitos remédios que ela tomava não precisa mais.Nenhum por enquanto.Bom ja faz 1 ano que ela toma., Negativo: Nada.</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Laboratório já dá desconto</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Diovan, Positivo: Ssss, Negativo: Ssssss</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sssss, Positivo: Ssssss, Negativo: Ssssss</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Laboratório já dá desconto</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Diovan, Positivo: Ssss, Negativo: Ssssss</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sssss, Positivo: Ssssss, Negativo: Ssssss</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu fiz o uso da medicação e me dei super bem.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou o meu desepenho , consigo fazer as coisas sem me sentir cansada, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Divalol, Positivo: Melhora minha respiração, Negativo: Sem efeito negativo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento mudou minha vida pra melhor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/ 26 mg, Positivo: Melhorou muito meu cansaço físico , Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacs se beneficiam na prática clínica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora de classe funcional e redução de mortalidade, Negativo: Edema de membros inferiores</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Procoralam, Positivo: Melhora de classe funcional, Negativo: Não tem</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O resultado do uso remédio é absurdamente superior aos outros tratamentos. Sinti isto no meu dia a dia, e quando tive de ficar 2 semanas sem usar por falta de \$\$\$.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Este apenas Sacubitril / valsartana, Positivo: Não sinto o órgão em sofrimento, nenhuma dor, disposição geral, sono em geral muito melhor., Negativo: Não tenho a comentar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana potássica e Aradois (losartana original), Positivo: Diminuíram as dores de cabeça., Negativo: Dificuldade para dormir, coração em sofrimento, e perda de libido.</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os resultados positivos decorrentes ao uso do sacubitril-valsartana sao inegáveis, a melhora q os pacientes apresentam é altamente significativa.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril-Valsartana, Positivo: Melhora significativa dos sintomas da insuficiência cardíaca. , Negativo: Não observei efeitos negativos que provoquem a suspensão do uso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Espironolactona, carvedilol, bisoprolol, losartana, Positivo: Geralmente efecto positivo de melhora. , Negativo: Nao significativos.</p>
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não sei os motivos pelo parecer não favorável</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Meu pai melhorou significativamente o cansaço que sentia. Minha mãe inicialmente não vi melhora , mas depois de uns quatro meses ela teve melhora tb do cansaço., Negativo: Com o tempo meu pai precisou aumentar a miligrama. Não sei se depois que utilizar com a dosagem máxima e com o tempo se voltará o cansaço.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concor. Mas não sei se tem a mesma finalidade , Positivo: Mesma coisa do Entresto , Negativo: Idem</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos clínicos mostraram redução de mortalidade e segurança com a droga!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valdartana, Positivo: Melhora da classe funcional da IC e redução de hospitalizações , Negativo: Discreta hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores da Eca/ betabloqueadores/antagonistas da aldosterona/diuréticos/ ressinronização , Positivo: Melhora da classe funcional, Negativo: Hipercalemia/ ins renal/ hipotensão</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, os resultados são incontestáveis e já referendados nas diretrizes o não uso seria um retrocesso</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril/valsartan, Positivo: melhora acentuada da evolução clínica do paciente., Negativo: discreta hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: os referendados como tratamento das classes II e III da insuficiência cardíaca., Positivo: melhora do quadro porém sem a melhora quando acrescido o sacubitril valsartan, Negativo: quando utilizado com o sacubitril valsartan a melhora é muito mais acentuada.</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SACUBITRIL-VALSARTANA, Positivo: DIMINUIÇÃO DE INTERNAÇÕES POR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA E MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE, Negativo: HIPOTENSÃO RELATIVA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BETABLOQUEADORES, INIBIDORES DA ANGIOTENSINA 2, DIURETICOS, NITRATOS, HIDRALAZINA, IVABRADINA, DIGOXINA, Positivo: TODOS JÁ CITADOS NAS DIRETRIZES ATUAIS, Negativo: TODOS JÁ CITADOS NAS DIRETRIZES ATUAIS</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicação que melhora qualidade de vida, diminui risco de internação e morte dos pacientes com insuficiência cardíaca</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril/valsartana, Positivo: melhora da qualidade de vida e diminuição da necessidade de internações , Negativo: se prescrito criteriosamente é medicamento seguro</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bbloq, ieca, bra , espironolactona, Positivo: são medicamentos que comprovadamente melhoram a evolução de pacientes com ICC, Negativo: se prescritos criteriosamente são seguros</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ha estudos renomados e com significancia estatistica mostrando o beneficio do entresto para pacientes com IC, com reducao de mortalidade, melhora dos sintomas, reducao de internacao e morte subita, sendo assim, e uma medicacao que trara inumeros beneficios ao paciente!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apos iniciar Entresto a um paciente con IC avançada, houve melhora sigbificativa dos sintomas apos otimizacao da medicacao., Positivo: Acima., Negativo: Medicamento nao disponivel no SUS, sendk que nem todo paciente temCondicoes de arcar com os custos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA e BRA2, Positivo: Sao medicamentos que atuam no tratamento da IC disponiveis no SUS., Negativo: Sao medicamentos usados para o tratamento da IC, porem, o sacubitril associado ao valsartan no estudo PARADIGM mostrou superioridade ao tratamento convencional com essas drogas. Com reducao de INTERNACAO, melhora da qualidade de vida, resucao de MORTALIDADE e MORTE SUBITA.</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos de sobrevida são muito superiores ao tratamento usual</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores da eca, bloqueadores at1, beta bloqueadores,antagonistas da aldosterona, Positivo: São favoráveis em relação a mortalidade e reinternação,mas com efeitos colateraisMa, Negativo: Tosse, hipotensão, aumento do potássio</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ieca, bra, Positivo: Melhora capacidade física, Negativo: Tosse, hipotensão</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CARVEDILOL BRA IECA E SPIRONOLACTONA, APRESSOLINA DINITRAO , Positivo: REDUZEM A MORTALIDADE, INTERNAÇÃO HOSPIITALAR E MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA, Negativo: HIPOTENSÃP</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ARVEDILOL BRA IECA E SPIRONOLACTONA, APRESSOLINA DINITRATO, Positivo: EDUZEM A MORTALIDADE, INTERNAÇÃO HOSPITALAR E MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA, Negativo: HIPOTENSÃO</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, houve redução de mortalidade em pacientes CFII II e IV. Com isto, acho que deveria estar presente no receituário destes pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: entresto, Positivo: melhora de classe funcional, Negativo: hipotensão</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Possibilidade de melhorar a qualidade de vida de pacientes portadores de insuficiência cardíaca</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Utilização de medicamentos clássicos para a IC e agora associado ao entresto., Positivo: Entresto - melhora da qualidade de vida, com capacidade de tolerar atividade física com evolução gradativa., Negativo: Pelo custo do produto, não se consegue atingir uma maior massa populacional que necessita do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: diurético, betabloqueador, vasodilatador, antiadesivo plaquetário, Positivo: os medicamentos em questão já são consagrados., Negativo: Medicamentos para tratamento da IC, grande quantidade de drogas.</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos mostram diminuição na morbidade e mortalidade com uso da medicação, incluindo hospitalização por IC.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Diminuição dos sintomas e melhora da classe funcional., Negativo: Não apresentaram.</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação com indicação IA para ICC com fração de ejeção reduzida, com trabalhos de peso,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora clínica dos pacientes e da necessidade de internação., Negativo: Hipercalemia- hipotensão arterial sistêmica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA E CARVEDILOL, Positivo: Paciente tem melhora clínica porém inferior ao Entresto, Negativo: Resultados inferiores ao Entresto</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta associação mudou o paradigma de controle e melhora acentuada da qualidade de vida e expectativa de morte de todos os pacientes com ICC com FE reduzida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com esquema triplice otimizado de controle da ICC, Positivo: Aumento importante da tolerância ao esforço. Diminuição importante de reinternações, diminuindo os custos do SUS. Melhora acentuada da qualidade de vida., Negativo: Raros episódios de Hipotensão arterial, perfeitamente administráveis</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ressincronização , Positivo: Melhora da tolerância ao esforço, Negativo: Custo muito alto</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta medicacao entresto, é favoravel para insuficiencia card. Pois faço uso e estou bem melhor .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ponte safena . Implantei cdi fiz cardio versao e outros., Positivo: Mais desposicao mrnos cansaço menos falta de ar, Negativo: Tosse seca pigarro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vastarel mr 35. Concardio 5. Monocardil 20. Digoxina 0.25. Furosemifa 40, Positivo: Me dei bem com todos nao da pra saber qual.deles fez mais efeito. Pra melhor., Negativo: Mesmo con estes meficamentos aonda sentia cansaco e falta de ar.</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento em questão tem evidências científicas robustas de sua eficácia e segurança.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora da classe funcional da ICC., Negativo: Disfunção renal transitória</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EnalaprilFurosemidaLosartanaEspironolactonaBisoprolol, Positivo: A associação acima promove redução de mortalidade- que é ainda melhorada com o Sacubitril/Valsartana., Negativo: A associação acima pode desencadear hipotensão postural.</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação tem excelentes resultados e com estudos robustos que comprovam isso, sendo comumente usada em outros países e pelos principais profissionais do país, referência no tratamento da insuficiência cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril/valsartana, Positivo: melhora importante na classe funcional e na fração de ejeção pelo ecocardiograma, Negativo: diurético exagerado se associado a medicações diuréticas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IEC, beta-bloqueadores, BRA, bloqueadores da aldosterona..., Positivo: Melhora na sintomatologia da ICC e aumento da sobrevida, Negativo: hiponatremia, insuficiência renal, intolerância a glicose...</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a experiencia clinica com ENTRESTO vem se mostrando muito bem sucedida. Os sintomas melhoram na primeira semana. Em pouco tempo os pacientes melhoram a Classe funciona NYHA (mesmo os mais graves). Os pacientes demonstram de forma muito intensa a satisfação com o medicamento Há evidencias robusta de redução de internação e aumento de sobrevida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO, Positivo: Os sintomas melhoram na primeira semana. Em pouco tempo os pacientes melhoram a Classe funciona NYHA (mesmo os mais graves). Os pacientes demonstram de forma muito intensa a satisfação com o medicamento Há evidencias robusta de redução de internação e aumento de sobrevisa, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENALAPRIL, Positivo: A MELHORA CLINICA OCORRE NA MAIORIA DOS PACIENTES MAS DE FORMA MENOS INTENSA QUE COM ENTRESTO, Negativo: TOSSE - NÃO REDUZ A INTERNAÇÃO</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ValsartanaSacubitrillecas Betabloq, Positivo: Melhora da Classe Funcional, Negativo: Bradicardia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Espírono NitratosDiuréticos de alça , Positivo: Redução classe funcionalAumento deveDiminuiu congestão pulmonarMenos internação , Negativo: Betabloq:Pré síncope Diurético de alça:HipocalemiaNitratos:Cefaleia</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril-valsartan, Positivo: Reducao de morbimortalidade em insuficiencia cardíaca., Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, Positivo: Redução de morbimortalidade, Negativo: Tosse</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Analisando o custo com relação a diminuição de internação do paciente e melhora da qualidade de vida o medicamento vale a pena.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o sacubitril / valsartana, Positivo: Diminuição de internaçãoMelhora da qualidade de vida, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CarvedilolEspironolactona, Positivo: Melhora da insuficiência cardíaca, Negativo: Tontura</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu concordo por que ele tem direito</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Concor zinpass aldactone entresto lazique, Positivo: Insuficiência cardíaca, Negativo: Nem uma</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concor zinpass aldactone entresto lazique, Positivo: Insuficiência cardíaca, Negativo: Nem uma</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A MELHORA DO QUADRO CLINICO COM O ENTRESTO E QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE É EVIDENTE EM TODOS OS ASPECTOS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO EM PACIENTES COM INSUFICIENCIA CARDIACA, Positivo: MELHORA DO QUADRO CLINICO, Negativo: PREÇO MUITO ALTO PARA UM PACIENTE DEBILITADO E QUE JA USA OUTRAS MEDICAÇÕES CONCOMITANTEQUEDA DA PRESSÃO ARTERIAL</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BETABLOQUEADORES, ESPIRONOLACTONA E DIURETICOS, Positivo: MELHORA DA FRAÇÃO DE EJEÇÃO NO ECGARDIOGRAMA, Negativo: QUEDA DA PRESSÃO ARTERIAL E DA FREQUENCIA CARDIACA ACENTUADA EM DOSES ELEVADAS</p>
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: entresto, Positivo: melhora clínica, Negativo: sem efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora de sintomas e classe funcional do paciente , Negativo: Descontinuidade do tratamento devido alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EspironolactobaEnalaprilCarvedilolFurosemida, Positivo: Melhora sintomatologia e classe funcional, Negativo: Espironolactona: ginecomastia, hipercalemiaEnalapril: tosseFurosemida: hiponatremia</p>
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é melhor até o momento para o controle e o avanço da cardiomiopatia crônica. Inclusive este medicamento fortalece o músculo cardíaco e implementa um ganho significativo quanto aos efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na qualidade de vida., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Maleato de enalapril., Positivo: Bom, mas o corpo construiu resistência. , Negativo: Perdeu a eficiência com o tempo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Insuficiência cardíaca é um quadro sindrômico com várias etiologias, altamente prevalente no nosso país , levando a um ônus por internações de repetição de imensa repercussão na saúde do País. Além de também ser uma patologia que sem um controle adequado, tira os cidadãos precocemente do mercado de trabalho, onerando mais uma vez o Estado, com aposentadorias precoces. Essa nova droga trouxe uma forma bem eficiente e acessível de controle do quadro, melhorando todos esses indicadores. Tenho atualmente, como cardiologista, uma experiência muito marcante com Entresto, vendo a melhora clínica dos pacientes assim como de indicadores ecocardiográficos. Tenho também conhecimento técnico através da literatura dos diversos estudos realizados, desde grandes trials até pequenos estudos em hospitais locais mostrando a melhoria dos pacientes. Sinceramente, acredito que chegando-se a um preço justo para ser pago pelo governo, nós, profissionais de saúde, teríamos uma ferramenta de grande significado para a mudança da evolução natural da doença., assim como uma melhora nos impactos de gasto do Estado com essas respectivas internações dos pacientes. Espero que o Estado reavalie a proposta e aceite incorporá-lo no rol dos medicamentos oferecidos pelo SUS. É uma questão de saúde pública, assim como de impacto econômico para os cofres do Estado. Atenciosamente, Dra Valéria F A Pereira CRMSP 57958, médica cardiologista, mestre , doutora e pos-doutora em Medicina. Diretora Científica da 19 regional da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nesse caso com sacubitril/valsartana (Entresto) no tratamento da ICC, Positivo: Melhora do quadro clínico do paciente. Melhora da classe funcional da ICC NYHA Melhora da qualidade de vida Diminuição do número de internações hospitalares por descompensação do quadro., Negativo: Quando é bem indicado, não observei efeitos negativos. Precisamos observar o paciente, que tem um quadro instável. Para isso , existem os ambulatórios de doenças crônicas. Dessa forma, fazemos ajustes na medicação. Custo totalmente diferente de ter que internar o paciente para compensá-lo com maior risco de mortalidade a cada internação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta bloqueador, IECA, Diurético, vasodilatador, digital, espironolactona., Positivo: Todos tem seus efeitos. O problema é que não temos uma resposta tão duradoura da estabilidade do quadro como entresto, além de que o tempo para compensação é bem maior. Nesse interim, o paciente pode piorar bastante e ter que internar. Outro ponto positivo é a necessidade maior de medicamentos quando não utilizamos entresto. Isso dificulta muito o entendimento e a tomada correta dos medicamentos pelo paciente. Quantos pacientes no nosso país podem pagar um cuidados? Muitas pessoas ficam sozinhas em casa, responsáveis por tomar as suas medicações em vários horários. Bem diferente de eu ter 2 ou 3 ao invés de 8 tomadas de medicamentos ao dia., Negativo: A piora dos níveis de potássio, trazendo arritmias cardíacas, alergias, trazendo tosse intensa, com os iecas. Hipotensão importante com os beta bloqueadores, além do tempo maior para que uma possível compensação ocorra.</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, sacubitril/valsartana</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sau, Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol , Positivo: Melhora da sobrevida, Negativo: Broncoespasmo, hipotensão</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Digoxina, Positivo: Melhora do quadro., Negativo: Dispneia.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O benefício aos pacientes em termos de reducao de mortalidade não pode ser privado dos paciente do SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartan, Positivo: Redução de mortalidade, redução de internações por IC, melhora na qualidade vida/sintomas., Negativo: Poucos, hipotensão em casos selecionados.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quase todos os betabloqueadores, IECAs, BRAs, Espironolactona, diuréticos., Positivo: Melhora na qualidade e expectativa de vida dos pacientes., Negativo: Efeitos colaterais as classes das Drogasil citadas, hipercalcemia, hipotensão, tosse, angioedema, bradicardia, bloqueios AV.</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Através do uso do medicamento Entresto saí da fila do transplante. Meus batimentos cardíacos estavam em 15 por cento agora estão em 41 por cento., Negativo: Para mim não apresentou efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação de efeito comprovado deve ser plenamente disponibilizada</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora no desconforto pos esforço , Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diovan , Positivo: Não observei algo significativo , Negativo: Não observei algo significativo</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso de Entrestor deve ser considerado como parte principal no tratamento de IC, por todos os benefícios que ele oferece; tanto do ponto de vista do paciente como de economia social, pois ao diminuir as internações, está se recuperando o investimento realizado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entrestor.(sacuvitril/valsartana), Positivo: Diminui a sintomatologia do paciente, melhora classe funcional. Melhorando a qualidade de vida e se incorporando as funções tanto sociais como profissionais. A procura por atendimento de emergência e internações tbm diminuiriam consideravelmente.Diminui morte súbita em pacientes estáveis., Negativo: Hipotensão que dá para ser contornada, melhorando as medicações em uso paralelamente.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Maleato de Enalapril. Beta bloqueadores, diuréticos., Positivo: Melhora de classe funcional e sintomatologia. , Negativo: A presença de morte súbita mesmo com estabilidade do quadro é muito alto.</p>
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho o medicamento extremamente útil ao cardíaco e de valor expressivo como uso contínuo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Manter o quadro estável do paciente cardíaco., Negativo: Nihil</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sinvastatina e outros diversos receitados pelos médicos., Positivo: Nihil, Negativo: Nihil</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação é superior ao que o Sus oferece. Para um tratamento otimizado todo o paciente tem o direito de receber o melhor tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora importante dos sintomas em comparação ao tratamento padrão , Negativo: Não vi nenhum até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores da eca e BRAs. Todos trazem beneficio mas não se compara ao que o Entresto oferece., Positivo: Vide acima, Negativo: Vide acima</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Me senti bem melhor. Fadigas que tinha, praticamente sumiu., Negativo: Nenhum. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Vastarel, Positivo: Os mesmos do entresto., Negativo: Não me lembro.
06/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO, Positivo: MELHORA DA FRAÇÃO DE EJEÇÃO, Negativo: HIPOTENSÃO ARTERIAL EM ALGUNS PACIENTES, GERALMENTE BEM TOLERADA COM A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TODOS OS OUTROS JÁ AMPLAMENTE UTILIZADOS, Positivo: MELHORA CLINICA, Negativo: NÃO HÁ MELHORA SIGNIFICATIVA NA FUNÇÃO SISTOLICA DO VENTRICULO ESQUERDO
06/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação já tem comprovada eficácia na melhora do prognóstico dos pacientes, devolvendo a qualidade de vida a eles e diminuindo internações que sobrecarregam hospitais 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril / Valsartana, Positivo: Melhoras de sintomasMenos internaçõesMelhora de sobrevida, Negativo: Não houve 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECAsEspironolactonaBetabloqueadores, Positivo: Semelhantes, Negativo: Hipotensão, bradicardia, recorrência de sintomas
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não sei os motivos pelo parecer não favorável 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Meu pai melhorou significativamente o cansaço que sentia. Minha mãe inicialmente não vi melhora , mas depois de uns quatro meses ela teve melhora tb do cansaço., Negativo: Com o tempo meu pai precisou aumentar a miligrama. Não sei se depois que utilizar com a dosagem máxima e com o tempo se voltará o cansaço. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concor. Mas não sei se tem a mesma finalidade , Positivo: Mesma coisa do Entresto , Negativo: Idem
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora no desempenho e na função cardíaca , Negativo: Até o momento, nenhum 3ª - Não
06/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O enterro ofere nova opção no tratamento da IC com redução de sintomas e mortalidade trazendo novas perspectivas para o paciente e a família. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Paciente com IC apresentou melhoras significativas bem como remodelação do ventrículo esquerdo e fração de ejeção., Positivo: Entresto reduziu em defecho duro em 20% de nortalidade e hospitalizacao. Boa tolerabilidade. , Negativo: Hipotencao 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta bloqueadores, Ieca, Bra e espirolactona., Positivo: Reducao de sintomas , Negativo: Menos eficaz que Entresto
06/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ENTRESTO TEM MOSTRADO OTIMOS RESULTADOS. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO., Positivo: REDUÇÃO DA SINTOMATOLOGIA. MELHORA DA PERFORMANCE CARDIO-VASCULAR., Negativo: CUSTO LIMITA SEU USO, IMPEDINDO USO PLENO EM TODOS OS PACIENTES QUE SE BENEFICIARIAM DO PRODUTO. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DIGITAL, ALFA-BETA-BLOQUEADOR, DIURÉTICO,, Positivo: REDUÇÃO DO GRAU DE INSUFICIÊNCIA CARDIACA., Negativo: OS EFEITOS SÃO INFERIORES AO DO ENTRESTO.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento se mostrou eficaz nos sintomas da insuficiência cardíaca e reduziu o risco de internação hospitalar por descompensação da doença, reduzindo, portanto os custos da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora dos sintomas, qualidade de vida e menores taxas de internação hospitalar., Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ivabradina, espirolactona, ieca, bra, beta bloqueador , Positivo: Melhora de sintomas, Negativo: Nenhum</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de uma medicação com estudos robustos em relação a mortalidade cardiovascular, melhora da qualidade de vida, de reinternação hospitalar, que além de beneficiar o paciente, irá contribuir para redução dos custos para o sistema único de saúde, já que a maior e mais honrosa causa de internação no SUS é a insuficiência cardíaca. Medicação amparada, com indicação Ib para o tratamento de IC, nas diversas diretrizes das principais sociedades de cardiologia mundiais</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora da qualidade de vida, sintomatologia e menor reinternacao , Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betabloqueador, IECA, BRA, ESPIRONOLACTONA, DIURETICOS, IVABRAFINA, Positivo: Todas as drogas acima tem efeito na mortalidade e morbidade, Negativo: O grande efeito e o custo das drogas acima, efeitos colaterais são bem específicos de cada medicação e do paciente. Mas são drogas que devem fazer parte do arsenal terapêutico para o tratamento dessa síndrome IC, que tem a cada ano aumentado seu custo por paciente tratado</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MEDICAMENTO IMPRESCINDIVEL A PORTADORES DE ICC COM RISCO DE MORTE</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TODOS, SOU ESPECIALISTA NA AREA, Positivo: MELHOA DA RESPOSTA CLINICA E SINTOMAS AUMENTA A SOBREVIDA DO PACIENTE, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA, Negativo: PREÇO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: JA DISSE TODOS, SOU ESPECIALISAT NA AREA, Positivo: O RATAMENTO CONVENCIONAL ESTABELECIDOO PELAS DIRETRIZES DA SBC NAO MELHORAVAM A QUALIDADE DE VIDA NEM AUMENTAVAM A SOBREVIDA DO GRUPO EM PELO MENOS 20% EM CINCO ANOS, Negativo: O RATAMENTO CONVENCIONAL E MUITO INFERIOR AO REALIZADO COM ENTRESTO EM TODOS OS ASPECTOS MENOS O PREÇO DO MEDICAMENTO</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril/valsartana, Positivo: melhora significativa da qualidade de vida do paciente, diminuição do número de internações, Negativo: eventuais crises hipotensoras</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: enalapril, Positivo: efeitos positivos transitórios, Negativo: maior incidência de descompensação de insuficiência cardíaca</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, dos 21 pacientes no uso da medicação dsde 10/2017, todos FE de VE menos que 40% e NT pró BNP acima de 150, 21 tiveram estabilização do quadro clínico e/ou melhoria</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivaroxabana, Positivo: queda do NT PRÒ BNP , Negativo: até o momento nada a contestar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: captoprildigoxinaprazozinfurosemide, Positivo: sono sem elevação da pressão veno capilar pulmonar, Negativo: síncope</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho insuficiência cardíaca, e cheguei ao hospital morrendo sem falta de ar. Logo me colocaram no Grupo de Insuficiência Cardíaca da Secretaria de Saúde do DF, com dois dias que iniciei o tratamento com o Entresto, eu na não estava mais sentindo nenhum cansaço, pois o medicamento agiu diretamente e instantaneamente no meu problema. Sou extremamente agradecido pela Equipe do Dr. Lucimir, cardiologista do Hospital Regional do Guara, que através da sua percepção e sensibilidade me ajudou a melhorar por demais a minha qualidade de vida. Se hoje estou andando e continuando viver mais alguns anos de vida, agradeço ao Dr. Lucimir e ao Entresto. Antes de iniciar o tratamento, estava indo ao hospital toda semana para ser socorrido pela emergência com falta de ar e cansaço. O medicamento retirou todos os meus problemas e hoje eu só vou as consultas marcadas e acompanhamento regular com o médico, não precisando mais ter que passar mais momentos dentro da emergência de um Hospital público.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Não sinto mais absolutamente nada de falta de ar e cansaço., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Avaliando os pacientes, encontramos benefícios no que tange a desfecho duro , sendo imprescindível na prática clínica .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avaliado o Entresto em Pacientes com insuficiência cardíaca , Positivo: Redução de morte cardiovascular , Negativo: Cuidado na função renal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Redução de desfecho cardiovascular, Negativo: Sem efeitos negativos</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento de Insuficiência Cardíaca de ponta e com base nas últimas evidências científicas deve ser disponível a todos de modo igual, mesmo que seja de alto custo (pois pode evitar reinternacao e óbito) - portanto reduz custo global.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora dos sintomas (principalmente de dispnéia) e redução do tempo para reinternacao., Negativo: Hipotensão arterial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta-bloqueadores, IECAs, BRAs, Espironolactona, Diuréticos do tipo Furosemida, Positivo: Redução de sintomas e principalmente morbimortalidade, Negativo: Hipotensão, tosse seca, desidratação.</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Excelente medicação quando aplicada corretamente segundos os ensaios clínicos e o estudo PARADIGM-HF</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou a função cardíaca com melhora da classe funcional., Negativo: Ter cuidado com a dosagem de potássio e o uso concomitante de inibidores de IECA.Só utilizar após suspensão por 36 hs destes.E pacientes com Insuficiência hepática grave tb é contra-indicado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol,Valsartana,Furosemida ,e todos os demais para tratamento de ICC., Positivo: Melhora dos sintomas clínicos e função cardíaca, Negativo: Distúrbios hidro-eletrolíticos e frequência cardíaca.</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, concordo somente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: entresto, Positivo: sobreviva, Negativo: não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: carvedilol, Positivo: sbrevida, Negativo: hipotensão</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: valsantam, Positivo: enhum, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: valsanta, Positivo: não, Negativo: nao</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto faco uso continuo de emtresto, Positivo: regulariza a pressao cardiaca e ajuda na insuficiencia cardiaca, Negativo: Este medicamento nao me caus efeito colate.Sinto bem com a medicacao.Que tenho uao continuo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nao lembro o nome, Positivo: Nao senti bem, Negativo: Tinha tontura e dificuldade para regularizar a pressao</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, , Positivo: Com entresto tenho evolução no grau de resistência física., Negativo: Com losartana, tinha muito cansasso</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Cansasso, Negativo: Cansasso</p>
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Este medicamento causou a morte da minha doce e amada mamãezinha, o cardiologista fez a maior propaganda deste medicamento, horrível, e nós acreditamos... caímos no conto de fadas de que este seria o medicamento ideal... porém o uso do medicamento Entresto causou a morte da minha mãe. Ela começou o tratamento com dosagem mais baixa no mês de agosto, em outubro o cardiologista aumentou a dosagem e no dia 30/11 minha mamãezinha faleceu, por causa do Entresto , horrível, ela teve uma hipotensão e fibrilação Atrial, os médicos fizeram tudo para salvá-la, sem sucesso, eles deixaram claro que foi por causa deste horrível Entresto que minha mamãe faleceu. Nunca mais na minha vida eu quero ouvir o nome deste veneno em forma de medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o horrível Entresto., Positivo: Nenhum efeito positivo, Negativo: Entresto mata pessoas por hipotensão.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ancorou , Positivo: Não deixava o coração da minha mamãe fibrilar., Negativo: Nenhum efeito negativo</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, HÁ EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS ROBUSTAS DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE, INCLUINDO RISCO DE MORTE SÚBITA. PERCEBO, NA PRÁTICA, MELHORA CLÍNICA DOS PACIENTES.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SACUBITRIL/VALSARTANA, Positivo: MELHORA SINTOMÁTICA E DO REMODELAMENTO CARDÍACO, COM MELHORA IMPORTANTE DA FEVE. , Negativo: RISCO DE HIPOTENSÃO, QUE PODE SER MINIMIZADO COM TITULAÇÃO DA DOSE PRESCRITA.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BETA BLOQUEADORES, INIBIDORES DA ECA, BLOQUEADORES DO RECEPTOR DA ANGIOTENSINA II E ESPIRONOLACTONA, Positivo: MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA, REDUZINDO SINTOMAS E MELHORA DO PROGNÓSTICO, MELHORANDO A FUNÇÃO SISTÓLICA DO VE., Negativo: IECA: TOSSE. ESPIRONOLACTONA: MASTALGIA E GINECOMASTIA. BETA BLOQUEADOR; BRADICARDIA.</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na insuficiência cardíaca , Negativo: Pressão baixa</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inalapril, Positivo: Insuficiência cardíaca melhorou, Negativo: Pressão alta</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O benefício é consistente e cientificamente comprovado em todo o primeiro mundo Nem mais há polemicas quanto aos enormes beneficios</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Recuperação da função sistolica na IC , Negativo: Hipotensao arterial no inicio do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BetabloqueadorBRAEspironolactina , Positivo: Melhora lenta da função sistolica, Negativo: Lentidão e nem Sempre sucesso</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação valsartan/sacubitril veio para mudar o prognóstico e melhorar qualidade de vida daqueles pacientes já em tratamento medicamentoso otimizado e que mesmo assim persistem sintomáticos. Uma excelente opção de tratamento para casos específicos que pelo custo fica impossibilitado de ser ofertado aos pacientes do sus. A medicação não precisa ser liberada para todos os casos, a princípio, porém é fundamental que seja uma opção de tratamento para pacientes em tratamento otimizado e que ainda estão sintomáticos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Valsartana/sacubitril, Positivo: Melhor controle da disnia, aumento da autonomia do paciente, melhor qualidade de vida, redução de necessidade de internação para compensar a insuficiência cardíaca e redução de mortalidade, Negativo: Prescrição limitada para pacientes com disfunção renal e hipoercalemia, prurido ocasional.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos disponíveis no mercado e utilizados no tratamento da Insuficiência cardíaca , Positivo: Mesmos descritos acima porém em menor proporção e intensidade, Negativo: Mesmos descritos acima</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da sobrevida, Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol, Captopril., Positivo: Melhora dos sintomas e da sobrevida, Negativo: Tosse</p>
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sou usuário de valsartana/htc (Diovan) desde 2006/2007. e conheço bem os benefícios deste componente. e no caso do sacubitril/valsartana, segundo todos os profissionais da área médica e farmacêutica, só dão boas referências no Mundo todo !!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Renitec, Diovanq/HTC, Positivo: estabilização da PA, Negativo: nenhuma, mas com o passar do tempo, o Renitec, foi substituído pelo Diovan</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Renitec, Diovanq/HTC, Positivo: estabilização da PA, Negativo: nenhuma, mas com o passar do tempo, o Renitec, foi substituído pelo Diovan</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu era usuário de vários outros medicamentos como : Renitec, Captopril, Losartana, e outros medicamentos que já não recorro, pois sou hipertensa desde 1982, meu filho usa o Diovan/HTC e conheço bem os benefícios deste componente. e no caso do sacubitril/valsartana, segundo todos os profissionais da área médica e farmacêutica, só dão boas referências no Mundo todo !! e desde que iniciei meu tratamento com sacubitril/valsartana, minha PA estabilizou (há tempos não ocorria), porém o preço é muito elevado</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Renitec, Captopril, Losartana, Anlodipino, e muitos outros, Positivo: Estabilidade da PA, Negativo: no caso do Anlodipino inchaço nas pernas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Renitec, Captopril, Losartana, Anlodipino, e muitos outros, Positivo: Estabilidade da PA, Negativo: no caso do Anlodipino inchaço nas pernas</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Melhora da Qualidade de vida , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol, enalapril, Positivo: Estabilização dos sintomas por um período , Negativo: Polifarmácia/ Efeitos colaterais com outras medicações</p>
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Produto proporcionou melhora considerável para meu pai</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora do fluxo de injeção, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Losartana, Positivo: Melhora no início do tratamento, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Evidencias robustas do beneficio em insuficiencia cardiaca com fração de ejeção menor de 35%</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diureticos, betabloqueadores, inibidor da aldosterona e sacubitril/losartan, Positivo: Melhora da classe funcional, Negativo: Raros efeitos de hipotensao e hiperpotassemia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim todos, Positivo: Melhora clinica, Negativo: Hipotensao sintomatica rara</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Excelente experiência com ótima resposta clínica nos meus pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Excelentes resultados na qualidade de vida, dispnéia, edema, internações, tolerância ao esforço, redução das intenções por descompensação por insuficiência cardíaca e melhora evidente da fração de ejeção cardíaca do VE ao ecocardiograma., Negativo: Raros casos de tosse ou hipotensão arterial.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Digoxina, beta bloqueadores, aldactone, diuréticos, nitrato e ieca ou Bra., Positivo: Melhora cardíaca porém não tão acentuada sem o Entresto., Negativo: Tosse, intoxicação digitalica, fadiga, tontura, intolerância a betabloqueadores e pouca melhora da fração de ejeção.</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio é importante e tem me ajudado muito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trato pacientes com insuficiência cardíaca severa e a resposta desta medicação foi superior ao tratamento convencional</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, losartana , Positivo: Aumento de fração de ejeção; diminuição do diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo , Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril , Positivo: Melhora dos parâmetros cardíacos. Porém, quando troquei para o entresto a resposta foi muito superior , Negativo: Enalapril: tosse, hipotensão, insuficiência renal Beta bloqueadores: broncoespasmo</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana , Positivo: Com entresto tenho evolução no grau de resistência física., Negativo: Com losartana, tinha muito cansaço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Cansaço, Negativo: Cansaço</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os dois., Positivo: Melhora importante do cansaço e edema. Sintomas, Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Brasleca Diurético alça e espirinolactona....., Positivo: Melhora dos sintomas., Negativo: Mantinha a evolução natural da doença e piora progressiva da gravidade com aumento da morbidade e mortalidade.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta medicação está mudando a história da insuficiência cardíaca</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitri/valsartana, Positivo: Melhora da função ventricular, diminuição de internação por insuficiência cardíaca e da mortalidade, Negativo: Reação alérgica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores de enzima de conversão, betabloqueadores, bloqueadores do sistema regina angiotensins, Positivo: Também melhoram a função ventricular mas são inferiores ao sacubitril_/valsartana, Negativo: Tosse, reação alérgica</p>
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eficácia do medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 24/26 mg., Positivo: O paciente passou a dormir melhor sentindo menos cansaço., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Losartana, Positivo: São poucos os efeitos positivos, Negativo: Paciente sentindo cansaço constantemente.</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamentos com custo altíssimo fora do alcance da grande maioria</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Controle da pressão e cardíaco , Negativo: Não os conheço</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento essencial para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida conforme diretrizes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora importante dos sintomas e melhora da sobrevida, Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enslapril , Positivo: Compensa os sintomas da ICC, Negativo: Não melhora prognóstico</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma medicação relativamente nova e que dá excelentes resultados, SALVA VIDAS! Infelizmente, é muito caro e muitas vidas seriam salvas se tivesse acesso a essa medicação. Faço uso com sacrifício, reduzindo até às compras no supermercado, pois, a medicação é vital.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso desta medicação e os resultados foram ótimos para a minha insuficiência cardíaca., Positivo: Estou vivo., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103. Concardio 5mg, Positivo: Estou vivo, Negativo: Nenhum</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso da medicação entresto 97/103 mg, salvou a minha vida. Infelizmente é uma medicação cara e faço uso com sacrifício, diminuindo as compras no supermercado, pois, terei que usar por toda vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103 e concardio 5mg, Positivo: Estou vivo graças a essas medicações., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto e concardio, Positivo: Estou vivo, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Comprovada cientificamente a eficácia da droga em relação a diminuição de hospitalização e melhora da classe funcional e redução dos diâmetros cavitários.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da classe funcional Diminuição de internação Melhora qualidade de vida Diminuição dos diâmetros cavitários, Negativo: Angioedema se não for respeitada a transição do IECA para o entresto. Custo elevado. Hipotensão arterial nas doses mais elevadas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, Positivo: Melhora do remodelamento. Bom controle pressorico, Negativo: Efeitos colaterais - tosse Piora da função renal Hipercalemia Angioedema</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril/valsartan, Positivo: MELHORIA DOS SINAIS E SINTOMAS DA ICC NAS PRIMEIRAS SEMANAS DE USO DO MEDICAMENTO. RETORNO AS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA DO PACIENTE., Negativo: HIPOTENSÃO ARTERIAL EM ALGUNS PACIENTES QUANDO DA ELEVAÇÃO DA DOSAGEM, CONTORNÁVEL COM ESCALONAMENTO DE DOSES AO LONGO DO DIA</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Reduz mortalidade de 20%.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as drogas existente no brasil, Positivo: Reduziu a sintomas, Negativo: Diarreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidor danemo-nos de conversão. Betabloqueadores . Inibidor mineralocorticoide. Bra . Diuréticos. Digoxina. Ivabeadina . Nitratos. Hidralazina. Dobutamonia., Positivo: São drogas utilizadas na insuficiência cardíaca. Pois esta doença tem mortalidade alta e com frequência os pacientes são internados . E segundo o dataSus e a 3 causa de internação clínica no Brasil. Correspondendo a 7 milhões de brasileiros., Negativo: Todos os medicamentos podem ter efeitos negativos. A digoxina intoxica facilmente . Os diuréticos câimbras. Ieca e bra dao tosse . Betabloqueadores bradicardia e hipotensão. Enfim não existe remédio sem efeitos colaterais</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois trata-se da melhor medicação atualmente para insuficiência cardíaca que muda mortalidade inclusive vários pcte saindo da fila de transplante com essa medicação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Pacientes que tiveram recuperação da fração de ejeção pcte que tinha 18% que foram para 50%! Pcte que iam transplantar melhoraram a ergoespirometria, Negativo: Hipotensao</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, captopeil, losartana, espironolactona, carvedilol, bisopeolol, Positivo: Efeitos bons como melhora de sintomas porém poucos casos de remodelamento reverso. Nunca consegui tirar pcte da fila c essas medicacoes, Negativo: Impotência sexual Hipotensao Tosse seca</p>
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicacao é compativel com quem usa levotiroxina e outros medicamentos nao o sao . Tambem é uma medicacao cara para grande parte da populacao.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Compativel com medicacao para tireoide, Negativo: Não foi notado nada em desacordo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Benicar, Positivo: Bom controle da pressão arterial, Negativo: Incompatível com levotiroxina</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: entresto, Positivo: melhora da dispneia, melhora da performace cardiaca, melhor controle pressorico, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: carvedilol, espironolactona, losartana potassica, procuralan, enalapril, furosemida, hidroclorotiazida, Positivo: controle pressorico, Negativo: hipeotensão arterial, tosse com enalapril, edema com hidroclorotiazida,</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha experiência clínica é muito gratificante, pois melhora a qualidade de vida dos paciente em quase que em 100% dos pacientes. Aí ainda temos o embasamento científico robusto mostrando redução dos desfechos de MACE... Não tem como não desejar esta medicação para todos!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril-Varsartana, Positivo: melhora dos sintomas da IC com melhora da classe funcional do paciente aos esforço, Negativo: hipotensão inicial com queixas de tontura que desaparecem em até 21 dias do início do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ivabradina, Carvedilol, Nebivolol e Bisoprolol, Positivo: todos melhoraram os sintomas da IC, Negativo: Carvedilol > hipotensão não tolerada pelos pacientes e sem melhora a médio prazoNebivolol > pode causar insuficiência renal importantelvabradina eventualmente mostrou-se pró-arrítmicaBisoprolol não notei efeito negativo</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho experiência própria da melhora clínica dos pacientes que</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Melhora dispneia , diminui internação e diminui óbito , Negativo: Não tive a</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SACUBITRIL-VALSARTANA, Positivo: MELHORA SINTOMÁTICA DOS PACIENTES COM IC, REDUÇÃO DE ADMISSÕES HOSPITALARES., Negativo: HIPOTENSÃO.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA/BRA, ESPIRONOLACTONA, FUROSEMIDA, IVABRADINA, DIGOXINA, HIDRALAZINA, NITRATOS., Positivo: MELHORA SINTOMÁTICA, REDUÇÃO INTERNAÇÕES, Negativo: HIPOTENSÃO, TOSSE, GINECOMASTIA, HIPERCALEMIA.</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entreato , Positivo: Muito positivo, Negativo: Não teve efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora a falta de ar e a fadiga, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicação e eficaz diminui internação hospitalar ja com estudos paradigm que relatam isso. medicação deve ser instituída,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sim medicação entresto (sacubitril/valsartana) em todas dosagens 24/26 -dose 49/51 - dose 97/103, Positivo: - diminuição de internação - melhora clinica satisfatório - diminuição de descompensação cardíaca e idas para `PS, Negativo: - efeito negativo ate o momento nao tive com o produto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: produtos que tenho utilizado para insuficiencia cardiaca - espironolactona - carvediolol- enalapril - losartana -selozok - bisoprolol , Positivo: - sao medicacoes estabelecidas para tratamento de insuficiencia cardiaca , Negativo: efeitos negativo polifarmacia - ma adesão ao tratamento pela paciente</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ele é um medicamento muito bom pra insuficiência csrdiaca</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entreato 24/26, Positivo: Eu utilizo o Entresto 24/26 e foi muito bom pra minha recuperação acabando com dudmsiod, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atorvastatina, Brilinta, Positivo: Todos muito bom, Negativo: Muitos desmaios</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido ao alto preço e como aposentado nao tenho condições de compra-lo todo mes, sendo que consumo duas caixas por mês ee medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97mg via otal, Positivo: Foi percebido uma leve melhora na capacidade reapirotoria, Negativo: Nada</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana e amiodrona, Positivo: Nenho notado, Negativo: Queda na pressão</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sacubitril/valsartana trata o paciente com excelente eficácia devolvendo qualidade de vida aos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Paciente com rápida recuperação da classe funcional, redução importante do edema e recuperação da qualidade de vida, Negativo: não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: inibidores de enzima de conversãoespironolactonabetabloqueadoresivabradina, Positivo: esses medicamentos tem ação efetiva porém em muitos casos a resposta é limitada, Negativo: incapacidade de alcançar as metas preconizadasefeitos indesejáveis das medicações</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso domedicamento está definido por sociedades internacionais e brasileira de tratamento para insuficiência cardíaca com excelente resultados</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da classe funcional, menor taxa de internação , Negativo: Apenas hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores da Eca, da angiotensina , Positivo: Melhora dos sintomas , Negativo: Tosse, insuficiência renal, hipotensão</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO, Positivo: MELHORA DA CLASSE FUNCIONAL, Negativo: TOSSE</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DIGOXINA LASIX IECAS ESPIRONOLACTONA, Positivo: MELHORA DA CLASSE FUNCIONAL, Negativo: TOSSE, DESIDRATAÇÃO, INTOXICAÇÃO DIGITÁLICA</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, remedio oneroso</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: EntrestoCarbedilolFurosemida, Positivo: Remédios eficientes no tratamento de doenças cardíacas, Negativo: Não há efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EnalaprilMetoprololCarvedilolEspironolactonaBisoprololFurosemidaDigoxinaEmpagliflozina, Positivo: Em conjunto todos são bom para ICC, Negativo: Varias tomadas e multi drogas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já citados, Positivo: Vide Bula, Negativo: Vide Bula</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mostrou ser efetivo no tratamento de icc</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol, Positivo: Remodelamento cardiaco, Negativo: Inotropismo negatico</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, Positivo: Remodelamento cardiaco, Negativo: Tosse,alergia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo PARADIGM mostrou redução de 20% em reinternação e morte. A melhora clínica é absurda além da diminuição do BNP em pacientes com ICC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril valsartana, Positivo: Melhora clínica melhora ecocardiográfica e melhora de BNP, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IRCA BRA Nitrato Hidralazina B bloq ARNI Diuréticos, Positivo: Redução de mortalidade e redução de internação, exceto nitrato diurético e hidralazina, Negativo: IECA - tosse B bloq - hipotensão ARNI - hipercalemia</p>
06/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu médico receitou o entresto como melhor opção de mercado momento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana Entresto, Positivo: Losartana médio Entresto remédio atual com altas pesquisas internacionais, Negativo: Losartana desatualizado Entresto valor altíssimo</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio de auto custo com 28 comprimidos tendo que tomar 2 por dia</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24. 26, Positivo: Melhorou bem a cansaça que eu apresentava, Negativo: Muito caro o medicamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Effient 10 mg. Entresto. 24 26. Crestor. 10 mg, Positivo: Como tenho 4 stends e insuficiência coronária esses medicamentos citados tem sido bons com resultados satisfatórios., Negativo: Não tenho efeitos negativos pra enumerar.</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Deve haver uma análise de custo-efetividade realizada por especialistas. A depender do preço em que a droga será disponibilizada ao governo, ela deveria ser disponibilizada pois diminui a mortalidade cardiovascular de pacientes portadores de Insuficiência Cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora de sintomas, Negativo: Hipotensão arterial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, BRA, Beta bloq, Espironolactona, Positivo: Redução de sintomas, Negativo: Tosse, hipercalemia, insuficiência renal. hipotensão.</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que este medicamento deva ser custeado pelo SUS, principalmente para pessoas idosas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26, Positivo: Senti menos fadiga nos exercícios físicos., Negativo: Menos atividade sexual</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não me lembro do nome do medicamento., Positivo: Os efeitos é o mesmo do medicamento descrito " Entresto", Negativo: Não houve efeitos negativos.</p>
06/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito caro e todo o meu tratamento fica mais caro ainda, pois, tomo outros medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: Não sei descrever</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Procoralan, sinvastatina, aece, Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: Não sei descrever</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartam, Positivo: Redução do número de internações por insuficiência cardíaca e limitação da progressão da mesma, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CarvedilolEspironolactona, Positivo: Carvedilol: reduz frequência cardíaca e aumenta fração de ejeção Espironolactona: reduz mortalidade, Negativo: Hipotensão</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem muitos pacientes que estão morrendo por ICC e essa medicação é de extrema necessidade para o tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos cardiológicos, Positivo: Menos número de internação e melhora clínica significativo, Negativo: Pacientes com alergia a essa medicação, que é muito raro</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Digoxina, tem muito mais efeito colateral, Positivo: Diminui o edema e a sobrecarga ventricular, Negativo: Arritmias</p>
06/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril/valsartan, Positivo: inotropismo positivo com melhora da insuficiência cardíaca, melhor que os bloqueadores beta 1 alfa 1, Negativo: baixa intolerância</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bloqueador beta 1 alfa 1, Positivo: inotropismo positivo com melhora da insuficiência cardíaca, Negativo: baixa intolerância</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Até porque já uso o medicamento e tenho que pagar um absurdo no mercado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: xig duo., entresto, concardio, insulina., Positivo: Tomava 25 medicamentos por dia. Hoje tomo 8. Melhorei 70%, Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Monocordil, aspirina Prevent, Furosemida, Metformina, Glibenclamida, Sinvastatina, Homelprazol, etc..., Positivo: Tive melhora considerável., Negativo: Prejudicial ao estômago.</p>
03/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é muito importante para a qualidade de vida de centenas de pessoas e inclusive salva vidas, muitas dessas pessoas não tem condições para comprar e é desumano negar esse direito.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Diminuiu os efeitos da insuficiência cardíaca, aumentou a fração de ejeção, Negativo: Pressão arterial caiu ao longo do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: -, Positivo: -, Negativo: -</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento contribui e muito na minha doença</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: Terminou meus cansaços, falta de ar, minha qualidade de vida aumento bastante, Negativo: não teve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: LEVOTIROXINA/PURAN 50MG - 2 COMPRIMIDOS (JEJUM)ESPIRONOLACTONA 25 MG – 1 CP DIA (ALMOÇO)AMIODARONA 200 MG – ½ CP – DIA (ALMOÇO)CITALOPRAM (ANTI-DEPRESSIVO) – 1 no ALMOÇO (Receita controlada)OMEPRAZOL 20 MG – 1 CP CEDOSELOZOK 25 MG – 1 CP CEDOFUROSEMIDA 40 MG – 1/2 CP CEDOVASTAREL MR 35 MG – 12/12 HORASPRADAXA 110 MG – 12/12 HORAS (anticoagulante)ENTRESTO 49/51 – 1 CP CEDO/NOITEROSUVASTATINA 10 MG – 1 CP NOITE, Positivo: cada medicamentos tem a sua função , Negativo: Só melhoras</p>
03/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ENTRESTO 49/51, Positivo: A PACIENTE APRESENTOU MELHORA NA DISPOSIÇÃO, PAROU DE SENTIR CANSAÇO E DORMIR MELHOR., Negativo: SEM EFEITO NEGATIVO</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação reduz a morbidade e a internação hospitalar, pois auxilia o paciente a ter uma ótima qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: O MEU CANSAÇO DIMINIU. , Negativo: NÃO ME OCORREU NENHUM EFEITO NEGATO</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: MALEATO DE ENALAPRIL , Positivo: É UM BOM MEDICAMENTO PORÉM O ENTRESTO É BEM MELHOR, Negativo: NAO FORAM VERIFICADOS EFEITOS NEGATIVOS</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: acubitril/valsartana, Positivo: Controle da arritmia, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Varios, Positivo: Não foram suficientes , Negativo: Não foram suficientes</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, FAÇO USO DO ENTRESTO E HOUE MELHORA MUITO SIGNIFICATIVA DA MINHA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. TENDO EM VISTA QUE É MUITO DIFÍCIL FINANCEIRAMENTE MANTER O CONTROLE DESSA MEDICAÇÃO, SENDO MUITO IMPORTANTE SUA INSERÇÃO NO SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: FAÇO USO DO ENTRESTO 24MG/26MG. , Positivo: Usado para tratar insuficiência cardíaca., Negativo: PREÇO DO MEDICAMENTO NAS FARMÁCIAS.</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Visto o benefício em relação à morte, internações por insuficiência cardíaca a combinação sacubitril valsartana nos estudos clínicos é muito mais benéfica aos pacientes com IC que o tratamento até hoje fornecido pelo SUS. Essa medicação também reduziria gastos em hospitais terciários com internações desses pacientes .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril valsartana, Positivo: Melhora de sintomas e internações por IC, Negativo: Hipotensão em alguns pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores da eca Beta bloqueadoresDiuréticos , Positivo: Controle PA , Negativo: Sintomas de IC mantidos mesmo com terapia otimizada</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, remédio de uso contínuo que eu uso se pudesse pegar pelo SUS me ajudaria muito</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto 24/36, Positivo: melhora o andamento do coração, Negativo: não percebi ainda</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: vários, Positivo: não resolveu, Negativo: não resolveu nada</p>
03/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 24/26 mg, Positivo: Melhora da insuficiência cardíaca, Negativo: não observado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ancoron 200 mg, Positivo: não observado, Negativo: Efeitos colaterais na pele, tireoide, visão e gástrico.</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apenas discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pessoas com insuficiência cardíaca crônica, geralmente não podem trabalhar e o preço desse medicamento é muito caro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: meu coração de 17% de funcionamento passou para 37% depois do uso desse medicamento, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação tem se mostrando bastante favorável na melhora clínica e redução de eventos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Entresto- redução sintomas, internamentos, Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores de IECA, bloqueadores receptor angiotensina, betabloqueadores, espirolactona, Positivo: Melhora de sintomas e redução de mortalidade, Negativo: IECA- tossebetabloqueador- broncoespasmoespirolactona- ginecomastia e hipercalemia BRA- piora da função renal</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DOENÇA CARDIOVASCULAR É A QUE MAIS MATA . Como vou concordar em deixar de dar um medicamento que diminui mortalidade na ICC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhor capacidade física e menos internação hospitalar, Negativo: Alto preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, Positivo: Tem nas farmácia popular, Negativo: Tosse</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, baseado em evidência científica para melhor com nossos pacientes, devemos considerar a inclusão de padronizar o ENTRESTO com primeira escolha para o tratamento de IC.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO, Positivo: Melhora da qualidade de vida, redução do número de hospitalização/ reinternação, alteração da classe funcional precocemente. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, Positivo: Comparado com o ENTRESTO, se mostrou inferior em todos os quesitos cotados anteriormente, Negativo: Hospitalização recorrente, aumento das taxas de internação, morte súbita, diminuição da qualidade de vida, sem prognóstico quanto a mudança da classe funcional.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na Insuficiência Cardíaca, melhor qualidade de vida, Negativo: Não observados.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Enalapril, Positivo: Manteve a pressão normalizada., Negativo: Pouco efeito sobre a insuficiência.</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartana, Positivo: Melhora importante da classe funcionalMelhora da qualidade de vida redução de internações, Negativo: ainda não tive casos com efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol, Bisoprolol, Espironolactona, Valsartana, Enalapril, Ivabradina, Positivo: redução de mortalidade, Negativo: efeitos colaterias</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97mg/103 dois comprimidos ao dia., Positivo: Meus exames apos quatro meses de uso, me sinto mais presente no meu dia a dia . Os meus exames tiveram relativa alteração favoravel.</p> <p style="text-align: right;">, Negativo: Custo do remédio, muito caro, estou pagando R\$ 199,17,</p> <p>isto porque fiz o cadastro no site da novartis.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Micardis, Anlo 80,5g, Positivo: Estou e sentindo melhor, Negativo: Não tenho mais pressão alta.</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portador da miocardiopatia dilatada e faço uso do entresto, sem ele não consigo ficar estável, dependo de doações de laboratórios pra poder toma-lo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, enalapril, carvedilol 25 mg, digoxina, furosemida, espirolactona, Positivo: O entresto estabiliza meu cansaço e com uso diario dele posso fazer ate exercicios leves e nao dependo tanto de internações. Faço uso tbem de carvedilol, digoxina, espirolactona, furosemida., Negativo: Tive um efeito negativo com o enalapril, ele nao foi eficaz e acabei internando.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, enalapril, carvedilol 25 mg, digoxina, furosemida, espirolactona, Positivo: Todos me ajudam no tratamento, menos o enalapril, Negativo: Tive um efeito negativo com o enalapril, ele nao foi eficaz e acabei internando.</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os efeitos da droga extremamente positivos justificam os custos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da ICCRedução da hospitalização Redução de riscos cardiovasculares , Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidor da ECAEspironolactonaDigitálicoVasodilatador , Positivo: Redução de riscos , Negativo: Altos efeitos colateraisBaixa efetividade Risco de morbidade/ mortalidade ainda elevados</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, PREÇO MUITO ALTO , PARA O POVO QUE NÃO TEM APORTE FINANCEIRO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Excelente terapeutica para o controle de pacientes com insuficiencia cardíaca, demonstrando excelnete em diminuição de hospitalização e morte cardiovasculares. Conseqüentemente, melhor qualidade de vida e menor risco para o paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril 24 mg valsartana 26 mg Sacubitril 49 mg + valsartana 51 mg Sacubitril 97 mg + valsartana 103 mg , Positivo: Minimização de internação com o melhor controle dos pacirentes com Insuficieância Cardíaca, Negativo: Durante esses meses de uso, não foram detectados pontos negativos clinicos e/ou comercias</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betabloqueadores farmacologicos , Positivo: Controle de insuficiencia cardíaca , Negativo: nada a declarar</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessidade devido a insuficiência cardíaca</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: estabelecimento cardíaco, Negativo: não há nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: estabelecimento cardíaco, Negativo: não há nenhum efeito negativo</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Posso muitos pacientes em tratamento com sacubitril/valsartana e a melhora é muito significativa, sendo para alguns a única droga que teve melhora do quadro clínico do mesmo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora da classe funcional da ICC, Negativo: Piora da função renal nos pacientes com insuficiência renal crônica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, Valsartana, Candesartana, Captopril, Olmesartana e Losartana, Positivo: Melhora limitada da classe funcional, Negativo: Piora da função renal em muitos pacientes, persistência do edema nos pacientes com classe funcional III da NYHA</p>
03/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na falta de ar, inchaço e pressão alta., Negativo: Sonolência e pressão baixa.</p> <p>3ª - Não</p>
02/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento já foi incorporado às diretrizes mundiais e reduz mortalidade e reinternações.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da classe funcional, Negativo: Hipotensao</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: MANTEM A PRESSÃO ARTERIAL CONTROLADA, Negativo: CUSTO DO MESMO</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NEBILET, Positivo: AJUDA A MANTER A PRESSÃO CONTROLADA, Negativo: NIVEL SÉRICO CURTO</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Ha beneficios clinicos evidentes em expressivo grupo de pacientes.Ha reducao de mortalidade e internacao.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril valsartan, Positivo: Ganho de Capacidade FuncionalEstabilizacao de insuficiencia cardiacaReducao internacao, Negativo: Hipotensao</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros ieca e bra, Positivo: Mesmos. , Negativo: Mesmos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estamos falando de um medicamento novo, importantíssimo para o tratamento da insuficiência cardíaca e é fundamental que todos tenham acesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um absurdo o governo se abster em fornecer um medicamento tao importante à população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O produto traz benefícios para a saúde do paciente. Diminui a mortalidade e a hospitalização. Dando melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Tirou do paciente a dispneia. Antes não levantava pra nada. Hoje já faz caminhadas. Melhorou muito a vida., Negativo: Hoje a dificuldade de tratar com Entresto é o preço onde muita gente não tem como pagar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Enalapril, Positivo: Ser fornecido pelo SUS. GRATIS, Negativo: Enalapril dá tosse e não traz todos os benefícios do Entresto na qualidade de vida com menor risco de morte.</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como cardiologista, especialista em insuficiência cardíaca e transplante cardíaco, observo o sofrimento dos pacientes e observo a alta incidência de internação e morte nesses pacientes portadores de insuficiência cardíaca. Nesse contexto, a droga sacubitril/valsartana foi o primeiro medicamento desde 1999 (com a espironolactona), não há novos medicamentos que afetem de forma substancial desfechos clínicos nesses pacientes. Sabemos que a insuficiência cardíaca é uma das patologias que mais oneram as fontes pagadoras, principalmente em países desenvolvidos. Entretanto, ela onera ainda mais os pacientes e familiares. O sacubitril/valsartana é custo eficaz, melhora a qualidade de vida desses pacientes e reduz desfechos clínicos importantes. Acredito que sua inclusão no rol de medicamentos cobertos pelo SUS traria enorme benefício aos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril / valsartana, Positivo: melhora da qualidade de vida melhora dos sintomas de insuficiência cardíaca retorno dos pacientes a sua rotina de trabalho maior chance de melhora da função cardíaca menor chance de hospitalização, Negativo: risco de hipotensão, que pode ser contrabalanceado com redução de diuréticos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta bloqueadores inibidores de enzima conversora de angiotensina inibidores de aldosterona digoxina diuréticos vasodilatadores ivabradina, Positivo: já são tratamento padrão, Negativo: já são tratamento padrão</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, sugiro seguir as diretrizes internacionais para o tratamento da IC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril valsartana, Positivo: melhora da CF, Negativo: hipotensão</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pela minha experiência sou favorável a padronização do ENTRESTO ao arsenal médico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: carvedilol//nebivolol, digoxina, furosemida, espironolactona, Positivo: Em todos eles, a resposta sempre fica um pouco a desejar, mas era o que tínhamos em mãos, Negativo: Os efeitos negativos com a digoxina era a intoxicação, com os demais, as vezes havia bronco-espasmo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os descritos acima, Positivo: Idem, Negativo: idem</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Comprovadamente melhora a qualidade de vida dos pacientes, reduzindo a necessidade de transplante cardíaco, procedimento mais dispendioso ao governo e mais moroso.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da classe funcional de insuficiência cardíaca, Negativo: Não relatado pelos pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento convencional para IC (diurético de alça, IECA, beta bloqueador, antagonista de aldosterona), Positivo: Combinação geralmente com efeito positivo na IC CF II, III e nem sempre na CF IV., Negativo: Difícil resposta nos pacientes com IC avançada.</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Saber da melhora que os pacientes obtiveram com o uso da medicação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril e valsartan, Positivo: Melhora dos sintomas de cansaço, melhora da classe funcional, melhora da Fração de ejeção ao Ecocardiograma., Negativo: Hipotensao</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamentos: betabloqueador, diureticos, vasodilatadores, inibidores da ECA, bloqueadores dos receptores do angiotensinogenio, derivados da digital,, Positivo: Melhora da dos sintomas, Negativo: IECA: TOSSE, BRAS: hipotensao, Bbloqueador: bradicardia, diureticos: hipocalemia</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E uma medicação que muda completamente a qualidade de vida do paciente, diminuído internação se retardando ou evitando em muitos casos a indicação de transplante cardíaco . Diminuindo desfechos primários e secundários , inclusive morte. E já foi incorporada , devido aos resultados, às principais diretrizes para tratamento de insuficiência cardíaca .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/ valsartana, Positivo: Vide resposta pergunta n 7 , além de melhor da função renal em muitos casos , Negativo: Hipotensão que pode ser manejada com o ajuste das outras medicações .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA / BRA Betabloqueadores Espironolactone Diuréticos Hidralazina + apresolina Digital , Positivo: Nenhum se igualou aos efeitos obtidos com sacubitril/ valsartana , Negativo: Diversos</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação melhora a sobrevida e reduz hospitalização dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/ valsartan , Positivo: Melhora significativa dos quadros de insuficiência cardíaca , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: São inferiores ao sacubitril/valsartan, Negativo: Não há</p>
03/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora o cansaço e disposição , Negativo: Não vi nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu uso continuo esse medicamento e tenho que comprar e como ganho 1 salario minimo e compro ainda outros medicamento pro coração, gasto em média 570,00 mensais com medicação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103mg Cilostazol 100mg Clopidogrel 75mg Diamicrom MR60mg Procolaram 7,5mg, Positivo: Efetuei cirurgia no coração em janeiro de 2017, como sou diabetico a veia da perna não estava totalmente boa, ai foi feito 1 safena e 1 mamaria sendo que precisava de 5 safenas, no dia da alta o profissional da saude me disse que eu precisava tomar medicamentos pro resto da vida ou entrar na fila de transplante, eu prefiro tomar os medicamentos, pois fiquei 2 dias a mais na UTI e se for fazer o transplante vou morrer., Negativo: Se eu não tomar esses medicamentos citados acima com certeza nao viverei.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As evidências científicas atuais estão em oposição à recomendação da CONITEC Existe estudo com grande casuística mostrando claro benefício da medicação em relação ao tratamento padrão com enalapril</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril -valsartana , Positivo: melhora da capacidade funcional adicional ao tratamento padrão com enalapril melhora da qualidde de vida adicional ao tratamento padrão com enalapril redução de chance de internação por descompensação adicional ao tratamento padrão com enalapril menor taxa de hiperpotassemia em relação ao tratamento padrão com enalapril , Negativo: maior taxa de hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: enalapril , Positivo: melhora da classe funcional melhora da qualidade de vida redução de chance de internação , Negativo: hipotensão insuficiência renal hiperpotassemia</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: sacubitril/valsartana), Positivo: remédio me fortaleceu muito, sou outra pessoa após o uso do medicamento, Negativo: o valor é muito alto</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: não me lembro, Positivo: não me lembro, Negativo: n</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação reduz drasticamente internação e óbito por insuficiência cardíaca e com sólidas evidencias científicas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não lembro, Positivo: Redução de morte e internação por insuficencia cardíaca reduzindo assim o custo efetivo da doença., Negativo: Custo para os pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta bloqueadores, IECA, BRA entre outros., Positivo: redução de desfechos mas não de forma tão significativa como o Sacubitril/Valsartana., Negativo: Custo para os pacientes.</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Optei pela troca de medicamentos em dose maxima preconizados para insuficiência cardiaca (ieca/bra) em pacientes sintomaticos classe III da NYHA pela medicação em questao com melhora importante da sintomatologia do paciente e melhora da qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartan - nome comercial entresto nas dosagens 24/26 mg, 49/51 mg, Positivo: Melhora da classe funcional NYHA em que o paciente se encontrava com reducao da dispnea aos esforcis, dispnea paroxistica noturna, astenia e fraqueza; nao houve piora da função renal; nao apresentou hipercalemia., Negativo: Deve-se aumentar a dose do entresto Gradativamente pelo risco de hipotensao.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, captopril, Losartana, valsartana., Positivo: Sao medicamentos que agem no remodelamento cardiaco com reducao d progressao da cardiopatia, Negativo: Piora de função renal, hipercalemia, angioedema e hipotensao</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2018	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É indiscutível a melhora que o Entresto trás ao paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartana/IECABRA, Positivo: Sacubitril/Valsartana: melhora de sintomas principalmente Enalapril: era a melhor opção de tratamento por anosBRA: paciente que não tolerava IECA, Negativo: Enalapril: muito evento adverso e constantes internações.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTOENALAPRILLOSARTANA, Positivo: Sacubitril/Valsartana: melhora de sintomas principalmente Enalapril: era a melhor opção de tratamento por anosBRA: paciente que não tolerava Enalapril, Negativo: Enalapril: muito evento adverso e constantes internações.</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Para beneficio dos pacientes portadores de insuficiência cardíaca, os estudos são claros e relevantes no tratamento dessa patologia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartana, Positivo: Redução de mortalidade cardiovascularRedução no internamentoRedução de mortalidade por todas as causas, Negativo: Não utilizar em pacientes dialiticosNão iniciar tratamento em pacientes com hipotensão sintomática</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: x, Positivo: x, Negativo: x</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pela redução de morte súbita, menor percentual de internações e, conseqüentemente melhora da qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por ser uma medicação de uso contínuo é muito cara.Precisamos que seja liberada pelo SUS urgentemente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou testemunha ocular e presencial de um paciente de ICfer que utiliza Valsartana/sacubitril, meu tio que reside ao lado de minha residencia e tenho grande responsabilidade no cuidado com ele, vi a melhora fantastica em qualidade de vida após iniciar o tratamento com esse produto, acredito que muitas pessoas que são portadoras desta doença poderiam se beneficiar e salvar suas vidas, é um medicamento indispensavel para todos os pacientes com ICfer</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Enalapril, Positivo: Enalapril, durante anos meu Tio utilizou esse medicamento, apresentou algum controle da doença e um custo baixo que ele não tinha dificuldade de comprar, e só...., Negativo: Durante anos meu tio utilizou Enalapril apresentando uma tosse insuportável e continuando a ter cansaso, fadiga, indisposição para tudo, limitação em todos os sentidos, nem banho ele tomava sozinho, com a toraca para Sacubitril/Valasartana ele é outra pessoa, voltou a ter gosto pela vida, voltou a ser independente e a ter perspectiva de vida, mesmo custando um pouco mais do que enalapril, vale muito a pena pis a melhora de meu tio, não tem preço.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Enalapril, Positivo: Enalapril, durante anos meu Tio utilizou esse medicamento, apresentou algum controle da doença e um custo baixo que ele não tinha dificuldade de comprar, e só...., Negativo: Durante anos meu tio utilizou Enalapril apresentando uma tosse insuportável e continuando a ter cansaso, fadiga, indisposição para tudo, limitação em todos os sentidos, nem banho ele tomava sozinho, com a toraca para Sacubitril/Valasartana ele é outra pessoa, voltou a ter gosto pela vida, voltou a ser independente e a ter perspectiva de vida, mesmo custando um pouco mais do que enalapril, vale muito a pena pis a melhora de meu tio, não tem preço.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio totalmente necessário que ajuda os pacientes com essa terrível doença debilitante e que a maioria não tem acesso pelo valor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto e karvil, Positivo: Entresto melhora demais a qualidade de vida, Negativo: Deu um pouco de enjoo. Mas nada que não desse pra contornar.</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo , baseado em evidência científica para o melhor com os nossos pacientes, devemos considerar a inclusão de padronizarmos o Entresto como primeira escolha para o tratamento de IC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Muda a mortalidade, melhora a qualidade de vida e altera classe funcional frequentemente e diminuição da hospitalização/internação, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enapril, Positivo: Comparado com entresto se mostrou inferior em todos os quesitos citados anteriormente , Negativo: Varios, evolucao e estabilizacao do paciente lenta , hospitalização recorrente e piora da qualidade de vida</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo .Baseado em evidência científica para o melhor com os nossos pacientes , devemos considerar a inclusão de padronizarmos o Entresto como primeira escolha para o tratamento IC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Todos que mudam mortalidade, diminui hospitalização, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, Positivo: Comparado com Entresto se mostrou inferior , Negativo: Vários, hospitalização recorrente é frequente , lenta estabilização</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O beneficio para o paciente é imensurável</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ieca, betabloqueadores, diuréticos, dentre outros, Positivo: melhora da IC, Negativo: Se manter em classe funcional III e IV</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA , Positivo: Melhora da IC, Negativo: Tosse</p>
03/12/2018	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Entresto, está incluindo é recomendado nas diretrizes Americanas, Europeia e Brasileira. Reduz significativamente a mortalidade cardiovascular, hospitalizações e reinternações por Insuficiência Cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto e Ieca , Positivo: Entresto : Melhora significativa dos sintomas, melhora na qualidade de vida e redução de hospitalização., Negativo: Ieca: Frequente internações e tosse como efeito adverso.</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com Sacubitril/valsartana em todas as suas dosagens, Positivo: Melhora significativa do quadro da ICC, poucos dias após o início da terapêutica com Sacubitril/Valsartana., Negativo: Hipotensão Piora da função renalInacessibilidade devido ao alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores da angiotensina e do seu receptorBetabloqueadoresDiuréticos Espironactona Nitratos , Positivo: Todos, quando usados em conjunto podem melhorar o quadro de ICC, Negativo: Inibidores: hipotensão Betabloqueador: bradicardiaDiurético : espoliação. HiponatremiaEspironolatna: retenção de potássio</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO PLENAMENTE, POIS NA PRÁTICA CLÍNICA, ENTRESTO SE APRESENTA MELHOR QUE IECAS NA REDUÇÃO DE HOSPITALIZAÇÃO - ESTUDO PAIONNER MOSTROU REDUÇÃO DE HOSPITALIZAÇÃO EM 49%. PORTANTO, MAIS ECONOMIA PARA O GOVERNO. ESTUDO PARADIGM HF, MOSTROU MAIS EFICÁCIA NA REDUÇÃO DE MORTE E HOSPITALIZAÇÃO FRENTE AOS RESULTADOS DOS IECAS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BETA BLOQUEADORES, DIURÉTICOS, IECAS, BRÁS, ENTRSTO., Positivo: ENTRESTO É MAIS EFICAZ QUE IECAS NA REDUÇÃO DE HOSPITALIZAÇÃO, MAIS QUALIDADE DE VIDA, MENOS IDAS AOS HOSPITAIS. VERIFICAR ESTUDO PIONNER., Negativo: IECAS SÃO MENOS EFICAZES QUE ENTRESTO NA REDUÇÃO DE HOSPITALIZAÇÃO. APRESENTAM EFEITOS ADVERSO COMO ANGIOEDEMA E TOSSE SECA.</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo Paradigma foi bastante consistente e convincente na redução da mortalidade cardiovascular com sacubitril e valsartan, a ponto de recomendar nas diretrizes americana e europeus o valsartan/ sacubitril como classe I.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim, com um ano de uso da medicação em quase cem pacientes, efeitos muito positivos: redução da mortalidade, todos os pacientes estão vivos, e melhoraram a classe funcional da ICC. Considero grande avanço. Nenhum deles necessitou de re-hospitalização, dos que usam s medicação citada. Logo, podemos economizar na reinternações, D nos custos hospitalares, com esta medicação. O impacto é extremamente positivo. Com sacubitril valsartan., Positivo: Sim, como descrevi acima: redução da mortalidade, redução da re-hospitalização, e melhora da classe funcional com sacubitril: valsartan., Negativo: Leve hipotensão arterial sistêmica, que reverti reduzindo a dose do diurético, pois os pacientes ficaram sem edema de membros inferiores. E tive nos resposta assim.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betabloqueadores, como carvedilol ou bisiprolol, antagonistas da aldosterona, como espironolactona, D inibidores de enzima conversora, como enalapril, diuréticos como a furosemida., Positivo: Redução da mortalidade, redução da re-hospitalização, melhora na classe funcional da ICC. , Negativo: Hipotensão arterial. Controle da função renal para evitar aumento da creatinina e do potássio, interação medicamentosa.</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho varios pacientes hoje em uso continuo e regular de Sacubitril/Valsartana , portadores de insuficiencia cardiaca com FE abaixo 40%,com melhora clinica importante,estabelecendo uma qualidade de vida que ha tempos tinham perdidos e diminuicao periodos de internacoes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartana, Positivo: Melhora dispneia,diminuicao exacerbacao com reducao periodo de internacao,melhora num todo na qualidade de vida, Negativo: Nao apresentou,pois nao havia mais a oferecer a esses paciente,e com a introducao da Sacubitril/Valsartana efeitos positivos a esses pacientes de rapida resposta</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Espuronolactona,Enalapril,betabloqueadores, Positivo: Melhora sintomas parcialmente, Negativo: Nao atende na qualidade de vida e sintomas</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho varios pacientes hoje em uso continuo e regular de Sacubitril/Valsartana , portadores de insuficiencia cardiaca com FE abaixo 40%,com melhora clinica importante,estabelecendo uma qualidade de vida que ha tempos tinham perdidos e diminuicao periodos de internacoes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartana, Positivo: Melhora dispneia,diminuicao exacerbacao com reducao periodo de internacao,melhora num todo na qualidade de vida, Negativo: Nao apresentou,pois nao havia mais a oferecer a esses paciente,e com a introducao da Sacubitril/Valsartana efeitos positivos a esses pacientes de rapida resposta</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Espuronolactona,Enalapril,betabloqueadores, Positivo: Melhora sintomas parcialmente, Negativo: Nao atende na qualidade de vida e sintomas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: lec, beta bloq, bloq do canal de calcio, Positivo: Melhora do remodelamento cardiaco e sintomas, Negativo: Hipotensao, preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: leca, Positivo: Melhora da qualidade de vida , Negativo: Em comparação com entresto pior resultado em mortalidade</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ESSE MEDICAMENTO, DEVE SER APROVADO O MAIS RAPIDO POSSIVEL EM PROL DO TRATAMENTO DE PACIENTES COM INSUFICIENCIA CARDIACA, POIS COMPROVADEMENTE ESSA MEDICAÇÃO REDUZ MORBI MORTALIDADE E DIMINUI NUMEROS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SACUBITRIL/VALSARTANA, Positivo: MELHORA DOS SINTOMAS, CLASSE FUNCIONAL DO PACIENTEREDUÇÃO NO NUMERO DE INTERNAÇÕES POR DESCOMPENSAÇÃO CARDIACA, Negativo: DIFICULDADE DE ACESSO AO TRATAMENTO POR PACIENTES DE BAIXA RENDA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BETA BLOQUEADORIECA / BRAESPIRONOLACTONA, Positivo: CUSTO BAIXO, Negativo: EFEITOS COLATERAISMÁ ADESÃO AO TRATAMENTO POR TER QUE UTILIZAR MAIS DE 1 MEDICAMENTO E ALTAS DOSES</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A associacao destas drogas melhora muitos qualidade de vida destes pacientes minimizandoSuas queixas e limitacoes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta bloq Cardiotonicos Diuréticos Imib da eCA, Positivo: Minimiza muito a dispnea aos esforços e decúbito,confere mais liberdade e menores limitações ao paciente cardiopata ,descompensada menos e reinterna muito menos., Negativo: Quando o paciente é hipotenso, a resposta é um pouco limitado porém reduzimos o uso de diuréticos a aceitação é melorb</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta bloqueadores,cardiotonicos ,diuréticos ,inibidores de enzima de conversao da angiotensina , Positivo: Melhora da FE, diminuição de edemas e de retencao líquida comoUm todos,melhora da dispnea ,etc porém com a associação do saci/valsartan a resposta é muito mais convincentere, Negativo: Redução acentuada da FC ,hipotensão ,câimbra,etc</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação em questão reduz o número de internações por descompensação da IC, melhorando a qualidade de vida do paciente. Se isso por si só já não bastasse, em termos de investimento, redução de internações significa menos gasto público com este paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril Valsartan, Positivo: Melhora da qualidade de vida, redução das internações por descompensação., Negativo: Hipotensão em alguns pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta-bloqueadores (carvedilol, metoprolol, bisoprolol), ivabradina, espironolactona, furosemida, inibidores de ECA e antagonistas de receptor de angiotensina II., Positivo: Alívio dos sintomas sem necessariamente melhora da classe funcional., Negativo: Nenhum deles reduz drasticamente as descompensações e internações</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento muito bem descrito pelos seus benefícios</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Diminuição de morbi mortalidade , Negativo: Nao presenciado</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há 2anos aguardamos a introdução desse medicamento no Brasil, medicação com indicação precisa para Insuficiência Cardíaca com benefícios adicionais importantes em relação à medicação usual. Essa medicação em nosso arsenal terapêutico trará um grande avanço na expectativa de vida para muitos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com IECA em especial o Enalapril, tb BRA e Betabloqueadores., Positivo: São medicações efetivas e que mudam positivamente o a evolução da ICC..Dão maior sobrevida aos pacientes.Diminuem os riscos de morte súbita., Negativo: Observei em alguns pacientes intolerância como tosse e hipotensão.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, principalmente o Enalapril e BRAs como Valsartana e Candesartana.Também os betabloqueadores principalmente o Carvedilol e Bisoprolol.O antagonista da Aldosterona o Espironolactona., Positivo: Inibição do Sistema renina Angiotensina, controle pressórico, proteção renal.Diminui o trabalho Cardíaco e atua positivamente na remodelação miocárdica., Negativo: Reações adversas como tosse e hipotensão.</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento tem o grande benefício em sobrevida, melhora clínica, hospitalização e mortalidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, BRA, BB, Diurético , Positivo: Melhora clínica , Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, betabloqueador, espironolactona, ivanbradina, Positivo: Melhora clínica e sintomas de ICC, Negativo: Hipotensão</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação com comprovada eficácia na diminuição da mortalidade dos pacientes com insuficiência cardíaca. Recomendada pelos consensos das sociedades de cardiologia do Brasil, Europa e Estados Unidos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril/valsartana em pacientes com insuficiência cardíaca, Positivo: Melhora da dispneia dos pacientes e os estudos indicam diminuição da mortalidade, Negativo: Hipotensão arterial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nitratos, diurético e IECA/BRA, Positivo: Melhora da dispneia e do edema, Negativo: Hipotensão</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso de sacubitril/Valsartana é interessante e apresenta no uso diário para off uma melhora boa para o paciente e melhora FE, Positivo: Melhora sintomas e qualidade de vida , Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Melhora clínica , Negativo: Sem efeitos negativos</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As atuais recomendações das diretrizes Brasileira, Europeia e Americana que o colocam como grau 1 de recomendação nesse caso. Além disso sou cardiologista e tenho tido Excelentes resultados com a droga!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubril + valsartana ! , Positivo: Rápido recuperação , queda do Pro BNP e melhora importante dos sintomas com melhora do grau da IC , Negativo: Em raros casos hipotensão sintomática</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECAS DIURÉTICOS betabloqueadorss , Positivo: Também melhorar padrao da IC porem em menor monta que sacubitril valsartana , Negativo: Hipotensão piora da IRC</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os resultados nacionais e de trials internacionais mostram indiscutivelmente benefícios tanto nas internações destes pacientes como aumento sobrevida. O gasto com pacientes que situam-se no escopo da indicação do medicamento, ou seja, disfuncao de ventrículo esquerdo importante, diminui sensivelmente o que torna sua padronização clínica e economicamente justificável.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Entresto-- regressão classe funcional, melhora da disfuncao Ventrículo esquerdo e menor necessidade de reinternações., Negativo: Até o momento, nenhum que justificasse retirada e apenas em pouquíssimos pacientes hipotensão inicial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores ECA, digitálico, diuréticos de alça, espirolactona e betabloqueadores., Positivo: Todos têm seu espaço na terapêutica da ICC. Entretanto nenhum deles exceto Entresto mostrou visível regressão da disfuncao ventricular esquerda., Negativo: Não se aplica.</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já há fortes evidências do benefício para os pacientes com melhora de classe funcional (sintomas) e redução de morbi-mortalidade. Infelizmente não é tradição do poder público e instituições brasileiras fazer avaliações tipo custo x efetividades, neste caso, a impresso que temos é que um eventual maior custo com compra de medicamentos seria mais que compensado com menor custo de internamentos e tratamentos de complicações da IC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos pra IC disponíveis no mercado., Positivo: Controle clínico, melhora de sintomas e de classe funcional, redução de morbi-mortalidade, redução de internações e intervalos entre internações, Negativo: Para o SUS o maior impacto negativo acaba sendo sempre o CUSTO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores de ECA, beta bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, diuréticos, vasodilatadores, digitálicos, Positivo: Drogas com eficácia comprovada em grandes trials e dispensa pelo sus ou custo acessível , Negativo: Falência em tratar casos refratários de IC</p>
03/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Insuficiência cardíaca é uma doença com muita medicação e toda ajuda é pouca.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Somos favoráveis a incorporação da droga com critérios precisos de indicação para uso e não disponibilizar para todos os pacientes com ICC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartan, Positivo: Melhora significativa de sintomas, Negativo: Custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os indicados para tratamento da ICC, Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Tolerabilidade</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem evidências consistentes da redução de morbimortalidade com esta droga segundo as sociedades de cardiologia americana, brasileira e europeia</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril valsartana, Positivo: Melhora da IC, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BRA, beta bloqueador, Positivo: Melhora da ic, Negativo: Não houve</p>
04/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO 97/103 , ENTRESTO 49/51 E ENTRESTO 24/26, Positivo: AUMENTO DA FRAÇÃO DE GESSÃO, Negativo: AINDA NÃO TIVE</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: USAVA MUITOS MEDICAMENTOS PARA MIOCARDITE VIRAL , , Positivo: NO PRIMEIRO MOMENTO ME AJUDOU NO CANSAÇO E DOR NO PEITO MAS DEPOIS NAUM FAZIA MAIS EFEITO, Negativo: MESMPO COM O USO CONTINUO NÃO MELHOROU ,</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, produtoi com resultados excelente para as indicacoes clinicas prescritas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: entresto , Positivo: pronta resposta terapeutica com melhora dos sintomas e qualidade de vida dos pacientes e menor tempo de internacao e reducao de mortalidade , Negativo: ate o presente momento sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos paciente do nosso serviço de insuficiencia cardiaca apresentaram resposta satisfatoria quanto ao uso do entresto</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso do entresto, Positivo: Pacientes que recuperarma a função cardiaca, melhorando as queixas clínicas e consequentemente diminuindo os indices de internação por descompensação cardiaca, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para mim Pessoalmente foi uma associação benéfica destes medicamentos... Pelo menos até agora(tomo ao longo de cerca d 4 meses) já estive em avaliação médica e o médico avaliador (através d resultados d exames aos quais volto nos próximos 2 meses a complementar com outros tipos)</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Marevan 5mg varsatana. Individualmente, Positivo: Entresto 49mg/51mg sacubitril/varsatanaCondição geral melhor após estar em uso deste medicamento, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Varsatana. Marevan 5mg, Positivo: Varsatana sozinho não fez grande coisaMarevan 5mg na avaliação médica não correspondeu muito ao esperado , Negativo: Não correspondeu a expectativa médica na ocasião</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação com impacto importante na qualidade e quantidade de vida dos pacientes com IC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto 24/26Entresto 49/51Entresto 97/103, Positivo: Melhora importante na sintomatologia , e redução de reinternações por descompensação cardíaca , Negativo: O Preço comercial do mesmo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol, bisoprolil, valsartana, candesartana, losartana, procoralan, espironolactona, furosemida, digoxina , Positivo: Furosemida melhora sintomática Carvedilol e bisoprolol controle na remodelação cardíaca e melhora da Ic com redução da mortalidade,no seguimento longitudinal BRA (losartana, candesartana, vaksartana) redução de mortalidade e controle da ICProcoralan, melhor controle da frequência cardíaca , Negativo: Carvedilol, bisoprolol e os BRA dificuldade de acesso na rede pública de saúde.Procoralan e entresto , preço comercial elevado</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo deste medicamento é muito alto pra pra manter o tratamento eu por duas vezes tive que parar de fazer uso do entresto</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: A melhora quase emediata dos batimentos cardíacos à preção normalizou uma melhora na respiração é melhor qualidade de vida , Negativo: Uma leve tosse no começo mas com o uso contínuo normaliza</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cardiovilou é lezartana , Positivo: Tive melhora mas estaquinou o tratamento não evoluiu , Negativo: O outro medicamento antes do entresto dava muita. Falta de ar tipo uma bronquite era muito ruim daí tive que usar novamente entresto e tive uma melhora muito considerável e cada vez melhor</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A utilização da droga combinada Sacubitril/Valsartana vem mostrando um grande impacto na melhora da qualidade de vida dos pacientes e melhorando o prognóstico dos mesmos com aumento da estimativa de vida e impacto sobre a mortalidade dos pacientes com Insuficiência Cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartana, Positivo: Melhora da qualidade de vida, redução da mortalidade, redução das taxas de reinternamentos e hospitalização no SUS por insuficiência cardíaca descompensada. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: iECA, betabloqueadores, diureticos., Positivo: Todos baixo custo., Negativo: Pouco impacto sobre taxas de re-hospitalização e mortalidade.</p>
03/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, CONHECI PACIENTES QUE UTILIZAM SACUBITRIL/VALSARTANA E ELES RELATARAM A MELHORA CLÍNICA QUE TIVERAM, ALGUNS ESTAVAM APOSENTADOS E VOLTARAM A TRABALHAR ENQUANTO OUTROS ESTAVAM NA FILA DO TRANSPLANTE E SAIRAM DEVIDO A MELHORA QUE TIVERAM.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelo que sei, esse produto reduz mortalidade, e está nas principais diretrizes para IC</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O próprio Entresto, Positivo: Melhora e muito a qualidade de vida da pessoa e reduz mortalidade , Negativo: Eu não tive nenhum problema</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Salva vida, Negativo: Preço</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto 24/26 , Positivo: sou cardiaco estava em crise e ao iniciar o tratamento em agosto/17 estava muito inchado perdi mais ou menos doze kgs de agua voltando a ter uma boa qualidade devida., Negativo: não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: diagua, Monocardil, cozar, Positivo: Funcionaram por algum tempo, Negativo: depois de algum tempo não faziam mais efeito e eu inchava muito tive interno 3 vezes para tirar água do meu corpo inclusive nos pulmões</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO PLENAMENTE PORQUE MINHAS EXPERIÊNCIA MOSTRAM QUE ENTRESTO APRESENTA MELHOR RESULTADO EM QUALIDADE DE VIDA, MAIOR REDUÇÃO DE MORTE E HOSPITALIZAÇÃO. ESTUDO PARADIGM- O RESULTADO É MUITO ROBUSTO FRENTE OS RESULTADOS DOS IECAS, TANTO NA REDUÇÃO DE HOSPITALIZAÇÃO, QUANTO DE MORTALIDADE. ESTUDO PIONNER- REDUÇÃO DE 49% MEOS HOSPITALIZAÇÃO. MENOR CUSTO PARA O GOVERNO, JÁ QUE OS PACIENTES FICAM MENOS TEMPO HOSPITALIZADOS. IECAS REDUZ SOMENTE 26% DE HOSPITALIZAÇÃO.RECOMENDAÇÃO PELAS DIRETRIZES AMERICANS, EUROPEIAS E BRASILEIRA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO, IECAS, BETA VLOQUEADORES, ESPIROMOLACTONA, BRÁS., Positivo: PACIENTES COM ENTRESTO OBTÉM MEHOR QUALIDADE DE VIDA FRENTE OS IECAS. SE HOSPITALIZAM MENOS. REDUÇÃO DE MORTE SUBTA, IECAS NÃO REDUZ MORTE SUBTA., Negativo: EFEITOS NEGATIVOS DOS IECAS- EFEITOS DE ANGIOEDEMA, EFEITO COLATERAL GRAVE. ABANDONO DOMTRATAMENTO DEVIDO A TOSSE SECA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO, IECAS, BRÁS, BETA BLOQUEADORES, DIURÉTICOS., Positivo: ENTRESTO E BETA LOQUEADORES REDUZEM MORTE SUBTA. ENTRSTO E MAIS EFICAZ NA REDUÇÃO DE MORTE E HOSPITALIZAÇÃO FRENTE AOS IECAS. ESTUDO PIONNER- 49% DE REDUÇÃO DE HOSPITALIZAÇÃO IECAS SOMENTE 26% ROBUSTEZ DO ESTUDO PARADIGM DE ENTRESTO VERSO SOLVED DOS IECAS., Negativo: IECAS APRESENTA BASTANTE EFEITOS DE TOSSE E EDEMAS.</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em pacientes com descompensações está bem estabelecido que o uso de Sacubitril / Valsartana tem redução de risco de mortalidade e hospitalização da ordem de 20%</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com Sacubitril / Valsartana e a experiência realmente é muito boa, Positivo: Redução sintomática e com melhora efetiva de classe funcional com o uso, reduzindo hospitalizações e gastos extras dos pacientes com outras terapias, Negativo: raros episódios de hipotensão no início do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a terapia convencional com IECA ou BRA para ICC, Positivo: Também temos bom controle da doença com um desses medicamentos, Negativo: Falhas terapêuticas mesmo com dose apropriada. Tosse com IECA.</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já está comprovado a eficácia da medicação, além disso observamos melhora dos sintomas nos pacientes tratados com a medicação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todas as medicações para insuficiência cardíaca, Positivo: Cada medicamento tem a sua indicação, no caso do sacubitril/ valsartanabé usado para pacientes já otimizados com as medicações fornecidas pelo sus e q não obtiveram boa compensação clinica, Negativo: Como disse anteriormente, a questão é indicação adequada para o uso da medicacao</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos de ic, Positivo: Depende de cada caso, Negativo: Depende de cada caso</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ESTE REMÉDIO DEU UM RESULTADO SURPREENDENTE, FIQUEI MUITO MELHOR, MUDANDO MESMO MINHA VIDA. NO COMEÇO GANHEI AMOSTRAS GRATIS, AGORA TOMO MÊS SIM, MÊS NÃO, POIS NÃO TENHO DINHEIRO PARA COMPRAR TODO MÊS. PERDEU BOA PARTE DO RESULTADO. PEÇO QUE O GOBVERNO NOS AJUDEM, POIS NÃO É UMA OP'ÇÃO NOSSA ESTAR DOENTE DESTA FORMA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: O ENTRESTO FOI O PRIMEIRO A SER EM FORMATO DE TESTE, Positivo: TIROU MINHA FALTA DE AR CONSTANTE, ME DEU MIAS FORÇAS PARA ANDAR E TRABALHAR., Negativo: NENHUM.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: RAMIPRIL, Positivo: POUÇOS, NÃO MUDAVA NADA A SITUAÇÃO, Negativo: NENHUM</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se trata de medicamento de uso contínuo, de grande efeito positivo e de custo alto. Muito difícil manter o tratamento sem auxílio</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26 mg, Positivo: Melhora no quadro geral da ICC, Negativo: Não tive reações adversas, já uso a 10 meses.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entresto salva vidas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora qualidade de vida, reduz morbi mortalidade, reduz hospitalização e morte súbita , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Caverdilol, Losartana, Enalapril....., Positivo: Fazem parte do protocolo orientado pelas diretrizes , Negativo: Não mudam prognóstico</p>
03/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Produto e Seguro E Eficaz e mostrou se modificar o Prognóstico do Pacientes, garantindo assim melhora rmqualidade de Vida e diminuindo Hospitalizações, internações, consequentemente diminuindo outros custos indiretos...</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 24/26, Entresto 49/51 e Entresto 97/103mg, Positivo: Melhora da qualidade vida, diminuição de sintomas “cansaço, falta de ar, retenção de líquidos.... dormir melhor...”, Negativo: Não teve.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: IECA e diureticos, Positivo: Diminuição de liquidos, Negativo: Cansaço ainda permacia, hospitalizações</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Droga com impacto favorável de mortalidade nos pacotes com ic</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Uso recente sem tempo para analisar desfecho , Negativo: Não observei nada</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Valsartana enalapril etc, Positivo: Melhora casse funcional e redução mortalidade mas sabidamente esses efeitos são superiores com o entresto , Negativo: Hipotensão.</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A medicação quando bem indicada traz benefícios ao paciente!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pacientes com ICC grave refratária ao tratamento apresentam melhora significativa dos sintomas com Entresto!, Positivo: Entresto controla a pressão arterial e reduz sintomas associados à ICC como dispneia, ortopneia e intolerância aos esforços!, Negativo: Entre os pacientes que fizeram uso um apresentou tosse importante tornando o tratamento inviável.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores de ECA, diuréticos de alça, bloqueadores da aldosterona e betabloqueadores cardioseletivos., Positivo: Redução de edema, redução de dispneia, melhora da tolerância aos esforços, melhora da ortopedia. , Negativo: Tosse, hipercalemia, hipotensão, síncope.</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha experiência está de acordo com o resultados científicos. Os pacientes melhoram muito.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Redução de hospitalização e sintomas., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: B-bloqueadorb-bloqueador: redução dos sintomas , Positivo: Redução dos sintomas, Negativo: Evitar em asmático</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente inclusive, ando com dificuldade financeira para adquirir o medicamento conforme prescrição médica...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: boa melhora do funcionamento cardíaco e estabilização da pressão arterial., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: losartana, sustrate, carvedilol, vastarel, rossuvastatina, AAS, espirolactona., Positivo: Todos, com exceção do losartana atendem minha necessidade., Negativo: O losartana já não faz o efeito desejado para o meu caso que é grave...</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque Entresto é um produto que reduz mortalidade .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto., Positivo: Melhora na qualidade de vida, reduz hospitalização, reduz morte súbita e morte cardiovascular., Negativo: Preço alto.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Caverdilol, Bisoprolol, Enalapril e Hidroclorotiazida., Positivo: Estão nas diretrizes e ajudam a tratar o paciente com e C., Negativo: Não mudam prognóstico do paciente.</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho observado excelentes resultados em pacientes com icc, com melhor qualidade de vida e menos hospitalizações e mortalidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhor qualidade de vida e hospitalizações com muito menos morte, Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol e ou ieca, Positivo: Com menor intensidade que o Entresto, melhora qualidade de vida e diminui hospitalizações, Negativo: Pisos efeitos ! Falta de resposta em alguns casos !</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudo robusto com desfecho duro favorável.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril valsartab, Positivo: Melhora dos sintomas Melhora da FEVE Redução de internação, Negativo: Hipotensão arterial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Arsenal convencional no tratamento da ICC, Positivo: ————, Negativo: ————</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este remédio funcionou bem para mim.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: melhorou a insuficiência cardíaca., Negativo: Não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2018	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação com grandes resultados no tratamento da ICC, com redução da morbimortalidade superior ao Enalapril. Já presente em várias Diretrizes para o tratamento da ICC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartana, Positivo: Melhora do GF dos pacientes mesmo em graus funcionais avançados, Negativo: Apenas Hipotensão arterial na fase de adaptação à medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betabloqueadores , Inibidores de ECA e antagonistas da aldosterona, Positivo: Melhora da ICC, Negativo: Habituais</p>
03/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Penso que seria importantíssimo a incorporação deste medicamento no SUS. É um medicamento MUITO importante, resolveu o problema crônico, mas infelizmente, é muito caro demais. Muitos estão incapacitados de adquiri-lo em farmácias. Sou super à favor da incorporação do medicamento sacubitril/valsartana. Obrigado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sim. Sacubitril/Valsrtana., Positivo: Teve um efeito muito bom na insuficiência cardíaca de minha mãe, pois estava muito debilitada, mas comeste medicamento teve uma boa recuperação., Negativo: Não aconteceram efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É UM MEDICAMENTO QUE MOSTROU SER SUPERIOR AOS MELHORES MEDICAMENTOS PARA ICC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SACUBITRIL VALSARTANA (ENTRESTO), Positivo: FACIL DE USARAJUDA BASTANTE NA COMPENSAÇÃO DO PACIENTE COM ICCPERMITE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEDICAMENTOS CONCOMITANTES COMO O CARVEDILOL, EPIRONOLACTONA, FUROSEMIDA, DIGOXINA ETC, Negativo: PREÇO ELEVADO MAS NÃO ABUSIVO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECASBRASCARVEDILOL, BISOPROLOLFUROSEMIDADIGOXINA, Positivo: IECA, BRAS, CARVEDILOL SÃO FUNDAMENTAIS PARA O TTO DA ICC FUROSEMIDA E DIGOXINA NAO SÃO FUNDAMENTAIS MAS TIRAM OS PACIENTE DES CRISES DE ICC, Negativo: QUANDO BEM USADOS NÃO TEM EFEITOS NEGATIVOS NA ICC</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não entendi essa posicionamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Que me recorde, somente esse, o Entresto., Positivo: Quanto ao Entresto, tenho tido melhora nos sintomas., Negativo: Não sei se é desse medicamento em específico, mas tenho sentido fraqueza.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xigduo-XR, Positivo: Leve melhora, Negativo: Muita tontura.</p>
02/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Indicação IA em diretrizes europeia, americana e Brasileira</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/ valsartana, Positivo: Melhora da classe funcional e diminuição da mortalidade segundo as diretrizes , Negativo: Custo elevado</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO COMPLETAMENTE.MOTIVOS: ENTRESTO SE MOSTRA MAIS EFICAZ NA REDUÇÃO DOS SINTOMAS, MORTE E HOSPITALIZAÇÃO.ESTUDO PARADIGM MOSTRA ESTE RESULTADO.ESTUDO PIONNER REDUZ A HOSPITALIZAÇÃO EM 49%-CONGRESSO AMERICANO DE CARDIOLOGIA 2018. MENOS CUSTO PARA O GOVERNO, OS PACIENTES PASSAM MENOS TEMPO EM LEITOS DE HOSPITAL.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO, IECAS, BRÁS, BETA BLOQUEADOR, DIURÉTICOS., Positivo: PACIENTES MORREM E SE HOSPITALIZAM MENOS COM ENTRESTO FRENTE AOS PACIENTES QUE USAM IECAS, Negativo: PACIENTES QUE UTILIZAM OECAS DE HOSPITALIZAM E MORREM MAIS QUENOSPACIENTES QUE UTILIZAM IECAS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRSTO, IECAS, BRÁS, BETA- BLOQUEADORES DIURÉTICOS., Positivo: ENTRESTO SE MOSTRA MAIS EFICAZ NA REDUÇÃO DE MORTE E HOSPITALIZAÇÃO.MAIS TOLERADO QUENIECAS, MENOS ABANDONO TRATAMENTO VERSO IECAS, Negativo: IIECAS MENOS EFICAZES NA REDUÇÃO DE HOSPITALIZAÇÃO E MORTE FRENTE AOS PACIENTES QUE UTILIZAM ENTRESTO.</p>
08/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remedio excelente e com alto poder de cura de um problema gravíssimo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Alta capacidade de melhora e cura , Negativo: Efeito colateral</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entresto é muito bom pra cura do coração</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Da um efeito de cura uma melhora no organismonenu, Negativo: Nenhum efeito negativo pra mim</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Este medicamento isossorbida me causou muito mal, Positivo: Uma sensação de mal estar tontura e muita ancia de vmal vomito, Negativo: Um mal estar muito grande</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que todos usuários do SUS devem ter acesso ao medicamento 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora nos exames, Negativo: Nenhum 3ª - Não
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mae usa e sofremos para pagar fazer divisao entre filhos para comprar. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto103, Positivo: Nao preciso internar por motivo da insuficiência cardiaca, Negativo: Canseira ânsia... 3ª - Não
06/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entresto temedio maravilho e comprovou eficacia superior e redicai de morte 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Nelhira sintoma qualidade de vida e reduz hospitalizacao, Negativo: Nao 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diureticos. Betabloquadores, ieas digitalicos, Positivo: Ajuda na melhira na doenca, Negativo: Intoxicacao digitalica broncoespasma e e efeito pequeno levando a descompensacao da ic
06/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho tido casos o qual indiquei o tratamento e este mudou a história da vida destes pacientes .saindo de uma incapacidade funcional para a vida para uma vida mais próxima do normal 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto(sacubitril+valsartana), Positivo: Melhorou a capacidade funcional,o paciente que não conseguia mais ir à feira já consegue ir, Negativo: Nos casos em que indiquei não houveram efeitos colaterais 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Melhora da capacidade funcional, Negativo: Nenhum
06/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49mg/51mg, Positivo: Houve diminuição da descompensação após o uso do medicamento, melhora na redução dos edemas e diminuição do cansaço decorrente da insuficiência cardíaca., Negativo: Não notei efeitos negativos. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Captopril, Enalapril e Losartana Potássica de 25mg e 50mg, Positivo: O Captopril e o Enalapril auxiliaram na estabilização da insuficiência cardíaca no início, quando ainda era grau I. Com a piora da função da cardíaca ao longo dos anos, a Losartana potássica de 25mg ajudou no controle dos sintomas., Negativo: Captopril: tosse seca; Enalapril: ineficaz no controle dos sintomas com a piora da insuficiência cardíaca; Losartana Potássica 50mg: hipotensões frequentes e tontura; Losartana Potássica 25mg: insuficiente para evitar as descompensações frequentes.
06/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Custo proibitivo para parcela majoritária da população, especialmente para quem vive de aposentadoria 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na função cardíaca, Negativo: Não constatados 3ª - Não
06/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso, sinto os benefícios maso remédio é de alto custo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: De todos os remédios ate hj utilizados é ele que me roporciona maior bem-estar, Negativo: Sinvastatina e similares-: Dores musculares e articulares fortes 3ª - Sim, como paciente, Qual: Revascularização e cintilografia, Positivo: Melhora da atividade cardiaca, Negativo: Algumas delas são ferecuperacao lenta e com dores generalizadas

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora no coração, sem falta de ar , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora no coração, sem falta de ar, Negativo: Não houve</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remedio ajuda varios pacientes a terem maior qualidade de vida . Tem que ter maior facilidade sim em ter acesso nas unidades públicas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, alodipano, carvil. , Positivo: Melhorou minha doença cardíaca., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu esposo faz uso contínuo e teve a melhora significativa.porem o preço é muito alto.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora no estado geral da cardiopatia, Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Monocórdio,isosorbida, Positivo: Melhora substancial, Negativo: Cefaléia</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA É UMA DOENÇA DE ALTÍSSIMA PREVALÊNCIA E ALTÍSSIMA MORTALIDADE (TAXAS MAIORES QUE CASOS DE CÂNCER POR EXEMPLO) DEVENDO SER OFERECIDO OPÇÕES TRAPEUTICAS EFICAZES E COMPROVADAMENTE MELHORES QUE TERAPIAS ATUALMENTE UTILIZADAS. SACUBITRIL/VALSARTANA MOSTROU DIMINUIÇÃO NÃO SOMENTE DA MORTALIDADE DESTES PACIENTES E SIM DA QUALIDADE, GANHO SIGNIFICATIVO NA VIDA DE MILHARES DE PACIENTES.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO EM SUAS TRÊS DOSES DE APRESENTAÇÃO , Positivo: DIMINUI SIGNIFICATIVAMENTE OS SINTOMAS QUE GERAM INCAPACIDADE FÍSICA NOS PACIENTES, DEVOLVENDO A VONTADE DE VIVER E INTERAGIR SOCIALMENTE REGRIDE MARCADORES DE REMODELAMENTO CARDIACO EM EXAMES DE IMAGEMDIMINUI A INCIDÊNCIA DE ARRITMIAS FATAIS, Negativo: ALTO CUSTO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA (CAPTOPRIL/ENALAPRIL)BRA (LOSARTANA, VALSARTANA), Positivo: AMBOS MELHORAM SINTOMAS E CAPACIDADE FÍSICA PORÉM DE MANEIRA MAIS TARDIA MELHORA REMODELAÇÃO CARDÍACA COM UM MAIOR TEMPO DE USO , Negativo: TOSSE FREQUENTEHORÁRIOS DE USO: EXEMPLO CAPTOPRIL 3 X AO DIAHIPOTENSÃO SINTOMÁTICA QUE LEVA A ABANDONAR TRATAMENTO ALGUNS DELES ALTO CUSTO COMO VALSARTANA POR EXEMPLO</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remédio muito importante para combater a insuficiência cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Está melhorando muito a minha doença., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remédio de custo elevado</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Efeitos muito mais positivos que outros remédios para insuficiência cardíaca , Negativo: Nenhum efeito negativo específico digno de nota.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da eficiência cardíaca , Negativo: Nenhum efeito negativo específico digno de nota</p>
08/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remedio excelente e com alto poder de cura de um problema gravíssimo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Alta capacidade de melhora e cura , Negativo: Efeito colateral</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuário deste medicamento e fica muito caro para mante-lo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora real, Negativo: Nenhum 3ª - Não
08/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhora da classe funcional , remodelamento reverso e redução de eventos cardiovasculares quando comparado ao IECA; sendo que esses pacientes estavam tambem em uso de espironolactona e betabloqueador 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da classe funcional , remodelamento reverso e redução de eventos cardiovasculares quando comparado ao IECA; sendo que esses pacientes estavam tambem em uso de espironolactona e betabloqueador, Negativo: Nao tive 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betabloquedor,IECA, BRA, espironolactona, nitrato,hidralazina, digitalico, procoralam,dobutamina, CDI, ressinchronizador, Positivo: -, Negativo: -
08/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Prejudica as pessoas que precisam da medicação 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Melhorou muito a falta de ar e o cansaço , Negativo: O preço é muito caro 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Enalapril, espironolactona, procoralam, digoxina, carvedilol, losartan, Positivo: -, Negativo: Tosse com enalapril, teve que trocar pro losartanA digoxina baixou muito os batimentos do coração
08/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente tem um benefício enorme com a droga , não só em melhorar qualidade de vida , como reduzir mortalidade. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Melhora da classe funcional , redução de hospitalização, redução de mortalidade , Negativo: Hipotensão , que pode ser controlada 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Todos acima citados , Negativo: Poucos
08/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse remédio mudou a vida de varias pessoas que eu conheço. 2ª - Não 3ª - Não
08/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudo mostra eficácia na redução de mortalidade. E melhora na qualidade de vida 2ª - Não 3ª - Não
08/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97mg/103mg, Positivo: A minha pressão arterial passou a ficar mais equilibrada, Negativo: Parabéns 3ª - Sim, como paciente, Qual: Benicare HCT 40/12.5, Positivo: Todos os dois controlaram muito bem a minha pressao, Negativo: Nao senti nenhum
08/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Quase todos, Positivo: Diminuição dos sintomas desconfortáveis , Negativo: Poucos 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/11/2018	Instituição de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente com grande melhora da qualidade de vida, reduzindo necessidades de internações hospitalares</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da qualidade de vida, Negativo: Não observados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA e BRA, Positivo: Alívio de sintomas, Negativo: Tosse incontrolável</p>
02/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação sacubitril/valsartana reduz significativamente, em torno de 20% a mortalidade cardiovascular assim como desfechos cardiovasculares maiores em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER) sintomática (classe funcional da NYHA >/-II). Cumprido salientar que a ICFER é uma doença altamente prevalente no mundo e no Brasil, sendo que estimativas mais recentes sugerem existir entre 3-4 milhões de pessoas no Brasil com essa condição. Vale ressaltar que como a nossa população envelhece, a incidência e prevalência da ICFER aumentam continuamente. Por outro lado a ICFER está também associada com elevada morbidade e mortalidade, sendo que uma medicação que reduza adicionalmente 20% dos desfechos cardiovasculares maiores, deve ser implementada o mais breve possível. Cumprido salientar que enquanto os gastos relacionados a internação hospitalar ICFER vem crescendo exponencialmente, o uso de sacubitril/valsartana esteve significativamente associado com reduções expressivas de novas internações assim como redução do tempo de internação. Suportando a minha colocação existem várias publicações em periódicos de elevada relevância, incluindo o estudo PARADIGM que foi o MAIOR estudo com ICFER sintomática já realizado no MUNDO. Esse estudo recrutou cerca de 8 mil pacientes pelo mundo todo, inclusive com grande número de pacientes recrutados no Brasil, mostrando que o uso de sacubitril/valsartana esteve associado com reduções expressivas de mortalidade e eventos cardiovasculares maiores. Finalizando, as diversas diretrizes de cardiologia ao redor do mundo, incluindo a diretriz da sociedade brasileira de cardiologia, indicam com destaque o uso de sacubitril/valsartana para ICFER sintomática em substituição ao uso do inibidor de ECA - recomendação dessa classe I. Além disso, mesmo com todo tratamento para ICFER a mortalidade dessa doença continua elevada, justificando e MUITO a necessidade de novas medicações para reduzir essa elevada mortalidade residual. Nesse sentido o sacubitril/valsartana contribui e muito para reduzir o risco de morte dessa condição. McMurray JJV, Packer M, Desai AS, et al. Angiotensin-Nephrilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure. N Eng J Med published on line on August 30, 2014. DOI: 10.1056/NEJMoa1409077.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tivemos experiência com o medicamento sacubitril/valsartana., Positivo: Nos casos em que utilizamos, o referido medicamento esteve associado com melhora significativa dos sintomas em curto período de tempo. Além disso como coordenador do ambulatório de transplante cardíaco na Universidade Estadual de Campinas, várias pacientes apresentam melhora tão expressiva, que foram retiradas da lista de transplante., Negativo: A referida medicação precisa ser utilizada com critérios, sobretudo em pacientes com insuficiência renal e aqueles com hipotensão, sendo necessário reajuste do uso de diuréticos. Quando respeita as recomendações a droga se mostrou MUITO segura. Nesse sentido o efeito colateral mais importante foi a hipotensão sintomática.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eu tenho experiência com TODOS os medicamentos e tratamentos para ICFER. Como coordenador do ambulatório de IC e transplante cardíaco da UNICAMP, diariamente indicamos os mais diversos tratamentos para IC., Positivo: O uso de IECA, BB, ARM, assim como marcapasso com dessincronizados, CDI quando indicados adequadamente reduzem significativamente a mortalidade da ICFER., Negativo: Todas as terapias para ICFER tem seus efeitos colaterais, mas que quando bem indicadas, melhoram o prognóstico.</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento de uso contínuo e de alto custo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Aldactone, Positivo: Somente o médico sabe, Negativo: Aldactone - apresentou dores nos mamilos e caroços nos mesmos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aldactone, ictus, somalgim, rusovas, Positivo: Somente o médico sabe, Negativo: Aldactone, já exemplificado acima.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vi uma grande melhora do meu parente quando começou a usar Entres tô, ele deixou de internar tanto. Tem.uma qualidade de vida muito melhor. A família está muito feliz com a melhora dele. Que outros pacientes possam usar um produto tão bom como esse</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Absurdo ser contrário à uma medicação que tem evidências de benefícios com redução de mortalidade e hospitalização por IC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Melhora do quadro congestivo, da dispneia e da qualidade de vida , Negativo: Nenhum até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, BRA ,INIBIDORES DA ALDOSTERONA ,BETABLOQUEADOR, Positivo: Quando combinados melhora da IC, Negativo: IECA TOSSE ,BETABLOQUEADOR BRADIARRITIMIA HIPOTENSÃO ,,INIBIDORES DA ALDOSTERONA HIPERCALEMIA ,BRA HIPOTENSÃO</p>
29/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A molécula sacubitril/valsartana é comprovadamente superior ao enalapril (disponível no SUS), em todos os parâmetros: diminuição de mortalidade, hospitalizações e melhora na qualidade de vida. Os pacientes que sofrem de IC no Brasil e não tem condições de comprá-lo não podem ser privados de ter acesso a esse tratamento. A decisão da CONITEC está baseada na comparação de custo do Enalapril (genérico) vs o Entresto. Mesmo que seja mais caro, é o custo de termos uma tecnologia inovadora que trará mais benefícios aos nossos pacientes (e seus familiares). Além disso, o produto demonstrou ser custo-efetivo (ainda que considerando os custos de hospitalização do SUS, que sabemos não são os custos reais, que são maiores). Ainda, as diretrizes da SBC/DEIC incluem o Entresto, da mesma forma que outras diretrizes internacionais como dos EUA e Europa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na prática diária os pacientes estão tendo resultados fantásticos com a medicação...Melhora dos sintomas ...diminuição nas internações....Atendo paciente do SUS em grande escala....Seria uma pena não termos essa medicação na rede.....</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim...medicamentos acima descrito, Positivo: Melhora dos sintomas...redução das internações...Melhora na qualidade de vida, Negativo: Nenhum até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamentos inferiores ao sacubitril, Positivo: Os já descritos na literatura, Negativo: Os já descritos</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Redução de mortalidade e redução de hospitalização , Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ieca e Beta bloqueador , Positivo: Melhora dos sintomas , Negativo: Poucos efeitos colaterais</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Estudos comprovam diminuição do numero de internações por ICC e quando ocorrem, há uma redução no número de dias internados.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril com Valdartana. Claro que associado a outras drogas., Positivo: Diminuição significativa da sintomatologia dos pacientes em breve espaço de tempo., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betabloqueadores + Diurético , Positivo: Reduzida sintomatologia e edema , Negativo: Hipotensão e espoliação de potássio.</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ótimos resultados</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Melhora significativa dos sintomas , Negativo: Cuidado hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores de ecame, Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Tosse</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não podemos e hipótese alguma colocar interesses financeiros a frente da saúde da população. Os resultados do estudo PARADIGM-HF são inquestionáveis quanto ao benefício no tratamento do IC crônica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartana, Positivo: Melhora importante na redução dos sintomas, qualidade de vida e melhora da fração de ejeção, Negativo: Alguns pacientes tiveram hipotensão no início d tratamento, porém foi bem tolerada e conseguiram chegar na dose máxima da medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todo o arsenal existente para tratamento da IC, Positivo: Redução importante da morbi-mortalidade, Negativo: Em sua maioria, quando há efeitos negativos, são por hipotensão ou bradicardia.</p>
29/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora significativa na qualidade de vida do paciente., Negativo: Tontura no início do tratamento.</p> <p>3ª - Não</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Redução de mortalidade e melhoria da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora do quadro de insuficiencia cardiaca., Negativo: Hipotensão em paciente dialítico.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ieca/bra, Positivo: Trivial., Negativo: Hipotensao, tosse.</p>
28/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de um valor elevado, nem todos podem comprar. Injusto para quem vive de salário mínimo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto de 49mg, Positivo: Ainda não sei falar pontos positivos, pois comecei usar agora. Mas o médico recomendou que era o melhor que estava tendo no mercado., Negativo: Ainda não sei falar pontos negativos, pois comecei usar agora. Mas o médico recomendou que era o melhor que estava tendo no mercado.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Levando em consideração o mecanismo de ação inovador do medicamento em questão, assim como as evidências científicas publicadas, é possível observar melhora no quadro clínico dos pacientes acometidos pela insuficiência cardíaca após o início do tratamento, quando comparado ao medicamento padrão ouro. Portanto, a incorporação do sacubitril/valsartana para insuficiência cardíaca crônica sintomática (NYHA classe II-IV) é fundamental para os pacientes acometidos por esta doença devido à redução dos sintomas e melhora no quadro clínico e na qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da função cardíaca, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
29/11/2018	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A evidência de redução de mortalidade e hospitalização no estudo por si já seria uma recomendação incontestável, como presidente da sociedade de Cardiologia Regional Sergipe seria um ato de omissão não pleitear o direito ao paciente do sus em ter o melhor e mais completo tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto nas três apresentações disponíveis , Positivo: Antes de tudo melhora da dispneia e congestão! Retorno do paciente as suas atividades sociais e até trabalhistas! Melhora significativa da qualidade de vida e da autoestima interferindo positivamente na vida familiar , Negativo: Hipotensão facilmente tratável com reescalonamento da dosagem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, BRa, beta-bloqueador, inibidor de aldosterona , ressinronização , Positivo: Melhora do quadro de dispneia e congestão com todos os medicamentos associados , Negativo: IECA tosse intratável, BRa hipotensão tratável, betabloqueador bradiarrtmia e hipotensão, inibidores da aldosterona hipercalemia</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: CONTROLE PA, Negativo: PREÇO</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: LOSARTANA, Positivo: XX, Negativo: DIFICIL CONTROLE PA</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor de que os remédios caros (como o ENTRESTO), sejam dados a todas as pessoas que,, como eu, são, infelizmente, portadores de cardíaca crônica.A forma mais simples de fornecimento poderia ser através do SUS, bem como, através da farmácia de alto custo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não recordo o nome, mas, lembro bem, que nenhum dos medicamentos controlava tão bem a pressão alta e a minha insuficiência cardíaca crônica., Positivo: Não lembro., Negativo: Não recordo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: Com o ENTRESTO minha pressão, ficou dentro dos parâmetros da normalidade e a insuficiência cardíaca ficou, definitivamente, sob controle., Negativo: Não há (ou não percebi) nenhum efeito negativo no ENTRESTO.</p>
03/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho obtido excelente resultado utilizando esse medicamento, porém, tenho dificuldade financeira para adquirir -lo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49mg/51mg, Positivo: Melhora da insuficiência cardíaca e pressão arterial controlada , Negativo: Não observei efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Valsartana, Positivo: Controlava a minha pressão arterial. , Negativo: A insuficiência cardíaca se mantinha</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A qualidade de vida de minha mãe está melhor com o uso diário do medicamento sacubitril/valsartana</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 49mg/51mg, Positivo: Obtivemos melhora na insuficiência cardíaca e no controle da pressão arterial. , Negativo: Não observamos efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Valsartana, Positivo: Controle da pressão arterial , Negativo: Insuficiência cardíaca progredindo.</p>
03/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: entresto, Positivo: melhora significativa da insuficiência cardíaca já em uso dos medicamentos tradicionais, Negativo: hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Iecablocadores de renina angiotensinabeta bloqueadoresdiuréticosdigital, Positivo: bons efeitos para insuficiência cardíaca, Negativo: nenhum</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe passou a fazer uso do medicamento a 10 meses e vem se sentindo muito melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Substrate, clopidogrel, amiodarina, sinvastatina, sotalol ., Positivo: Difícil especificar os benefícios., Negativo: Tontura, fraqueza, quedas repentinas.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso o Entresto há oito meses com um ótimo resultado na minha vida. A insuficiência cardíaca regrediu, levo um vida normal hoje em dia., Positivo: Não sinto efeitos colaterais, tive uma ótima adaptação a medicação., Negativo: O maior efeito negativo é o custo alto da medicação, mesmo com o desconto do laboratório.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto Controle da arritmia , Positivo: Controle da pressão arterial , Negativo: Fadiga</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Controle pressão arterial , Negativo: Não controle da pressão arterial passado algum tempo devido insuficiência cardíaca</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe toma o referido remédio que possui um custo muito alto. E este foi o único remédio que trouxe qualidade de vida à ela</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Após o uso do Entresto minha mãe parou de ter falta de ar e a qualidade de vida melhorou 100%, Negativo: Não foi observado nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Enalapril, Positivo: Não foram significativos os efeitos, Negativo: Não consegui melhorar a insuficiência cardíaca</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, discordo baseada na minha experiência clínica com Sacubitril/valsartana, e reforço que O medicamento tem recomendação grau I nas diretrizes americana, europeia e brasileira.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora clínica em todos os pacientes e de mortalidade e de internações , Negativo: Sem efeitos negativos até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol, metoprolol, diuréticos, digoxina, BRAs, IECA. Vastarel. Procoralan. , Positivo: Melhora clínica. Alguns com melhora da mortalidade , Negativo: Bradicardia. Hipotensão arterial. Piora de função renal.</p>
28/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicacao que ven somar no tratamentos de pacientes com insuficiência cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubiitril/valsartana, Positivo: Melhora da classe funcional e da função ventricular , Negativo: Hipotensao</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metoprolol. Carbedilol, nevigolol. Espirinolactona, ramipril, valsartana. Etc..., Positivo: Melhora da classe funcional e função ventricular, Negativo: Tosse, hipotensão, ginecomastia.</p>
30/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Redução da mortalidade, melhora da classe funcional, melhora da qualidade de vida, Negativo: Alteração de função renal e eletrólitos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA/ BRA/ DIURETICO DE ALÇA/ ANTAGONISTA DE ALDOSTERONA, Positivo: Redução da mortalidade e melhora da qualidade de vida, Negativo: Piora da função renal, hipercalemia</p>
30/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente pois observei presencialmente com uma amiga que melhorou muito quando começou a tomar Entresto, ela teve um infarto e ficou numa situação que não tinha mais qualidade de vida, com 2 filhos pequenos, não conseguia sair de casa com problemas de falta de ar, não conseguia brincar com os filhos, não dormia direito, não fazia exercícios e após o primeiro infarto foi para emergência do hospital algumas vezes com sério risco de perder a vida...Quando começou tomar Entresto no inicio do ano a vida dela mudou, literalmente!! tudo que eu citei acima hoje ela faz com facilidade, dentro dos limites que ela possui por ser uma paciente com Insuficiência Cardíaca, mas o que mais chamou atenção foi fato poder levar novamente seus filhos na escola, poder brincar com eles e um fato marcante que não precisou mais ir em emergência de hospitais devido piora dos sintomas..., acredito é claro reduzindo risco de morrer e ficar internada. Infelizmente não consegue pagar o produto mas os resultados foram muito importantes que a família ajuda no tratamento...motivo da importância do produto ser distribuído na rede pública pois imagino que deva ter outros milhares de pessoas que possa se beneficiar com uso de Entresto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Dispomos de um estudo que avaliou a eficácia da medicação, sendo que reduziu-se principalmente morte por arritmia, um desfecho não esperado e não ainda explicado pelo laboratório. Porém o principal motivo é o custo. Não há como essa medicação ser comprada pelo governo. Nenhum país rico do mundo faz isso porque não tem viabilidade econômica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: No paciente que usei não teve diferença clínica., Negativo: Preço e hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol, enalapril, espirolactona, Positivo: Melhora clínica comprovada, Negativo: Sem efeitos negativos</p>
30/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os benefícios apresentados e comprovados através de estudos de sacubitril/valsartana são altamente significativos e além de reduzir mortes e hospitalizações, trazem uma excelente melhora na qualidade de vida dos pacientes com IC. Não permitir o acesso à população devido a questões de custos, é um fato muito decepcionante para as pessoas que estão sofrendo com IC e para seus familiares. Pois, todos estão esperando por um tratamento mais eficaz, que é disponível através de sacubitril/valsartana, e que já foi incorporado nas principais Diretrizes mundiais, comprovando assim todos seus benefícios.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, este medicamento salva vidas, numa doença que tem um índice de mortalidade muito alto e afeta a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 49/51 mg, Positivo: tenho um familiar que tem ICFER e que já foi internado diversas vezes, depois que iniciou o tratamento com este produto teve uma melhora significativa (já está há mais de 6 meses sem hospitalização) e melhorou muito a sua disposição física conseguindo caminhar sem ter falta de ar e conseguindo dormir deitado (antes ficava praticamente sentado com dois ou tres travesseiros).Ao adicionar o Entresto em seu tratamento ele teve uma melhora significativa em sua qualidade de vida, fato este que impactou positivamente inclusive a família e ele pode voltar a fazer as suas atividades diárias com independência., Negativo: não foram observados efeitos negativos neste tratamento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Hidroclorotizada, Enalapril., Positivo: aumento da frequência urinária e melhor controle da pressão arterial., Negativo: hipotensão, edema e perda do efeito ao longo do tratamento.</p>
30/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos comprovam que esta medicação muda evolução da patologia. Meus resultados práticos confirmam os estudos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O próprio , Positivo: Redução de internações e melhora na qualidade de vida dos pacientes, Negativo: O medicamento é caro !</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento clássico da insuficiência cardíaca , Positivo: Amplamente consolidado na literatura, Negativo: Amplamente consolidado na literatura</p>
30/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tendo em vista o grande benefício do novo medicamento, inclusive com diminuição de internações por insuficiência cardíaca, haverá grande benefício para os pacientes que usariam a melhor droga à disposição no mundo e por consequência, provável economia para o SUS com diminuição de internações e complicações da ICC.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Temperamento miocárdio reverso em cardiopatia Peri parto, Negativo: Custo para o paciente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, BRA, antagonista de mineralocorticoide, diuréticos de alça, betabloqueadores, Positivo: Melhora clínica razoável, Negativo: Hoje em dia entresto- valsartan/sacubitril demonstrou-se ser melhor que ieca e bra isolado.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho conhecimento que os pacientes que fizeram uso desse medicamento tiveram uma melhora significativa na sua qualidade de vida e além disso são pessoas carentes que não tem condições de comprar o medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O uso de sacubitril valsartana para os pacientes sintomaticos da IC com expectativa de vida superior há 1 ano `e fundamental para reduzir hospitalizacoes frequentes e melhorar a qualidade de vida. O custo de re-hospitalizacoes `e muito maior que uso de medicação oral comprovadamente superior em relação aos desfechos morte e re-hospitalização. Portanto a economia de não incorporar será suplantada pelo uso de leitos hospitalares e todo aparato diagnóstico repetido a cada hospitalização.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Tolerabilidade, melhora de sintomas e redução de hospitalização e remodelamento reverso, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Combinação Hidralazina + Mononitrato, Positivo: Custo Baixo, Negativo: Menos Eficiente, mas utilizado para o subgrupo de afro descendentes. Enquanto o entresto aplicável para todos os individuos.</p>
30/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho conhecimento que o medicamento Entresto é um produto revolucionário no tratamento da Insuficiência Cardíaca. Após muitos anos sem nada inovador para o tratamento de uma doença tão grave, Entresto surge como uma esperança para milhares de pacientes, em sua maioria carentes. Os resultados obtidos nos estudos clínicos e também através de relatos dos pacientes que já puderam fazer uso do produto são impressionantes. São pacientes que estavam na fila de transplante, UTIs e outros, com prognósticos muito ruins, que após começarem a fazer uso de Entresto tiveram uma melhora significativa dos sintomas, melhor qualidade de vida e aumento na expectativa de vida. A Insuficiência Cardíaca mata mais que inúmeros tipos de câncer e é inadmissível pensar que o Governo irá negligenciar estes doentes, diante de um medicamento que comprovadamente apresentou evidências e superioridade versus os tratamentos atuais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente a ICC é uma doença que pouco se fala gerando baixa consciência pelos pacientes, com isso muitos morrem sem nem ter noção total da sua condição. Novas terapias são importantes quando trazem clara mudança na perspectiva de viver melhor e também de prolongar com qualidade portanto, acredito que uma incorporação para tratar pacientes com ICC deve ser feita.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mudança clara nas atividades diárias básicas, pacientes que antes mau levantavam para fazer higiene pessoal ou pequenas rotinas voltam a vida normal para sua faixa etária. Prolongar vida com qualidade foi o principal diferencial., Positivo: Já mencionado acima, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECAs são bons até um momento do tratamento. Podem continuar sendo terapias iniciais no SUs pelo custo da nova medicação, mas chega um momento que precisamos mudar a perspectiva do tratamento e só entresto mostrou na prática , Positivo: Custo boa resposta, Negativo: Tolerabilidade e eficácia não são iguais para todos os pacientes</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento extremamente tolerado por pacientes e com melhora visível e significativa</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Melhora da dispneia e tolerancia a atividades da vida diária , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora do quadro clínico, maior disposição física e respiratória., Negativo: Nenhum efeito negativo. O único problema é o alto valor de custo do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caverdilol, Positivo: Perda de peso., Negativo: Queda de pressão; Desânimo; Indisposição física.</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril-Valsartana, Positivo: Melhora dos sintomas de insuficiência cardíaca e redução de internação , Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: -, Positivo: -, Negativo: -</p>
30/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Sacubitril/Valsartana através do estudo PARADIGM-HF mostrou sua eficácia em pacientes com ICFeR na redução de morte cardiovascular e redução de hospitalização comparando com Enalapril. Com isso, os pacientes tem uma melhora clinica significativa aumentando sua expectativa de vida com qualidade. Além de reduzir o custos com hospitalização para o SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entresto reduzir morte, hospitalização e melhora a qualidade de Vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da qualidade de vida, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Enalapril, Positivo: Preço, Negativo: Tosse, aumento de hospitalização</p>
30/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entresto está nos principais diretrizes de tratamento p ICC.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Paciente não mais hospitalizou., Negativo: Não há pontos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, Positivo: Preço, gratuito., Negativo: Tosse, pior controle dos sintomas.</p>
30/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento melhora muito os sintomas e prolonga a vida de pacientes com mortalidade muito alta`com muitas internações hospitalares muito dispendiosas. O custo/benefício compensa porque melhora a vida e reduzimos muito as despesas com internações dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril/valsartana, Positivo: grande melhora dos sintomas e dos sinais clínicos da ICC, em pacientes refratários ao tratamento convencional , Negativo: De 07 pacientes 01 apresentou quadro sugestivo de alergia, precisando ser suspensa (prurido na face e orofaringe) e 01 intolerância por hipotensão. 05 estão em uso boa melhora clínica e de qualidade de vida</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, BRA, Diuréticos, Betabloqueadores, Espironolactona, Positivo: Os medicamentos acima são usados em conjunto no tratamento da ICC , com ações sinérgicas levando a melhora do quadro clínico, Negativo: IECA: tosse, hipotensão; B Bloqueador: bradicardia, hipotensão: diuréticos: hipotensão, fraqueza, hipocalemia; espironolactona: hipercalemia, ginecomastia</p>
01/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril-valsartana, Positivo: Remodelamento cardíaco, Negativo: Tosse seca</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril valsartana, Positivo: Remodelamento cardíaco, Negativo: Tosse seca</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entendo ser de fundamental importância para o bem estar da população carente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Resultados pessoais com tratamento e pacientes com ICFeR têm demonstrado resposta excelente com rápida melhora do quadro e aumento da qualidade de vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril., Positivo: Melhora significativa dos sintomas e remodelação ventricular., Negativo: Alguns casos com elevação do potássio e piora da insuficiência renal, corrigidas com acompanhamento adequado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BRAS, IECAS., Positivo: Semelhantes, mas o Sacubitril agrega benefícios por se tratar de outro mecanismo de ação., Negativo: Semelhantes ao Sacubitril.</p>
01/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É uma medicação que muda prognóstico e melhora a qualidade de vida dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartan, Positivo: Melhora significativa dos sintomas e da qualidade de vida, Negativo: Principal efeito colateral hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartan, Positivo: Melhora da qualidade de vida , Negativo: Hipotensão</p>
01/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Altos impostos que pagamos deveriam garantir tratamentos melhores a quem precisa.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos indicados para o tratamento desta doença , Positivo: Vasodilatação, controle de frequência cardíaca, melhora metabólica e ajuda na sintomatologia. Dentre outros., Negativo: Inúmeros</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos indicados para o tratamento desta doença , Positivo: Vasodilatação, controle de frequência cardíaca, melhora metabólica e ajuda na sintomatologia. Dentre outros., Negativo: Inúmeros</p>
01/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Droga com forte evidência de melhora clínica na insuficiência cardíaca. Doença grave de alta prevalência e carente de uma droga mais efetiva e com um custo aceitável.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora dos sintomas com redução da classe funcional do nyha, Negativo: hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: enalapril, valsartana, espirolactona, furosemida, carvedilol, Positivo: IECA/BRA E CARVEDILOL COM MELHORA DOS SINTOMAS E FUROSEMIDA E ESPIRONOLACTONA MELHORA DOS SINTOMAS E REDUÇÃO DA CLASSE FUNCIONAL , Negativo: IECA/BRA HIPERCALEMIA/ HIPOTENSÃO. FUROSEMIDA = PIORA DA FUNÇÃO RENAL ESPIRONOLACTONA = HIPERCALEMIA</p>
01/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não podemos deixar de oferecer aos pacientes um medicamento que comprovou reduzir a mortalidade cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nenhum, Positivo: Sacubitril/valsartam : reduziu sintomas de I Cardíaca e evitou internação dos pacientes, Negativo: Pequena queda de Pressão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, furosemida, digoxina, espirolactona, Positivo: Todos auxiliam no tratamento da Ins. Cardíaca, Negativo: Tosse, hipotensão, hipercalemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Cuido da minha sogra que desenvolveu insuficiência cardíaca por causa da doença de Chagas, vivia acamada e internando, utilizava um monte de medicamentos e mesmo assim íamos pro hospital várias vezes, em algumas crises, ela saía e voltava quase que na mesma semana pro hospital. Depois que médico trocou seu remédio por entresto, nossa vida melhorou muito, tem 6 meses que a minha sogra não interna, recuperou o fôlego e está muito disposta. O médico tem nos fornecido o medicamento pois não temos condições de comprar e precisamos desse remédio na farmácia do hospital. Por favor... Nos dê essa oportunidade de viver fora do hospital.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Os medicamentos da minha sogra pra insuficiência cardíaca , Positivo: O Entresto melhorou a vida da minha sogra e a vida da nossa família., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Citado anteriormente , Positivo: Citado anteriormente , Negativo: Citado anteriormente</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação muda completamente os desfechos clínicos de morte e qualidade de vida do paciente. Reduzindo internações e sintomas, além de aumentar a sobrevida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartan, Positivo: Melhora na qualidade de vida, capacidade funcional e redução de reinternações , Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ValsartanaCandesartanaLosartanaEnalaprilRamiprilFurosemida, Positivo: Ajuda no remodelamento reverso, Negativo: Tosse com IECA, sem tanta regressão da doença</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acho que o sacubitril/valsartan tem sido utilizado em pacientes com IC e tem demonstrado benefícios em mortalidade e sintomas dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacibitril/valsartana, Positivo: Melhora dos sintomas. Aumenta sobrevida dos pacientes com insuficiência cardíaca , Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidora da ECABetabloqueadoresAntagonistas mineralocorticoides, Positivo: Aumento sobrevidaMelhora dos sintomas Remodelamento reverso do ventrículo esquerdo , Negativo: Hipotensão Hipernatremia Tosse</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sacubitril/valsartana comprovadamente reduz mortalidade, sintomas e internações por insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, trazendo além da melhora clínica dos portadores da doença, importante economia para o sistema de saúde, visto que a internação por insuficiência cardíaca responde por parte significativa dos gastos do SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Em pacientes acompanhados em meu consultório e no ambulatório de insuficiência cardíaca do Hospital PUC-Campinas, onde sou coordenador do serviço de cardiologia, professor de Cardiologia da Faculdade de Medicina e responsável pelo ambulatório de insuficiência cardíaca, Positivo: Houve redução significativa dos sintomas e, ainda mais importante, grande impacto na re-internação destes pacientes, trazendo considerável economia à instituição., Negativo: Eventuais casos de hipotensão, facilmente corrigidos com ajuste dos outros medicamentos em uso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) como o enalapril, Positivo: Traz efeitos positivos sobre sintomas e re-internações, porém inferiores quando comparados aos do sacubitril-valsartana., Negativo: Hipotensão e piora da função renal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As evidências científicas já comprovaram sua importância no tratamento da ICC em pacientes graves com limitação de classe funcional e limitação consequente na sua qualidade de vida. Já tive experiência própria com diversos pacientes que acompanho, nos quais pude comprovar claramente a melhora dos sintomas e sobrevida após o início dessa droga.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Valsartana + Sacubitril, Positivo: Já pude evidenciar a melhora dos sintomas nos pacientes com ICC com o uso da Valsartana, porém tenho observado uma melhora muito mais significativa e mais prolongada nos pacientes que usam a associação Valsartana + Sacubitril, nos quais observei melhora expressiva principalmente na qualidade de vida., Negativo: Pode alterar a função renal, assim como a Valsartana isoladamente. Além de também poder causar hipotensão, o que pode ser evitado com o ajuste das doses das medicações.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Valsartana, Losartana, Enalapri, Captopril, Carvedilol, Bisoprolol, Nebivolol, Metoprolol, Furosemida, entre outros., Positivo: Melhora nos sintomas, classe funcional da ICC., Negativo: Podem piorar a função renal, causar hipotensão, bradicardia, impotência.</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril-Valsartana, Positivo: Melhora dos sintomas de insuficiência cardíaca e redução de internação , Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: -, Positivo: -, Negativo: -</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É notória a evidência em diretrizes nacionais e internacionais. Provar o paciente desta opção é onerar o sistema de saúde com a evolução da insuficiência cardíaca</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril valsartana, Positivo: Melhora dos sintomas e do remodelamento , Negativo: Hipotensão. Que pode ser manejada com uso adequado</p> <p>3ª - Não</p>
29/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho amigo proximo que utiliza Sacubitril valsartana e , apos a introducao do medicamento sua vida mudou muito . Ele possuia muitas limitacoes e agora parece ser outra pessoa, alem do fato de que nao reinterna há meses. Acredito que a incorporacao deste medicamento poderá beneficiar muitos pacientes pois a Insuficiência cardiaca é uma questao de saude publica .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, droga já estudada por estudos referenciados como importante para reduzir morbimortalidade numa patologia de alta prevalencia no mundo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: beta - bloqueador bloqueadores do sistema renina - angiotensina diureticos , Positivo: controle da frecuencia cardiaca aumento da fração de ejeção do VE MELHORA DA CAPACIDADE FUNCIONAL , Negativo: TOSSE HIPOTENSÃO ARTERIAL</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BETA BLOQUEADOR BLOQUEADORES DO SISTEMA RENINA ANGIOTENSONA DIURETICOS , Positivo: CONTROLE DA FC AUMENTO DA FRAÇÃO DE EJEÇÃO DO VE MELHORA DA CAPACIDADE FUNCIONAL , Negativo: TOSSE BLOQUEIOS ATRIOVENTRICULARES CAIMBRAS ELEVAÇÃO DA GLICEMIA</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Resultados pessoais com tratamento de pacientes com IC classes III e IV tem demonstrado resposta excelente com rapida melhora do quadro e aumento da qualidade de vida dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhoravda capacidade de fazer esforços, descapitalização mais rápida dos quadros mais graves, Negativo: Hipotensão em alguns pacirntes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol, Positivo: Melhora da fração de ejeção com o aumento das doses, Negativo: Asma, hipotensão, bradicardia, síncope</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Possui superioridade, melhora de sobrevida e qualidade de vida, em relação aos outros fármacos disponíveis. Sendo, inclusive, incluído nas principais diretrizes para tratamento da Insuficiência Cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril-valsartana, Positivo: Melhora da qualidade de vida dos pacientes, com redução das internações e sintomas., Negativo: Não houveram.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Maleato de Enalapril, Perindopril, Losartana, Captopril., Positivo: Melhora de sintomas e internações , Negativo: Não houveram</p>
29/11/2018	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MEDICAÇÃO COMPROVADAMENTE EFICAZ NA REDUÇÃO DE HOSPITALIZAÇÃO E NAS TAXAS DE MORTALIDADE. ESTUDO PARADIGMI E ESTUDO PIONEER (REDUÇÃO DE 44% DE HOSPITALIZAÇÃO). ISTO PROVA QUE PARA O GOVERNO SAIRÁ MAIS EM CONTA TRATAR O PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA, POIS FICARÁ MENOS TEMPO HOSPITALIZADO E MAIS TEMPO EM SUA RESIDÊNCIA COM SEUS FAMILIARES. MAIS QUALIDADE DE VIDA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECAS, BETA-BLOQUADORES, DIURÉTICOS, EXPINOROLACTONA., Positivo: EXPERIÊNCIA COM IECAS, SOMENTE 10% DE REDUÇÃO DE MORTALIDADE E HOSPITALIZAÇÃO. ENTRESTO - REDUÇÃO DE 20% DE MORTALIDADE E HOSPITALIZAÇÃO. BETA-BLOQUEADOR - REDUÇÃO DE 30% DE MORTALIDADE , Negativo: IECAS - ÍNDICE DE TOSSE E EDEMA MUITO ELEVADO. ENTRESTO - EFEITOS ADVERSOS DE TOSSE E EDEMA MENORES QUE IECA.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECAS, BETA-BLOQUEADORES, DIURÉTICOS, ENTRESTO , Positivo: EXPERIÊNCIA COM IECAS, SOMENTE 10% DE REDUÇÃO DE MORTALIDADE E HOSPITALIZAÇÃO. ENTRESTO - REDUÇÃO DE 20% DE MORTALIDADE E HOSPITALIZAÇÃO. BETA-BLOQUEADOR - REDUÇÃO DE 30% DE MORTALIDADE , Negativo: IECAS - ÍNDICE DE TOSSE E EDEMA MUITO ELEVADO. ENTRESTO - EFEITOS ADVERSOS DE TOSSE E EDEMA MENORES QUE IECA.</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acúmulo de experiência favorável</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora expressiva dos sintomas, controle clínico rápido, após tendo mantido os pacientes já estavam com seu tratamento prévio otimizado, Negativo: Hipotensão em poucos casos, corrigido com o ajuste da dose</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, Losartana, captopril, espirolactona, carvedilol, metoprolol, furosemida, Positivo: Boa toletabilidade, alívio de sintomas, melhora da qualidade de vida e pelo tempo de uso e experiência, certamente diminuição da Mortalidade pela doença , Negativo: Enalapril e captopril a ocorrência de tosse, basicamente.</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, apesar do preço, a evolução clinica dos pacientes que eu acompanho em uso da medicação são muito satisfatórias, alem das referencias literárias.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: valsartana-sacubitril, Positivo: melhora clinica de pacientes, já em tratamento com outros farmacos, Negativo: preço do medicamento. dificuldade em pacientes com pressão arterial mais baixa.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IecabraEspironolactonabeta bloqueador Ressincronização, Positivo: Entendo que as terapias são progressivas e/ou complementáres. IecabraEspironolactonabeta bloqueador Ressincronização, Negativo: Ieca => torlerancia => evoluçãobra => evolução Espironolactona => tolerancia beta bloqueador => tolerancia Ressincronização => dificuldade de acesso</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho usado esta droga em pacientes com ICFER com significativo sucesso. O impacto clínico-hemodinâmico tem sido positivo tanto em termos de compensação do paciente quanto de melhora de parâmetros ecocardiográficos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Melhora de classe funcional (NYHA) ; redução de doses ou retirada de outras drogas prescritas anteriormente ao sacubitril/valsartan ; melhora de parâmetros ecocardiográficos. , Negativo: Hipotensão Arterial e preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA ; BRA ; ESPIRONOLACTONA; BETABLOQUEADOR; DIURÉTICOS , Positivo: Melhora hemodinâmica às custas de redução da pós-carga, da volemia e do cronotropismo ; assim como elevação do inotropismo. , Negativo: IECA: tosse ; hipotensão arterial BRA: hipotensão arterial; disfunção renalEspironolactona: hipercalemia Diuréticos: hipovolemia; insuficiência renal ; hipocalemia Betabloqueador: broncoespasmo; distúrbios de condução</p>
29/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sacubitril/Valsartana conforme estudo Paradigm foi comparado ao Enalapril(ieca), sendo que neste estudo Paradigm o Sacubitril/Valsartana demonstrou uma redução de 20% de morte frente ao Enalapril, além disso demonstrou 21% de redução de hospitalização frente ao Enalapril e redução de 20% de morte súbita frente ao Enalapril. Importante destacar que o estudo Paradigm é o maior estudo já feito na Insuficiência Cardíaca. A 20 anos não tínhamos uma nova droga para o tratamento da IC, e o Enalapril durante todos estes anos foi a droga referência. Um amigo está usando Sacubitril/Valsartana e a melhora do quadro clínico deste meu amigo foi surpreendente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo. Sou cardiologista, trato muitos pacientes com IC e a melhora observada com a droga chama a atenção. Claro acho que devem existir regras claras para avaliar quem teria direito. Sugiro otimização máxima com terapia anterior por 3-6 meses. Uso de IECA ou BRA dose máxima, Espironolactona e Beta bloqueador e confirmação de beta bloqueio. Não é incomum pacientes com dose alta de Beta Bloqueador que mantém FC acima do preconizado e acho que isso poderia ser checado antes da liberação da droga.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartan, Positivo: Melhora da Fração de ejeção Melhora expressiva da Classe Funcional em pacientes graves , Negativo: Alguns pacientes não toleram por conta de hipotensão mas acredito ser um problema da própria curvas aprendizado dos colegas. Muitas vezes é preciso diminuir ou suspender a furosemida ao iniciar Entresto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos usados pra IC - IECA, BRA, Beta bloq, espironolactona, furosemida, Ivabradina e Digoxina em raros casos , Positivo: Todos têm seu valor. Tenho pacientes que recuperaram da IC após tratamento com Enalapril e Carvediolol.. por isso penso que um período de tratamento antes de iniciar O Sacubitril Valsartan, Negativo: IECA, BRA e espironolactona piora da função renal, hiperpotassemia, hipotensão Beta bloqueador - hipotensão, bradicardia excessiva, broncoespasmoDigoxina- intoxicação</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora dos sintomas de dispneias, melhora da fração de ejeção ventricular esquerda, melhora da capacidade funcional., Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os outros, Positivo: Melhoras da capacidade funcional, Negativo: Hipotensão</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo PARADIGM mostrou redução de mortalidade , hospitalização e sintomas nesses pacientes com fração de ejeção menor que 35%</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto - sacubitril/valsartana, Positivo: Sacubitril valsartana - redução de mortalidade Redução de sintomas e hospitalização , Negativo: Não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora significativa dos sintomas clinicos, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol, espirinolactona, valsartana, furosemida, digoxina, Positivo: Todos contribuem com a melhora clinica, Negativo: Hipotensão em alguns casos</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha experiencia clinica é muito favoravel com o uso da medicação. Alem disso o nivel de recomendacao pelaa sociedades americana e europeia é classe I. O beneficio para o paciente é indiscutivel.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Valsartana / Sacubitril, Positivo: Melhora dos sintomas e dos examea clinicos dos pacientes , Negativo: Ainfra nao tive provlemas com meus pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol, IECA, BRA, Inibidores da aldosterona, Positivo: Atuam na remodelacao cardiaca, ajudando a melhorar ICC, Negativo: Insuficiencia renal, bradicardia, hipotensao, ginecomastia</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Reduz drasticamente os sintomas da IC e melhora o quadro geral do paciente. De acordo com os guie line brasileiro atende perfeitamente a necessidade do médico e pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, BRA, , Positivo: Redução dos sintomas, remodelamento ventricular e melhora da qualidade de vida., Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto com betabloqueadotes e diureticos, Positivo: Sacubitril/valsatana reduzem mortes e hospitalização , Negativo: Ieca e bra não melhoraram a qualidade de vida</p>
29/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este produto tem porporcionado um melhora grande em minha vida. Estou utilizando já fazem 6 meses e desde então não voltei ao hospital e tenho consigo realizar atividades que há muito tempo não vinha fazendo. Apesar disso é um produto caro e compromete muiito minha aposentadoria. Se colocar gratuito no SUS com certeza vai beneficiar muitas pessoas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso ENTRESTO 97/103 - Lasix 40 - Rosuvastatina 20 - Aldactone 25 - Combordart 0,5 - concor 5 - Eliquis 2,5., Positivo: Usava valsartana 320 e anlodipino 5 e não consegui mais nem andar direito. Até para falar no telefone tinha diuldade. Depois que prescreveu os outros medicamentos tenho realizado as coisas do dia dia sem dificuldades. Desde que passou os novos remedios não fui mais aos hospitais e estou muito mais dispostos., Negativo: Aumentou a quantidade de vezes de ir para o banheiro para mijar, mas depois reduziu o lasix melhohrou.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso ENTRESTO 97/103 - Lasix 40 - Rosuvastatina 20 - Aldactone 25 - Combordart 0,5 - concor 5 - Eliquis 2,5., Positivo: Combordat melhou muito a necessidade de mijar, Negativo: as vezes combordat aumenta a frequencia.</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril Losartana., Positivo: Melhoras dos sintomas e pcp das internações hospitalares , Negativo: Não observado.Hipotensão em alguns casos com facilidade para contornar.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betabloqueadores.Inibidores mineralocorticoides.Diuréticos. Vasodilatadores.Inibidores da Eca.BRA., Positivo: Melhoram a sobrevida e diminuem a hospitalização , Negativo: Distúrbios eletrólitos.</p>
29/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha vó tem insuficiência cardíaca diagnosticada e os medicamentos padrão liberados pelo SUS não atendem a necessidade dela.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Enalapril , Positivo: Melhorou os sintomas da doença , Negativo: Tosse e alteração da função renal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai é usuário deste medicamento e após o uso percebi uma melhora grande na realização de tarefas que ele já não vinha realizando há muito tempo. Ao pesquisar na internet também tive a grata surpresa de ver relatoria de médicos que estão prescrevendo este produto por acreditar que aumenta a expectativa de vida das pessoas com esta doença. Uso</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Melhorou a respiração, consegue fazer atividades que não vinha realizando , não voltou ao hospital devido a queixas de falta de ar . , Negativo: O preço , pois ele utiliza outros medicamentos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ele estava usando o Valsartana 320 , anlodipino é hidroclorotiazida. , Positivo: A pressão estava controlada com esses remédios., Negativo: Apesar do uso dos medicamentos estava piorando , com muitas queixas de falta de ar e cansaço sem disposição. Não conseguia beber água que piorava.</p>
29/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe diagnosticada com insuficiência cardíaca e os medicamentos oferecidos pelo SUS não garantem a ela uma boa qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Enalapril, Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Tosse e alteração da função renal</p>
04/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: UMA MELHORA MUITO GRANDE NA MINHA QUALIDADE DE VIDA., Negativo: NÃO HOUE ATÉ O MOMENTO ALGUM EFEITO NEGATIVO</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CARVEDILOL, Positivo: TEVE UMA MELHORA PORÉM NÃO TÃO SIGNIFICATIVA., Negativo: NÃO É 100 % EFICAZ</p>
29/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Sacubitril/valsartana é um dos maiores avanços no tratamento da IC (insuficiência cardíaca), doença que acomete cerca de 2 milhões de brasileiros e é responsável por mais de 300.000 hospitalizações por ano, segundo dados do Data-SUS. A IC é a 7ª causa de hospitalização em todas as idades e a 4ª causa em pacientes com mais de 60 anos. O medicamento reduz significativamente a progressão da doença, reduz hospitalizações por descompensação da IC, reduz o tempo de internação e reduz a mortalidade de forma igualmente significativa. O custo de um dia de hospitalização consegue cobrir o gasto de mensal com o medicamento para 7 pacientes. Se assumirmos que dados do DATA SUS indicam cerca de 350.000 hospitalizações por IC a cada ano no Brasil e que cada hospitalização por IC descompensada dura em média 7 dias, então temos cerca de 2.100.000 dias de internação/ano. Considerando que essas hospitalizações poderiam ser reduzidas em 20%, teríamos 410.000 dias a menos de hospitalização nos pacientes utilizando o medicamento. Esse custo poderia ser revertido em subsídio para a compra desse medicamento para os pacientes que não conseguem comprá-lo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na qualidade de vida medida através de questionários de saúde, melhora na capacidade funcional, melhora nos sintomas de fadiga e dispnéia, redução de hospitalização., Negativo: O medicamento é muito bem tolerado. Um dos maiores cuidados é a introdução gradual para evitar hipotensão arterial e piora na função renal.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, com IECAs e BRAs., Positivo: Semelhantes ao Sacubitril/valsartana, porém com menor intensidade. Quando comparado com enalapril o sacubitril/valsartana foi significativamente melhor em todos os quesitos, sobretudo em melhorar os sintomas, reduzir internação e prolongar a vida., Negativo: Os IECAs produzem maior risco de dano renal e hiperpotassemia.</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há muitos pacientes com insuficiência cardíaca e de baixa renda, que com a renda que possuem mal conseguem se alimentar. Se o medicamento fosse fornecido pelo SUS com certeza teriam a qualidade de vida melhorada.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Diminui a cansaço cardíaca, não causou efeito colateral. E possibilitou que meu pai idoso conseguisse reestabelecer a sua rotina., Negativo: Não foi observado nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não entendo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: A paciente está sentindo-se bem ao fazer uso do mesmo, Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remédio muito bom e necessário ao doente, poucos poderão fazer uso dele por longo prazo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24mg/26mg, dois compr ao dia., Positivo: Estou me sentindo muito bem. Não tive mais nenhum mal estar., Negativo: Até agora o único efeito negativo é o preço. Apesar de o Laboratório dar um desconto para os pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caverdilol 25 mg, Positivo: Até o final do ano passado estava bem, mas do início pra cá muita falta de ar. Me senti melhor ao passar a usar Entresto, Procoralan e vastarel., Negativo: A mesma descrição acima.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um medicamento de ponta sem similar no sus, diminui o uso de outros medicamentos fornecidos já pelo sus sendo seus efeitos muitos benéficos para quem tem cardiopatia, sendo seu uso dificultado pelo alto custo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Pressão estabilizada, diminuição c cansaço, aumento da disposição, melhora sono., Negativo: Não notei</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu estava sendo medicado com Benicar, me sentia uma pessoa cansada. Depois da troca pelo entresto, sou outra pessoa. Disposta e revigorada.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Passei a me sentir disposto ao trabalho, a tudo. Antes me sentia um velho de oitenta anos., Negativo: Não senti nenhum efeito negativo no uso do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Benicar, me sentia muito cansado. Sivastatina me sentia com o corpo todo dolorido., Positivo: Entresto disposição física., Negativo: Benicar, me sentia muito cansado. Sivastatina me sentia com o corpo todo dolorido.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou cardiopata e preciso do medicamento, para meu caso foi muito bom e deveria chegar para todos que necessita desses cuidados! Seria um avanço se esse medicamento fosse distribuído pelo sus</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Uso regularmente o medicamento antes utilizava o enalapril mais o entresto foi mais eficaz aumentando a suficiência cardíaca., Negativo: Para mim não tem pontos negativos!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, Positivo: nada a declarar, Negativo: nada a declarar</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No meu caso, que tomo outros medicamentos, essa maneira, ameniza um pouco, o lado financeiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou aposentado por invalidez meu salário fica difícil para me sustentar e comprar o remédio pois é muito caro</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto cardevilol atensina piravastatina ispirolaquitona metiformina etc mais insulina nph hulmalogui lispro , Positivo: Controle do diabetes pressão arterial e do coração por causa da insuficiência cardíaca, Negativo: Problemas renais cardiovasculares e morte</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com losartana , Positivo: Nen hum só alterou a insuficiência cardíaca , Negativo: Alteração da insuficiência cardíaca</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é ótimo porém o preço não é acessível, por esse motivo tem que ser gratuito ou com um preço simbólico, para pacientes que precisam e não tem condições de comprar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto24mg/26mg, Positivo: Melhorou muito a cansaça que sentia, não dormia direito devido a essa cansaça agora passa a noite muito bem., Negativo: Não tive nenhum efeito negativo só bons resultados.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Valsartana - Entresto , Positivo: Com esse medicamento controlou minha pressão e batimentos cardíacos, possibilitando realizar atividades simples do cotidiano, sem ter falta de ar. Escovar os cabelos, tomar banho e caminhar dentro de casa., Negativo: Até regular a dose certa tinha sonolência e cansaço</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remédio muito caro e compromete a renda familiar de aposentados e pensionistas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Entresto prolongou minha vida, de forma a poder esperar o agendamento do cateterismo realizado na cidade de Piracicaba, está ajudando na espera do agendamento da cintilografia que não tem em minha cidade (Rio Claro/SP).Atualmente possuo dois infartos, que antes da medicação não conseguia fazer mais nada, estava totalmente descompensada. Agora posso fazer algumas coisas que fazia, como por exemplo, tomar banho sozinha, cozinhar e realizar pequenas caminhadas., Negativo: Até o momento nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Junto ao Entresto, tomo Concárdio, Esperonolactona e Lasix, Positivo: O conjunto destes remédio me mantém normalizada, Negativo: Nenhum até o momento, já tomo estes remédios a 6 meses</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Um remédio que me ajuda muito no meu bem estar porém com preço muito elevado por isso concordo com incorporação do Entresto no SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Diminui minha falta de ar e cansaço, Negativo: Até agora nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessidade para viver</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Otimo, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de auto custo, porém com eficácia e salvando vidas, auxiliando no tratamento de insuficiência cardíaca, deve sim ser distribuído ao sus, nem todos tem condições de comprar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 93/107, Positivo: Normalização de hipertensão, auxílio na insuficiência cardíaca visivelmente benéfico, Negativo: O valor</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clexane, Positivo: Para gestantes, e auxílio na coagulação de sangue, também de auto custo, Negativo: O valor</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Nenhuma, Negativo: A pressão caía muito</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio tem um custo alto muitas pessoas precisam dele e não tem como comprar, minha mãe mesmo é uma que precisa e não tem condições de comprar pq além desse, ela toma o pradaxa que também custa caro.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Ajudou muito a minha melhorar, ela tinha apenas 30% do coração funcionando e com esse remédio já subiu pra 43%, ela já se sente melhor e mais disposta a fazer os afazeres dela consegue fazer tudo de uma vez, está mais saudável e melhor, Negativo: Os efeitos negativos são os efeitos colaterais no começo até a pessoa se adaptar com o médica então</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio cobrado pelo laboratório muito alto mesmo com desconto do laboratório quantas pessoas necessitam e não podem pagar o valor. Insuficiência cardíaca é muito sério e perigoso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Nos meu exame de Eco a insuficiência cardíaca melhorou 90%, Negativo: nada consta. Só o preço da medicação</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorei sensivelmente a saúde, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concardio, Positivo: Normal, Negativo: Não tive</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhor resposta cardíaca a exercícios físicos. O paciente teve mais energia e não se sentia cansado., Negativo: Não houve nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de alto custo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Deixa bem estabilizada a pressão, Negativo: Ainda não houve</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse remedio e essencial pra quem precisa porem o valor nao e acessivel pois nao e so um mes de uso e sim continuo e no meu caso são 60 comprimidos por mes</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51mg, Positivo: Mi há doença está controlada e não sinto nenhum efeito colateral grave, Negativo: O preço</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Para o paciente com Insuficiência cardíaca é muito importante o uso deste medicamento para que o paciente possa levar a vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: O uso correto recomendo deixa a respiração melhor, facilitando para uma noite tranquila e mais confortável de sono., Negativo: Não tive nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ancorom, eliquis, digoxina, indapem liples, concardio, Positivo: Somente a utilização dos medicamentos citados foi possível o controle da Insuficiência cardíaca e f.a., Negativo: Não tive nenhum</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como usuário contínuo desse medicamento o preço absurdo está se tornando inviável a continuidade do meu tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, carvedilol, somalgin, sinvastatina, metformina., Positivo: Melhora da pressão diminuição da dor no peito melhora do colesterol, Negativo: Não observei efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Empresto carvedilol , Positivo: Melhora da pressão arterial e falta de ar, Negativo: Não houve efeitos negativos.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já faço uso contínuo ha um ano e me sinto bem.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Atenolol Losartana, Positivo: Estabilização de pressão arterial, Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atenolol, Positivo: Estabilização de frequencia cardíaca e pressão arterial, Negativo: Não observei</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vou tomar o medicamento ate eu morrer, preciso dele para ter uma boa qualidade de vida, o remédio é muito caro se for incorporado ao sus poderei viver melhor</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Mudou a dor que eu tinha no peito, palpitações e me ajudou a ficar mais disposta, Negativo: Não tive efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concardio e entresto, Positivo: Eles são ótimos minha vida melhorou 100%, Negativo: Não tem</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento tem sido eficaz no tratamento porém é muito caro para o paciente que necessita dele.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Diminuição de cansaços, falta de ar e normalização da fração de ejeção., Negativo: Abaixa pressão</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Aldactone, Ancoron e Indapen., Positivo: Evitar arritmias., Negativo: Demora nos resultados.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na qualidade de vida. Controle da doença , Negativo: Custo alto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Positivo: Melhora na qualidade de vida , Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SE É UM REMEDIO PARA CONTROLE E USO CONTINUO DO CARDIACO, EU ENTENDO QUE É UM REMEDIO QUE DEVA SER COLOCADO NA FARMACIA POPULAR.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: MELHOROU MUITO UM CANSAÇO QUE EU TINHA. ESTAVA UM POUCO INCHADO O QUAL REDUZIU MUITO., Negativo: NÃO NOTEI NENHUM EFEITO NEGATIVO.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: VARIOS., Positivo: ANTES DE CONHECER O ENTRESTO OU OUTROS MEDICAMENTOS EU ACHAVA QUE ERAM BONS., Negativo: SENTIA CANSAÇO E INCHAÇO NOS PÉS.</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da condição do paciente, Negativo: Produto caro e a cada 20 dias precisa ser adquirido.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto24/26, Positivo: Houve melhora sensível no folego, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora importante dos sintomas da insuficiência cardíaca, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Digoxina e carvedilol, Positivo: Manutenção do quadro clínico, Negativo: Hepatotoxicidade</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Remédio Entresto, Positivo: Ele controlou totalmente os batimentos cardíacos além do coração ter parado de crescer consideravelmente , Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caverdilol, Positivo: Melhorou um pouco o coração, Negativo: Depois de um tempo ele nao fez mais efeito sozinho</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou muito meu quadro cardíaco, Negativo: No primeiro mês tive algumas reações mas agora esta normalizado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Tomo várias meficações, Negativo: Nenhuma teve efeito negativo</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Pra min foi ótimo , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não me lembro, Positivo: Não me lembro, Negativo: Não me lembro</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: LosartanaAnlodipino, Positivo: Estabilizaram a minha pressão , Negativo: Retenção de líquidos com o Anlodipino</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Intresto, Positivo: Melhorou o meu desempenho, Negativo: Não teve efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Era fraco, Negativo: Não fazia mais efeito</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se é necessário ao tratamento conforme prescrição médica, é obrigação do Estado prover os medicamentos necessários e indispensáveis ao tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Causa um bem estar maior , Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora o bem estar, qualidade de vida, Negativo: Custo</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é imprescindível para os portadores de insuficiência cardiorrespiratória, além do alto custo ao paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril Valsartana, Positivo: Me possibilita uma melhor mobilidade e qualidade de vida , Negativo: Preço e dificuldade mesmo em farmácias próximas ao local de residência</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Amiodarona, AAS, espirolactona, sinvastatina e furosemida, Positivo: Essenciais ao meu bem estar físico e psicológico , Negativo: Nenhum</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu uso o medicamento Entresto e tem me ajudado muito, porém é muito caro e penso nas pessoas que poderiam usufruir deste medicamento e não tem condição.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Meu cansaço acabou. Consigo fazer exercícios em sentir falta de ar., Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Ajudou no ICC. Mais piorou a ir do meu familiar por este motivo teve de serAjudou no icc, Negativo: Piorou a IRC do meu familiar</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Efeito mais eficaz, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preço muito alto</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entreato 49/51, Positivo: Melhora a insuficiência cardíaca , Negativo: Alergia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concor , Positivo: Controle da insuficiência , Negativo: Não tolera, abaixa muito os batimentos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Nao entendo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ENTRESTO, Positivo: Controle (insuficiência cardíaca), Negativo: Nao</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou fazendo uso de entresto, Positivo: Entresto foi o melhor medicamento que eu já usei, me sinto ótimo , Negativo: O único lado negativo é que são medicamentos caros</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou paciênte do medicamento entresto , Positivo: Remédio dá uma qualidade de vida melhor , Negativo: Os pontos negativos é que o governo não dá medicamento com um custo menor</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora no funcionamento do coracao, Negativo: Não percebi nada</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora, Negativo: Não observei</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou minha pressão arterial, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Selozok, carvedilol, maré van, , Positivo: Melhorou em relação aos sitomas da doença., Negativo: Nenhum.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Controle da hipertensao, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E eficaz e nessesário</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Praticamente zerou minhas internações, Negativo: Nenhum, apenas o custo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ramipril, Positivo: Desconheço, Negativo: Foi menos positivo</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora no cardio, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora no cardio, Negativo: Nenhum</p>
05/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do medicamento e sei que é o mais evoluído até o momento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Em 15 dias seu efeito foi de anular todo o mal estar do problema cardíaco, Negativo: Não notei nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Controle da pressão arterial, Negativo: Usar várias vezes ao dia Ju</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Melhora da Insuficiência Cardíaca , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AtacandCélulas Tronco, Positivo: Redução da falta de ar, Negativo: Nenhum</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Melhorou o meu percentual cardíaco , Negativo: Nao tive</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse remédio é o único que está surgindo efeito positivo no sentido de impedir o agravamento da insuficiência cardíaca que tenho.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Tenho me sentido muito melhor., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Enalapril, espirolactona., Positivo: Não senti., Negativo: Todos os demais foram meros coadjuvantes, e não impediram a progressão da insuficiência cardíaca.Disfunção erétil e sexual. Desmaios, bloqueio cardíaco e falta de ar noturna.</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como familiar de usuária e aluna em formação do curso de enfermagem, acredito que pessoas como meus familiar teriam muito proveito da gratuidade desta medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sacubitril /Valsartana, Positivo: Melhor resposta cardíaca, a pressão arterial estabilizada, Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho ICC há 2 anos, há 1 ano passei a tomar Entresto, minha vida melhorou muito, até voltei a trabalhar, minha FE foi de 32 para 52</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO , Positivo: Aumento FE, diminuição tosse, insônia, vertigem e falta de ar que eu tinha até para pequenos serviços de casa, hj faço tudo, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Procolaran, Positivo: Pressao melhorou , Negativo: Aumentou tontura/vertigem</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Sem cansaço , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de grande necessidade publica, mas de valor alto pra maioria da população.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51 MG e , Positivo: Melhora considerável na atividade cardíaca., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Nada a declarar, Negativo: Nada a declarar.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Aumentou minha fração de ejeção no coração, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Positivo: Melhora da pressão, Negativo: Preço</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Temos que ter protocolo para indicação.Acompanhamento do cliente por um cardiologista Sinais e sintomas do cliente e evolução do quadro.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Melhora do cansaço, do bronco espasmo que minha mãe tinha e principalmente da qualidade de vida que tem hoje. , Negativo: Evolução progressiva de bronco espasmos da minha mãe, com o uso do caverdilol.Foi duro relacionar o cansaço, falta de ar com o uso prolongado do caverdilol.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Losartana, Caverdilol., Positivo: Entresto, melhora da qualidade de vida de minha mãe, depois que iniciou o tratamento ela consegue realizar as suas tarefas de auto-cuidado, antes não conseguia fazer nada até pentear o cabelo que por sinal é curto., Negativo: Preço, ela usa a medicação de 12/12 horas a caixa só dá para 14 dias de tratamento. Fica honeroso para ela. Se fosse introduzido no SUS ficaria o casamento perfeito.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Concordo de ser fornecido pelo fato de situações comprobatórias de melhorias em vários pacientes entre eles eu estou incluso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Rusovastatina, AS Infantil, Clopidogrel, Furosemida e Entresto. , Positivo: Melhorou na disposição, me senti menos cansado., Negativo: Não percebi nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorei passou o cansaço a indisposição ficavficava pálida , Negativo: Sem observações</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO , Positivo: Disposição física , Negativo: Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento de elevadíssimo custo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhoria da qualidade de vida, Negativo: Não perceptível.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes com insuficiência cardíaca precisam tomar este remédio , que é caro e não acessível a todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entretanto 24/26 mg, Positivo: Melhoramento da minha função cardíaca., Negativo: Ainda não tenho efeitos negativos apresentado.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvediol, digoxina, amiodarona. E já passei por duas cirurgias cardíacas de troca de válvulas e para o implante do CDI., Positivo: Pressão arterial controlada, melhora da função cardíaca., Negativo: Não tive sintomas negativos.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um remédio de altos benefícios e sobrevida aos pacientes portadores de insuficiência cardíaca crônica.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: Diminuição do risco de morte súbita. Melhoria na dispnêia e capacidade respiratória. Ânimo., Negativo: Ressecamento intestinal</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acesso mais fácil</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Boa recuperação do problema. , Negativo: Não tive problema.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concor, Positivo: Boa recuperação. , Negativo: Não tive efeitos negativos.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Que incorpore o sucubitril/valsartana no SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49mg/51mg(sucubitril Valsartana), Positivo: Melhoras na falta de ar dores nas pernas e canceiras, Negativo: Queda da pressão arterial</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol enalapril,monocordil, procedimentos vários cateterismos e várias angioplastia após ter feito duas revascularização., Positivo: Não sei especificar pois continuei com os sintomas , Negativo: Não obtive resultado bem favorável como muitas intervenções seguidas</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sofro de insuficiência cardíaca e faço uso de Entresto e estou me dando muito bem. Porém, o remédio é caro e se entrasse na lista do SUS ajudaria muitas pessoas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum., Positivo: Não usei outros medicamentos, Negativo: Não usei outros medicamentos</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Diminui os batimentos cardíacos , Negativo: Moleza e sonolência</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou a falta de ar e regulou a pressão arterial, Negativo: Não apresentou nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Somente no começo regulava a pressão, mas após um tempo de uso nao faxia mais efeito, Negativo: Minha pressão era alta mesmo com a medicação e tinha muita falta de ar devido a isso</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que ser liberado para as pessoas de baixa renda</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Teve uma melhora significativa, Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Nada a declarar, Negativo: Nada a declarar</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 49mg/51mg e Entresto 97mg/103mg, Positivo: O Entresto 49/51mg manteve a paciente estável.O Entresto97/103mg aumentou o vigor da paciente (em uso), Negativo: Até o momento não foi observado nenhum efeito negativo com o uso desse medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Losartana, Olmesartana, Rosucor, Somalgim, Espironolactona, Condor, Gastarem, Lasix.Três pontes de safena e colocacao de estent., Positivo: Após o inicio do tratamento com Entregou, a paciente não teve mais internamentos com dores no peito., Negativo: A paciente tinha crises terríveis de dores no peito sendo necessário internamento em urgências com bastante frequência. (Antes de iniciar o tratamento com Entresto).</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Um medicamento muito caro, e muitos médicos vão recomendar para agradar os laboratórios . Já acho que o desconto concedido muito bom!!! Laboratórios querem lucrar com essa mania de se aproveitar do coitadismo brasileiro !!!! Quem vai pagar essa conta???????</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97, Positivo: Minha fração de ejeção subiu de 28 para 42% e com muita disciplina também , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acertil, Positivo: Foi eficiente , Negativo: Nenhum efeito negativo</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se é remédio de uso contínuo e relacionado a problemas cardíacos, deveria ser fornecido pelo SUS, assim como outros.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto. 49 mg, Positivo: Controle da insuficiência cardíaca. , Negativo: Não houve. O produto é caro, mesmo com desconto do laboratório.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Maleato de inalapril. Não consegui estabilizar o problema. , Positivo: Minha mãe não teve efeito colateral. Está com o problema estabilizado. , Negativo: Não resolveu.</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remedio muito bom, mas muito caro para a maioria da população comprar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora muito boa no indice de injecao de fração e de forma rápida , Negativo: Formigamento nos braços como efeito colateral</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Selozok, renitec, aldactone, Positivo: Nao se aplica, Negativo: Nao aumentaram o indice de fração</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Obtive uma melhora significativa</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vários, Positivo: Pouca melhora, Negativo: Não obtive melhora significativa</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários mais não me lembro o nome no momento, Positivo: Pouca melhora, Negativo: Não me deu qualidade de vida</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma medicação moderna, que atende as necessidades do cardiopata, como eu, que aumenta em 30% o sucesso no tratamento, em relação às outras drogas, deveria ser vista com um olhar altruista, pois geralmente um cardiopata carrega outras doenças, o que acaba encarecendo o tratamento. Toda recomendação de algo que venha auxiliar nas questões da saúde pública, devem ser vista e revista, pois a inclusão desta medicação na rede pública, além de tirar este isto das pessoas que não tem dinheiro sequer para levar uma vida digna, acabaria impactando de forma muito positiva no sua...evitando eu diminuindo as ocorrências de entrada nas emergências dos hospitais e PS's, , o que por sua vez, significa menos gasto com a saúde pública. Eu poderia enumerar vários fatores positivos para a inclusão do entresto no SUS, mas TD o que diria, seria redundante ao ministério da Saúde, pois todos estão cansados de saber que medidas de prevenção, são infinitamente melhores que tentar remediar algo mais grave.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto (sacubitril/valsartana), Positivo: Felizmente ao ter uma crise cardíaca, procurei um cardiologista e após exames fui diagnosticado com o coração dilatado por insuficiência cardíaca congestiva (ICC), tomei Naprix, dentre outros medicamentos, e qdo a Anvisa liberou a comercialização do Entresto no país, meu cardiologista substituiu, pois segundo estudos, o entresto com sua nova tecnologia, aumenta em cerca de 30% a sobrevida do paciente, e realmente desde que passei a fazer uso do mesmo, os efeitos colaterais que eu sentia, deixaram de fazer parte da minha vida, melhorei muitinho condição cardíaca, obviamente, com a prática de exercício físico moderado, Negativo: Com a sacubitril/valsartana, deixei de ter efeitos negativos, como tosse seca e tontura.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Naprix (Ramipril), aldactone(espironolactona), cloridrato de amiodarona, vatis(cloridrato de propafenona, com(bisoprolol), Positivo: Todos foram eficazes na minha doença, me tiraram da minha primeira crise., Negativo: Naprix me dava tonturas e muita tosse, me cansava mais fácil, apesar de me tirar da minha primeira crise e o amiodarona, alterou a minha tireóide, e foi substituída pelo Vatis(propafenona)</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu avô tem insuficiência cardíaca crônica e faz 4 meses que o médico receitou esse remédio..por bondade e por saber das condições financeiras de minha família o médico deu três meses de remédio .meu avô teve uma melhora que parece mais um milagre, recuperou muito até na condição física do , porém meses passado a família teve que se virar nos 30 para conseguir comprar o remédio..estamos desesperados pq sabemos que não temos condições e meu avô é totalmente dependente deste remédioPor favor não deixem meu avô morrer!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 49/51, Positivo: Recuperação de musculatura e peso, fadiga diminuída ao andar, frequência cardíaca mais controlada e como o médico mesmo atestou recuperação considerável por um maior número de anos de vida sem intervenção hospitalar frequente., Negativo: Não observamos qualquer reação negativa</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Enalapril, furosemida, espironolactona,, bisoprolol, furoseque, Positivo: Todos têm sua importância para manutenção da vida do meu avô, diminuição da tosse que não o deixava dormir mas o remédio que trouxe resultado aparente foi o entresto., Negativo: Dores no estômago</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento caro. Tem que ser fornecido pelo SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora nos sintomas da insuficiência cardíaca, Negativo: Preço elevado</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Entrei em fase de teste com Entresto obtendo um resultado muito positivo na Melhora de meu problema, porém muito difícil continuar com tratamento devido O valor não acessível..., Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rtmonorme, Positivo: Tive pouca melhora, Negativo: Não obtive resultado esperado</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, concor, Positivo: Tem me ajudado no trramento, Negativo: Muito caro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Tem me ajudado no tratamento, Negativo: Muito caro</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para mim está tendo um excelente resultado!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhor disposição, menos cansaço!, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aradois, Positivo: Resultados extremamente positivos quanto ao meu tratamento, Negativo: Nenhum</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26, Positivo: Maior facilidade pra respirar, fico com muito menos cansaço, pressão arterial controlada, batimentos cardíacos controlados, etc..., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na qualidade de vida, menos cansaço, mais disposição, Negativo: Abaixa muito a pressão arterial</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estresto, Positivo: Melhora da dispneia ao subir escadas, Negativo: Ainda não percebi nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Candessartana, Positivo: Controle da pressão arterial, Negativo: Nenhum</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Estou me sentindo bem, Negativo: Para mim não teve efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, Positivo: Pegar na farmácia popular, Negativo: Menos efeito</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamentos necessários no tratamento da cardiopatia, devendo ser incorporado à lista de medicamentos gratuitos destinados aos usuários em tratamento permanente permanente, nesse tipo de medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Procoralan, entresto, CarvenidilolEspironolactona, Outros, Positivo: Atenuou o problema sintomático característico do problema cardíaco., Negativo: Não significavo, porém todas as drogas provocam efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CaptoprilEtc..., Positivo: Amenização dos sintomas cardíacos., Negativo: Sobre carga nos rins. Retenção de sais</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na fração de ejeção , Negativo: Tontura ao se levantar 3ª - Sim, como paciente, Qual: Indapamida, Positivo: Não teve melhora , Negativo: Não teve melhora
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Nunca mais teve picos cardíacos, qualidade de vida melhorou muito , Negativo: Nenhum 3ª - Não
05/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho muito válido a ideia de que o remédio Entresto seja fornecido pela rede pública pois a compra pelo paciente é muito onerosa.5 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto. Carvedilol e Furosemida., Positivo: Sem comentários, Negativo: Não existe efeitos negativos. 3ª - Não
05/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora cardíaca , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora cardíaca , Negativo: Nenhum
05/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento excelente. 2ª - Sim, como paciente, Qual: 97/103, Positivo: Atende às necessidades (insuf cardíaca), Negativo: O preço 3ª - Sim, como paciente, Qual: Sao varios..., Positivo: Nenhum, Negativo: Nao atenderam as necessidades
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remédio de alto custo que é de uso principalmente de idosos, portanto deveria sim ser fornecido gratuitamente às pessoas com insuficiência cardíaca. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Controle do batimento cardíaco e da pressão arterial. , Negativo: Desconheço 3ª - Não
05/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apoio a integração deste fármaco ao SUS pelo fato de ser essencial para a sobrevivência e a manutenção clínica da saúde do paciente, e dentro dos 3 os princípios doutrinários que conferem legitimidade ao SUS: a universalidade, a integralidade e a equidade. Já que a universalidade está ligada à garantia do direito à saúde por todos os brasileiros, sem acepção ou discriminação, de acesso aos serviços de saúde oferecidos pelo SUS. A integralidade. conceito parte da ideia de que existem várias dimensões que são integradas envolvendo a saúde dos indivíduos e das coletividades. Assim, o SUS deve procurar a ter ações contínuas no sentido da promoção, da proteção, da cura e da reabilitação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na qualidade de vida, diminuição na frequência cardíaca, manutenção da pressão arterial, Negativo: Preço da medicação</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Carvedilol, Digoxina, Espirrolactona, Furosemida, Ass, Losartana Potássio., Positivo: Todos possuem ações que ajudam a manter a sobrevivência, manutenção e melhora da sintomatologia e do quadro clínico., Negativo: Medicação de uso contínuo, onde se tem um gasto mensal para se obter melhora e estabilidade no quadro.</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Tiro o cansaço respiração qualidade de vida melhorou, Negativo: Não achei</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sacubitril/valsartana possui grau de recomendação I para tratamento de IC de acordo com as diretrizes europeia, americana, brasileira</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora dos sintomas, melhora da classe funcional, melhora da dispneia , Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, carvedilol, espironolactona, furosemida , Positivo: Melhora dos sintomas , Negativo: Hipotensão</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Controle significativo P.A, Negativo: Nenhum até o momento</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio deve ser distribuído pelo SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Diminuição do cansaço, Negativo: Tosse</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe está bem melhor após 10 meses em tratamento com Entresto, mas é muito caro o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto., Positivo: Minha mãe tem estreitamento da valva e com Entresto houve uma melhora significativa, comprovada nos exames., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não sei exatamente o nome dos medicamentos, mas minha mãe já trarava o estreitamento da valva há anos e só piorava., Positivo: Não havia., Negativo: Pouca melhora.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: 100% eficiente , Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana , Positivo: Pouca melhora , Negativo: Não controlou totalmente</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do medicamento e os resultados foram excelentes, contudo o elevado preço do mesmo, o torna inacessível a grande parte da população e onera demasiadamente àqueles que pretendem continuar usando-o para poderem ter uma saúde melhor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Controle de meus batimentos cardíacos diminuição do cansaço., Negativo: Nenhum até o presente momento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não me lembro., Positivo: Não sei, Negativo: Não sei</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: Melhora na disposição, cansaço, sem efeito colateral, Negativo: Não observado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: sustrate, carvedilol, Positivo: Redução do batimento cardíaco, Negativo: Inchaço nos pés</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97 mg/ 103 mg, Positivo: Melhorou muito a falta de ar e o desempenho para caminhar, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, sinvastatina, Positivo: Fez efeito ate um certo tempo, depois nao mais, Negativo: Parou de fazer efeito</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto., Positivo: Em menos de uma semana de uso ele me tirou de uma crise de insuficiência cardíaca. , Negativo: Não tive efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concor e furosemida. , Positivo: Auxilia no efeito de eliminar a retenção de líquidos. , Negativo: As vezes ao levantar dava uma certa vertigem</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, NÃO CONCORDAMOS POR ESSA DECISÃO POR VARIOS MOTIVOS:A primeira porque meus pacientes apresentam melhor qualidade de vida com ENTRESTO, resultado superior aos obtidos com iecas Segundo, porque segundo os estudos, os pacientes morrem menos com Entresto que pacientes que utilizam IECAS- ESTUDO PARADIGM HF Terceiro, porque os pacientes os pacientes que utilizam Entrsto se hospitalizam menos que os pacientes usuários de IECAS- ESTUDO PIONEER- resultado divulgado recentemente no congresso americano.. Este resultado por si só mostra que para o governo sai mais barato utilizar ENTRESTO verso IECAS, pois Entresto reduz em 49% as hospitalizações, IECAS somente 26%.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECAS, BRÁS, DIURÉTICOS, BETA BLOQUEADORES, VASODILATADORES, NITRATOS, ENTRESTO., Positivo: Redução de mortalidade e hospitalização proporcionado por Entresto é superior aos IECAS., Negativo: Pacientes com IECAS se hospitalizam e morrem com mais frequência frente aos pacientes que utilizam Entresto- ESTUDOS E PRÁTICA CLÍNICA.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, esta medicação melhora significativamente a sintomatologia e qualidade de vida destes pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: entresto, Positivo: melhora do sintomas da icc, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: beta bloqueadores, inibidores da enzima de conversão da angiotensina, espirolactona, diuréticos, Positivo: também são medicamentos para tto da icc, Negativo: ...</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes com miocardiopatia dilatada não isquêmica e isquêmica em que eu tenho acompanhado, tem melhorado muito a qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/ Valsartana, Positivo: Melhora acentuada da dispneia e da classe funcional pela NYHA., Negativo: Raros episódio de alergia (angioedema).</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Valsartana e enalapril, Positivo: Pouca melhora na classe funcional pela NYHA, Negativo: Tosse e angioedema</p>
04/12/2018	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O Entresto veio para mudar a vida do paciente.Quando retornam ao consultório, relatam que na primeira semana já se sentem melhor.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto., Positivo: Melhora rápida dos sintomas., Negativo: Número quebrado das apresentacoes.</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já há fortes evidências do benefício para os pacientes com melhora de classe funcional (sintomas) e redução de morbi-mortalidade. Infelizmente não é tradição do poder público e instituições brasileiras fazer avaliações tipo custo x efetividades, neste caso, a impressão que temos é que um eventual maior custo com compra de medicamentos seria mais que compensado com menor custo de internamentos e tratamentos de complicações da IC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos pra IC disponíveis no mercado., Positivo: Controle clínico, melhora de sintomas e de classe funcional, redução de morbi-mortalidade, redução de internações e intervalos entre internações, Negativo: Para o SUS o maior impacto negativo acaba sendo sempre o CUSTO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores de ECA, beta bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, diuréticos, vasodilatadores, digitálicos, Positivo: Drogas com eficácia comprovada em grandes trials e dispensa pelo sus ou custo acessível , Negativo: Falência em tratar casos refratários de IC</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MEDIANTE BENEFÍCIOS OBSERVADOS NA PRÁTICA CLÍNICA E MUDANÇA DA CURVA DE PROGNOSTICO SOU FAVORÁVEL À UTILIZAÇÃO PELOS BENEFÍCIOS CITADOS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO EM TODAS AS APRESENTAÇÕES , Positivo: ENTRESTO REDUÇÃO DE MORTALIDADE E HOSPITALIZAÇÃO ALÉM DE MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE, Negativo: INACESSIBILIDADE DO ENTRESTO PARA POPULAÇÃO MAIS CARENTE</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA/BRAS, BETABLOQUEADOR, INIBIDOR MINERALOCORTICOIDE, IVABRADINA, Positivo: MELHORA DE SINTOMAS, DESFECHOS SECUNDÁRIOS, Negativo: EFEITOS ADVERSOS COMO TOSSE, GINECOMASTIA, NÃO REDUÇÃO DE PROGNÓSTICO</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Esse medicamento está trazendo maior qualidade de vida para meu esposo e outros pacientes que conheço e que estão fazendo uso dessa medicação. o valor do mesmo não é acessível a todos. Então acredito que todos os pacientes que tem problema de insuficiência cardíaca como o meu esposo deveria ter acesso ou de forma gratuita ou com um valor menor, como é o caso de muitos outros que constam na lista de programa da saúde.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto de 24 a 26mg, Positivo: melhora considerável na saúde do meu esposo e do amigo de família. , Negativo: Não se encontra em todas as farmácias esse medicamento e o valor está alto.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Foram tantos que o meu esposo já usou por recomendação médica... , Positivo: Garante a melhoria do paciente mesmo que de forma lenta. , Negativo: melhora a saúde mas não tanto quanto o paciente precisa para ter uma vida com mais qualidade</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento seguro</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Eficácia e segurança , Negativo: Não poder ser utilizado em renais crônicos. Valor elevado do medicamento .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Segurança, Negativo: Custo e não poder utilizar em renal crônico</p>
04/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO 49/51 mg, Positivo: Na manutenção da pressão arterial, ela tem se mantido controlada (120 x 80), não tenho apresentado inchaço nas pernas devido a retenção de líquido, nos exercícios de caminhada, de aproximadamente 1h a 1h e 20 m não sinto nenhum desconforto como falta de ar., Negativo: Não tive até o momento nenhum efeito negativo com o tratamento.</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: uma melhora no quadro clínico, Negativo: n ocorreu efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: vasopril, Positivo: instável , Negativo: piora do quadro clínico</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É A MELHOR OPÇÃO EM TRATAMENTO DE I.C.F.E.R., COM AMPLA SUPERIORIDADE NA MELHORA CLINICA DOS PACIENTES, CONFIRMADO POR ESTUDOS CONFIÁVEIS E EXPERIENCIA DE VIDA REAL</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: I.E.C.A / BRA / ANTAG. MINERALOCORTICOIDE/ BETA BLOQUEADORES/ DIGITAL/ DIURETICOS, Positivo: COMPENSAÇÃO DO QUADRO / REDUÇÃO DE EDEMA/ MELHORA DE DISPNEIAMELHORA NA C.F., Negativo: RARAMENTE BRADICARDIA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IDEM AO ANTERIOR, Positivo: IDEM DESCRITOS ACIMA, Negativo: IDEM DESCRITOS ACIMA</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: Avaliar se piora da função renal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ieca, bra, beta bloqueador , diurético d, Positivo: Melhor controle da frequência cardíaca e mortalidade com beta bloqueador . Melhora da congestão com diuretico, Negativo: Hipotensão , desidratacao</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicacao reduziu 20% morte cardiovascular 20% morte súbita, hospitalização reduziu em 40%</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto sacubitril / valsartana, Positivo: Redução de morte cardiovascular melhora dos sintomas e melhora da qualidade de vida, Negativo: Falta de inclusão no SuS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora dos sintomas e qualidade de vida e redução de morte cardiovascular e súbita , Negativo: Falta de acesso ao produto</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tive experiência favorável com a associação em questão, observando diminuição do tempo de internação necessário para o paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto (sacubitril / valsartana)., Positivo: O maior benefício na minha opinião foi a diminuição do tempo que havia previsto para a hospitalização. Também observei o paciente mais compensado no tratamento ambulatorial. , Negativo: Um dos pacientes teve hipotensão, que foi corrigida após o ajuste na dose dos diuréticos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Furosemida, IECA ou BRA, espironolactona., Positivo: O tratamento padrão é eficaz principalmente no início do tratamento da descompensação., Negativo: O tratamento padrão é eficaz no início do tratamento da descompensação, mas manutenção com maior número de drogas é mais complicada.</p>
04/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente e usuário do ENTRESTO ; aposentado e mau pago, acho que esse medicamento DEVE SER FORNECIDO PELO SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO ., Positivo: Minha insuficiência cardíaca melhora e eu passei a ter uma qualidade de vida melhor.Consigo fazer caminhadas...., Negativo: Não notei ,até agora,nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: monocordil, apresolina.Eletrocardio versãoAblação.ancoron, Positivo: A melhora existe, porém a arritmia volta depois de um certo tempo., Negativo: os efeitos negativos não sei descrever ..porém noto que a substituição de monocordil e apresolina pelo ENTRESTO trouxe efeitos positivos.</p>
04/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o remédio e caro e todo brasileiro pelo constituição tem direito a melhor saúde os remédios similares muitos estão ultrapassados efeitos a desejar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com ICC com fração de ejeção reduzida melhoram muito seus sintomas utilizando sacubitril/ valsartana</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril / valsartana, Positivo: Melhoras dos sintomas Melhora da fração de ejeção , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bisoprolol, espironolactona, furosemida, sacubitril / valsartana , Positivo: Melhora dos sintomas Melhora da fração de ejeção , Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os consensos: europeu, norte-americano e brasileiro, demonstram a eficácia das medicações, melhora da qualidade de vida, redução do tempo de internamento, redução de custos e melhora em geral do paciente. O estudo PIONEER reforça essas evidências</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO, Positivo: Melhora da fração de ejeção, redução da classe funcional da ICC, redução de internamentos, Negativo: Pode causar edema de membros inferiores e o custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: inibidores da ECA, diuréticos, nitrato, digital, betabloqueadores, Positivo: Todos melhoraram a classe funcional, mas nunca detectei uma melhora tão rápida da fração de ejeção como aconteceu com o uso do entresto, Negativo: Hipotensão postural, hiponatremia dilucional, Distúrbios metabólicos em geral e intoxicação digital</p>
04/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: MELHORIA SIGNIFICATIVA NOS EFEITOS DA DOENÇA;, Negativo: NÃO ENCONTRADO.</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os resultados dos estudos comparando Entresto verso IECAS são inquestionáveis. Resultados são muito grandes tanto na redução de hospitalização quanto mortalidade. IECAS foram comparados a placebo, Entresto foi comparado a droga ativa. Reveja os resultados do estudo PARADIGM.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECAS, Brás, diuréticos, beta bloqueadores, Entresto., Positivo: Resultados superiores de Entresto na redução de mortalidade e hospitalização frente aos resultados de IECAS, Negativo: Resultados inferiores na redução de hospitalização e mortalidade.</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Conitec, embora reconhecendo os benefícios da droga, contra indica seu uso na rede pública pelo alto custo. Não avalia porém o custo das reinternações dos pacientes que poderá superar os custos da manutenção dos medicamentos.)</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Houve uma melhora expressiva da capacidade funcional dos pacientes., Negativo: Até o momento não observei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos usados na IC, conforme as orientações das diretrizes da SBC., Positivo: Os efeitos positivos são conhecidos e reconhecidos pelo conjunto de medicamentos usados no protocolo da IC, porém todos eles em conjunto são superado pela substituição do Ieca ou BRA pelo Entresto., Negativo: Os efeitos negativos das drogas usadas na IC são dependentes da sensibilidade ou do grau de comprometimento do coração e são bastante notificadas pelos médicos que tratam este tipo de patologia. O entresto vai somente fazer parte deste arsenal substituindo um deles.</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da qualidade de vida. Inclusive com melhora da fração de ejeção aobecardiograma., Negativo: Não observei. Aliás, custo elevado da medicação impedia a melhor adesão do paciente.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECa, BRA, diuréticos, betabloqueadores, digital, ivabradina, vastarel..., Positivo: Todos tem sua indicação na ICC, Negativo: Efeitos colaterais conhecidos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um produto excelente, mas muito caro. Fora das condições reais dos brasileiros e que são assalariadas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ENTRESTO, Positivo: AJUDOU A REGULARIZAR OS PROBLEMAS QUE ESTAVAM ACONTECENDO, COMO O CORAÇÃO INCHADO POR EXEMPLO., Negativo: O CUSTO, MUITO ALTO.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: FORAM MUITOS PRODUTOS, NÃO SEI ESPECIFICAR TODOS., Positivo: FIZERAM EFEITO ATÉ UM DETERMINADO PERÍODO, DEPOIS FOI NECESSÁRIO TROCAR PELO ENTRESTO., Negativo: FIZERAM EFEITO ATÉ UM DETERMINADO PERÍODO, DEPOIS FOI NECESSÁRIO TROCAR PELO ENTRESTO.</p>
04/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com o medicamento em epígrafe, depois de seu uso minha qualidade de vida melhorou 100%.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhor qualidade de vida, mais animo, menos cansaço e com melhor respiração, peito menos pezado., Negativo: Não senti nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cardivilou, Positivo: melhor qualidade de vida, Negativo: nenhum</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso do referido medicamento proporciona melhora clinica bastante rapida alem de diminuir as internações hospitalares de modo significativo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SACUBITRIL/VALSARTANA, Positivo: A melhora clinica é espantosa. O paciente passa a suportar melhor os esforços, com grande melhora na qualidade de vida. , Negativo: Até agora nao tive nenhum efeito negativo nos pacientes que estao usando esta droga.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DIURETICOS, IECA, DIGITALICOS., Positivo: MUITOS PACIENTES MELHORAM OUTROS NAO. , Negativo: COMO A EXPERIENCIA COM ESTES MEDICAMENTOS É MAIOR, VISTO QUE O SACUBITRIL/VALSARTANA É UM MEDICAMENTO RECENTE, A EXPERIENCIA COM ESTES MEDICAMENTOS É MAIOR E CONSEQUENTEMENTE MAIS EFEITOS COLATERAIS COMO HIPONATREMIA, HIPOTASSEMIA, INTOXICAÇÃO DIGITALICA.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remédio muito caro pra quem tem outros remédios pra tomar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: O meu coração voltou a bater normal, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Positivo: Melhora do coração, Negativo: Não tive</p>
04/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Tive uma melhora expressiva, tem melhorado aos poucos., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelos resultados obtidos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Melhora da qualidade de vida e hospitalização hipot, Negativo: Hipotensão hiperpotassemia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Caverdiol. Bra, Positivo: Melhora da qualidade de vida , Negativo: Disfunção renal, tosse</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: entresto, Positivo: melhora sintomática e da classe funcional, Negativo: hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bra ieca. espirolactona. vaso dilatadores diureticos, Positivo: melhora dos sintomas, Negativo: tosse hiponatremia arritmia</p>
04/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a pessoa tem que tomar para sua sobrevivência todo o tempo, além disso não é uma medicação com preço acessível para nossa condição salarial</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma medicação de suma importância para o tratamento da Insuficiência Cardíaca</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartana, Positivo: Melhora da classe funcional do paciente , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta bloqueador, IECA, BRA, Positivo: Melhora da função cardiológica, menos cansaço e mais disposição para exercícios, Negativo: Podem causar hipotensão</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho pacientes que usam e tiveram boa evolução estando no momento muito bem</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da icc com melhora da fração de ejeção, Negativo: Em alguns teve diminuição da pressão o que foi resolvido com diminuição de diurético</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Digoxina , furosemida, beta bloqueador espirolactona, Positivo: Melhora do quadro clínico, Negativo: Intoxicação digitalizar perda de potássio</p>
04/12/2018	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Entresto, está incluído é recomendado nas diretrizes Americanas, Europeia e Brasileira. Reduz significativamente a mortalidade cardiovascular, hospitalizações e reinternações por Insuficiência Cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto e Ieca , Positivo: Entresto : Melhora significativa dos sintomas, melhora na qualidade de vida e redução de hospitalização., Negativo: Ieca: Frequente internações e tosse como efeito adverso.</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Desde o lançamento do produto, venho receitando sacubutril-valsartana aos pacientes mais graves de ICFEr do ambulatório público onde atuo. Já acompanho mais de 40 pacientes em uso, e é muito evidente a melhora de classe funcional de quase todos. Muitas internações hospitalares estão sendo evitadas, gerando enorme economia para o SUS, Positivo: Os pacientes com ICFEr em CF III e IV vivenciam evidente melhora de classe funcional e recorrem menos às emergências e hospitais, Negativo: Poucos são os pacientes intolerantes à droga, sendo a causa mais comum de intolerância a hipotensão arterial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: betabloqueadores, IECAs, espirolactona, ivabradina, marca-passo ressinchronizador e Mitraclip, Positivo: O esquema betabloqueador + IECA + espirolactona beneficia a maioria dos pacientes. Ivabradina, ressinchronizador e Mitraclip têm indicações limitadas a casos específicos. Mas é importante ressaltar que os efeitos de todos têm limites. , Negativo: Efeitos negativos dos medicamentos são raros e irrelevantes. Os procedimentos cirúrgicos apresentam riscos inerentes, além de, algumas vezes, não trazerem os resultados esperados</p>
04/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordamos por Entresto apresentar maior eficácia verso IECAS- vê Estudo PARADIGM e as recomendações das diretrizes mundiais. Os benéficos de Entresto são indiscutíveis. Economia para o governo- ENTRESTO proporciona 49% de redução de hospitalizações, portanto, o paciente passa menos tempo nos leitos dos hospitais verso IECAS- Estudo PIONNER divulgado no último congresso americano.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Brás, IECAS, beta bloqueadores, diuréticos, Entresto., Positivo: O maior efeito positivo de Entresto, e apresentar maior eficácia na redução morte e hospitalização frente aos resultados apresentados por IECAS., Negativo: Pacientes com IECAS irão passar mais tempo nos leitos de hospitais frente aos pacientes que tomam Entresto.</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação de fácil posologia e grande benefício para os cardiopatas com Insuficiência Cardíaca e fração de ejeção reduzida conforme minha experiência clínica e os resultados do estudo "Paradime", reduzindo morte súbita e internação e reinternação por descompensação cardíaca. Se aprovada essa medicação, o SUS vai economizar muito com os gastos de internação e reinternação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o medicamento Sacubitril/Valsartana, nome comercial "Entresto", Positivo: Os pacientes melhoraram a capacidade física, passando a ter mais qualidade de vida, e no acompanhamento pelo Ecocardiograma nítida melhora da fração de ejeção, Negativo: Na minha experiência alguns pacientes apresentaram pressão baixa que melhoraram com a titulação da dose do remédio</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com Enalapril e Valsartana, Positivo: Melhora reduzida quando comparado ao Sacubitril/ Valsartana, Negativo: Tosse, hiperpotassemia, hipotensão, aumento da creatinina</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Baseados em estudos publicados existem pacientes com indicação e benefício para o uso da medição em questao, Positivo: Melhora da classe funcional, Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lasix, digoxina, enalapril, aldactone, Positivo: Melhora do quadro clinico, Negativo: A depender da classificação funcional do paciente as medicações acima citadas não conseguem compensar o paciente clinicamente.</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Resposta positiva ao uso da medicacao</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da fração de ejeção e da sintomatologia, Negativo: Hipotensão esporadica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, metoprolol, furosemida, Positivo: Melhora da sintomatologia, Negativo: Em casos mais graves não houve resposta esperada</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É primordial o governo incluir esse remédio no programa social, por se tratar de um remédio bastante eficaz e importante para quem tem problemas de coração. Além do mais o preço do remédio é caro R\$ 200.00</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51, Positivo: 100% nao tenho mais problemas de cansaço , inchaços nos pés etc. Faço meus exercícios diariamente,bike. , Negativo: não tenho essa experiencia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: nao tive, Positivo: nao tive, Negativo: nao tive</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque diminui mortalidade versus tratamento existente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril Valsartana, Positivo: Reduz mortalidade e melhora qualidade de vida., Negativo: Não encontrados.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, Carvedilol., Positivo: Enalapril - diminui mortalidade, porém menos, o mesmo com a qualidade de vida. Carvedilol - também diminui mortalidade, porém menos., Negativo: Enalapril dá tosse e Caverdilol dá espasmo bronquico</p>
04/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Meu pai foi acometido de um enfarto tem o mesmo que usar o medicamento devido falta de ar, o mesmo esta resolvendo o problema., Negativo: sem comentario</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou cardiologista tenho ido boa experiencia com sacubitril/valsartana nos pacientes com IC e que tenho observado como descrito na literatura reducao significativa de internacao ,melhora da classe funcional do paciente ao de ser reavaliado para procedimento de transplante cardíaco e ressincronizacao miocardica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: digital IECA BRA B.Bloqueadores Ivabradina nitrato hidralazina espirolactona diureticos ressincronizador miocardico transplanta cardiaco, Positivo: num cotexto geral melhora dos sintomas e melhora da sobrevida porem inferiores a sacubitril /valsartana, Negativo: intolerancia a doses alvos de inerente a cada droga ou classe terapeutica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: digital IECA BRA B.Bloqueadores Ivabradina nitrato hidralazina espirolactona diureticos ressincronizador miocardico transplanta cardiaco, Positivo: num cotexto geral melhora dos sintomas e melhora da sobrevida porem inferiores a sacubitril /valsartana, Negativo: intolerancia a doses alvos de inerente a cada droga ou classe terapeutica</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo com a decisão, pois na minha prática clínica, Entresto apresenta melhores benéficos frente aos IECAS como: Menos Hospitalização, menor risco de morte subta. Verificar as diretrizes mundiais da IC, Estudo PARADIGM, e PIONEER. PIONNER, último estudo divulgado, confirmou redução de 49% nas hospitalizações, menos custos para o governo. Pacientes tendo menos tempo em leitos de hospitais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECAS, diuréticos, beta bloqueadores, nitratos, Entresto., Positivo: Resultados de redução de morte e hospitalização proporcionados por ENTRESTO são indiscutíveis frente aos resultados dos IECAS. Verificar estudo PIONNER na redução de hospitalização., Negativo: Menos eficaz frente ao resultados de Entresto na redução de hospitalização.</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Os trabalhos de fase 4 mostram amplo benefício na redução da mortalidade e sintomas, embora ainda não tenha dúvida estudo de vida real</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora do grau funcional com melhora dos sintomas, Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, BRA, Vasodilatador, Diurético, betabloqueadores, Positivo: Os mesmos do sacubitril/ valsartana, Negativo: Hipotensão, disfunção renal, bradicardia, distúrbio hidroeletrolítico</p>
04/12/2018	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entresto é uma medicação de extrema importância para o sucesso do tratamento da IC.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EntrestoBRAIECA, Positivo: Entresto- Paciente tem uma melhora significativa dos sintomas, como por exemplo, consegue subir uma escada, dormir melhor sem falta de ar. Diminui também as idas e internações que são frequentes quando não toma o Entresto.BRA e Ieca - Acesso ao tratamento., Negativo: Entresto- Não estar na rede pública, uma vez que a maioria dos pacientes com IC não tem condições financeiras. Ieca - Tosse, o paciente não tolera este efeito colateral.</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Resultados fase 4 e clínicos mostram benefício em melhora da classe funcional e qualidade de vida Ainda sem trabalhos de vida real</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartana, Positivo: Melhora de classe funcional e sintoma, Negativo: Disfunção renal hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, Bra, Beta bloqueadorDiuréticoVasodilatador, Positivo: Melhora de sintomas e classe funcional, Negativo: Hipotensão, distúrbio eletrolítico, arritmia</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é comprovadamente eficaz no tratamento da icc sintomática</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entrestom, Positivo: Melhora clínica evidente , Negativo: Raras quedas de pressão arterial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros normalmente utilizados no tratamento da icc, Positivo: Melhora discreta, Negativo: Não tem a mesma eficácia</p>
04/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ENTRESTO, Positivo: MELHORIA NA VIDA DO PACIENTE., Negativo: N/A</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sacobitril valsartana é o que há dr mais novo para terapêutica com impacto para hospitalização na morte súbita e hospitalização baseado nas últimas directrizes internacionais e brasileira.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacobitril valsartana, Positivo: Redução de mortalidade e hospitalização , Negativo: Hipotensão caso o médico não saiba manejar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacobitril valsartana , Positivo: Redução de mortalidade e hospitalização , Negativo: Hipotensão</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MINHA PRATICA CLINICA COM ENTRESTO, FALA MUITO MAIS FORTE. MEUS PACIENTES TÊM MELHOR QUALIDADE DE VIDA FRENTE AOS RESULTADOS APRESENTADOS POR IECAS. PACIENTES ESTÃO MAIS FELIZES PORQUE PERMANECEM MAIS TEMPO COM SEUS FAMILIARES, MAIS TEMPO EM CASA, MENOS TEMPO EM HOSPITAIS.O GOVERNO TEM QUE LEVAR ESSA CONSIDERAÇÃO, PACIENTES PERMANECEM MENOS TEMPO EM LEITOS DE HOSPITAIS.SUGIRO QUE OBSERVEM RESUKTADOS DOMESTUDO PIONNER. 49% DE REDUÇÃO DE HOSPITALIZAÇÕES.ESTUDO PARADIGM MOSTRA MAIOR REDCUAO DE MORTE E HOSPITALIZAÇÃO.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diuréticos, beta bloqueadores, diuréticos, ENTRESTO, nitratos, vasodilatadora., Positivo: A evolução do tratamento da IC com ENTESTO foi fantástica. Entrsto proporciona maior resultado de redução de morte e hospitalização em relação aos resultados apresentados por IECAS., Negativo: IECAS além de apresentar resultados inferiores na redução de morte e hospitalização verso Entresto, 20% dos pacientes abandonam o tratamento por efeitos de tosse seca e angioedema</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai apresentou um resultado muito bom depois de fazer uso deste medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo por um motivo bastante positivo de ENTRESTO. Estudo PARADIGM é um Estdo cujo os resultados são indiscutíveis. Superior tanto na redução de mortalidade quanto de hospitalização.Estudo PIONNER mostrou que os pacientes se internam menos que os pacientes que utilizam iecas. Reduz em 49% as internações, isso reflete economia para o governo, pois os pacientes com IC ficam mais temp fora dos leitos de hospitais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRSTO, IECAS, beta bloqueadores, Brás, diuréticos, vasodilatadora, Nitratos., Positivo: OS EFEITOS DE REDUÇÃO DE MORTE E HOSPITALIZAÇÃO PROPORCIONADO POR ENTRESTO VERSO IECAS SÃO INDISCUTÍVEIS.A PRATICA CLINCA DE MEU DIA A DIA MOSTRA ESSE EFEITO SUPERIOR DE ENTRESTO., Negativo: IECAS além de ser inferior ao Entresto na redução de hospitalização e mortalidade, apresentam efeito negativos de tosse seca e angioedema.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Valor alto</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora clinica, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: O medicamento teve ótima eficácia na insuficiência cardíaca da minha mãe , Negativo: Deu um pouco de hipotensão quando usado com diurético</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ENTRESTO , Positivo: Diminuição do inchaço das pernas, acabou a falta de ar, Negativo: Nenhum 3ª - Não
05/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Concor , Positivo: ., Negativo: .
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O produto é excelente e devido a falta de acesso para a classe que consulta no SUS ele deveria estar no sistema unico 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Meu pai faz uso do produto há um ano, e aumentou a potência do coração, bem como a qualidade de vida. Era um paciente desenganado pelo cardiologista , Negativo: No começo do tratamento precisa ter um controle assíduo da pressão arterial 3ª - Não
05/12/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto entre outros medicamentos para insuficiência cardíaca, Positivo: Mais disposição , Negativo: Pressão arterial baixa 3ª - Sim, como paciente, Qual: Não recordo, Positivo: Menos cansado , Negativo: Taquicardia
05/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Abaixou a pressão. Nao forçando muito o coração , Negativo: Nao tem ate o momento 7 meses de uso 3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana anlodipino diapamida aradois causaram no passar do tempo tosse alergica muito forte, Positivo: Baixou a pressao. Com alguns picos de alta esporadicamente, Negativo: Muita tosse
05/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento caro, sou aposentado de orçamento super apertado.. 2ª - Não 3ª - Não
05/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Meu pai teve uma melhora geral, em todos os aspectos., Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Losartana, carvedilol, Positivo: Foram bons de modo geral, Negativo: Não surtiu o efeito esperado
05/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo de aquisição para os aposentados é alto 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Controle da pressão, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Diovan hct 160+12,5, Positivo: Controle da pressão , Negativo: Nenhum

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é muito caro</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: Me sentindo melhor q qdo era só a Valsartana, Negativo: Sonolência</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Valsartana, Positivo: Não sei especificar, usei por pouco tempo, Negativo: Não sei especificar, o médico sugeriu novo medicamento</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Tenho menos cansaço e mais disposição para atividades físicas., Negativo: Não tem. O único efeito negativo é na conta bancária</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concor, Positivo: Ajuda a manter meu coração sob controle, Negativo: Não percebi nenhum efeito negativo. Não sou médica.</p>
04/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: A melhora foi satisfatória , Negativo: o medicamento é muito caro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: não me recordo, porque sempre tomo medicamento sob prescrição médica, Positivo: Não sei classificar, Negativo: não tenho como especificar</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ja tomo esse medicamento a 1 ano apos o uso dee xonsehui conyrolar meu tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Varios , Positivo: Controle de hipert nsao e artmias, Negativo: O unico efwito negtivo e o preco por ser remedio de ultim geracao lara o tratamento cardiologico</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atenlol, emnalapril, Positivo: Nao fazia efeito esperado, Negativo: Onresultado nao era satisfatorio</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O benefício para o paciente usar e muito grande</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou importantemente os sintomas clínicos do paciente com ICC e melhorou a fração de ejeção do Coracao, Negativo: Causou hipotensão em alguns pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, losartana carvedilol, lasix aldactone, Positivo: Melhorounoscsintimas clinicos e a fração de ejeção do coracao, Negativo: Dimimuiacao sintomática da pressão arterial</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuário do medicamento e foi o único que conseguiu ajustar a deficiência da insuficiência cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bisoprolol, atenolol, valsartana, Positivo: Nao os obtive, não regularam a pressao arterial , Negativo: Cansaço físico</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ñ me recordo., Positivo: Ñ os obtive, Negativo: Ñ tive.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos tem que ter acesso ao medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na qualidade de vida , Negativo: Não tive efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caverdilol espirolactona, Positivo: Melhora na qualidade de vida , Negativo: Não teve</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou a qualidade de vida , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Qualidade de vida , Negativo: Preço</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento importante benéfico e muito caro</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: disposição, sem batadeiras, menos cansaço, menos dores, Negativo: não observei</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concardio, losartana, Positivo: bem estar, Negativo: não observei</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio possui uma eficácia imediata e de grande valia aos pacientes. Meu Pai teve uma recuperação excelente com ele. É necessário possibilitar o seu uso pelos mais carentes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Recuperação do funcionamento do coração do meu Pai em mais de 30% em seis meses de uso., Negativo: Não constatei efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Aumento de batimentos cardiacos, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos têm o direito ao tratamento, assim como eu... Pois ele e muito caro...porque não e só o entresto tem outros também !</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103Concor 10mg, Positivo: Mais disposição..Menos cansaço..., Negativo: Até o momento não tive efeito colateral</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou usuário continua do valsartanaConcor SivastatinaAssmetiformina entre outros, Positivo: Todos me ajudaram a ter uma vida mais saudável ...e com mais disposições, Negativo: Até o momento nenhum efeito colateral</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O meu pai faz uso do medicamento e a fração de ejeção do coração dele passou 32% para 41%, excelente melhora para a redução de risco de morte súbita.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhoria na qualidade de vida e na fração de ejeção do coração., Negativo: Não apresentado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diversos, Positivo: Melhoria de vida, Negativo: Não apresentado.</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Estabilização da insuficiência cardíaca, Negativo: Não percebíveis Ainda</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso e me faz muito bem</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entreato, Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: No início uma redução da pressão arterial em demasia</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é de alto custo, eu sou usuária do mesmo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Eficiente, ação rápida de melhora., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Minha pressão atingiu o valor ideal., Negativo: Esse medicamento é muito caro</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação vai diminuir afastamento do trabalho, internações, Ressincronização e Transplantes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sarcubitril/Valsartana, Positivo: Melhora da CF, Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento padrão, Positivo: Usada há anos, os resultados são sempre os menos, Negativo: Muitos efeitos colaterais como tosse e hipotensão. Estagnamento do quadro.</p>
04/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento salvou minha vida, ajudaria muito se pudesse recebê-lo através do Governo, seria uma grande ajuda</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Minha rotina melhorou, muito, a arritmia me parece controlada., Negativo: Não apresentou nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhora da fração de ejeção e sintomas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Melhora qualidade de vida, melhora disfunção ventricular , , Negativo: Pode apresentar hipotensão , hipercalemia e piora função renal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Acima descritos, Negativo: Acima descritos</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há importante melhora da classe funcional nos pacientes que iniciaram o sacubitril/valsartana, melhora do BNP e melhora da função ventricular. Tenho inclusive paciente inclusive que estava em programação de troca de valva mitral por insuficiência importante e disfunção ventricular grave e em classe funcional IV, que posteriormente passou pra classe I, normalizou bnp e ficou apenas com insf mitral discreta.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da classe funcional na ICC, melhora do nt-pro-bnp, melhora da função ventricular(remodelamento reverso) , redução das internações., Negativo: Não encontrei nenhum efeito negativo em seu uso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitri/valsartan- vide item 8.2BRA, IECA, beta bloqueador de terceira geração, furosemida, aldactone , digoxina, nitrato, hidralazina, digoxina, ressincronizador cardiaco, cdi, transplante cardiaco- que são os pilares do tratamento de ICC, Positivo: -, Negativo: -</p>
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Medicamento auxiliar do tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca. , Negativo: Alto valor, não é acessível à classe média baixa.</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Paciente não andava a varios meses, apos ao uso medicamento voltou a poder fazer usas atividades normalmente, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Enalabril, Positivo: Poucos, Negativo: Paciente é internado varia vezes ao mes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como cardiologista, tenho ampla experiência com a droga, inclusive em ambulatório de SUS, e a melhora sintomática, com redução de internações e melhora na qualidade de vida é muito significativa.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril-Valsartana, Positivo: - melhora de sintomas e na qualidade de vida a curto prazo (cerca de 2- 3 semanas)- redução de necessidade de internações - redução de eventos cardiovasculares , Negativo: A hipotensão que às vezes acontece é completamente manejada com a revisão dos outros medicamentos em uso e orientação do paciente.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, carvedilol, espironolactona, digoxina, Positivo: redução de eventos, porém insuficiente para uma doença de elevada morbi-mortalidade, Negativo: hipercalemia, insuficiência renal</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diurético inibidores da IECa betabloqueadores vasodilatadores, Positivo: Melhora do quadro clínico, Negativo: Alergias. Hipotensão arterial</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Além de comprovação por estudos científicos, tenho pacientes que melhoraram a Classe funcional da ICC, com melhora na qualidade de vida e diminuição de internação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Melhora da dispneia e da tolerância para esforço bem como diminuição de reinternação , Negativo: Queda inicial da pressão arterial</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha experiência clínica mostrou resultados extremamente favoráveis</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Melhorando fração de ejeção e diminuição de sintomas e internações , Negativo: Não foram observados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Digoxina, aldactone, Positivo: Diminuição de internação Diminuição de edema , Negativo: Pode causar intoxicação Alto número de pacientes são acometidos por ginecomastia</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento inovador que trás uma opção aos pacientes principalmente aqueles refratários aos tratamentos disponíveis. Também há redução das internações com esta medicação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora clínica e laboratorial da icc, Negativo: Alguns casos de hipotensão.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diurético . Carvedilol ., Positivo: Melhora clínica da icc., Negativo: Hipocalemia em alguns casos raros.</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Foi muito bom para o meu problema de saúde. , Negativo: Infelizmente meu médico trocou meu medicamento, pois meu organismo não continuou reagindo bem</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação altamente efetiva</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto sacubitril/ valsartana , Positivo: Melhora significativa dos pacientes em relação ao tratamento padrão , Negativo: Tosse concor,</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Concor, nebilet, captopril, procoralan, isca, acc, Positivo: Melhora do quadro de ICC , Negativo: Limitado em casos graves, inferior ao sacubitril/valsartana</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As evidências são bem claras quanto aos benefícios do medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/ valsartan, Positivo: Melhora da classe funcional; melhora dos sintomas; melhora da qualidade de vida; diminuição de internamentos., Negativo: Tempo de espera para adaptação do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA; Digital; IECA; BRA; Betabloqueador., Positivo: Todos os citados melhoram discretamente os sintomas da ICC., Negativo: Alguns causam hipotensão e distúrbios hidroelwtrolíticos.</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartan, Positivo: Aumento da fração de ejeção, melhora da diápnéia, desaparecimento de áreas de acinesia no ecocardiograma ., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação com bons resultados para pacientes com IC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril/valsartana, Positivo: melhora dos sintomas redução de internações, Negativo: custo alto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: procoralam, Positivo: melhora dos sintomas, Negativo: custo</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque é uma excelente medicação para o controle de pacientes com Insuficiência Cardíaca Descompensada (CF II-IV NYHA).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartana, Positivo: Melhora considerável dos sinais clínicos da Insuficiência Cardíaca, Negativo: Poucos pacientes precisaram diminuir a dosagem da medicação, pois apresentaram aumento das escórias nitrogenadas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Espironolactona + Carvedilol + IECA + Furosemda, Positivo: Melhora dos sintomas clínicos, Negativo: Tosse - Broncoespasmo -Hipocalemia + Câimbras</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este remédio atualmente é fundamental no tratamento da ICC PELA MINHA EXPERIÊNCIA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sá unitário balsartana, Positivo: Melhoras muito relevantes na qualidade de vida e nos parâmetros funcionais do paciente, Negativo: Muito poucos em poucos paciente hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, Positivo: Melhora a qualidade de vida porém menos pronunciado do que o outro produto acima descrito, Negativo: Hipercalcemia e tosse</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a MEDICAÇÃO ESTÁ MUDANDO A HISTÓRIA NATURAL DOS PACIENTE COM ICC.MELHORA IMPORTANTE DOS SINTOMAS E REDUZ A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO POR DESCOMPENSAÇÃO</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SACUBUTRIL-VALSATAN, Positivo: MELHORA DO GRAU DE INSUFICIENCIA CARDÍACA COM MAIOR TOLERÂNCIA AOS ESFORÇOS E REDUZ SIGNIFICATIVAMENTE NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO POR DESCOMPENSAÇÃO, Negativo: NO INICIO QUEDA DE PRESSÃO MAS BEM TOLERADA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SACUBUTRIL-VALSARTAN EM TODAS DOSAGENS, Positivo: MELHORA DA ICC E REDUZ DRASTICAMENTE NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, Negativo: INICIO TRATAMENTO QUEDA DA PRESSÃO E NECESSIT MONITORAR NIVES DE POTASSIO</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O governo não deve deixar que os pacientes com ICeR sejam melhor tratados. Minha experiência com Entresto é muito superior frente aos iecas. Os pacientes de hospitalizam menos e morrem menos com uso de Entresto. Estudos mostram que se hospitalizam menos frente aos pacientes com uso de IECAS. Estudo PIONEER, PARADIGM. O governo economiza custo , pois os pacientes passam menos tempo HOSPITALIZADOS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECAS, Entresto, Brás, diuréticos, nitratos., Positivo: Entrsto é mais ficar na redução de hospitalizações e mortalidade frente os resultados de IECAS , Negativo: Os r3suktados na redução de hospitalização são menores que os resultados obtidos com ENTRETO. Estudos Paradgm, pioneer, e solved.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Beneficio comprado para uma doença muito grave, de alta mortalidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Hipotensão em alguns pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, espirolactona e betabloqueadores cardioseletivos, Positivo: Melhora clínica, Negativo: Tosse, ginecomastia e hipotensão</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SOU GERIATRA E TRATO PACIENTES IDOSOS COM ICeR, PIRTANTO, ESTES PACIENTES APRESENTAM RISCO DE FALÊNCIA RENAL E ALTERAÇÃO DE POTACIO, EFEITO ADVERSO QUE PODE LEVAR À MORTE. ESTUDO PARADIGM, MOSTROU SER MAIS SEGURO QUE O SIECAS NESTE PONTO. PACIENTES SE HOSPITALIZAM MENOS QUE PACIENTES COM USOMDEMIECAS. ECONOMIA PARA O GOVERNO.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AS ALTERAÇÕES DA FUNÇÃO RENAL FOI MENOR COM ENTRESTO VERSO IECAS., Positivo: AS ALTERAÇÕES DA FUNÇÃO RENAL COM ENTRSTO FOI MENOR QUE ALTERAÇÕES COM IECAS.- ESTUDO,PARADIGM-MAIS SEGURANÇA PARA OS PACIENTES. SE HOSPITALIZAM MENOS COM ENTRESTO FRENTE AOS IECAS. , Negativo: A FALÊNCIA RENAL E ALTERAÇÃO DE POTACIO COM IECAS SÃO MAIORES FRENTE AOSPACIENTES COM USO DE ENTRESTO. ESTUDO PARADIGM.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, É uma opção para trato ppte classe III/IV cujo retorno é comprovadamente positivo na relação custo benefício em saúde pública , pq além das complicações cardiológicas há todo contexto das comorbidades em termos de hospitalização desses pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril valsartana , Positivo: Melhora da classe funcional de ICC e retorno às atividades diárias com melhora da qualidade de vida , Negativo: Alguns casos de hipotensão sintomática</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos das diretrizes , Positivo: Melhora clínica , Negativo: Baixa efetividade e médio e longo prazo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação comprovou além da prática clínica e dos estudos apresentados uma melhora na qualidade de vida e também redução de morte e hospitalização. A medicação apesar do custo diferenciado reduziria os custos altos de hospitalização.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto em todas as apresentações, Positivo: Melhora da qualidade de vida, redução de sintomas, menor índice de hospitalização por parte dos pacientes e aumento da fração de ejeção , Negativo: Nenhum até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: lecas, furosemda, betabloqueador, Bras e espiralactona , Positivo: Melhora clínica e sintomas, Negativo: Não houve melhoras tão significativas como observei com Entresto</p>
05/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com poder aquisitivo baixo não tem condições de comprar essa medicação, principalmente o idoso que gasta quase todo o valor da aposentadoria em medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 24/26 mgEntresto 49/51 mg, Positivo: Mais disposição, menos cansaço , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diovan 80 mgFurosemda 40 mgAlouporinol 100mgRosuvastatina 10 mgAmiodarona 100mPantoprazol 20 mgDuloxetine 60mgDorene 75 mgCarvedilol 25 mgAAS 100 mgAldactone 25 mg, Positivo: Menos cansaço, pressão arterial controlada, menos dor , sono controlado, Negativo: Boca seca, vontade de urinar com muita frequência, cansaço</p>
05/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação tem um ótimo resultado para os pacientes que se encaixam no perfil para usarem a medicação, melhorando a sintomatologia e mortalidade do paciente portador de IC .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Melhora das classe funcional, melhora dos sintomas de dispneia, adinamia , edema, Negativo: Hipotensão no início do tratamento em alguns pacientes que já tinham pressão mais baixa</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todas as medicações cardiovasculares de uso para IC , Positivo: Melhora da sintomatologia porém de ação limitada , Negativo: Os efeitos colaterais de cada medicação usada na terapia de IC</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Alto custo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Risco , Negativo: Não conheço.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xarelto e carvedilol, Positivo: Redução arritmia e riscos de trombo., Negativo: Nihil</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação essencial e de alto custo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Melhora na capacidade cardíaca e qualidade de vida. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Valsartana , Positivo: Não notei., Negativo: Não sei.</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser gratuito o medicamento pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: MELHOROU BASTANTE MINHA INSUFICIENCIA CARDIACA, Negativo: NENHUM 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Clopidogrel, Positivo: Melhora na circulacao sanguines, Negativo: Nada
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril/valsartana 97mg/103 mg, por recomendação do meu cardiologista., Positivo: Mantém minha pressão sob controle, diminuiu bastante o cansaço. , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Tomava Losartana 50 mg,, Positivo: Não me adaptei., Negativo: Me dava tosse, inchaço e dor de cabeça
17/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril e propalolonol, Positivo: Redução do batimento ccardíacos pacientes hipertensos, Negativo: São competitivos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril propalolonol, Positivo: Redução dos batimentos ccardíacos em pacientes hipertendos, Negativo: São competitivos
17/12/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/12/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Há recomendações médicas. 2ª - Não 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio é ótimo, porém com o custo de R\$ 300,00 Por mês fica inviável o uso contínuo. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103, Positivo: Pressão estável e baixa dando melhor condição de vida, Negativo: Nenhum 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Muito bom. Auxiliou na recuperação cardíaca., Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Eliquis, Positivo: Melhora consi derável na função cardíaca., Negativo: Nenhum

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tal associação reduz risco de morte súbita, além de melhorar qualidade de vida reduzindo sintomas da insuficiência cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a associação mencionada., Positivo: Melhora de sintomas e qualidade de vida do paciente., Negativo: Alto custo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Espironactona + carvedilol + furosemida + enalapril, Positivo: Alguns pacientes atingem bons resultados com às medicação utilizadas até o momento., Negativo: Grande parte dos pacientes não tem melhora de sintomas nem redução de morte súbita e outros eventos cardiovasculares com as associações usadas e citadas acima.</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que o melhor medicamento para insuficiência cardíaca é o Entresto</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora substancial dos sintomas , Negativo: Nenhum</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe está tendo ótimos resultados com o uso dessa medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Bom , não sei descrever clinicamente / profissionalmente como esse remédio age, só posso afirmar q os médicos dizem q o estado da minha mãe está controlado. Porém, continua sendo grave. , Negativo: Não sei dizer.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, estou em uso para teste de adaptação. , Positivo: Melhorou minha qualidade de vida , estou me sentindo mas disposto , hoje consigo dormir , e me alimentar melhor , , Negativo: Por enquanto não tenho pontos negativos , há não ser o preço e um pouco de dificuldade para comprar a medicação, tanto financeira quanto encontrar nas farmácias</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ramipril; monocordil, procoralam,, Positivo: Não tive uma boa evolução quanto a melhora da insuficiência cardíaca, o desconforto respiratório não melhorava., Negativo: Hipotensão e bradicardia</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Gostaria que fosse fornecida pelo governo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26, Positivo: Melhoria sensível na qualidade respiratória durante caminhadas, Negativo: Valor de aquisição</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Controle de pressão , Negativo: Sensação de aperto no peito nas caminhadas</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ha inumeros pacientes sem confivoes financriras psra comprar o medicamento e ter um mimimo de dignidade com o trramento da doenca</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Valsartana, Positivo: Nao sri dizer, Negativo: Insuficiencia cardiaca</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, USO O RENEDIO CONTINUO E ESTA CARO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação muito cara. Baixa renda não tem acesso</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorias nas funções cardíacas., Negativo: Estômago.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concor, Positivo: Melhorias nas funções cardíacas., Negativo: Estômago</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por ser remédio de alto custo e por eu gastar muito com a compra de outros medicamentos, penso que Entresto deveria ser gratuito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, aldactone, digoxina, divelol, lasix, puran T4, finasterida, cloridrato de tansulosina, Lexotan, alopurinol, endofolin, maxidrate, ancoron, Positivo: Os medicamentos para o coração mantém minha insuficiência cardíaca estabilizada e com menos episódios de taquicardia; os remédios para a próstata mantém minha hiperplasia sob controle e o puran T4 regula meu hipotireoidismo., Negativo: Hipotensão.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Captopril , Positivo: Era um coadjuvante no tratamento da insuficiência cardíaca., Negativo: Não sei de efeito negativo que ele causasse. a</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma medição com um alto custo, no entanto, muito indicada para pacientes cardiopatas grave. E a grande maioria não tem condições de arcar com o valor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O Entresto, Positivo: Como família de paciente que faz uso, observo melhora no quadro de sintomas do portador de cardiopatia grave, Negativo: Apenas o valor muito alto que infelizmente não condiz com o salário que recebemos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A Losartana, espirolactona, carvedilol., Positivo: Ajudam na diminuição sintomas da cardiopatia grave, Negativo: Não são tão eficazes, segundo a cardiologista.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Ajuda na recuperação e manutenção após ter colocado stend , Negativo: Sem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro o nome, Positivo: Não lembro, Negativo: Não lembro</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Melhora na função cardíaca, mais disposição, menos cansaço, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo do remédio é muito alto</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Me senti muito melhor e praticamente sem crises, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril e losartana potassica, Positivo: Os efeitos positivos eram pouco vez ou outra tinha crises ao se deitar, Negativo: A melhora era quase imperceptível</p>
13/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana , Positivo: Melhora sintomática de Insuficiência cardíaca , Negativo: Preço / hipotensão eventual/ tosse por valsartana</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vasodilatadores(inibidores de ECA/ BRA) beta-bloqueadores(carvedilol), Positivo: Melhora sintomática. , Negativo: Tosse, hipotensão eventual.</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por ser um medicamento de uso contínuo e é caro deve ser incorporado no SUSTh</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Varios, Positivo: Não houve efeitos positivos, Negativo: Não houve melhora no quadro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim O que realmente funcionou foi o entresto, Positivo: Não houve melhora, Negativo: Não melhorou</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nem todos consegue pagar valor muito alto</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Somente esse, Positivo: Esse melhora significativa na minha qualidade de vida, Negativo: Abaixa muito minha pressao</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isto é um problema de Saúde Pública</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do medicamento. Melhorou muito a questão da insuficiência cardíaca. Medicamento muito caro. Principalmente porque sou aposentado por invalidez.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto. , Positivo: Melhora na condição cardíaca. Medicamento mais eficaz do que os que eu tomava., Negativo: O preço.</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não conheço. Este medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cardizem,diovam,somalgim , plavix,nexiumsinvastatina,galvus,citalopram,frontal., Positivo: Qualidade de vida., Negativo: Misturar com medicamento de dor dá sangramento abdominal</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não conheço. Este medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cardizem,diovam,somalgim , plavix,nexiumsinvastatina,galvus,citalopram,frontal., Positivo: Qualidade de vida., Negativo: Misturar com medicamento de dor dá sangramento abdominal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Na prática clínica tenho visto melhora dos paciente com uso da medicação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Médico paciente sacubitril no trata-me de da lcc Cc 3, Positivo: Sacubitril melhorou os sintomas melhorando a qualidade de vida do paciente mudando de classe funcional a icc, Negativo: No momento o custo que não deixa ser acessível</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pará uma doença grave como esta é altamente mortal, deveria ter sido aprovada a disponibilização pelo SauD</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EnalaprilDiurético Beta bloqueador, Positivo: Melhorou a capacidade de fazer as coisas, Negativo: Falta de arCansaço</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou os resultados e o bem estar do paciente., Negativo: Não se aplica.</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Ajuda no funcionamento do coração , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora clínica Melhora da capacidade funcional, Negativo: Não apresentados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Existem varias medicações utilizadas para o tratamento da insuficiência cardíacaImpossível de relatar todas aqui, Positivo: Impossível de relata-lós aqui, Negativo: Impossível de descrevê-los</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remédio com custo elevado para pacientes que recebem um salário mínimo, que precisam do medicamento. Acredito que o valor para a Nação ficará bem menor do que o custo de internações deste pacientes devido seus problemas cardiac</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entreato 49mg, Positivo: Minha mãe tinha muita falta de ar, o que acasionava diversas idas ao pronto socorro, naoconseguia fazerNenhum atividade que implicava mínimo esforço, estava ficando depressiva devido sua condição de saúde. Após o uso do medicamento aparenta melhora visível e tem mais de um ano que não precisamos correr para os prontos socorro com ela, Negativo: O valor</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concor, Vaslip, xarelto, euthyrox, lasix., Positivo: Ajuda a ter um melhor qualidade de vida., Negativo: Valor</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuario</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Controle na arritmia, Negativo: Nenhum efeito</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritmonorm, Positivo: Bom para o evento, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou muito a insuficiência cardíaca. , Negativo: Não teve efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ----, Positivo: ----, Negativo: ----</p>
13/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A associação Valsartana+ sacubitril tem resultados positivos no que se refere ao controle dos sintomas de ICC e, melhora da classe funcional (NYHA) dos pacientes portadores de Cardiopatia grave acompanhados no PROCAPE/UPE.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto nas dosagens de 24/26mg, 49/51mg e 97/103mg. Temos os registros nos prontuários eletrônicos no serviço em que trabalhamos.Os pacientes estão otimizados para IC., Positivo: Na abordagem multiprofissional observamos a melhora clínica com redução da hospitalização, redução da mortalidade e melhora de qualidade de vida., Negativo: Já casuística observada até agora e através da utilização dos critérios de inclusão protocolares temos obtido bons resultados, boa evolução do grupo acompanhado e monitorado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os padrões recomendados pelas diretrizes e otimizados através do acompanhamento clínico criterioso., Positivo: De forma geral, os medicamentos utilizados e recomendados para IC nos seus estágios evolutivos promovem um efeito conjunto como o controle da ICC, melhora da qualidade e qualidade de vida. Reduzem a mortalidade, MS, hospitalização. A ação da equipe técnica é de fundamental importância para os bons resultados., Negativo: Os efeitos colaterais descritos na literatura podem ocorrer e, devem ser monitorados através do acompanhamento multiprofissional, monitoração laboratorial e exames e procedimentos de maior complexidade, quando necessários. As diretrizes aplicadas à prática clínica.</p>
13/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Melhora significativa dos sintomas em pacientes refratários ao tratamento convencional</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim. Entresto, Positivo: Melhora sintomas e diminui internações recorrentes, Negativo: O preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ieca, Bra, inotropicos, Positivo: Melhora parcial dos sintomas depende do perfil do paciente e da Classe Funcional, Negativo: Alguns pacientes são refratários</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Graças a esta medicação a pressão estabilizou e a frequência cardíaca não tem sofrido piora no caso de chagão a tendência é o coração ficar cada vez mais fraco.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caverdilol ,procoralan, aldactone, furosemida, Positivo: No inicio bem estar temporario mas nos exames nenhuma melhora., Negativo: Coração continuou a enfraquecer</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, ACREDITO QUE ASSIM COMO OUTROS FORMAS DE TRATAMENTO JÁ EXISTENTES NO BRASIL QUE OBTIVERAM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS BEM FUNDAMENTADAS COMO ESTA DROGA, TEMOS QUE OFERECER O MELHOR TRATAMENTO PARA NOSSA POPULAÇÃO, ENTENDO A LIMITAÇÃO DE RECURSOS, ENTRETANTO ESTE ITEM PODE SER TRABALHADO QUANDO SE INCORPORA O TRATAMENTO A GRUPOS ESPECIAIS E REFERENCIADOS EM UNIDADES ESPECIALIZADAS. ESTA AÇÃO PODE INCLUSIVE AJUDAR NA OTIMIZAÇÃO DE OUTRAS MEDICAÇÕES E DISPOSITIVOS DE ALTO CUSTO QUE ATUALMENTE SÃO MUITAS USADOS SEM CRITÉRIOS DE OTIMIZAÇÃO DO TRATAMENTO CLÍNICO. NÃO DEVE SER DESCARTADA A OPORTUNIDADE DE PADRONIZAÇÃO DESTA MEDICAÇÃO COM INDICAÇÃO POR CENTROS REFERÊNCIAS CAPACITADOS NO TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SACUBITRIL/VALSARTANAMELHORA CLÍNICA EVIDENTE DE PACIENTES E DIMINUIÇÃO DAS DESCOMPENSAÇÃO E DA MORTALIDADE., Positivo: SACUBITRIL / VASLSARTANAMELHORA DA SOBREVIVÊNCIA DOS SINTOMAS CLÍNICOS DIMINUIÇÃO DA REINTERNAÇÃO, Negativo: LIGEIRAMENTE OS PACIENTES FICARAM MAIS HIPOTENSOS, ENTRETANTO, SEM AGRAVO DOS SINTOMAS E DA DOENÇA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL GRAVE NÃO PODE SER UTILIZADO, SEM ESTUDOS CLÍNICOS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSÃO BETA BLOQUEADORES DESFIBRILADORES IMPLANTÁVEIS SINCRONIZADORES, Positivo: INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSÃO BETA BLOQUEADORES MELHORA DA SOBREVIVÊNCIA, REINTERNAÇÃO E QUADRO CLÍNICO DESFIBRILADORES IMPLANTÁVEIS - MELHORA DA SOBREVIVÊNCIA SINCRONIZADORES - MELHORA DA SOBREVIVÊNCIA E SINTOMAS, Negativo: DESFIBRILADORES IMPLANTÁVEIS - ALTO CUSTO SINCRONIZADORES - ALTO CUSTO INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSÃO - HIPOTENSÃO E PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL GRAVE BETA BLOQUEADORES - DIFICULDADE NA OTIMIZAÇÃO DA DOSE</p>
14/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acompanhei a melhora clínica da minha avó quando iniciou o tratamento com Entresto, o quanto diminuiu as idas ao hospital. Melhorou a qualidade de vida dela seguramente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: - Minha avó melhorou muito o quadro clínico com melhora na respiração e disposição para atividades que ela já havia abandonado. Além de necessitar menos de hospital., Negativo: - Não percebi problemas durante o tempo de uso.</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, é preciso saber qual laboratório irá fornecer, pois sabemos que nem sempre os medicamentos oferecidos pelo SUS para a população, são confiáveis.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO 97/103. Uso diariamente, 01 comprimido a cada 12h, Positivo: é ótimo. Me sinto muito bem, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Pois sou paciente e preciso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril/Valsartana, Positivo: Vasos sanguíneos relaxam e menos água e retida pelo corpo, Negativo: Tosse, diarreia etc</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Espironolactona Cilostazol (vasogard) Selozok (succinato de metoprolol) Furosemida, Positivo: Espironolactona: Eliminação de água através da urina e diminui a pressão arterial. Cilostazol: Auxilia na circulação e diminuição de fluxo de sangue para os músculos etc. Selozok: Redução da pressão arterial etc. Furosemida: diurético e antihipertensivo., Negativo: Espironolactona: Dor de cabeça. Cilostazol: Dor de cabeça, diarreia e Náusea etc. Selozok: Fadiga e Astenia. Furosemida: Não Tive nem um efeito negativo.</p>
14/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe faz uso do medicamento com muito sucesso</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 24/26, Positivo: Melhora nas taxas BNP e no estado geral, Negativo: Não identificados</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Diminuição de mortalidade e de hospitalizações. E melhora de qualidade de vida e sintomas., Negativo: O preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ieca ou bra, Positivo: Baixo custo, diminuição de mortalidade e hospitalizações com relação a placebo, Negativo: Entresto mostrou melhor resultado comparado ao Ieca. Tosse crônica efeito colateral</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou portador de insuficiência cardíaca, o medicamento Entresto é de alto custo, é importante que seja distribuído pela rede pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento salvou minha vida. Após conectar a máquina a minha melhora foi surpreendente. E muito importante que se tenha esse medicamento no hospital</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Zarmine, atenolol, amiodarona, etc..., Positivo: Esse medicamento faz que meus batimentos cardíacos estejam controlados. Mas sempre associado ao entresto, Negativo: Não posso dizer que é um efeito negativo. MAS NO ENCOMANDO UM POUCO A QUANTIDADE DE VEZ QUE URINO AO DIA</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Familiar faz uso com bons resultados porém custa muito no orçamento familiar. (CUSTO)</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Internações frequentes. ACABARAM., Negativo: Sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Janumet xr, Positivo: Controle ótimo da glicemia, Negativo: Sem efeitos negativos.</p>
13/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho fundamental que a população tenha acesso à medicação de forma gratuita e sabendo da sua eficácia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso de 2 comprimidos por dia alto custo onerando a despesa mensal. Pois tenho um tratamento com mais 07 comprimidos por dia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto de 100 mg. atualmente faço uso de Entresto 50 mg., Positivo: Melhora nos problemas cardíacos., Negativo: N</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação é super eficaz para o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva e infelizmente é disponibilizada em um valor caro para se comprar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da função cardíaca com aumento da fração de ejeção do coração, melhorando significativamente a sobrevivência de pacientes portadores de insuficiência cardíaca congestiva., Negativo: Preço muito alto para o consumidor.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Enalapril, Espironolactona, Lasix, Positivo: Disponibilizados no Sistema Único de Saúde, com acesso a todos., Negativo: Em comparação com o Entresto, o aumento da fração de ejeção é minimamente percebida.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49.51, Positivo: Meu coração diminuiu em 15por centos , Negativo: As vezes eu tenho tonturas e diarréia
13/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Droga nova para Insuficiência cardíaca, com comprovação científica na redução de mortalidade e hospitalização, gerando farmacoconomia. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto (Valsartan+Sacubitril), Positivo: Melhora acentuada na sintomatologia do paciente, com implemento na qualidade de vida., Negativo: Não houve 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diuréticos, betabloqueadores, inibidores de enzima, digitálicos, Positivo: Desprezíveis, Negativo: Não seriam propriamente efeitos negativos, porém, não melhoram a qualidade de vida do paciente, embora, reduzam mortalidade.
13/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O ENTRESTO tem evidências significativas na mudança de prognóstico da IC 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Controle efetivo da IC e redução da progressão da doença , Negativo: Nenhum 3ª - Não
13/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da medicação evita internações recorrentes em enfermaria e UTI,e complicações decorrentes da insuficiencia cardiaca. Alem de melhorar qualidade de vida 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: S acubitril valsartana, Positivo: Redução internações,em enfermaria e UTI, menos afastamento do serviço , melhora qualidade de vida., Negativo: Custo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Procoralam, Bisoprolol, Positivo: Melhora razoavel do quadro., Negativo: Pe quena redução internações.
13/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Quanto mais variedade de medicamentos pra população melhor 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo Paradigm-hf que foi o maior estudo de ICC ja realizado demonstrou os seguintes resultados que sao muito favoraveis ao Entresto.- 20% de reduçao de risco de hospitalizao por IC ou morte cardiovascular.-20% de reducao de morte cardiovascular.-21% de reducao de risco de hospitalizao por IC.-20% de reducao de risco de morte subita.Estes dados sao muito robustos e justificam a padronizacao de Entresto, contribuindo enormemente para o gasto do governo com internadmentos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto 24/26mgEntresto 49/51mgEntresto 97/103mg, Positivo: Reducao de risco de hospitalizao em 20%Reducao de risco de morte cardiovascular em 20%Reducao de risco de hospitalizao por IC em 21%Reducao de risco de morte subita em 20%Comparado ao melhor tratamento atual que é o Enalapril., Negativo: Somente o custo mas que baseado em farmacoconomia o uso do produto se torna viavel.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto 24/26mgEntresto 49/51mgEntresto 97/103mg, Positivo: educao de risco de hospitalizao em 20%Reducao de risco de morte cardiovascular em 20%Reducao de risco de hospitalizao por IC em 21%Reducao de risco de morte subita em 20%Comparado ao melhor tratamento atual que é o Enalapril.Obs. conforme a minha pratica clinica o produto Entresto apresenta muitos beneficios em melhora da qualidade de vida do paciente e familiares o que reverte em reducao de custos e despesas da familia e do governo, com menos internamentos., Negativo: Apenas custo, na visao do governo, porém na visao do especialista da area de saude o custo beneficio com Entrestoé favoravel.</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Deveria que ter</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhoras na pressão e batimentos cardíacos, Negativo: Não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta medicação é INCOMPARAVELMENTE superior aos oferecidos pelo SUS chegando ao ponto de causar injustiça com os pacientes do SUS q não conseguem comprar. Basta obsedar o estudo PARADIGM que evidenciou 20% de redução em: 1 hospitalização, 2 morte,3 morte súbita comparado ao ENALAPRIL.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril valsartan, Enalapril, Captopril, Candesartan, Losartan, Valsartan., Positivo: O ENTRESTO é muito superior a todos eles. Os pacientes sentem a diferença em 3 dias de uso., Negativo: Hipotensão.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já citados, Positivo: Já citados, Negativo: Já citados</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser distribuído gratuitamente esse medicamento para as pessoas que necessitam do mesmo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Foram muitos e nao tenho controle, Positivo: Melhoras, Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Galvus, Positivo: Controle da diabetes, Negativo: Nada a declarar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio muito eficaz e salva vidas como a minha, deve ser fornecido sem custo aos brasileiros.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Controle cardíaco, melhora de sintomas maléficicos e melhoria do bem estar., Negativo: Nenhum, apenas o valor de compra inviável para nós classe baixa.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, caverdilol e marevam, Positivo: eram pouco eficientes, Negativo: Pouco eficiente pois não faziam o devido controle.</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso de 2 comprimidos por dia alto custo onerando a despesa mensal.Pois tenho um tratamento com mais 07 comprimidos por dia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 100 Mg., Positivo: Melhora nos problemas cardíacos., Negativo: Não tive efeito negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Arcócia , enalapril, Positivo: o remédio era administrado antes da vinda do entresto. , Negativo: Não tem efeito negativo.</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO E VASTAREL, Positivo: CONTROLE DA PRESSÃO., Negativo: COCEIRA APÓS DOIS DE USO.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: IGUAL ACIMA., Positivo: IFUAL ACIMA., Negativo: IGUAL ACIMA.</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O remedio tem que ter condição para comprar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26 atualmente uso 49/51, Positivo: Acabou o cansaço q eu sentia, Negativo: Não notei nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caverdilol, Positivo: Nenhum, Negativo: Fiquei toda dura</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Venho tomando Entresto há mais de seis meses apos um infarto e estou tendo resultados maravilhosos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97mg, Positivo: O ultimo ecocardiograma demonstrou que os efeitos do medicamento foram excelentes., Negativo: Nao tive.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Naprix, Positivo: Sem problema, Negativo: Nao tive.</p>
13/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril/valsartana, Positivo: Segurança e eficácia comprovadasReduz risco de mortalidade e hospitalizações recorrentesMelhora classe funcionalMelhora qualidade de vida, Negativo: São perfeitamente controlados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECADIURÈTICOSBETABLOQUEADOR, Positivo: Tratamento convencional de I . Cardiaca , Negativo: Maior recorrencia de internações por descompensação cardiaca</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o remédio é fantástico 2ª - Sim, como paciente, Qual: v, Positivo: v, Negativo: v 3ª - Sim, como paciente, Qual: v, Positivo: v, Negativo: v
13/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio excelente que tem muito a acrescentar a sua de dos usuários. Acredito que a Conitec é composta de pessoas ricas que nunca tiveram um familiar que precisou de utilização do SUS. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Minha mãe estava na UTI, saiu e passou a utilizar o medicamento, sua recuperação foi maravilhosa. Temos gastado muito dinheiro com o remédio, mas vale a pena. Porém, se tivéssemos este remédio no SUS nos ajudará a melhorar o orçamento da família., Negativo: Não tivemos nenhum problema. 3ª - Não
13/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Leia o estudo Paradygm 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Melhora de classe funcional e remodelamento reverso ventricular esquerdo, Negativo: Angioedema e hipotensão 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BrasIECASBETABLOQDIURÉTICOS , Positivo: Todos estão descritos nas Diretrizes de Insuficiência cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia , Negativo: Todos estão descritos nas diretrizes da sociedade brasileira de cardiologia
13/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, nescesito do medicamento e na verdade ele ainda é muito caro para pessoas de baixa renda como eu. 2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: ME SINTO UM POUCO MELHOR !!!! FAZ POUCO TEMPO QUE TOMO O MEDICAMENTO !!!, Negativo: MINHA PRESSÃO CAI UM POUCO E ME SINTO MAL AS VEZES MAIS ACHO QUE DEVE SER NORMAL NO INICIO . 3ª - Não
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Após uso do medicamento entresto, meu Pai Sr.Altair melhorou bem e é raro ir ao hospital! 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto!, Positivo: Fortalecimento e redução de internação!, Negativo: Não observado! 3ª - Não
13/12/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26Entresto 97/103, Positivo: Evita a morte súbita , Negativo: Falta de apetite 3ª - Sim, como paciente, Qual: EnalaprilCarvedilol, Positivo: Nenhum, Negativo: FraquezaFalta de ar
13/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na respiração, na disposição , Negativo: Não refere 3ª - Sim, como paciente, Qual: furosemda, Positivo: diminuição do edema , Negativo: excesso de diurese

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu tenho insuficiência cardíaca desde 2011, além do entresto, tomo outro medicamentos, aso o pradaxa, só com estes 2 gasto mais de 400,00 reais por mês.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, pradaxa, cardilol, aldactone, lasix e pontoprazol., Positivo: Me ajud na insuficiência cardíaca, controlr da arritmia e na coagulação sanguínea., Negativo: Pouca disposição sexual, perigo de efeito colaterL, especialmente no fígado e rins.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2018	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As doenças Cardiovasculares são a primeira causa de mortes no mundo e no Brasil. Trata-se de doenças que avançam devagar, são de longa duração e devem ser controladas por toda a vida. Assim como o Infarto e o AVC, a Insuficiência Cardíaca é uma das principais causas de morte de brasileiros. O Instituto Lado a Lado pela Vida tem trabalhado as doenças cardiovasculares desde 2014, quando criou a Campanha Siga seu Coração para chamar a atenção dos brasileiros para a importância da prevenção dos fatores de risco que podem levar às doenças crônicas, como o colesterol alto, a hipertensão, o estresse, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo e o diabetes. Além da prevenção, o Instituto também trabalha para influenciar aqueles que têm o poder de criar mecanismos e leis para mudar o quadro da saúde do Brasil a olharem para o paciente de alto risco cardiovascular e desenhar políticas públicas voltadas para eles, assim como chamar a atenção para a importância da adesão ao tratamento para todos com diagnóstico de doenças do coração. Já foram realizados pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, quatro fóruns (2015 a 2018) voltados para a discussão das políticas públicas e as necessidades dos pacientes diagnosticados com doença cardiovascular, além de uma audiência pública (2016), para tratar do paciente de alto risco cardiovascular. Destaque para Insuficiência Cardíaca (IC): entre as doenças do coração, a IC representa cerca de 25% do índice de mortes por doenças cardiovasculares no Brasil. Ao abrir a Consulta Pública Sacubitril / Valsartana para Insuficiência Cardíaca Crônica Sintomática – NYHA CLASSE II – IV pela CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, ficamos esperançosos de que os pacientes adultos com diagnóstico de Insuficiência Cardíaca crônica sintomática (NYHA – Classificação funcional da New York Heart Association – Classe II –IV) com fração de ejeção reduzida (ICFEr), possam contar que esse medicamento estará disponível no SUS. O Sacubitril / Valsartana é um bloqueador dos efeitos da neprilisina e do receptor angiotensina II que causa relaxamento dos vasos sanguíneos ocasionando a retenção de menos água pelo corpo, o que é benéfico para tratar a Insuficiência Cardíaca. No entanto, a recomendação inicial da CONITEC é pela não incorporação desta tecnologia de tratamento, por entender que o medicamento não apresenta benefícios clínicos condizentes com o valor proposto para aquisição pelo SUS, levando-se em consideração o impacto orçamentário que essa incorporação trará ao SUS e sugerindo um possível comprometimento da sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. Mediante esse cenário, o Instituto Lado a Lado pela Vida, por entender a gravidade da Insuficiência Cardíaca e o impacto na vida das pessoas diagnosticadas com a doença, apresenta abaixo as suas contribuições em favor da incorporação desta tecnologia que poderá melhorar a qualidade de vida desses pacientes e mais, reduzir o número de mortes por IC. Nossa contribuição: por tratar-se de uma doença muito grave, entendemos que a questão econômica não deve prevalecer em detrimento dos benefícios clínicos em redução de morbimortalidade, pois apesar do impacto orçamentário, o impacto da IC no sistema de saúde é enorme e mais ainda na vida das pessoas diagnosticadas e suas famílias. Dados sobre IC originárias do DATASUS, em 2017, mostram que aconteceram 208.638 internações por IC, das quais 86.228 ocorreram na região Sudeste. Quanto aos óbitos, foram notificados 22.649 devido à IC no mesmo ano, o que equivale a uma taxa de mortalidade de 10,86 (BRASIL, 2018). A prioridade deve ser o que é melhor para o paciente e a incorporação desse medicamento apresentou taxas de redução de mortalidade. Em comparação ao Enalapril, que apresenta um mecanismo de ação que envolve a inibição da enzima conversora de angiotensina, o sacubitril/valsartana reduziu em cerca de 16% as mortes por qualquer causa. De acordo com as evidências encontradas, o tratamento de ICFEr com sacubitril/valsartana pode beneficiar um subgrupo específico de pacientes, sendo aqueles com idade inferior a 75 anos, NYHA classe II, FEVE < 35% e refratários ao tratamento com IECA ou BRA, sem diferenças significativas no perfil de segurança. Outro ponto a ser levado em consideração é que o sacubitril / valsartana está incluído e recomendado nas Diretrizes de IC Brasileira, bem como em todas as diretrizes internacionais. O fluxograma de tratamento foi, inclusive, apresentado no relatório da CONITEC. Por estarmos pensando nos benefícios que os pacientes diagnosticados com IC podem obter com a incorporação dessa nova tecnologia, salientamos a importância de sua avaliação por parte da CONITEC, não exclusivamente sob o olhar do impacto orçamentário, mas sim, com o olhar para a mudança significativa que esses pacientes passarão a ter. E por trazer tantos benefícios, essa nova abordagem terapêutica de um sistema fisiopatológico para o qual não se tem nenhum outro representante farmacológico, feito por um dos componentes do sacubitril /valsartan, é que esse novo medicamento já foi aprovado e incorporado por várias agências de saúde no mundo, tais como: National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PBAC), Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG) - da Alemanha, Scottish Medicines Consortium (SMC), National Authority for Health (HAS) – da França, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). O público-alvo é a população com diagnóstico de IC que já está em estágio mais avançado. O índice de mortalidade é bem alto e para eles, todos os recursos disponíveis, incluindo as novas terapias disponíveis devem ser utilizados. Estes pacientes, considerados de alto risco precisam ter um olhar diferenciado.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
		<p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/61, Positivo: Melhoras na insuficiencia cardiaca, Negativo: Desconhecidos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/61, Positivo: Melhora na insuficiencia cardiaca, Negativo: Nenhum</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Me sinto bem melhor com o uso deste medicamento., Negativo: Nenhum até agora.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou portador de CDI. Medicamentos: Concor, digoxina, etc., Positivo: Controle da doença., Negativo: Efeitos colaterais.</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na fração de ejeção, Negativo: Um pouco de tontura ao me levantar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Indapamida, Positivo: Não senti efeitos positivos, Negativo: Não tive</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: COM O ENTRESTO , Positivo: Diminuição do cansaço, aumento na disposição , Negativo: nego efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: furosemida , Positivo: diminuição do edemas , Negativo: urina de mais</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: melhora no cansaço mais disposição , Negativo: não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: furosemida , Positivo: diminuição do edema , Negativo: excesso de diurese</p>
13/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação com resposta clínica impressionante e com estudos bastante relevantes demonstrando diminuição de mortalidade e de internações com o uso da medicação. É uma droga com uma ação muito boa e com resposta clínica exuberante do paciente, trazendo benefícios visíveis</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartan, Positivo: Melhora de Classe FuncionalMelhora de qualidade de vidaMelhora de edemaMelhora importante de ascite (em pacientes que a possuem secundária à Insuficiência Cardíaca)Importante ganho de capacidade física e consequente diminuição de caquexia cardíaca, Negativo: Hipotensão em raros casosPiora discreta de função renal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECAsBloqueadores de Receptores de AngiotensinaBetabloqueadores Diuréticos de AlçaDigitaisIvabradinaNitrito e Hidralazina, Positivo: Medicações com comprovada melhora de desfecho na IC , Negativo: Efeitos colaterais relacionados às drogas</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: diminuição do cansaço melhora na disposição , Negativo: não apresento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: furosemida, Positivo: Diminuição do edemas , Negativo: diurese elevada</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora no aspecto respiratório , Negativo: Não refere</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: furosemida , Positivo: diminuição do edema, Negativo: diurese elevada</p>
13/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu marido precisa desse remédio, duas vezes ao dia, e custa muito caro, em média R\$300,00 por mes, não tenho condições de comprar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ENTRESTO, Positivo: ENTRESTO, MELHORA MUITO A OXIGENAÇÃO DO SANGUE, RESPIRAÇÃO, ÂNIMO PARA ANDAR., Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, CONCORDO COM A INCORPORAÇÃO DO SACUBRITIL/ VALSARTANA NO SUS PARA PACIENTES COM IC COM O PERFIL PARA O TRATAMENTO COM O FÁRMACO(CF: II/ III) , BASEADO NO TRIAL ATMOSPHERE E NA EXPERIÊNCIA NO SERVIÇO DE REFERÊNCIA DE IC QUE TEMOS COM MAIS DE 30 PACIENTE E COM BOA RESPOSTA E MELHORA DE SINTOMAS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EXPERIÊNCIA COMO ENFERMEIRA NO SERVIÇO DE REFERÊNCIA DE IC, TEMOS MAIS DE 30 PACIENTES EM USO DO FÁRMACO SACUBRITIL/ VALSARTANA JE COM BOA RESPOSTA E MELHORA DE SINTOMAS. , Positivo: GRANDE MELHORA DE SINTOMAS, Negativo: HIPOTENSÃO, POR ISSO PRECISA SER BEM INDICADO E TER O ACOMPANHAMENTO DE PERTO PELA EQUIPE DO CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL. O CUSTO DA MEDICAÇÃO PARA ESSES PACIENTES É ALTO, A MAIORIA DOS PACIENTES TEM UMA RENDA PER CAPITA MENOR QUE 1 SALÁRIO MÍNIMO POPULAÇÃO COM BAIXO PODER AQUISITIVO E O FÁRMACO MOSTROU TEM GRANDE BENEFÍCIO PARA ESSES PACIENTES É IMPORTANTE A MANUTENÇÃO PARA O TRATAMENTO DA IC.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A TERAPÊUTICA DA IC COMO IECA, DIURÉTICOS, B-BLOQUEADORES, ESPIRONOLACTONA NITRATOS ETC..., Positivo: CADA UM TEM EFEITOS POSITIVOS QUE COLABORAM NO TRATAMENTO DA IC., Negativo: ALGUNS COMO POR EXEMPLO A ESPINOLACTONA TEM BENEFICIO NA REDUÇÃO DE MORBI MORTALIDADE MAS ALTERA POTASSIO, NECESSIDADE DE USAR COM O CONTROLE DO POTÁSSIO.</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: melhora no aspecto respiratório e melhora na disposição , Negativo: nega efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: furosemida , Positivo: diminuição dos edemas , Negativo: aumento da diurese</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E um remedio muito caro,tomo muitos outros remédios e preciso de ajuda de terceiros pra compra los.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe teve uma melhora de 16% da insuficiência usando Entresto. Mas não sabemos até quando conseguiremos pagar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora de 16% da insuficiência comprovada em antioxidantes ressonância. Mais disposição para atividades diárias, melhora na respiração., Negativo: Nenhum observado por enquanto</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mobocordil e mais um outro qu não estou recordando o nome, Positivo: Nada observado, nenhuma melhora, Negativo: Nada observado</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta medicação tem trazido significativa melhora no quadro clínico dos pacientes com IC do ambulatório que faço parte.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto 97/101, 49/51 e 24/26mg, Positivo: Melhora da dispnéia e da qualidade de vida de um modo geral, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CAVERDILOL, ESPIRONOLACTONA, Positivo: Melhora dos sinais e sintomas clínicos da IC, Negativo: Não tenho observado efeitos negativos, apenas chega-se a um ponto onde não se pode aumentar a dosagem dos medicamentos.</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: melhora na disposição melhora na respiração , Negativo: não refere</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: furosemida, Positivo: diminuição dos edemas , Negativo: excesso da diurese</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Milhões de cardiopatas não tem condição de comprar o medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26 mg, Positivo: Entresto 24/26 mg, Atorvastatina calcica 20mg, SOMALGIM cardio 100 MG,CARVEDILOL 6,26 mg, Espiroloctona 100mg, Ancoron 100 mg, Negativo: ____</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: PRAVASTATINA 60 mg, Positivo: Me dei bem., Negativo: ____</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entesto, Positivo: melhora na respiração e no cansaço , Negativo: não refere</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: furosemida, Positivo: diminuição de edema , Negativo: excesso de diurese</p>
13/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O ENTRESTO tem evidências significativas na mudança de prognóstico da IC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Controle efetivo da IC e redução da progressão da doença , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2018	Grupos/associação/organi-zação de pacientes	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelos resultados favoráveis apresentados pelos associados filiados em uso da medicação</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhoria da qualidade de vida, Negativo: Não informados</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Benznidazol 100mg, Positivo: Expectativa de melhoria dos efeitos deletérios sobre o coração, Negativo: Prurido e parestesia</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: melhora na respiração, e na disposição , Negativo: Não refere</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: furosemida , Positivo: diminuição dos edemas , Negativo: aumento na diurese</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: melhora mo cansaço e na disposição , Negativo: não refere</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: furosemida , Positivo: diminuição dos edemas , Negativo: aumento na diurese</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou usando há um ano como um dos medicamentos receitado para o diagnóstico de cardiomiopatia</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Me foi receitado para controle da minha cardiomiopatia os seguintes medicamentos: Digoxina, furosemida, espironolactona, xarelto, selozok, rosuvastatina cálcica e entresto., Positivo: Há um ano de uso dos medicamentos minha doença esta sob controle., Negativo: não foi constatado até o momento nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação eficiente porém de alto custo para população de baixa renda.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril/valsartana (Entresto), Positivo: Menos cansaço e melhor função cardíaca., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ele pode ajudar muitas pessoas que necessitam do tratamento do mesmo e não tem possibilidade de comprar, pois o valor é muito alto</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: mais disposição, melhorando a respiração, acabando com as dores na região do peitoral, diminuindo significativamente as crises cardíacas , Negativo: nenhum efeito negativo notável</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lasix; Aldactone; Zyloric; Velunid; Vastarel; Ictus; Somalgin Cardio; Rosucor; Dainitre; Deocil SI , Positivo: sem conhecimento de todos , Negativo: sem conhecimento de todos</p>
13/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na condição respiratória e na disposição , Negativo: nega efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: furosemida , Positivo: diminuição dos edemas , Negativo: aumento na diurese</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha mãe toma junto com o Entresto: Nebivolol, furosemida e digoxina, , Positivo: Melhora significativa do cansaço e inchaço., Negativo: Tomando estes medicamentos, faz-se necessário de tempos em tempos avaliar o sódio, potássio, creatinina e ureia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto mais os outros medicamentos citados no item 8. , Positivo: Antes de começar a tomar Entresto, minha mãe estava tomando Losartana duas vezes ao dia e continuava com a pressão arterial alta, com o Entresto a pressão está normal, o cansaço e inchaço melhorou também., Negativo: Precisa ter um controle maior para não prejudicar os rins. Controle de creatinina, sódio, potássio e uréia.</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É um medicamento muito caro e inacessíveis a população menos favorecida</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Sensível melhora na questão da insuficiência cardíaca., Negativo: Não teve.</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudo Paradigm mostra a superioridade da associação e seu uso já está em Diretrizes internacionais</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana , Positivo: Melhor tolerância aos esforços do cotidiano - tomar banho, pentear cabelo Menor frequência de descompensação , Negativo: Leve piora da função renal em um primeiro momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betabloqueador , IECA, Positivo: Diminuir o grau de IC, Negativo: Hipotensão , piora da função renal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Ajuda a controlar a pressão arterial, Negativo: Dá tontura</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com betabloqueador, inibidores da enzima conversora; bloqueador receptor angiotensina., Positivo: Melhora da classe funcional da insuficiência cardíaca., Negativo: Hipotensão, bradicardia, déficit função renal.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com betabloqueador, inibidores da enzima conversora; bloqueador receptor angiotensina., Positivo: Melhora da classe funcional da insuficiência cardíaca., Negativo: Hipotensão, bradicardia, déficit função renal.</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da fadiga, melhora da respiração., Negativo: Ndn</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Carvedilol, nitrencor, Positivo: No inicio foram efetivos, porém com o agravamento da insuficiência cardíaca, não mais., Negativo: Não foram mais efetivos com o agravamento do quadro.</p>
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Menor tempo de hospitalização , Negativo: Ndn</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entresto é um medicamento excelente para insuficiência cardíaca, não senti mais falta de ar após o uso do Entresto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Os efeitos positivos melhora considerável mente a insuficiência cardíaca, bem como a falta de ar devido a insuficiência cardíaca., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já tomei muitos medicamentos para insuficiência cardiaca, mais o melhor é o Entresto., Positivo: Todos positivos já mencionados anteriormente., Negativo: Nenhum</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria de um ganho enorme para a sociedade incorporar o sucubitril/valsartana no sistema único de saúde.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sucubitril/Valsartana 24/26mg , Positivo: Melhoras no cansaço físico, melhoras no inchaço do membros inferiores. , Negativo: Nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sucubitril/Valsartana 24/26mg , Positivo: Melhoras no cansaço físico, melhoras no inchaço do membros inferiores. , Negativo: Nenhum efeito negativo.</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicamento de extrema necessidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Este medicamento e fundamental para o controle da pressão. Pra Para alguém que já deve infarto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: A minha pressão está controlada , Negativo: Não tive nenhum efeito colateral.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana , Positivo: Baixar pressão em alguns dias., Negativo: Nem sempre a pressão se mantinha regulada.</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai usa esse medicamento, é ele é caro pra um assalariado. Por isso o sus deve sim disponibilisa-la</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho Insuficiência Cardíaca grave Crônica e descobri a mais de 10 anos e comecei a fazer uso desse medicamento a um ano, e após, tive uma melhora significativa, o grande problema é o valor do medicamento que caro e não consigo comprar. Por isso a disponibilidade dele pelo SUS vai nos ajudar em muito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril/Valsartana , Positivo: Sinto menos cansaço a pequenos esforços, menos inchaço e minha qualidade de vida teve uma grande melhora com a ingestão desse medicamento., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol 25mg, Ivabradina 5 mg, Somalgim Cardio (ASS) 100mg e Espironalocetona de 25 mg., Positivo: Melhoram e aumentam a função e a ejeção do meu coração., Negativo: Nenhum</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É necessário o entreposto distribuído pelo sus, tem muitas pessoas que não tem condições de pagar pelo tratamento,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou cardiologista e os pacientes que tomam essa medicacao tem uma melhora substancial de sinais e sintomas .tendo muitas vezes que tirar outras medicações</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos para icc , Positivo: melhora de dispneia edema etc, Negativo: os iecas tosse e nao atingem tanto melhora dos sintomas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril valsartana , Positivo: melhora expressiva de sinais e sintomas, Negativo: hipotensao</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 97mg/103mg, Positivo: A vida da minha mãe melhorou muito depois do medicamento., Negativo: nao reconheci efeitos negativos além do preço que não e muito acessível</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Sem comentários</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o entresto, Positivo: Pra evitar o crescimento do coração muito eficaz o medicamento, Negativo: Baixa um pouco a pressão pouco tontura depois normaliza</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sinvastatina xarel digoxina caverdilou marevam , Positivo: Alguns serviu, Negativo: Outros sem resultados positivos sem efeitos colaterais</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio de preço elevado, porém, muito bom no controle de PA</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51, Positivo: Controle PA, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Retirada no SUS, Negativo: Díficil Controle PA</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o medicamento é eficaz e reduz mortalidade em pacientes selecionados</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: entresto, Positivo: melhora dos sintomas diminuição de internação melhor controle pressorico, Negativo: preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: entresto, Positivo: os citados, Negativo: preço</p>
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Será muito bem vindo na farmácia Popular, pois o preço diminuirá bem.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da falta de ar, diminuição do cansaço. , Negativo: Não percebi.</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é de uso contínuo por pacientes cardiacos. E o valor dele é muito alto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento realmente muda a qualidade de vida dos pacientes, porém é de alto custo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Nao teve mais crise, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente deste medicamento é sobrecarregado financeiramente pelo alto custo do medicamento. Como é um medicamento de uso contínuo nem sempre o paciente tem condições de adquiri-lo podendo em risco a sua vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entre si 20/26., Positivo: Sinto melhor disposição. , Negativo: Não tive efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clopidogrel, Rosvastatina, AAS, Carvodilel, Positivo: Em geral estou passando bem apesar do infarto., Negativo: Não tive efeito negativo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Li a respeito e só encontrei vantagens no medicamento. Acho um absurdo a recomendação preliminar da CONITEC ser desfavorável. O único ponto negativo do medicamento é o alto custo para a maior parte da população, que deveria ser "bancado" pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Não fico cansada com facilidade (como antes de tomar o remédio), minhas pernas não ficam mais inchadas ,consigo realizar umas atividades sem ficar cansada, Negativo: Pressão baixa e tontura</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Amiodarona,caverdilol,procoralan , Positivo: Amiodarona: coração bate mais ritmado, não sinto tanto cansaço. Caverdilol: não permite os vasos sanguíneos entupir Procoralan: faz com que o coração bata mais ritmado , Negativo: Amiodarona: as vezes faz os batimentos cardíacos diminuírem Caverdilol: dores abdominais e diarreia Procoralan: momentos de luminosidade aumentada</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio de uso contínuo e aposentado não tem condições de adquirir</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhoria das condições de saúde, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Selozok, sincastatina, glifage, trezor, Positivo: Não houve melhora significativamente estabilizavam dos sintomas tão som, Negativo: Não houve regressão dos sintomas.</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Está sendo excelente pra mim melhorando consideravelmente minha qualidade de vida por isso sou favorável a implantação de entresto na rede pública</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103 e dos agentes menores comecei com a 24 mg, Positivo: Me sinto bem a fadiga não sumiu totalmente mas me sinto bem melhor, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aas e bissulfato de clopidogrel 75 mg, Positivo: Aas continuo tomando o clopidogrel parei pois me fazia sentir muita falta de ar, Negativo: Aas sem efeito negativo apenas me faltava muito ar</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana potassica/diacgua, Positivo: Sem informacao, Negativo: Não sei</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois estou super bem o medicamento indicado pelo médica.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o Entresto, todas as dosagens, atualmente estou usando entresto 97/103, Positivo: Com último estou bem melhor, não tenho mais palpitação cansaço., Negativo: Ele só me fez bem, não tenho o que reclamar do medicamento, pelo contrário está me fazendo muito bem</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 97/103mg , Positivo: Paciente menos ofegante, mais disposto, menos inchasso ., Negativo: não tivemos efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhorou minha vida em 80%, depois q comecei o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tomei quase todos os remédios p/ o coração, mas só esse houve evolução no tratamento., Positivo: Melhorou meu cansaço, batimento cardíaco, vou até a começar fazer testes ergométricas , que eu não podia fazer, pois não aguentava., Negativo: Não houve até o momento.</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento excelente mas muito oneroso</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Controle total da pressão arterial , Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 24/26mg 2x ao dia, Positivo: Paciente teve menos falta de ar aos esforços, mais ativa e qualidade de vida melhor., Negativo: O único efeito negativo e o preço, muito caro!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diovan e amiodarona e candessa, Positivo: No começo teve melhora porém com o tempo voltou a sentir os mesmos problemas de antes., Negativo: Não teve a melhora esperada.</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser oferecido à toda a população pelo SUS, pois todos devem ter acesso a tão importante e excelente medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Auxiliar no funcionamento e resposta cardíaca positiva , Negativo: Nada a relatar até o momento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diversos, Positivo: Melhora na resposta cardíaca , Negativo: Nada a relatar até o momento</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser oferecido à toda a população pelo SUS, pois todos devem ter acesso a tão importante e excelente medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Auxiliar no funcionamento e resposta cardíaca positiva , Negativo: Nada a relatar até o momento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários , Positivo: Melhora na resposta cardíaca , Negativo: Nada a relatar até o momento</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Regulariza frequência cardíaca., Negativo: Desconheço.</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É dever do Estado propiciar ao seus cidadãos o direito a saúde e a vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto.Excelente. , Positivo: Melhor condição de vida o que possibilitou e possibilita a continuidade da minha existência, Negativo: Não experimentei nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Silvastatina, Positivo: Bom., Negativo: Falta de ar. Batimento cardíaco com esforço.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deveria ser gratuito por ser um medicamento para tratar uma doença crônica 2ª - Não 3ª - Não
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O preço do é caro , as pessoas que não tem condições financeiras,tem dificuldade em comprar. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o Entresto, Positivo: Diminui o cansaço e o risco de infarto., Negativo: Não me lembro 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Evita o infarto, Negativo: Não lembro
12/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A EFICÁCIA DO ENTRESTO, JUSTIFICARIA E EVITARIA O NÚMERO DE PACIENTES COM REINTERNAÇÕES TÃO FREQUENTES, EM DECORRÊNCIA DA ICC 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO, Positivo: MELHORA, SIGNIFICATIVA DA DISPNEIA, Negativo: ATÉ O PRESENTE MOMENTO O SACUBITRIL, QUANDO BEM INDICADO , NÃO REVELOU EFEITOS NEGATIVOS 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CARVERDILOL, Positivo: MELHORA DA DISPNEIA, Negativo: EM NORMOTENSOS , PROVOCOU HIPOTENSÃO
12/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ocorre que tenho q tomar este medicamento por ter insuficiência cardíaca devido a quimioterapia para combater câncer de mamas e ossos, e meu salário de aposentada não chega a 2 salários. Não é suficiente para comprar todos os remédios necessários para o meu bem estar. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho tomado E Entresto Sacu bitril/valsartana24/26mg, Positivo: ConTrola a minha pressão que é alta. Segundo o cardiologista melhora a circulação vascular., Negativo: O efeito s negativo s é financeiro. Valor muito alto dos remédios para pressão e cardíacos. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Tomei Maleato de Inalapril e Lozartana., Positivo: Maleato de inalapril e. A Lozartana controlava a pressão., Negativo: O Maleato de Inalapril atacava a garganta. A Lozartana nada a declarar
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Compatibilidade com levotiroxina 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Compatibilidade com levotiroxina, Negativo: Desconheço 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Benicar, Positivo: Boa regulacao da PA, Negativo: Incompativel com levotiroxina
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O preço do Entresto é muito alto, as pessoas de baixa renda não possuem confeções de compra-lo. Portanto, ele deve ser disponibilizado no SUS. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o Entresto, Positivo: Diminuiu o cansaço e o risco de um infanto., Negativo: O preço do remédio dói no bolso, ou seja, é muito caro. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com vários outros, mas não lembro o nome exato., Positivo: Não lembro, Negativo: Não lembro

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho usado diariamente e tive melhora boa e melhorou minha falta de ar. Estou respirando melhor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49mg/51mg, Positivo: Mentira considerável na falta de ar, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vastarel . Procoralan, Positivo: Bom, Negativo: Nenhum</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho usado diariamente e tive melhora boa e melhorou minha falta de ar. Estou respirando melhor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49mg/51mg, Positivo: Mentira considerável na falta de ar, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vastarel . Procoralan, Positivo: Bom, Negativo: Nenhum</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de medicamento moderno, essencial no tratamento da I. C.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Já usei losartana, mas o entresto é bem melhor., Negativo: Nihil</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, concor, aldactone, diltiazem, entresto e outros.Implantei marcapasso com ressinchronizador., Positivo: Melhorei os sintomas com os diversos tratamentos., Negativo: Nihil</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o medicamento é muito bom, mas todos tem que ter acesso. É muito caro</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: bem estar, sem sintomas., Negativo: pressão baixa</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: acho que era Valsartana, Positivo: me manteve vivo, kkkkkk, Negativo: crises de tosse</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Mais disposição , Negativo: Muito caro</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Losartana, Positivo: Lodartana fornece no posto mais o entresto deu um resultado melhor, Negativo: Muita dor de cabeça e falta de ar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Carvedil, Positivo: Não tão bom quanto o entresto, Negativo: Dor de cabeça e ansia</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Todo medicamento contínuo , com resultados eficazes e custos elevados deveria ser incoeporado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicamento muito caro, difícil acesso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, procolaram, concor, aldactone., Positivo: Bastante eficais., Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xiguiduo, glifagem, lantus, Positivo: Controle da glicemia., Negativo: Efeitos colaterais</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Aas, carvedilol, Losartana, furosemida, digoxina, sinvastatina..., Positivo: Melhora a insuficiência., Negativo: Moleza, lentidão...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Todos descritos acima, Positivo: Melhora insuficiência, Negativo: Moleza, lentidão...</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Enpresto, Positivo: Melhorou muito a minha qualidade de vida e disposição para fazer as atividades do dia a dia , Negativo: Eu não tenho renda para fazer uso continuo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CaptoprilLosartanaCaverdilol, Positivo: Ajudam a controlar a pressão , Negativo: Não são tão bons quanto o Empresto, não me sentia tão disposta.</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso dessa medicação</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Monocórdio..., Positivo: Me ajudou temporariamente pós infarto, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cartel,caverdilol de 25,entresto, Positivo: Me ajudaran, Negativo: Nenhum</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Este remédio poderia fornecer para os pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E um medicamento que recuperou minha musculatura cardíaca e melhorou 100%</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Recuperou minha musculatura cardíaca , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: valsartana, Positivo: não surtiu efeito, Negativo: pressão permaneceu alta</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: vastarel mr, cavedilol, ácido acetilsalicílico, esprironolactona, rusocor , Positivo: vastarel- acabou com a dor no peito e diminuiu o cansaço.cavedilol- estabilizou a pressão arterial.ácido acetilsalicílico- melhorou a circulação sanguínea.esprironolactona- diminuiu o enchasso rusocor- estabilizou o colesterol e triglicérides , Negativo: sem efeito negativos até o momento.</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entresto é ótimo remedio para insuficiência cardíaca e por este motivo deve estar a acesso de todos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97 - 103, Positivo: Me senti nitidamente melhor. O resultado da FE passou de 38 para 54, além de me sentir bem melhor., Negativo: De início, senti um pouco de tontura, mas após uns 5 dias isso passou.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Renitec + Concor + Aldactone, Positivo: Não me sentia bem, muita tontura, moleza e mal estar.E a FE era de 38, Negativo: Ver acimaOBS: GOSTARIA DE SER INFORMADA POR QUE O REMÉDIO NÃO TEM RECOMENDAÇÃO FAVORÁVEL À SUA INCORPORAÇÃO AO SUS</p>
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o benefício em qualidade de vida e melhora dos sintomas é incomensurável, permite retorno as atividades laboral monitorada</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: betabloqueador/ieca/espirolactona/furosemida/digital, Positivo: no tratamento da ICC desde o uso dos mercurias passando pela digitalicos furosemide depois enalapril ,betabloqueador e agora o sacubutril há uma diferença muito grande nos resultados.temos agora produto que muda o perfil de estes pacientes , Negativo: até agora só registramos quadros de hipotensão em poucos pacientes que melhoram com o ajuste posologico</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: digital,diureticos,enalapril.betabloqueador, Positivo: houve melhora relativa com cada uma das drogas de forma individualAssociação delas apresenta melhor resultado mudando a sua classificação da ICC de IV para III ou II , Negativo: a manutenção da compensação cardíaca não é mantida a longo prazo</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao fazer o tratamento com ENTRESTO melhorei significativamente do meu problema cardíaco. É um medicamento eficaz, mais de difícil acesso para pessoas de baixa renda devido ao seu preço que é muito caro. Com a inclusão desse medicamento para o acesso de toda a população, com certeza irá resolver o problema de saúde daqueles que sofrem de problemas cardíacos e não podem comprar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: Ao fazer o tratamento com ENTRESTO melhorei significativamente do meu problema cardíaco. Meu coração estava crescendo e sentia muito cansaço, não tinha disposição para nada, depois do tratamento realizado com esse medicamento minha vida melhorou bastante, não sinto mais tanto cansaço e quando retornei ao médico para fazer nova avaliação o coração tinha parado de crescer e voltou a ter seu desempenho normal através de exames de ecocardiograma e eletrocardiograma. , Negativo: Efeito negativos é só o preço que é muito caro para pessoas que fazem tratamento contínuo.</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria de suma importância o uso do entresto por todos os pacientes assistidos pelo sistema único de saúde SUS. Muitos seriam beneficiados pelo tratamento. Já que o custo da medicação é muito alto uma pequena parcela da população vem ter acesso. O uso do medicamento vai impedir a evolução do quadro e diminuir o número de internações .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: O uso do entresto fez com que elevasse a injeção de fração. A minha estava muito baixa., Negativo: Houve uma queda da pressão</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso além do entresto: digoxina, hidroctiazida, concardio, Positivo: Todos melhoraram a minha fração de injeção, Negativo: Não sei especificamente os efeitos de cada um. No momento em que foi inserido essas medicações sentir tontura , mal estar, cheguei a desmaiar mas a minha médica conseguiu ajustar a medição.</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51, Positivo: Diminui minha falta de ar ,meu cansaço , Negativo: Efeito negativo e o auto preço do remedio</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento muito caro</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acho que se for para o meu bem aceito</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Espironolactona carvedilol entresto, Positivo: O 1 controla salo 2controla o coração o pressao, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inalapril, Positivo: No começo normal, Negativo: Acostumei</p>
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacobitril valsartana, Positivo: Melhora de classe funcional, redução de internação e morte, Negativo: Hipotensão arterial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril , Positivo: Melhora parcial de classe funciona, Negativo: Hipotensão arterial e piora de função renal</p>
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril e valsartana , Positivo: Melhora de classe funcional, redução de internação , Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, losartana , Positivo: Melhora de classe funcional , Negativo: Piora de função renal, hipercalemia</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tomo esse medicamento há um ano. Ele mudou minha vida. Tenho insuficiência cardíaca. É um remédio relativamente caro e toda população deve ter acesso a esse medicamento, e não apenas que,pm pode pagar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103, Positivo: Melhora pressão, menos cansaço, mais resistência a exercícios ou caminhadas e terreno em aclive, não causou efeitos colaterais. Mudou minha vida para melhor. , Negativo: No início baixou muito a pressão. Com o uso contínuo voltou ao normal e estabilizou dentro do limite esperado. Até hoje foi o melhor hipertensivo que tomei.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana potássica, captopril, somalgin,, Positivo: Captopril funcionou apenas no início. Depois não tinha o efeito hipotensor. Losartana é bom mas senti uma melhora significativa quando o substituí pelo entresto. , Negativo: Captopril não tinha o efeito hipotensor esperado depois que o corpo se acostumava com ele e tinha que elevar as doses para continuar com o efeito esperado. Losartana não teve efeito negativo.</p>
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Diminuição de mortalidade, internação por IC, melhora da qualidade de vida, Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora clinica a despeito do uso de outros vasodilatadores, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, Positivo: Custo e melhora clinica, Negativo: Piora de funcao renal</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na qualidade de vida , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Um medicamento muito bom</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vasartana, Positivo: Mantem controlada ha pressão arterial, Negativo: Nao teve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: padax, Positivo: Afinar o sangue, Negativo: Nao tem</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação é muito cara, sou paciente , ganho um salário minimo, necessito desse medicamento para manter- me vivo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou minha qualidade de vida, controlou os sintomas da doença. , Negativo: Nenhuma contra indicação com o uso do Entresto</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio, me deu uma outra perspectiva, pois antes a minha vida estava limitado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu tio faz uso do Entresto, e graças esse medicamento está tendo qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: A doença foi controlada, voltando a ter qualidade de vida., Negativo: Nenhuma contra indicação.</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remedio importante para cardíacos que o estado deve ajudar a distribuir e salvar vidas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Menos cansaço, menos falta de ar, Negativo: Não tenho nenhum para listar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Espirolonactona, rosovastatina calcica, ancoron, furosemida e a.s., Positivo: Meu coração ainda funciona , Negativo: Nada a listar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Paciente com melhora importante de sintomatologia em pouco tempo de uso da medicação . Além de apresentar remodelamento cardíaco , Negativo: Não identifico nenhum até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol losartana enalapril , Positivo: Estabilização do paciente , Negativo: As vezes difícil manejo de otimizar medicações ; tolerância ; e efeitos colaterais como tosse , hipercalemia</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, lasix, aldactone, Positivo: Melhora icc, Negativo: Tontura</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lasix, carverdilol, Positivo: Melhora a icc, Negativo: Tontura</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nenhum, Positivo: Melhora a saúde, Negativo: Muito caro</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Discordo pois devido o valor do medicamento Entresto, fica dispendioso para as pessoas de baixa renda.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aldactone, Losartana Potássica, Selozok /Zarmine 100mg, Positivo: Há anos que mim sinto bem, não precisei ser interna. , Negativo: Não senti nenhum.</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Disposição física, frequência cardíaca controlada., Negativo: Não há efeitos negativo até o momento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: FurosemidaLosartanaCaverdilolAasAtovastatinaEspironolactona, Positivo: Controle do ritmo cardíacoSangue mais fino nas artériasMelhoramento no controle de gordura no sangue, Negativo: Recanto na pelePerda de potássio</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha esposa previsa desta medicação 2x ao dia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prefiro não comentar , Positivo: Prefiro não comentar , Negativo: Prefiro não comentar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prefiro não comentar , Positivo: Prefiro não comentar , Negativo: Prefiro não comentar</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora das funções respiratória , Negativo: Não tivemos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou responsável pelo serviço de cardiologia de um grande hospital onde hoje atendemos mais de 3000 pacientes por mês todos pelo SUS. Temos um ambulatório de Insuficiência cardíaca hoje com mais de 300 ptes cadastrados e temos observado que com a chegada do medicamento sacubitril/valsartana observamos uma melhora dos sintomas, classe funcional e da fração de ejeção. Ressaltamos que os nossos pacientes com fração de ejeção inferior a 40% estão em uso do medicamento em questão. Ressalto também que temos conseguido retirar 90% dos pacientes da fila de transplante cardiaco desta forma creio que o medicamento deve ser incorporado ao arsenal de medicação para ICC guardado a suas indicações conforme estudos de grande impacto como Paradigm HF trial e Pionerr HF</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto (sacubitril/valsartana), Positivo: melhora dos sintomas Melhora na classe funcional melhora da Fração de ejeção, Negativo: 1 caso de angioedema em 175 pacientes em uso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: enalapril, ramiprilvalsartana, losartana, candesartanacarvedilol, nebivololfurosemidaespironolactonadigoxina, Positivo: cada medicamento descrito atua em determinada area na regulação neuro hormonal que é a base da patologia. Com estes medicamentos inibimos sistema simpatico, inibidor do sistema de angiotensina e aldosterona e atividade diuretica e inictropico positivo. O sistema dos peptideos natriureticos não eram abrangidos assim o inibidor da neprilisina veio a resolver esta lacuna., Negativo: tosse, bradicardia</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Não tive nenhuma rejeição , Negativo: Nenhuma</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto e carvedilol, Positivo: Melhora substância da classe funcional (Nyha), Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Atenolol, furosemida, espironolactona, digoxina, etc, Positivo: Melhoras dos sintomas, Negativo: Não alterou a sobrevida</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação traz vários benefícios para os pacientes com ICc, mas possui custo elevado, sendo inacessível para a maioria da população.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Estabilização do quadro, diminuição dá intercorrências, relato de melhora do quadro geral e conforto para o paciente., Negativo: Não verificados até o momento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Losartana, Positivo: NA, Negativo: Na</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na fração de ejeção., Negativo: Baixa a pressão</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Comprodamente eficaz recomendação pelas diretrizes 2a</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Redução de sintomas com melhora da qualidade de vida e sobrevida. Este medicamento associando aos já existentes nos protocolos de saúde foram a única opção para pacientes portadores de insuficiência cardíaca grave com rebaixamento da fração de ejeção que não poderiam mais se beneficiar com procedimentos de revascularização. Paciente já otimizados, Negativo: Pacientes com boa resposta</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Faço uso dos protocolos tentando otimizar os pacientes. Betabloqueadores bra ieca espirolactona , Positivo: Efeitos positivos são conhecidos pelas evidências já relatadas nos diversos trabalhos publicados, Negativo: Betabloqueador / ieca tosse , hipotensão</p>
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho boas experiências na prática clínica com o uso de Entresto e já considero uma medicação indispensável no arsenal terapêutico da ICC.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora rápida dos sintomas e redução nas hospitalizações, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bra, ieca, betabloqueador, ivabradina, espirolactona, trimetazidima, diuréticos , Positivo: Todos em associação melhoram os sintomas com menos rapidez, Negativo: TosseHipotensão Insuficiência renalNão resposta clínica</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, remédio fundamental no tratamento de IC</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto 24/36, Positivo: melhora nos controles de arritmia e frequência , Negativo: não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metoprolol, Positivo: baixo custo, Negativo: sudorese e queda da acentuada da pressão arterial</p>
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho vários pacientes em uso da medicação que apresentaram melhora clínica e ecocardiográfica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/vasartan , Positivo: melhora da fração de ejeção, melhora de classe funcional, melhora de qualidade de vida , Negativo: hipotensão em alguns pacientes, controlada com redução da dose</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bloqueadores do sistema renina-angiotensina, Inibidor da enzima de conversão de angiotensina , Positivo: melhora funcional (não tão evidente como com sacubitril/vasartan) , Negativo: tosse, hipotensão</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é excelente e seu custo é relativamente alto, com o salário q um aposentado não tem possibilidade nenhuma de fazer uso desta medicação. Por isso sou favorável a distribuição gratuita do SUS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu pai faz uso a 10 meses do Entresto 49/51 mg, Positivo: Sua capacidade cardíaca aumentou consideravelmente, diminuindo as crises respiratórias., crises estas q o levou inúmeras vezes ao hospital, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concor 5 mg, Positivo: Meu pai faz uso associado ao Entresto do concor, Negativo: Não tem</p>
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento revolucionário, devendo ser estendido a todos com indicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem de chegar pelo SUS sim. Caro para a maioria da população.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora considerável no quadro geral após uso., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol., Positivo: Idem 8.2, Negativo: Idem 8.3</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: Melhora cosideravel na qualidade de vida, mais disposição, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora cosideravel na qualidade de vida, mais disposição, Negativo: Nenhum
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Meu pai estava com um insuficiência cardíaca grave, com o uso da medicação e retorno ao médico para avaliação teve ótima recuperação., Negativo: Não teve contra indicações ao medicamento 3ª - Não
12/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Alto custo ideal seria distribuição rede pública!!! 2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTOR 49/51, Positivo: Efeitos colaterais praticamente nada !!!, Negativo: Preço muito elevado !! 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTOR , diovan , Positivo: Os dois são excelentes , Negativo: Preço elevado !!!Dificuldade para manter tratamento!!!
12/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nós aposentados nao temos como desembolsar de 20 a 30% de nosso salário, pois temos mais despesas com outros medicamentos , alimentação, água, luz,etc.... 2ª - Não 3ª - Não
12/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nós aposentados nao temos como desembolsar de 20 a 30% de nosso salário, pois temos mais despesas com outros medicamentos , alimentação, água, luz,etc.... 2ª - Não 3ª - Não
12/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio muito caro , não tenho condição de comprar , preciso desse remédio. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Vários, mas o entresto me dru nova vida, Positivo: Nada comparado ao entresto, Negativo: Não sentia nenhuma melhora 3ª - Sim, como paciente, Qual: Concor 05Concor 10, Positivo: Nenhum, Negativo: Muito cansaço
12/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Redução de risco de morte e necessidade de hospitalização, Negativo: Pressão arterial baixa, tosse, cansaço. 3ª - Não
13/12/2018	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 41/56mg., Positivo: Melhora nos batimentos cardíacos., Negativo: Baixa a pressão, ânsia de vômito.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Alto custo e necessidade</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 97/103, Positivo: Garantia de saúde, Negativo: NA</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aprove150, Positivo: Não tinha o mesmo resultado, Negativo: NA</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho necessária essa medicação entrar no plano.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Melhora significativa do músculo cardíaco , Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não , Positivo: Nao, Negativo: Nao</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento está tendo ótimos resultados e custo é muito elevado</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto é o primeiro em avaliação , Positivo: Segundo meu médico o resultado está excelente , Negativo: Não identifiquei nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atacand, Atenolol, Positivo: Enquanto utilizei esses medicamentos o efeito foi positivo, Negativo: Não houve efeitos negativos</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: sacubitril/valsartana, Positivo: Melhorou o inchaço e cansaço , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, elanapril, furosemida , Positivo: Não teve , Negativo: Não melhorei</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Não precisou fazer cirurgia, Negativo: Não sei dizer</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O acesso deve ser gratuito</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: O paciente ficou mais disposto, Negativo: Causa mal estar no início do tratamento</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ENTRESTO, Positivo: Melhora da qualidade de vida (sono , atividade física e respiração), Negativo: Não observei nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ENALAPRIL, Positivo: Bom até certo ponto, Negativo: Não observei nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento tem provado no meu caso,, sua eficiência,. Com a adoção desse medicamento pelo SUS, muitas outras pessoas poderão ser beneficiadas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Captopril., Positivo: Reduz a pressão arterial, aliviando a pressão sobre o coração., Negativo: Captopril provoca tosse.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: É um medicamento que está sendo testado pelo meu médico, e aos poucos tem observado os seus efeitos positivos., Negativo: Ainda não pode ser observado.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho q por ser um bom medicamento os pacientes do SUS devem ter acesso</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Melhorou muito os meus sintomas. , Negativo: Não percebi nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Não me lembro, Negativo: Não me lembro</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação de alto custo para a maioria da população e de imenso benefício a vida do paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26, Positivo: Sentido dores no coração... Hj estou renovado e feliz, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento melhora a qualidade de vida do paciente e pelo alto custo se faz necessário ser acessível a todas as pessoas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omeprazol, Sustrate, Enalapril, Positivo: Medicação comum., Negativo: Mal estar como tontura e náusea.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, espirolactona e hidroclorotiazida., Positivo: Todos mantém a pressão e frequência cardíaca estabilizadas., Negativo: Nenhum</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de auto custo com resultado rapido para ICC, onde pessoas de baixo poder aquisitivo nao conseguem ter acesso</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora no cansaço diario (respiratorio) em atividade simples xomo caminhadaMais vigor e animo diarioMaior disposicao, Negativo: Medicamento de auto custo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Carvedilol e outros que nao acompanhei à epoca, Positivo: Nao tenho conhecimento pois nao participava ativamente do tratamento da pessoa, Negativo: Idem acima</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento está sendo muito bem aceito e devexser fornecido a pessoas carentes pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Controle da pressão arterial, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Captopril, Losartana, Positivo: Entretanto consegui manter a saúde de minha mãe, Negativo: Muita tosse e vc pressão não controlava</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já uso este medicamento a 1 ano e já tive melhora.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Meu coração batia 42% e no último exame o resultado foi 47%.Estou me sentindo bem melhor. , Negativo: Não observei nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, mas não estava fazendo efeito desejado. , Positivo: No início, depois teve que trocar., Negativo: Eu me sentia muito cansada depois de qualquer atividade diária.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muito caro, embalagem desnecessária em tamanho.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51mg, Positivo: Remédio específico para meu problema cardiaco , Negativo: Preço, tamanho da embalagem.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma medicação muito caro nem todos pacientes pode comprar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: 51/49 mg 60 unidades , Positivo: Essa medicação salvou a vida da minha mãe. , Negativo: Não observei nada negativo</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tomo esse medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto/26 mg, Positivo: Bom para insuficiencia cardiaca, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol,espironolactona, rosuvastatina, omeprasol, aas, Positivo: Todos me fazem muito bem, já tomo a 3 meses, Negativo: Sem efeito negativo</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora do quadro de icc, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril,selozok,ritmonorm, Positivo: Não houve efeito esperado , Negativo: Agravou o quadro</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de alto custo e com resultados satisfatórios no paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhor qualidade de vidaAusência de fadigaAusência de inchaço , Negativo: Não observado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CarvedilolFurosemida, Positivo: Leve melhora na qualidade de vida, Negativo: Presença de cansaçolda várias vezes ao ex para urinar</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O entresto melhorou de forma contundente minha qualidade de vida. Eu estava mal e foi o que me levantou.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Aldactone e outros, Positivo: Me senti mais forte (estava debilitado), voltei a andar com mais segurança, sem uso de andador, melhorou muito minha disposição, não sinto o cansaço que sentia antes, Negativo: Sem efeitos negativos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103, Positivo: Melhora significativa na insuficiência cardíaca. Minha fração de ejeção melhorou muito depois que comecei com Entresto, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, Positivo: Foi bom, mas o Entresto melhorou muito o cansaço., Negativo: Não tive</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Indicação médica com efeito comprovado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora geral, Negativo: Sem efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Naprix, Positivo: Baixa pressão arterial, Negativo: Tonturas desmaios</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem se mostrado eficiente no controle, e estado geral da usuária.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto nas três dosagens. Progressivamente, Positivo: Paciente com 94 anos, cardiopata, hipertensa, diabética, com congestão pulmonar frequente. E rins com comprometimento nível 5. Tem auxiliado no controle., Negativo: Não consigo identificar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: CaptoprilValsartanaMetildopa, Positivo: A preocupação dos médicos com as consequências sobre os rins. E a ocorrência de congestão pulmonar., Negativo: Não consigo identificar.</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Me sinto melhor com esse medicamento, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: No momento não me lembro, Positivo: Nenhum, Negativo: Não surtiu o efeito desejado. Me senti com muita fraqueza e indisposição para realizar tarefas</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diante do resultado alcançado positivo no tratamento de minha mãe, não posso concordar com tal recomendação. Ela se encontrava muito mal, necessitando de internações em curto espaço de tempo, a introdução dessa medicação reverteu esse quadro.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Passou a não sofrer com acúmulo de líquidos e a ter a pressão arterial controlada., Negativo: Não observamos até o momento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Passou a não acumular líquido no abdômen e pulmão e ter a pressão arterial controlada., Negativo: Não observado</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Deveria ser da farmácia popular</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alequis ictus trayenta, Positivo: Bom resultado, Negativo: Não teve</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Menor número de eventos de morte súbita.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: digitaisdiurético e canitratosbetabloqueadores, Positivo: Todos contribuem para compensar o paciente com ICC, Negativo: Tosse, intoxicação digitalica, hipercalemia, cefaléia, broncoespasmo, etc</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: digitaisdiurético e canitratosbetabloqueadores, Positivo: Todos contribuem para compensar o paciente com ICC, Negativo: Tosse, intoxicação digitalica, hipercalemia, cefaléia, broncoespasmo, etc</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio tem um custo alto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhor qualidade de vida, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque esse remédio entresto no meu caso e a última alternativa pois já usei todos que estão disponíveis no mercado, o município no caso a prefeitura de Franca me fornece através de ação judicial mais o estado mesmo eu tendo a ordem judicial estipulando multa de 100 reais por dia o estado vem negando a ordem judicial</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com todos os remédios disponíveis inclusive estou tomando tbm o carvedilol 25mg duas vezes ao dia, Positivo: Os efeitos são bons mais não é suficiente para minha insuficiência cardíaca somente com o entresto 97/103 duas vezes ao dia E que consegui estabilizar um pouco, Negativo: Não há efeito negativo somente positivo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com todos disponíveis no mercado, Positivo: Os efeitos são bons mas só com o entresto 97/103 duas vezes ao dia E que me sinto melhor, Negativo: Não há efeito negativo somente positivo</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu preciso muito deste remédio porque me sinto muito</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, vastarel e sustrate, Positivo: Sinto menos cansada, Negativo: Não tenho nem uma</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Ne senti muito bem sem dor, Negativo: Nem um pouco</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Custo muito alto para pacientes que fazem uso contínuo do medicamento...como eu.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: Melhora das condições de funcionamento da função cardíaca., Negativo: Além do alto custo, desconheço os efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Depois que minha esposa passou a usar este medicamento a ida dela a rede de saúde diminuiu em 90%,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com O. procoralam, mas este medicamento aumenta a creatinina, Positivo: Procoralam aumenta a fração de ejaculação mas em compensação aumenta em muito a creatinina, Negativo: Aumento na creatinina</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Procoralam, Positivo: Aumento da fração de ejaculação, Negativo: Aumento da creatinina</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 49/51, Positivo: Com o uso de medicamento o inchaço dos pés e pernas diminuiu devido ao acúmulo de líquido., Negativo: Não notamos pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Captopril, Positivo: Nada a declarar, Negativo: Não fez o efeito desejado, pois meu pai teve Taquicardia, dores no peito e palpitações</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapryl - candessa, Positivo: Enalapryl não foi suficiente e me causou uma disgeusia. Então o cardiologista mudou para Candessa., Negativo: Enalapryl causou disgeusia.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103, Positivo: Melhora significativa na insuficiencia cardiaca, melhora no cansaco, melhora na disposicao., Negativo: Nao houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, Positivo: Foi bom, mas o Entresto apresentou melhoras mais rapido, Negativo: Nao senti</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xarelto 20 mg, Positivo: Me sinto muito bem com o medicamento..., Negativo: Não tive efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xarelto, Positivo: Me sinto muito bem..., Negativo: Não tive efeitos colaterais</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou a falta de ar e cansaço , Negativo: Apenas o valor que é bem alto</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril/valsartan, Positivo: diminuição de reinternações e de morte súbita conforme as publicações mostram. Melhor compensação em casos de refratariedade ao IECA/BRA, Negativo: Hipotensão arerial sintomática em alguns casos.Custo da medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA/ BRA, Positivo: Diminuição de morte cardiovascular e melhora da classe funcional., Negativo: Alergias, hiperpotassemia, hipotensão</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser incorporado ao SUS todo remédio de uso contínuo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Reduziu minha pressão arterial, pois esta é alta., Negativo: Sinto muito cansaço.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, Captopril, Positivo: É de graça, Negativo: Não abaixou minha pressão!</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26, Positivo: Sinto me bem tornando o., Negativo: Não observei nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entrsto 24/26., Positivo: Me sinto bem com ele., Negativo: Não observei nenhum.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento não tem preço acessível</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Desde que comecei utilizar não passei mais m, Negativo: Nao tenho efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartan, Positivo: Losartana não estava atendendo meu quadro clinico, Negativo: Losartana não estava atendendo meu quadro clinico</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Senti uma melhora muito grande, inclusive parei de engordar, Negativo: Não achei</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Não achei, Negativo: Me engordava demais</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24mg e concor 5mg, Positivo: Aumento da capacidade cardíaca e não prejudicou minha pressão como antes o carvedilol fazia., Negativo: Preço alto gasto 300,00 por mês e estou desempregada por conta desse problema cardíaco e retenção líquida me sinto inchada e engordei 3 quilos</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhor disPosição, respiraçãooffim Da tontura, Negativo: Baixa pressao</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Marca-passo ablação cat. StentEntresto concor vastarel atlansil aas diureTicos clopidogrl, Positivo: Mellhor disposição respiração , Negativo: As vezes pressão baixa</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remedio para tratamento continuo obrigatório, assim como outros dessa importância que são incorporados no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável a distribuição desta medicacao para atender as pessoas com insuficiência cardíaca de baixa renda.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na fração de injeção cardíaca., Negativo: Queda de pressão.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, aldactone, Losartana., Positivo: Na utilização do composto acima tive uma pequena melhora na fração de injeção cardíaca., Negativo: Queda de pressão.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nós pobres não podemos pagar altos valores,e precisamos desse medicamento, ele é muito bom!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entreato,estou usando 49*51 no momento!, Positivo: Entreato mantém controle da pulsação!, Negativo: Entreato me retém bastante líquido que extraímos com diurético!</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe usa essa medicação a um ano....fazia 70 dias de internação quando começou a tomar essa medicação e ela está bem graças à Deus. Foram 77 dias de internação e duas pontes de safena.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 49/51 mg., Positivo: Minha mãe teve uma melhora incrível...os médicos disseram que iam administrar o que tinha de mais moderno de medicação na cardiologista., Negativo: Não observei nenhum efeito negativo.Apenas o preço porque é muito caro.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu faço uso contínuo deste medicamento e sou aposentado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Me sinto mais disposto. A pressão arterial normalizou. A arritmia normalizou, quer dizer não tenho mais esse problema. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Medicamente essencial para a minha sobrevivência , Negativo: TonturaSeja e mau estar</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de alto custo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso Entresto como tratamento após sofrer enfarto , Positivo: Recuperar áreas danificadas no coração , Negativo: Não observados</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na qualidade de vida e diminuição de hospitalização, Negativo: Valor</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Enalapril, monitorato de isossorbina, Positivo: Melhora na pressão arterial, Negativo: Insuficiente para insuficiência cardíaca</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O medicamento vem mostrando bons resultados para mim, apesar de alguns efeitos colaterais, como a diminuição da pressão.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sucubitril/valsartana, Positivo: Diminuição de palpitações e cansaço., Negativo: Pressão muito baixa, sonolência.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caverdilol, Losartana., Positivo: Bem estar, Negativo: Sem efeitos visíveis</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhor condição de vida para a paciente, com insuficiência cardíaca grave melhorou bastante seu estado., Negativo: Como faz uso contínuo ,o custo do medicamento é muito alto pois não é só o entresto que utiliza.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Faz uso de carvedilol ,ictus,corselct,aldactone,sivastatina,lasix,faz nebulização com berotec,atrovent.Faz uso de insulina e Galvusmet para controle da diabetes tipo 2., Positivo: Todos,fizeram a paciente viver com mais qualidade de vida., Negativo: Carvedilol e aldactone foram suspeitos pq fizeram a paciente sofrer hipotensão.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por se tratar de um medicamento caro, e muito importante na vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Reduziu consideravelmente os ruins sintomas q sentia devido o coração fraco., Negativo: Não me sentia tão bem com o enalapril e o bisoprolol</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bisoprolol e inalapril., Positivo: Vim a me sentir melhor com o entresto.Parou minhas falta de ar, pqnas dores no peito,e umas fisgadas q davam no peito e uns tremorsinho tbm., Negativo: Baixava muito minha pressão, me dando muita sonolência, desânimo, e os sintomas todos q indemiquei a cima, sentia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho o problema, tomei o remédio quase um ano e me sentia super bem</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Falta de ar melhorou O cansaço melhorouConseguia dormir melhorFiquei um tempão estável sem ser internada, Negativo: Prejudicou meu rim, por esse motivo não consegui mais tomar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana , Positivo: Me mantém estável , Negativo: Não detectado até agora</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existe muitas pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca, sendo que além de pagar o acompanhamento cardíaco, que o Sus não fornece de qualidade, ainda, tem que comprar os remédios que são super caros. Quando muitos não tem condições.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Salsartona, Positivo: Muito bom, o efeito foi imediato e ótimo, Negativo: Para mim não teve negativo, somente a questão do preço.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Fez com que meu pai tenha melhor qualidade de vida, Negativo: Não teve. Só o preço</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO 24 MG, Positivo: ME TIROU DA CAMA, Negativo: NÃO HOUE</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tomo este medicamento e tem uma eficácia muito boa</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26 e 49/51, Positivo: Estabilizou os sintomas, Negativo: Não tive,</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26 e 49/51, Positivo: Estabilizou os sintomas , Negativo: Não tive</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é muito importante para o tratamento de pessoas com problema cardíaco, porem o preco nao e acessivel para toda a polulacao pois e muito caro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou tomando o entresto 100/25, sinvastacor 40, relvar 100/25, levotiroxina 50, pantoprazol 20, aldactone 25, selozok 100, aspirina prevent 100., Positivo: O coração estava com 40 por cento e depois do uso desse medicamento evoluiu para 43 por cento., Negativo: Não ouve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Naprix 2,5 dentre outros, Positivo: Ajudou na recuperação., Negativo: Nao ouve.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: melhoria na qualidade de vida, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ancorom, Positivo: melhoria na qualidade de vida, Negativo: nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas tem que ter acesso mais fácil ao medicamento, até porque é um produto caro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Diminuição de crescimento do coração , Negativo: Custa caro pra quem necessita tomar diariamente</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estão baseando apenas no preço. Se tivesse alguma substância na fórmula que fosse prejudicial, aí sim não deveria ser incorporada.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: O coração trabalha compassado. Sem aquela taquicardia. , Negativo: O preço é muito alto. O medicamento por enquanto não apresentou efeitos prejudiciais.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilat , carvedilol, Positivo: Os mesmos do Entresto. , Negativo: Com o passar do tempo, o organismo ja não responde corretamente ao medicamento e ha a necessidade de troca.</p>
17/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo. Sou a favor desse medicamento pelo SUS, pois nem todos tem dinheiro para comprar esse medicamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Não teve nenhuma...Só melhor , Negativo: Nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Carvedilol Enalapril Ancoron Esperilactona Digoxina Marevan Furosemida e o Entresto , Positivo: Todos só melhorou o quadro da doença , Negativo: Nenhuma</p>
17/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Bom medicamento para ICC</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da FE, Negativo: Baixa da PABBB</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Digoxina, Positivo: Melhora do quadro de ICC, Negativo: Aumento da mortalidade</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Por haver pessoas que não tem condições de comprar todo mês como eu.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Somente o entresto, Positivo: Este medicamento melhorou muito meus dias diminuindo o cansasso e a falta de ar durante uma leve caminhada, Negativo: Não tenho nada a reclamar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Positivo: Muitos pontos positivo, Negativo: Nada a reclamar.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento caro e essencial segundo orientação médica, não posso deixar de tomar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora o batimento cardíaco , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tomava anteriormente Digoxina 0,25 mg a qual me sentia mal. Passei a Tomar essa medicação Entresto , agora dou outra pessoa.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Digoxina , Positivo: Não me adaptei a Digoxina (muitas náuseas, tonturas sensação de cansaço físico , Negativo: Náuseas, Sudoreses, cansaço e mal estar constante(Digoxina)</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Digoxina , Positivo: Entresto, me sinto muito bem, Negativo: Nenhum</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103mg, Positivo: Positivo, Negativo: Nao tem efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caverdilol 25mg Espironolactona25mgFurosemida40mgGlinfagexr500mgIvabradina(procolaran)5mgGlicazidamr60mgSivastatina20mgJardiance 25mgOmeprazol20mg, Positivo: Muito bom, Negativo: Nao tem efeito ruim</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, losartana, spiro lactona, Positivo: Tudo bem, Negativo: Sem efeito</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acima, Positivo: Acima, Negativo: Acima</p>
17/12/2018	Instituição de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O referido medicamento promove redução de mortalidade cardiovascular bem como redução nas internações por IC.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora na qualidade de vida, melhora na capacidade de exercício, redução de mortalidade cardiovascular, redução de internações por descompensação da IC., Negativo: Não há efeitos negativos quando comparado com IECA ou BRA.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECAs, BRAs, espironolactona, beta bloqueadores., Positivo: Todos eles promovem redução de mortalidade e melhora na qualidade de vida., Negativo: Não existem efeitos negativos frente aos benefícios apresentados.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo pois este medicamento esta trazendo muito benefícios de melhoras para os pacientes</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto pradaxa ancoron cardilol entre outros muito bom eu já estive uma grande melhora es relação a meu poblema clinico, Positivo: efeito positivo foi com está medicação de entreposto melhorou o bastante satisfatório o meu poblema cardíaco , Negativo: Até em tão não vi efeito negativo para esta em questão</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto pradaxa âncora entre outros estes medicamento correspondeu dentro das minhas expectativas , Positivo: Efeito positivo para o meu quadro clínico , Negativo: Até então no momento não tenho a reclamada</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: ESTA SENDO MUITO EFICAZ NO CONTROLE DA PRESSAO ARTERIAL, Negativo: CAUSA TONTURA</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: METILDOPA 300MGNEBilet 10MG , Positivo: NÃO HOVERAM, Negativo: NAO CONTROLAVA A PRESSAO ARTERIAL</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento de alto custo. O SUS serve para ajudar pessoas que não podem adquirir este medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhoria da qualidade de vida, possibilidade de praticar e exercícios físicos e ter uma vida normal. O que para o paciente com Insuficiência Cardíaca não é possível., Negativo: Não observei nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Carvedilol, Positivo: A curto prazo melhoras, mas depois passou a não fazer efeito., Negativo: Causou DPOC</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: A melhora da insuficiência cardíaca foi rápida e mudou a qualidade de vida dos meus pais e da minha sogra., Negativo: Não observado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Teve vários, porém sem melhora do quadro de insuficiência cardíaca, Positivo: Não houve melhora, Negativo: Um deles causou problemas com a cisão da minha mãe.</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Entresto foi o q colocou minha mãe a vida normal novamente e com os custos muito alto para a realidade dos aposentados, deveria sim estar na lista de remédios liberado no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O Entresto, Positivo: Minha mãe estava sendo internada muitas vezes pela insuficiência cardíaca, com a administração do Entresto, nunca mais houve complicações, ela leva uma vida normal., Negativo: O preço muito alto, para manter a medicação, o orçamento teve q sofrer alterações.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É direito de todos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os cardiologista particulares prescrevem</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 24mg/26mg, Positivo: Estabilizou a pressão arterial normalizou, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dioxano 320 HCT, Positivo: Normalizou-se pressão , Negativo: Não teve</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que deveria ser estendido para todas as classes (I - IV)</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Não tenho mais câimbras , Negativo: Sonolência e coceira na garganta</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartan 50mg;Carvedilol 25mg;Furosemida 40mg, Positivo: Losartan 50mg - PA baixaCarvedilol 25mg - FC controlada e menos de 1% de arritmia em 24hFurosemida 40mg - controlava o excesso de líquido , Negativo: Câimbras e fraqueza nas pernas.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é muito bom</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Intrepto, Positivo: Controle da arritmia ., Negativo: Não observadi</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eliquis, Positivo: Bom controle, Negativo: sem efeitos negativos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Insuficiência controlada segundo cardiologista, Negativo: Não houve 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO 97/103, Positivo: Tomo a dosagem mais alta, é excelente o produto. Melhorou significativamente minha insuficiência cardíaca. Minha fração de ejeção melhorou muito após começar o tratamento com o Entresto, Negativo: Não houve 3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, Positivo: Foi bom, mas o Entresto respondeu mais rápido, Negativo: Não tive
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Eu utilizo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu utilizo o entresto e cardivilol, Positivo: Não tenho, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Cardivilol, Positivo: Me sinto bem, Negativo: Nenhum
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente e usuária do sacubitril/valsartana gostaria de salientar que o parecer não favorável colabora para o aumento de internações e possíveis óbitos e o aumento considerável de custos aos pacientes e ao governo. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do Entresto, Positivo: O Entresto me possibilitou diminuição do cansaço, da falta de ar e reincidência de internações , Negativo: Nenhum 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente e necessito da medicação e assim como outros também. Para precisa o medicamento é imprescindível mas caro para muitos. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora da função cardíaca em geral, Negativo: Preço 3ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril valsartana, Positivo: Melhora, Negativo: Nenhum
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tínhamos um similar 80% mais barato, quando entrou o ENTRESTO, ficou muito caro, inviável para mim pois compro 4 caixas para eu e minha mãe mensalmente, o paciente fica encurralado. 2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO , Positivo: Nem positivo ou negativo, seu efeito é igual ao do similar, 80% mais barato , Negativo: O valor 3ª - Sim, como paciente, Qual: Não me recordo , Positivo: Valor mais em conta , Negativo: Ter saído de circulação para entrar o ENTRESTO
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26 mg, Positivo: Melhora na qualidade de vida para quem tem insuficiência cardíaca crônica. Chance de sobrevida para pacientes crônicos. , Negativo: Não observado até o momento!! 3ª - Sim, como paciente, Qual: CateterismoMedicamentos BetabloqueadoresBalão de oxigênio. , Positivo: Controle da evolução da patologia. , Negativo: Câimbras, hipotensão ortostática.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho insuficiencia cardiaca grave e cronica e esse medicamento pesa demais no meu orcamento de aposentada impedindo a compra de outros medicamentos que preciso tomar pra ter qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Só o Entresto mesmo, Positivo: Melhoria do cansaço diária nas minhas atividades diarias, Negativo: Não percebi nenhum efeito negativo a não ser o preço.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de grande eficácia, que mudou a minha qualidade de vida, de uso constante.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nunca fiz avaliação, porém uso os medicamentos, além do entresto 97 mg/103,mg: ANCORON 200 MG,M CARVEDILOL 3.135 mg, FUROSEMIDA 40 mg e ALDACTONE 25 MG., Positivo: Tomava outros remédios, mas minha deficiência cardíaca não melhorava. Quando passei a usar o ENTRESTO minha vida mudou e sinto-me muito melhor, com alegria de viver., Negativo: Infelizmente o preço de aquisição é elevado em relação ao meu rendimento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NAPRIX e CLORIDRARO DE AMIODARONA, Positivo: Início de tratamento, sm êxito esperado., Negativo: Apesar do uso regular não estava sentindo-me melhor</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Atacand e captopril, Positivo: Controle da pressão , Negativo: Ineficácia algumas vezes</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Os mesmos acima, Positivo: Os mesmos acima, Negativo: Os mesmos acima</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discorto pois meu Pai Valfrido depois q conecou a fazer uso do sacubitril/valsartana (entresto) teve uma melhora significativa em sua qualidade de vida. E o resultado nos exames realizados tbm comprovam isso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto (sacubitril/valsartana), Positivo: O cansaço foi reduzido teve melhora significativa nós exames de Ecocardiograma quando meu pai começou a fazer o tratamento com entresto tinha 27% das funções cardíacas após 1ano de uso do ENTRESTO suas funções cardíacas estão em 40%, Negativo: Antes do ENTRESTO meu não tinha melhora era apático pois estava sempre cansado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu pai usava Maletto de enalapril, Positivo: Não teve, Negativo: Tomava medicamento e não tinha melhora</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O CUSTO É MUITO ALTO PARA PESSOAS APOSENTADAS QUE NECESSITAM DO MEDICAMENTO</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ENTRESTO 24/26, Positivo: MELHORA DE SAÚDE PROGRESSIVAMENTE-, Negativo: ALTO CUSTO</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ENTRESTO 24/26CONCÁRDIO, Positivo: EFEITO RÁPIDO , Negativo: A CURTO PRAZO NENHUM</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para pacientes com dificuldade financeira seria ideal.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O paciente toma um conjunto de medicamentos para esse controle, como: carvedilol, entresto, digixona, clopidrogel, etc, Positivo: Insuficiência cardíaca controlada., Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Colocação de stencio na veia., Positivo: Melhora de 50°/°, Negativo: Nenhum.</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora cardíaca, Negativo: Diminuição da pressão</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento essencial para o tratamento de insuficiência cardíaca, porém é um remédio com um slto Custo, não sendo acessível para toda a população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento tem um custo muito alto e impacta muito no orcamento de um aposentado como e o caso de minha esposa que tem insuficiencia cardiaca grave e cronica. Impedindo muitas vezes e poder comprar outros medicamentos pra ter qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhororia do cansaço das atividades diaria de minha esposa, Negativo: Nenhum a nao ser o custo alto</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou muito os sintomas, Negativo: Baixa muito a pressão arterial</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concor, aldactone, naprix, Positivo: Pouca melhora, Negativo: Pouca melhora</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou muito os sintomas, Negativo: Baixa muito a pressão arterial</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concor, aldactone, naprix, Positivo: Pouca melhora, Negativo: Pouca melhora</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou muito os sintomas, Negativo: Baixa muito a pressão arterial</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concor, aldactone, naprix, Positivo: Pouca melhora, Negativo: Pouca melhora</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tomo o medicamento e me sinto bem</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: valsartana, Positivo: tem contribuído muito ,para o bem estar do paciente., Negativo: custo extremamente elevado.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, uso e acabou co. Alergia de outros medicamentos de pressão</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: MinipressAlindipinoLosartana, Positivo: Pressao abaixou, Negativo: Com o tempo surgiu alergia muita tosse</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Parou tosseBaixou pressao, Negativo: Ainda não teve 6meses de uso</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio caro, porem de efeito muito favorável</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Melhora do estado geral, com aumento da disposição física , Positivo: Idem anterior, Negativo: Não há efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clopidogrel, rosuvastatina, carvedilol, aldactone, aspirina, Positivo: Vide campo 8.1, Negativo: Não houve efeitos negativos</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Muito bom</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril cardiologista velou , Positivo: Foi ótimo , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento muito importante aos portadores de insuficiência cardíaca, mas, com custo elevado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26, Positivo: Melhora muito grande., Negativo: Nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Reduz drasticamente internaç</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Tratamento muito eficiente, Negativo: N&#257;o há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Maleato Enalapril Lasix, Positivo: N&#257;o há, Negativo: N&#257;o controlam corretamentr</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Acho que o SUS tem que dar de graça</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou a F.C e a P.A., Negativo: Erupções cutâneas e coceiras</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atenolol, furosemida, , Positivo: Melhorou a pressão, Negativo: Tornozelo inchado</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Excelente medicação reduz drasticamente internações</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: maleato de enalapril , lasiz, espirolactona, Positivo: Não há, Negativo: Não controlavam bem retenção de água</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Maleato de enalapril, Lasix, Positivo: Não há , Negativo: Não controlavam retenção de líquido e outros sintomas</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou paciente com ihipertensão e insuficiencia cardíaca, já utilizei vários medicamentos e somente com o entresto consegui estabilizar e normalizar minha pressão arterial e função cardíaca. A medicação é cara e muitas pessoas não tem como comprar o medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, nas 3 dosagens disponíveis, Positivo: controlou muito bem minha função cardíaca, normalizando ela, além de ajudar a controlar a pressão arterial, Negativo: não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: losartana, captopril, Positivo: não funcionaram, Negativo: não funcionaram</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe como milhares de pessoas fazem uso desta medicação contribuindo muito para a sobrevivência.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, este medicamento traz melhor qualidade de vida e diminui mortalidade na insuficiencia cardiaca</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: melhora a falta de ar, o paciente consegue caminhar, fazer suas atividades diárias, consegue ser mais produtivo, Negativo: não observado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: carvedilol, digoxina, Positivo: pouca melhora no quadro clinico, Negativo: muitos efeitos colaterais, arritmia cardiaca</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: SENTI MELHORAS E MAIS REGULARIDADE NO MEU BEM ESTAR, Negativo: NÃO SENTI EFEITOS NEGATIVOS</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora falta ar, Negativo: Taquicardia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora falta de ar, Negativo: Taquicardia</p>
14/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora dos sintomas relativos a ICC (dispneia, ortopneia...) e da qualidade do músculo cardíaco e da qualidade de vida do paciente. , Negativo: Risco de hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Digoxina, Positivo: Melhora de alguns sintomas sem recuperação do músculo cardiaco, Negativo: Intoxicação digitalica.</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Me senti muito bem com o medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Valsartana, Positivo: Mais disposição no dia a dia., Negativo: Dor no estômago mais o problema foi resolvido com omeprazol.</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Não entendi essa pergunta.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Me senti muito bem com o medicamento. , Negativo: Dor no estômago mais o problema foi resolvido com omeprazol.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Aumentar acesso a tratamento de pacientes sem condição financeira</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora clinica, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Amiodarona, Positivo: Com entresto melhora mais consistente do quadro de ICC, Negativo: Com amiodarona complicações tireoideanas</p>
14/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Segundo os ultimos estudos a medicação tem importante papel na melhora dos sintomas e prognostico da insuficiencia cardiaca com disfuncao ventricular, diminuindo taxa de internação e mortalidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Entresto : melhora importante de classe funcional (sintoma) dos pacientes com disfuncao ventricular, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ieca e bra, Positivo: Prognostico da ic, Negativo: Insuficiencia renalAlergia</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26, Positivo: Melhoras na minha condição cardíaca, Negativo: Não tenho conhecimento suficiente para responder.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Captopril e carvedilol, Positivo: Sobreviver desde 2004 até o presente momento., Negativo: Não tenho conhecimento suficiente para responder.</p>
14/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Um tratamento adequado e de melhor qualidade e eficiência é direito de todos, sem distinção e é dever do estado. Recortes populacionais são desumanos. Saúde de ponta deve estar disponível para todos no SUS. Devemos exigir que o dinheiro recolhido com os impostos seja usado para a saúde da população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medição presente nas diretrizes atualizadas de tratamento da insuficiência cardíaca. indispensavel</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora expressiva da qualidade de vida e redução do número de internamentos hospitalares desses pacientes , Negativo: Raros casos de hipotensão com fácil manejo somente com readequação de dose deste e de outros medicamentos utilizados no tratamento da ICC</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trato insuficiência cardíaca há 33 anos e já utilizei todo arsenal disponível , Positivo: Melhoraram muito após uso do sacubitri/valsartana, Negativo: Efeitos colaterais normais dos medicamentos</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, uso atualmente entresto 97-103 e tive uma orientacao de minha medica cardio que iniciasse esta medicacao tem ja 6 mese para 7 e ja na fase maxima.....melhorei 100%</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: exelente, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: entrestoacho que poderia fazer parte do sus., Positivo: exelente para IC, Negativo: nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É difícil acompanhar um paciente com ICC, vivi uma experiência muito triste, meu pai devido maldita doença de chagas, doença negi</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Amiodarona, cavervdilol, cárdio desfibrilador implantável, Positivo: Amiodarona por alguns anos controlou a taquicardia ventricular do meu pai carvedilol betabloqueador , reduz efeito adrenérgicos, CDI, principal terapia nas arritmias do meu pai, em alguns eventos interveio em fibrilação ventricular, Negativo: Amiodarona efeitos adversos, alta toxicidade, causou hipotireoidismo no meu pai, reações negativas no pulmão</p>
15/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Por que é justo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sem comentarios</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fator 8 recombinante , Positivo: Tratamento de profilaxia em hemofílico, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento faz toda a diferença na vida de uma pessoa com insuficiência cardíaca! É preciso que o acesso seja garantido às pessoas que não tem condições de arcar com seu alto custo!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora efetiva do sintoma da insuficiência cardíaca. Resultado muito significativo nos exames médicos referentes ao funcionamento do coração. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Procorolan, Positivo: Nenhum , Negativo: Aumento dos sintomas da IC inclusive com internação do paciente.</p>
15/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes não estão melhorando com o tratamento convencional, estão cada vez mais doentes. Com necessidade de maior número de retornos e internações!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Melhora importante dos sintomas em pacientes refratários ao tratamento convencional , Negativo: Valor da medicação. A maioria para o uso após 3 meses devido o custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os IECAS; BRAs; Diuréticos; vasodilatadores e afins disponibilizados para o tratamento da ic , Positivo: Melhora dos sintomas e da qualidade de vida até certo ponto em uma parcela dos pacientes , Negativo: Cada vez mais temos que associar drogas e a tolerância dos pacientes fica cada vez menor</p>
15/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora significativa dos sintomas e melhora na evolução da doença com melhor qualidade de vida , Negativo: Preço não é compatível com a maioria da população brasileira</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diurético ,inibidores da Eca ,betabloqueadores , Positivo: Melhora mais limitada dos sintomas , Negativo: Melhora discreta dos sintomas e os medicamentos ã melhoram a evolução da doença</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da qualidade de vida do paciente, Negativo: Preço do medicamento para a população</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Melhora da qualidade de vida do paciente , Negativo: Nenhum</p>
14/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento que vem mostrado resultados fabulosos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na qualidade de vida . Redução do ritmo de cansaço. Maior disposição , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso do Entresto 97mg/103mg</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Meliato de Enalapril , Losartana Potássica 50 mg e depois o Entresto, Positivo: Maleato de Enalapril paliativo Losartana Potássica -- ou - o Entresto excelente. , Negativo: nihil</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Meliato de Enalapril e Losartana Potássica e Entresto , Positivo: Meleato paleativo Losartana mais ou menos e Entresto excelente, Negativo: Nihil nenhum efeito negativo</p>
14/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Droga reduz mais de 20% mortalidade em relação terapia padrão . E é uma doença de alta mortalidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mais de 30 ENTRESTO de , Positivo: Melhora rápida de sintomas e menos internação , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, Positivo: Melhora sintomas , Negativo: Hipotensão a</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque não foi favorável ? Todos tem que ter direito ao medicamento gratuito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora a insuficiência, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo Paradigm foi o maior estudo de IC já realizado no mundo comparado Enalapril e apresentou os seguintes resultados:-20% de redução de risco de hospitalização por IC ou morte cardiovascular.-20% de redução de risco de morte súbita.OB> Minha experiência pessoal de pacientes sem esperança de resgatar qualidade de vida foi excepcional.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto 24/26 mgEntresto 49/51 mgEntresto 97/103 mg, Positivo: Melhora significativa dos sintomas que provocavam limitação física como fadiga, falta de ar, cansaço e fraqueza geral, sono normal, melhorando muito a qualidade de vida do paciente para a tranquilidade da família, além da não necessidade de internamento hospitalar.Muitos pacientes idosos, octogenários e nonagenários que se recusavam em internar preferindo morrer em sua residência foram resgatados a uma vida praticamente normal., Negativo: Na minha experiência pessoal, o grande fator negativo é a falta de poder aquisitivo de grande maioria dos pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com diuréticos, Inibidores da Eca, espirolactona, betabloqueadores e vasodilatadores coronarianos(tratamento Full da ICC), Positivo: Junto com a medicação do item 9.1 soma do a Sacubitril/Valsartana, com doses individualizadas conseguimos o Controle completo da ICC com recuperação da Fração de ejeção do Ventrículo Esquerdo, inclusive com pacientes em fase terminal, Negativo: Impossibilidade, por parte do paciente, para usufruir um tratamento que no meu entendimento, é um divisor de água no tratamento da ICCV.</p>
14/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora significativa da capacidade funcional!!!, Negativo: Por enquanto nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os que são indicados para ICC, Positivo: Melhora da capacidade funcional mas não tão significativa quanto entresto, Negativo: Tosse // Hipotensão</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Regulariza a pressão , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação em questão pode aumentar a sobrevida, diminuir o número de internações, e necessidade de transplantes cardíacos economizando recursos para o estado e beneficiando os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora clínica , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: I-ECA e BRA s, Positivo: São de conhecimento de toda a comunidade médica, Negativo: São de conhecimento de toda a comunidade médica</p>
14/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação com resposta clínica impressionante e com estudos bastante relevantes demonstrando diminuição de mortalidade e de internações com o uso da medicação. É uma droga com uma ação muito boa e com resposta clínica exuberante do paciente, trazendo benefícios visíveis</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartan, Positivo: Melhora de Classe FuncionalMelhora de qualidade de vidaMelhora de edemaMelhora importante de ascite (em pacientes que possuem secundária à Insuficiência Cardíaca)Importante ganho de capacidade física e consequente diminuição de caquexia cardíaca, Negativo: Hipotensão em raros casosPiora discreta de função renal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECAsBloqueadores de Receptores de AngiotensinaBetabloqueadores Diuréticos de AlçaDigitaisIvabradinaNitrato e Hidralazina, Positivo: Medicamentos com comprovada melhora de desfecho na IC , Negativo: Efeitos colaterais relacionados às drogas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos experiencias pessoais com pctes em uso e todos os estudos comprova o eceito benefico do sacubitril valsartana</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril valsartana, Positivo: Melhora de sintomas e retirada de pctes da fila de transplante cardiaco, Negativo: Apenas 1 pcte teve rash cutaneo importante</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: leca.. beta bloqueador... espironolactona, Positivo: Bons efeitos em relacao a morbi mortalidade, Negativo: As vezes nao podendo ser usados em pctes renais e dpoc</p>
14/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Reduz drasticamente internaç</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Tratamento muito eficiente, Negativo: N&#257;o há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Maleato Enalapril Lasix, Positivo: N&#257;o há, Negativo: N&#257;o controlam corretamentr</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora significativa e recuperação da válvula mitral., Negativo: Ainda não detectei efeitos colaterais e/ou negativa. boa</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Controle de pressão arterial, Negativo: Sem resposta satisfatória ao problema.</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamento ENTRESTO, Positivo: Tive uma melhora significativa no meu tratamento , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ESTOU ATUALMENTE APOSENTADO, E POR TER OS PROVENTOS DRASTICAMENTE REDUZIDOS, TENHO DIFICULDADE PARA COMPRAR O MEDICAMENTO.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO 49/51 E ATUALMENTE ENTRESTO 97/103., Positivo: COM O ENTRESTO 49/51 TIVE UMA PEQUENA DIMINUIÇÃO DO CORAÇÃO. ESTOU ATUALMENTE USANDO O ENTRESTO 97/103, E EM MARÇO DE 2019 VAMOS VER O RESULTADO., Negativo: O UNICO EFEITO NEGATIVO E A DIFICULDADE DE COMPRAR.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: LOSARTANA. , Positivo: MANTEVE-ME VIVO, Negativo: O CORAÇÃO NÃO DIMINUIU.</p>
14/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um familiar que precisa usar esse medicamento continuamente e ele não tem condições de comprar por ser muito caro e depende da solidariedade de outros para tomar o remédio.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na qualidade de vida do portador de deficiência cardíaca crônica., Negativo: Não tenho conhecimento.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Menos cansaço , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto., Positivo: Menos cansaço , Negativo: Nenhum detectado
14/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por experiência na prescrição para pacientes com insuficiência cardíaca avançada, , observando rápida e significativa melhora clínica e até mesmo na fração de ejeção ventricular, com redução da classe funcional de insuficiência cardíaca na grande maioria dos pacientes em curto período de uso da medicação. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora clínica com diminuição de sintomas como dispneia, melhor tolerância a exercícios, melhora de ortopneia, melhora da classe funcional e fração de ejeção ventricular., Negativo: Hipotensão porém bem tolerado pela grande maioria dos pacientes 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, B-bloqueadores, BRA, demais medicamentos disponíveis para tratamento de IC atualmente, Positivo: Pouca melhora sintomática, pacientes não percebem os benefícios da medicação no curto prazo., Negativo: Também causam hipotensão em alguns pacientes. Sem melhora clínica importante.
14/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, TEMOS OTIMOS RESULTADOS COM O USO DA MEDICACAO, COM MELHORA DA FRACAO DE EJECAO E REDUCAO DAS DIMENSOES ATRIAIS 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SACUBITRIL/VALSARTANA, Positivo: TEMOS OTIMOS RESULTADOS COM O USO DA MEDICACAO, COM MELHORA DA FRACAO DE EJECAO E REDUCAO DAS DIMENSOES ATRIAIS , Negativo: DOSES MAIORES PODEM ACARRETAR HIPOTENSAO , CORRIGIDA COM O REAJUSTE DAS DOSES 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSAO , Positivo: MELHORA DA CAPACIDADE FUNCIONAL , Negativo: PIORA DA FUNCAO RENALEDEMA ANGIONEUROTICOTOSSE CRONICA
14/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um retrocesso 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Mel hgora considerável nas internações e qualidade de vida , Negativo: Angioedema 3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Positivo: Discreta melhora, Negativo: Dispneia
14/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A medicação deve ser utilizada baseada no protocolo do estudo que dá suporte científico para o uso da medicação, o PARADIGM 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: n, Positivo: n, Negativo: n 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: n, Positivo: n, Negativo: n
14/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de um medicamento que salva vidas. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51mg., Positivo: Melhorou o cansaço e parou com as dores no peito , Negativo: Não tive ainda 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de um medicamento que salva vidas. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51mg., Positivo: Melhorou o cansaço e parou com as dores no peito , Negativo: Não tive ainda 3ª - Não
14/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A medicação deveria ser incorporada para pacientes que não melhorem com a terapia otimizada. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora clínica importante, melhora da fração de Ejeção e da classe funcional da NYHA, Negativo: Custo alto Hipotensão e não poder chegar a dose máxima preconizada 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, carvedilol, bisoprolol, metoprolol, espirolactona, digoxina, furosemida, losartana, ivabradina, Positivo: Todos já amplamente testados em estudos clínicos e na prática diária que diminuem mortalidade, internamento Melhoram qualidade de vida , Negativo: Enalapril-tosse e hipercalemia Losartana-hipotensão e hipercalemia Digoxina-astenia e bradicardia Furosemida-hipocalemia e alteração do da função renal Ivabradina-bradicardia Betabloqueador-hipotensão e bradicardia
15/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril Valsartan , Positivo: Melhora da classe funcional , Negativo: Nenhum 3ª - Não
14/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A indicação é para os pacientes em classe funcional II. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora de sintomas e de classe funcional III para II., Negativo: Hipercalemia. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betabloqueador/Ieca/diurético/, Positivo: Melhora da clínica, da classe funcional, da sobrevida e da qualidade de vida., Negativo: Efeitos colaterais das drogas.
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não recordo agora, Positivo: Não recordo agora, Negativo: Não recordo agora 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não recordo agora, Positivo: Não recordo agora, Negativo: Não recordo agora
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Muito bom, Negativo: Nenhum 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Hipertensão , Negativo: Controlou 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: entresto, Positivo: Melhora importante no quadro do paciente, Negativo: no momento não tenho relato 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: sacubitril/valsartana, Positivo: --, Negativo: -- 3ª - Sim, como paciente, Qual: atorvastatina, Positivo: --, Negativo: --
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento excelente porém preço altíssimo, por isso o SUS deveria disponibilizar 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Minha mãe usa o Entresto e a qualidade de vida dela melhorou 100% Porém devido ao alto custo ele está se inviável, Negativo: Preço muito alto 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Ainda em obs., Negativo: Não tem registro 3ª - Sim, como paciente, Qual: Nihil, Positivo: Nihil, Negativo: Nihil
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso da medicação, remédio que melhora a expectativa de vida do paciente, porém muito caro 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Foi o remédio que consegui usar , mesmo sendo hipotensa, Negativo: Nenhum até agora 3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários, tomo 7 ao dia, Positivo: Me mantém viva, Negativo: Uma queda de pressão, mas nada que não seja suportavel
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Minha arritmia desapareceu, meus batimentos cardíacos voltaram a normalidade , Negativo: Alergia na pele, uma grosseira. 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tomo Entresto desde julho de 2018 e os resultados são muito bons. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora significativa da capacidade cardíaca., Negativo: Desconheço 3ª - Não
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na condição de preços, muito caro.Pessoas com renda muito baixa fica inviável comprar. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Melhorou os sintomas da insuficiência , Negativo: Abaixou muito a pressão 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Qualidade de vida melhorou , Negativo: Não teve
15/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na condição de preços, muito caro.Pessoas com renda muito baixa fica inviável comprar. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Melhorou os sintomas da insuficiência , Negativo: Abaixou muito a pressão 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Qualidade de vida melhorou , Negativo: Não teve
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Rápida e eficaz melhora no estado de saúde , Negativo: Sem efeito negativo 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ótimo medicamento. Porém muito caro. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Me sinto muito mais disposto para fazer caminhada. Depois que comecei a usar o Entresto não senti falta de ar., Negativo: Não tem. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários remédios., Positivo: Me sinto bem., Negativo: Não tenho.
17/12/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha e usuária temos que comprar ela é aposentada 2ª - Sim, como paciente, Qual: Varios, Positivo: Melhora totalmente a respiracao, Negativo: Nenhum 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento foi muito importante para a minha recuperação. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Ajudo a fortalecer o coração depois da cirurgia., Negativo: Nenhum. 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso o medicamento e é muito caro... 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Melhora a qualidade de vida! , Negativo: Não senti 3ª - Sim, como paciente, Qual: HEMAX, Selozok e ancoron , Positivo: Todos atuam em conjunto. , Negativo: Não lembro.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio de alto custo o SUS tem que oferecer</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou muito a resistência cardíaca e qualidade de vida, Negativo: Nenhum a não ser o alto custo dele</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MiniUso o medicamento e é muito caro....</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Melhora a qualidade de vida! , Negativo: Não senti</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: HEMAX, Selozok e ancoron , Positivo: Todos atuam em conjunto. , Negativo: Não lembro.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: sacubritil valsartana, Positivo: Esse medicamento esta sendo muito bom para o tratamento cardiaco, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, NA</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou mto minha vida qualidade, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio é bom para minha mãe...melhorou um pouco a qualidade de vida dela...mas é muito caro e as vezes nos vemos impossibilitados de comprar...ficando dependentes de ganhar amostra grátis!!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: A melhora foi rápida em menos de 3 dias passaram os mal estar que sentia, Negativo: Nenhum ,só e muito caro um preço que nos assalariado não temos como pagar</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Ajudou muito meu sogro, Negativo: Não tem efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vastarel, Positivo: Ajudou muito, Negativo: Custo</p>
16/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento de uso contínuo, rigorosamente necessário para manter minha saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lotar, Positivo: Mantem a pressão arterial razoavelmente regulada., Negativo: Aumenta a micção.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o Entresto, minha a vó faz uso desta medicação, mais ela é cara e vem poucos comprimidos..., Positivo: Melhorou muito a pressão arterial dela e também as aritmias. , Negativo: Pelo que percebi, nela não houve reações.. 3ª - Não
15/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, esta associação mostrou benefício clínico com melhora da expectativa de vida 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril + valsartana, Positivo: melhora da classe funcional dos pacientes, Negativo: não observei 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores de ECA e Bras sem sacubitril, Positivo: melhora dos sintomas, Negativo: hipotensão
15/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento precisa ser gratuito 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Foi muito bom, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Amilton ,karvil, Positivo: Foram ótimos, Negativo: Nenhum
15/12/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, De uso contínuo e de alto custo. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Losartana; Furosemide, , Positivo: Controle da pressão arterial, Negativo: Não adaptação ao medicamento.
16/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Droga é muito importante para o tratamento da insuficiência cardíaca, melhorando muito os sintomas e também a internação hospitalar por ICC 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto Valsartana/ Sacubitril, Positivo: Melhora nítida do quadro clínico da ICC, Negativo: Não vi efeito deletério 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betabloqueadores, diurético, IECA, Positivo: Melhora do quadro clínico da ICC, Negativo: Não vi efeito deletério
16/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devemos incorporar novas tecnologias ao SUS. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhoria significativa nas condições de saúde do paciente. Excelente reação ao medicamento., Negativo: Não apresentou efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Insuficiência cardíaca atinge milhões de brasileiros e tem prevalência nos mais desfavorecidos. Levando à morte na maioria dos casos em 05 anos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril losartana, Positivo: Rápida compensação inclusive em pacientes que não respondiam à medicação, mesmo otimizada e nas máximas dosagens., Negativo: Muito raramente hipotensão; e que correto da com a adequação da medicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betabloqueadores, IECAS, BRAS, Diuréticos, Vasodilatadores, Antagonistas da aldosterona....., Positivo: De uma maneira genérica reduzindo a pre e pos carga, aumentando o tempo de diástole....., Negativo: De maneira genérica, hipotensão, bradicardia, câimbras, tosse, ginecomastia.....</p>
16/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Para mim o resultado foi satisfatório</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atenalol, Positivo: Controlava o batimento cardíaco, Negativo: Deu tonteira</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: 2, Positivo: Melhorou a saúde, Negativo: Pode causar baixa da pressão arterial</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Losartana, Positivo: Sem informações, Negativo: Sem informações</p>
16/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento de uso contínuo, rigorosamente necessário para manter minha saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lotar, Positivo: Mantém a pressão arterial regulada., Negativo: Aumenta a migração.</p>
17/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não tive experiência, Positivo: Não utilizei, Negativo: Não utilizei</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha experiência clínica com o medicamento é positiva.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto., Positivo: Melhora clínica importante na sintomatologia da Insuficiência Cardíaca. (IC), Negativo: Não observei.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Digitálicos.Beta bloqueadores com efeito inotrópico positivo.Vasodilatadores., Positivo: Melhora clínica na sintomatologia da IC., Negativo: Efeitos na função pulmonar, redução na frequência cardíaca.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acredito que ele poderia estar disponível para casos selecionados com justificativa, em consonância com as diretrizes atuais brasileiras de IC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto e toda linha medicamentos para IC., Positivo: melhora de mortalidade e melhora clínica importante, Negativo: hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trabalho com toda linha de tratamento de IC, Positivo: os descritos em diretrizes, Negativo: da mesma forma</p>
16/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai é portador de insuficiência cardíaca a cerca de 14 anos. Faz uso de medicamentos caros. A cerca de um ano, foi adicionado o ENTRESTO para o tratamento. Os resultados foram fantásticos. Houve uma melhora substancial na qualidade de vida de meu pai, que hoje tem 80 anos de idade. O Entresto é um medicamento caro. Adquiri-lo mensalmente exige sacrifício financeiro. Acredito que muitos outros pacientes poderiam usufruir desses benefícios, a partir do próprio SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ENTRESTO, Positivo: O ENTRESTO trouxe evidente melhora na qualidade de vida de meu pai (80 anos), o qual é portador de insuficiência cardíaca a cerca de 14 anos., Ele também é portador de marcapasso. Os sintomas principais, como falta de ar, inchaços corriqueiros, dificuldade pra qualquer atividade doméstica etc, foram controlados e até eliminados. , Negativo: Não observamos efeitos negativos com o uso do ENTRESTO.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: CONCOR, Espironolactona 25mg, Vastarel MR 35mg, Procorolan 7,5mg, Digoxina, Ancoron, MICARDIS, LASIX., Positivo: O uso combinado dos medicamentos acima trouxeram qualidade de vida ao meu PAI, 80 anos de idade, O QUAL é portador de insuficiência cardíaca a 14 anos. No entanto, a adição do ENTRESTO trouxe de fato, uma melhora significativa ao quadro geral de saúde do meu pai., Negativo: No início, a administração do CONCOR, trouxe alterações na pressão arterial, visto que outros medicamentos, tais como ANCORON, MICARDIS, também atuavam na pressão arterial. Mas um ajuste de dosagem resolveu.</p>
16/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora clínica , Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Iecas e Bras , Positivo: Melhora clínica , Negativo: Melhora clínica parcial</p>
16/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril VALSARTANA, Positivo: Melhora dos parâmetros ecodopplercardiograficos em curto espaço de tempo (3-4 meses) em pacientes que já estavam em terapia otimizada segundo as recomendações das diretrizes da sociedade brasileira de cardiologia., Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores de ECA, ESPIRONOLACTONA, FUROSEMIDA, BETABLOQUEADORES, Positivo: Controle dos serviços narinas de ICC, Negativo: Perda gradual da eficiência terapêutica.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Nao me ajudou, Negativo: Boca seca
17/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicação com comprovação pelos estudos de benefício na qualidade de vida e na diminuição da mortalidade dos pacientes com Insuficiência Cardíaca com fração reduzida. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: melhora da qualidade de vida, em função da melhora dos sintomas Menos internações com consequente diminuição das complicações e da mortalidade, Negativo: Hipotensão, contornada com ajustes na terapêutica 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta bloqueadores leca Bradiuréticos espirolactona, Positivo: Melhora os sintomas Diminui a Mortalidade, Negativo: Hipotensão Intolerância Alteração de eletrólitos
17/12/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Ok 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Todos, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Todos, Negativo: Nenhum
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Prática diária no tratamento dos pacientes com ICC grave tem se mostrado concordante com os resultados do estudo PARADIGM-HF, com importante melhora clínica, diminuição de mortalidade e internamento por IC. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana (ENTRESTO), Positivo: Melhora da classe funcional, melhora da qualidade de vida dos paciente, na substituição do tratamento padrão até antes da disponibilidade dessa nova droga., Negativo: Único efeito negativo que tive foi os transtornos por conta do custo (pacientes entrando na justiça para conseguir a medicação) 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as drogas disponíveis para tratamento da insuficiência cardíaca., Positivo: O tratamento padrão funciona sempre funcionou bem, mas essa nova droga tem se mostrado ainda melhor, com 20% menos mortalidade e internamento quando comparado ao tratamento padrão., Negativo: O tratamento padrão funciona sempre funcionou bem, mas essa nova droga tem se mostrado ainda melhor, com 20% menos mortalidade e internamento quando comparado ao tratamento padrão.
16/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remedio importante para cardíacos que o estado deve ajudar a distribuir e salvar vidas 2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Menos cansaço, menos falta de ar, Negativo: Não tenho nenhum para listar 3ª - Sim, como paciente, Qual: Espirolonactona, rosuvastatina calcica, ancoron, furosemida e a.s., Positivo: Meu coração ainda funciona, Negativo: Nada a listar
09/12/2018	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Ok 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Estou me dando super bem com a medicação porém o mesmo é muito caro pra quem é pobre, Negativo: Nao tenho 3ª - Sim, como paciente, Qual: Nao, Positivo: Nao, Negativo: Nao

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartan, Positivo: Melhora da classe funcional, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Concor, monocordil, entresto, Positivo: Bons alívio, Negativo: Não descobri</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sivastantina, furozemida, Positivo: Podos bons, Negativo: Não encontrei</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de altíssimo custo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na pressão arterial, Negativo: Não observei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana Potássica, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p>
08/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou a favor que medicamentos caros sejam liberados pelo SUS com comprovação de renda</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto (valsartana/sacubitril), Positivo: Reduz internações e mortalidade melhora clínica significativa, Negativo: cuidados com PA (pode causar hipotensão) atentar para função renal e potássio Não pode ser utilizado com IECA (necessário wash out de 36h)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos os medicamentos utilizados no tto de ICC, betabloqueadores, ARA II, IECA, espirolactona, furosemida...., Positivo: melhora clínica, Negativo: cuidado com efeitos adversos</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu consumo atualmente o remédio ENTRESTO que é composto pelas 2 substâncias mencionadas. É excelente medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO 97/103 mg, Positivo: Após 4 pontes no coração e posterior (5 anos depois) colocação de 3 stents, meu coração estava fraquejando. Este remédio foi fantástico, Negativo: Estou tomando este remédio há mais de um ano. O que eu notei que emagreci bastante após que iniciei o consumo dele. Provavelmente pelo efeito diurético. Atualmente estou recuperando lentamente. Também reduzi a metade o remédio diurético que eu tomava antes.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concor, Adalat Oros., Positivo: Tomei durante muito tempo Adalat, mas finalmente comecei a ter problemas com acúmulo de líquido no pulmão, principalmente durante a noite e deitado. Só conseguia dormir sentado senão eu tinha falta de ar. O ENTRESTO resolveu esse problema do enfraquecimento do coração e consequente acúmulo de líquido no pulmão., Negativo: Não sei.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento aprovado pelo fda e que poderá evitar mortes súbitas, ou mesmo evitar maiores despesas com internação para o sus.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ictus, Brasart 160, spironolactona 25mg., Positivo: Não posso informar pois não sou especialista., Negativo: Não posso informar pois não sou especialista.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não sou profissional de saúde. , Positivo: Impossibilitado de responder pois não sou especialista de saúde. , Negativo: IDEM.</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicação de última geração para quem tem ICC gratuito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhuma , Positivo: Melhora a função cardíaca., Negativo: Nenhuma.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Positivo: Nenhuma , Negativo: Nenhum</p>
08/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma opção terapêutica muito boa</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquema tradicional de tratamento de insuficiência cardíaca, Positivo: É uma droga fantástica. , Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento convencional para insuficiência cardíaca, Positivo: Diurético, betabloqueador, bra e espiranolactona, Negativo: Infelizmente estes medicamentos não modificar</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Me fez bem ., Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Procoralan, Positivo: Um pouco, Negativo: Continuei com a insuficiência</p>
08/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora visível dos sintomas de minha mãe, Negativo: Não vi nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de medicação comprovadamente eficaz para o tratamento da insuficiência cardíaca, que tem se mostrado muito custo-efetiva, seja nos ensaios clínicos, seja nos estudos de vida real. Associada a redução significativa da mortalidade, melhora significativa na qualidade de vida, redução significativa no número de internações para os pacientes com insuficiência cardíaca, doença extremamente prevalente e limitante e que tem mortalidade maior que a da maioria dos cânceres.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o Sacubutril/Valsartan., Positivo: Tenho, atualmente, 33 pacientes usando a medicação e, até o momento, tenho observado significativa melhora clínica (melhora na classe funcional da NYHA; melhora nos questionários de qualidade de vida, como o KCQ; melhora na fração de ejeção ventricular esquerda). Além disso, todos estes 33 pacientes estão tolerando muito bem a droga., Negativo: Até o momento não vi efeitos negativos significativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiência com todo o arsenal terapêutico disponível para o tratamento da insuficiência cardíaca (inibidores da enzima convertora de angiotensina; bloqueadores dos receptores de angiotensina; betabloqueadores; antagonistas dos mineralocorticóides; diuréticos; ivabradina; nitratos; vasodilatadores venosos; inotrópicos)., Positivo: As drogas citadas acima são positivas para o tratamento da insuficiência cardíaca., Negativo: Apesar de efetivas, percentual considerável de pacientes usando tais medicações ainda internam-se muito e morrem subitamente. Por isso a sugestão de incorporação do sacubutril/valsartan, tendo em vista que, em pacientes tratados com as medicações acima, apresentou resultados muito superiores.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é essencial para salvar vidas, assim como salvou a vida do meu pai.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: De 42% de suficiência o coração do meu pai foi para 89%, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o medicamento beneficiaria muito no tratamento destes pacientes com Insuficiencia cardíaca, melhorando sintomas e qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: melhora da sintomatologia e qualidade de vida do paciente , Negativo: Nenhum dos meus pacientes ate agora apresentou.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: outrso BRAS, Positivo: melhora sintoma, Negativo: Hipotensao</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, Positivo: Revelou a pressão arterial, Negativo: Não houve melhora do sintoma cardíaco</p>
09/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora sintomática significativa do paciente, redução de internações e provavelmente na mortalidade, Negativo: Hipotensão.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, beta-bloqueadores, espironolactona, ivabradina, monocordial e hidralazina, Positivo: vide literatura., Negativo: Vide literatura</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora fisica, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o sacubitril/valsartana reduziu em cerca de 20% asmortes por causas cardiovasculares ou hospitalização por insuficiência cardíaca, e emcerca de 16% as mortes por qualquer causa - a redução do custos nas internações e mortes justificam sua incorporação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril-valsartana, Positivo: melhora clinica, Negativo: discreta hipotensao</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ECABeta-bloqueadoresDiureticos, Positivo: melhora clinica, Negativo: hipotensaoelevação do potassio serico com espironalactona</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preciso que me favoreça</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos deste remédio subsidiado pelo governo. Tratamento longo e custoso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: CONCOR, CUORE, VASTAREL E OUTROS, Positivo: Recuperação cardíaca pós infarto., Negativo: Caríssimo e tratamento longo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concor.Cuore.Vastarel. Aldactone.Sustrate. , Positivo: Recuperação cardíaca pós infarto., Negativo: Caríssimos e tratamento prolongado</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio de alto custo dificultando o acesso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103., Positivo: Melhoria na patologia após tratamento., Negativo: Não se aplica.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Karvil Carverdilol e Somalgin Cardio, Positivo: Diminuição no inchaço do coração., Negativo: Não se aplica.</p>
08/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, acho que essa doença por ser crônica e o paciente depende tomar por toda vida esse medicamento, o governo deve fornecer...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: me sinto melhor!, Negativo: não percebi</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou médico e sei de excelentes resultados com o uso deste medicamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/losartana, Positivo: Melhora de classe. Pacientes antes na Classe IV passando para III e até Classe II., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol/Losartana/Furosemida, Positivo: Não houve. Só pioraram. Daí, houve a necessidade de substituição., Negativo: Piora do cansaço, dispnéia, edema de MMII, etc....</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante!!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: NÃO TIVE MAIS DESCOMPENSACAO CARDIACA, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Positivo: Também me equilibra, Negativo: Não houve</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento que veio para melhorar a função cardíaca de uma forma que nem um outro consegue, e a pessoa qdo chega a usar esse medicamento, ela já está incapacitada para o trabalho e sem condições de comprar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Digoxina. Atacand, Positivo: Enquanto tomava os mencionados acima a doença deu umaregredida., Negativo: Não saberia mencionar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atacand, Positivo: Não vi resultado, Negativo: Não vi resultado</p>
10/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sacubitril/valsartana é um medicamento muito caro. Seria ótimo se esse medicamento estivesse disponível no SUS. Eu mesma já fiquei sem o medicamento porque eu não tinha dinheiro para comprá-lo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atacand , Positivo: Nos primeiros anos de uso a pressão baixou, Negativo: Depois de um período, o medicamento não fez mais efeito</p>
08/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Entresto foi o único medicamento que conseguiu estabilizar o meu pai, ele não conseguia caminhar, comer direito e não dormia bem. Com o entresto a qualidade de vida dele melhorou muito.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Losartana 50mg, Positivo: Controlava a pressão, nas não os sintomas da ICC., Negativo: Mantinha os sintomas da ICC</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Losartana, Concor e Lasix, Positivo: Não conseguiu produzir efeitos positivos , Negativo: Mantinha os efeitos negativos da ICC</p>
08/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Fortalecimento do musculo cardíaco com aumento da função, Negativo: Nao notamos efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cardilol, ancoron, espirolactona, Positivo: Todos melhoram qualidade de vida do paciente, Negativo: Nao ha</p>
08/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citarei apenas 2TrayentaEntresto, Positivo: Os dois dão resultados satisfatórios, sendo que muitas das vezes é necessário diminuir ou até mesmo suspender o uzo conjunto com outra medicação., Negativo: Entresto requer um cuidado maior em relação a parte renal, percebi tb um leve aumento na glicose.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ValsartanaAtenolol, Positivo: Resultado satisfatório, Negativo: Com o passar do tempo não surtia o efeito desejado.</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento caro dificultando o acessibilidade da população .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na condição física em geral, principalmente eliminação do cansaço ., Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lozartana, Positivo: Melhora relativa na pressão arterial, Negativo: Cansaço excessivo e falta de disposição em geral</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora geral do Estado de saúde, Negativo: Medicamento caro, tem efeitos negativos no bolso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários outros para controle da pressão arterial, Positivo: Controlavam a pressão máxima, Negativo: Não estabilização a pressão mínima.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é de ponta porém seu limita a compra para a maioria da população que necessita do mesmo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Tomo este medicamento há 6 meses e após 4 semanas já percebi uma grande evolução no meu quadro de ICC,, Negativo: Apenas no início tudo tratamento tive alguns períodos de tosse, mas acredito não ter sido efeito do mesmo haja vista que não tenho mais este problema.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caverdilol , Positivo: Complementando o tratamento com o Entresto houve melhora significativa do meu quadro de ICC diminuição do cansaço e falta de ar., Negativo: Quando foi aumentada a dose de caverdilol nos primeiros 10 dias sentia um pouco de tontura logo após a tomada que foi desaparecendo e hoje já só tenho mais este sintoma.</p>
08/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessario e comprovado.cientificamente a necessidade do uso de sacubitril/valsartana no tratamento de ICC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril valsartana associado a beta bloqueador e diurético deu qualidade de vida a alguns pacientes meus que fizeram uso.no tratamento de insuficiência cardiaca, Positivo: Melhora da dispneia, Negativo: Não verifiquei.</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento com valor elevado</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Melhora na freqüência cardíaca, melhora no cansaço, controla a pressão arterial, entre outros benefícios!, Negativo: No inicio do uso tosse com freqüência!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na freqüência cardíaca, diminuição do cansaço, controle da pressão arterial , Negativo: Tosse com freqüência no inicio do uso da medicação</p>
08/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A ASSOCIAÇÃO CITADA É BENÉFICA PARA OS PACIENTES COM ICC, REDUZINDO CHANCE DE INTERNAÇÕES E MORTE SÚBITA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SACUBITRIL/VALSARTANA, Positivo: MELHORA IMPORTANTE NOS SINTOMAS E CLASSE FUNCIONAI DA ICC, Negativo: PODE ELEVAR O POTÁSSIO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECABRADIURÉTICOS, Positivo: INUMEROS, Negativo: GERALMENTE TODOS TEM UM CERTO GRAU DE PIORA DA FUNÇÃO RENAL E/OU ELEVAÇÃO DO POTÁSSIO</p>
08/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Medicação muito importante e sem alternativa em termos de genéricos por se tratar de droga nova.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora do quadro clínico, Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora do quadro clínico, Negativo: não tive</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque sei de perto e falo com propriedade que o Entresto tem sido de tão grande importância para no tratamento e saúde do meu pai. Porém passamos pelos entraves de uma sociedade muitas vezes injusta para com sua população, onde poucos tem acesso a um medicamento de tão grande valor para amenizar os sintomas de uma doença complicada e sofrida tanto para o doente quanto para seus familiares, pois por falta de acesso gratuito pelo SUS, ficamos em dificuldade para comprar. Venho pedir uma avaliação e um olhar diferente quanto a essa recomendação negativa e peço sensibilidade ao tratar deste assunto. Porque tenho meu pai hoje presente em nossas vidas, primeiramente agradeço a Deus e depois ao Entresto que nos tem proporcionado essa alegria a cada dia. É uma medicação muito cara e sofremos muito para comprar e dar um conforto para meu pai, passamos muitas vezes por privações.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o Entresto, meu pai faz uso contínuo deste medicamento e tem sido imprescindível na vida dele e na nossa como familiar. Porque diante da situação que meu pai se encontrava, extremamente debilitado e nós desesperados com medo de perdê-lo a qualquer momento. Enfim, encontramos um cardiologista excelente e de grande valor que nos apresentou o Entresto e desde então, mesmo diante da Doença de base de meu pai e todas as suas complicações que é a Insuficiência Cardíaca grave, essa medicação tem sido nossa aliada e tem amenizado nosso dor e sofrimento. Meu pai tem respondido bem ao uso do Entresto e como filha e também profissional de saúde, apoio a liberação do Entresto gratuitamente pelo SUS tendo em vista por se tratar de uma medicação de alto custo e por conta disso o acesso da população é difícil e sofrido. Aqui em casa tem momentos que passamos necessidade para podermos manter meu pai em uso do medicamento, somos usuários do SUS e tenho esperança de não muito distante poder receber o Entresto gratuitamente para dar continuidade ao tratamento do meu pai., Positivo: Amenizou o quadro que meu pai se encontrava grave, pensamos que íamos perder ele. E tem mantido ele estável com o uso do Entresto. , Negativo: Do Entresto só tenho a elogiar e agradecer pelo que tem feito por nós. É um medicamento de grande relevância.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Carvedilol, Espironolactona e Captopril. Esses são os medicamentos também prescritos para meu pai., Positivo: sozinhos não obtive resposta desejada com o quadro e sintomas ao qual meu pai se encontrava, com a inclusão do Entresto, vimos a melhora dos sintomas e o conforto que proporcionou ao meu pai., Negativo: O uso destes medicamentos sozinhos não foi eficaz, meu pai continuava a decair e nós desesperados com a situação, infelizmente não surtiu efeito positivo no caso dele. Necessitou da introdução do Entresto.</p>
08/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho uma tristeza um remédio que poderia ajudar a saúde de tanta gente ser tão caro, pois muitos cardiologistas deixam de receitar o remédio devido ao seu alto custo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Um medicamento muito eficaz que poderia ajudar muita gente., Negativo: Valor alto</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Carvedilol, losartana. Aas, Positivo: Eficaz no tratamento, Negativo: Com o tempo perdem a eficácia</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Aumento da capacidade de funcionamento do coração , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é a esperança de uma melhor qualidade de vida para os cardiopatas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO 24/26, Positivo: Me permitiu uma maior circulação de oxigênio. Senti isso até na diminuição das dores de cabeça inicialmente., Negativo: Fiquei com dores no estômago .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Aspirina, Preventil, Valsartana, Ciprofibrato, Rosuvastatina, Diovan, Pantoprazol, Bissulfato de Clopidogrel, Positivo: Me mantém vivo. , Negativo: Ataca meu estômago, tantos remédios.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo por ser um medicamento de alto custo e de uso contínuo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97mg/103mg, Positivo: Todos os descritos na bula, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97mg/103mg, Positivo: Todos os descritos na bula, Negativo: Nenhum</p>
08/12/2018	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, entresto é recomendado pelas diretrizes e melhora qualidade de vida e reduz mortalidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: entresto, Positivo: melhora da qualidade de vida, Negativo: não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: procoralan, Positivo: melhorada qualidade de vida, Negativo: não há</p>
08/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso da medicação desde o lançamento e venho tendo excelentes resultados, melhorando qualidade de vida e aumentando sobrevida de pessoas que sofrem de Insuficiência cardíaca e não tinham essa opção de tratamento .Quanto mais pacientes beneficiados, melhor.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O Entresto , Positivo: Melhora de sintomas , diminuindo hospitalização e aumento de sobrevida., Negativo: Não tive . Apenas preço relativamente alto pra paciente sus</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já usamos de longa data furosemida, espironolactona, caverdilol, enalapril , Positivo: Melhora sintomas, alguns melhora sobrevida , Negativo: Mesmo usando todos eles ainda tem paciente que continua sintomático e teve ótima resposta com o Entresto</p>
08/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito nos resultados favoráveis para qualquer tipo de paciente com insuficiência crônica cardíaca sintomática. Minha mulher quando trocou Enanapril por Entresto a qualidade de vida mudou para melhor. Diminuiu a falta de ar para pequenos esforços e a hipotensão arterial. Passou a se sentir muito melhor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sem comentário.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: EntrestoCarvedilolFurosemida, Positivo: Sem efeitos colaterais., Negativo: Sem efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: EntrestoCarvedilolFurosemida, Positivo: Medicamentos agem positivamente., Negativo: Sem efeitos negativos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento se mostrou cientificamente superior ao enalapril inclusive na necessidade de reinternações. Isto deve favorecer a custo efetividade. Associado aos melhores resultados acredito que o poder de compra do governo (pelo Volume) pode produzir um excelente resultado final na custo efetividade. Somente seria contrário se a relação Custo-Efetividade, no nosso País, for desfavorável.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril Valsartana em todas as doses para ICFER (FE <40%)., Positivo: Melhora sintomatica com aumento na tolerância ao esforço mesmo em pacientes já em dose plena de leca além é claro de todo o arsenal terapêutico para lcc., Negativo: Efeitos muito semelhantes aos do leca ou Beta bloqueador no inicio do tratamento em pacientes com ICFER</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: leca/Bra/beta bloq/espironolactona/vasodilatadores/Diuréticos/digital/aminas Vasoativas/sensibilizadores de Calcio(estes último muito pouca)., Positivo: Aqueles descritos em profusão na literatura médica , Negativo: Aqueles descritos em profusão na literatura médica</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Pressão arterial controlada, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Controle da pressão no início do tratamemto, Negativo: Ineficaz com o passar do tempo</p>
08/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que ter o sacubitril/valsartana cadastrado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: melhora na função cardíaca, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: entresto (sabucatril/valsartana), Positivo: melhora no ritmo cardíaco., Negativo: nenhum...</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, HÁ ABSOLUTA NECESSIDADE. JÁ QUE O CUSTO É INVIÁVEL PARA A MAIOR PARTE DA POPULAÇÃO</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO 49/51, Positivo: PASSEI ATER A PRESSÃO CONTROLADA E DIMINUIÇÃO DE ARRITMIA CARDIACA, Negativo: APARENTEMENTE NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: DIOVAN 160 E 320 - CARVEDILOL - LOSARTAN, Positivo: CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL, Negativo: COM O TEMPO PASSOU A NÃO MANTER OM CONTROLE</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eundiscordo porque os resultados dos Estudos de Entresto me garantem tratar melhor meus pacientes com ICFER. Estudos PARADIGM e PIONNER confirmam esses resultados. Hospitalização por exemplo, com Entrsto, meus pacientes ficam menos tempo em leitos de hospitais frente aos pacientes que utilizam IECAS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diuréticos, IECAS, Brás, Entresto, nitratos, Espironolactona., Positivo: Para resumir, Entresto se apresenta como melhor alternativa na redução de mosrtalidade e hospitalização dos pacientes com ICFER versus iecas., Negativo: IECAS provocam maior alteração de potássio e alteração da função renal, dois efeitos adverso ruins para pacientes com ICFER. ESTUDO PARADIGM confirmou esses efeitos negativos dosmiecas verso Entresto.</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DE ACORDO COM AS ULTIMAS DIRETRIZES, A MEDICAÇÃO TEM GRANDE IMPACTO EM MORTALIDADE E PORTANTO DEVE SER DISPONIBILIZADO PARA POPULACAO PELO SUS!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SACUBITRIL / VALSARTANA, Positivo: REDUÇÃO DE REINTERNAÇÃO, MAIOR TEMPO DE COMPENSAÇÃO CLÍNICA, IMPACTO NA QUEDA DOS INDICES DE MORTALIDADE E MORBIDADE POR INSUFICIENCIA CARDIACA., Negativo: RAROS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SACUBITRIL / VALSARTANA, Positivo: IMPACTO NA MORTALIDADE, REDUCAO DE SINTOMAS E REINTERNACAO POR INSUFICIENCIA CARDIACA, Negativo: RAROS</p>
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo Paradigm-HF já demonstrou variados benefícios quando utilizado a medicação em questão para pacientes com Insuficiência Cardíaca. Redução de risco de hospitalização, redução de risco de morte cardiovascular, redução de hospitalização por insuf. cardíaca, redução do risco de morte súbita.Além de nossa experiência positiva com o uso de tal medicação em nossos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto em suas doses (24/26mg / 49/51mg / 93/107mg), em conjunto com demais drogas indicadas para Insuficiência Cardíaca. , Positivo: Os pacientes, em sua maioria, demonstram boa adesão ao tratamento, como também melhora da performance cardíaca ao longo do tratamento (melhora da fração de ejeção), Negativo: Hipotensão, porém não tive até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamento padrão - iECA ou BRA, Positivo: Melhora sobrevida, porém em nossa experiência em menor intensidade do que a medicação em questão., Negativo: Hipotensão.</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai usa está medicação, é caro, ele aposentado. Portanto o custo é significativo devido à a outras doenças crônicas que também fazem com que ele precise gastar muito do seu benefício em medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto., Positivo: Meu pai melhorou a respiração, passou a se alimentar melhor e a ter ânimo para se deslocar pela casa, pois antes da medicação senti-se fatigado., Negativo: sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Minha mãe tem ICC e não estava respondendo ao tratamento. Mas quando começou a usar o entresto melhorou muito, mas do que o esperado. , Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de medicação de fundamental importância para os pacientes portadores de Insuficiência cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO . PRESCREVI PARA VÁRIOS PACIENTES MELHORA SIGNIFICATIVA., Positivo: MELHORA CLÍNICA. CONSEGUIRAM EXECUTAR TAREFAS QUE NÃO FAZIAM MAIS. MELHOR DESEMPENHO FÍSICO. ALGUNS RETORNARAM AO TRABALHO., Negativo: TIVE POUCOS EFEITOS NEGATIVOS. BASTA AJUSTAR CORRETAMENTE A DOSE.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: USO MUITOS MEDICAMENTOS PARA TRATAR A IC. INIBIDORES E ECA(CAPTAPRIL ETC) . LOSARTANA, CANDESARTANA, LASIX, PROCORALAN, ESPIRONOLACTONA, CARVEDILOL., Positivo: CAPTOPRIL- MELHORA CLÍNICAESPIRONOLACTONA-MELHORA CLÍNICALASIX- MELHORA DOS SINTOMAS E DO EDEMAPROCORALAN-MELHORA CLÍNICA GERAL, AUMENTO DA CAPACIDADE FÍSICALOSARTANA, CANDESARTANA-MELHORA CLÍNICA GERAL, AUMENTO DA CAPACIDADE FÍSICACARVEDILOL- MELHORA CLÍNICA GERAL, AUMENTO DA CAPACIDADE FÍSICA, Negativo: HIPOTENSÃO. ESTE SINTOMA PODE OCORRER EM QUASE TODOS OS MEDICAMENTOS.BRADICARDIA- SOMENTE COM O CARVEDILOL.</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou usuário, sinto me bem e quero ver o produto entresto no SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: houve uma sensível melhora no controle da pressão arterial, com menos inchaço nos membros inferiores, Negativo: nao houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CAPTOPRIL, ATENOLOL INAPRIL, Positivo: por um tempo foram uteis para a manutenção da pressão arterial, Negativo: Nao estavam efetuando os efeitos esperados</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um bom substituto de outros medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Substitui com vantagens outros medicamentos. , Negativo: Não houve efeito colateral.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril Selozok , Positivo: Tiveram resposta positiva , Negativo: Não provocaram efeitos colaterais, mas podem ser substituídos por um medicamentos unico.</p>
09/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, tal droga DIMINUI MORTALIDADE, HOSPITALIZAÇÕES RECORRENTES, ATENDIMENTOS EM EMERGÊNCIAS E PERMANÊNCIA em UTIs !! SEGURANÇA e EFICÁCIA COMPROVADAS!!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECAS, BRAS , BETA-BLOQUEADORES, ESPIRONOLACTONA, NITRATOS, HIDRALAZINA, Positivo: IECAS/BRAS/BETA-BLOQUEADORES e ESPIRONOLACTONA DIMINUÍRAM SINTOMAS E MORTALIDADE E HOSPITALIZAÇÕES. NITRATO e HIDRALAZINA DIMINUÍRAM PREDOMINANTEMENTE SINTOMAS, Negativo: TODOS TÊM EFEITOS POSITIVOS (e poucos NEGATIVOS) PORÉM SACUBITRIL/VALSARTANA, AO SUBSTITUIR IECA/BRAS, HOUVE UM EFEITO POSITIVO ADICIONAL e SIGNIFICATIVO. MUITO SURPREENDENTE e RÁPIDO!!</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SUPRACITADO, Positivo: SUPRACITADO, Negativo: SUPRACITADO</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, estou usando o medicamento, com bons resultados, mas o preço do medicamento é alto para minha renda</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: diminuiu o cansaço, Negativo: preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: enalapril, Positivo: melhorou um pouco, Negativo: a melhora insuficiente</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Aldactone, valsartana, Positivo: Sei la, Negativo: Muito menos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concord, ancoron, Positivo: Senti melhor pois não possuo arritmia, Negativo: Não tem</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido ao alto valor do medicamento e a frequência que o mesmo deve usado</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto sacubitril/valsartana, Positivo: Regularização dos batimentos cardíacos, antes do uso tinha insônia devido incomodo causado pela arritmia cardíaca, Negativo: Inchaço na região dos joelhos e abdômen</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu Alaides Nascimento da Silva envio está mensagem por ser cardíaca crônica que preciso deste medicamento Entresto por não ter condicoes de comprar toda quinzena que aqui e muito caro minha aposentadoria não da para compra todos medicamentos inclusive este eu agradeço se puderem me ajudar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com Wastarel caverdilol12 Entresto, Positivo: O Entresto que eu me sinto bem., Negativo: Wastarel me cinto cansada pernas enchadas. Muita tosse</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Wastarel caverdilol12 Entresto e muitos outros que já não lembro mais por ter passado por cateterismo ressonância com estresse e muitos outros exames cardíacos por ser. Doença de família., Positivo: Com o medicamento Entresto eu me sinto sem muita tosse e cansaço e dor, Negativo: Muita falta de ar muita tosse e cansaço</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não me adaptei aos outros medicamentos, posso dizer que se ainda estou viva, primeiramente, graças a Deus e segundo a esse medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora no chiado ao dormir, ausência de dores no peito, redução do cansaço, melhora respiratória, desaparecimento dos inchaços., Negativo: Comigo, não teve efeitos negativos até o momento. Estou em tratamento com ele há pouco mais de um ano e meio.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lozaetana e posteriormente Angiotril, Positivo: Não tiveram., Negativo: Inchaço, chiado muito alto, dificuldade respiratória, pressão alta, cansaço nas pequenas atividades.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ha grandes trabalhos evidenciando resultados favoraveis a mortalidade e morbidade, com menor indice de reinternação e melhor qualidade de vida e redução de gastos com essas reinternações e devolvendo o paciente a sua atividade laborativa conforme grau de atividade funcional.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO (SACUBITRIL E VALSARTANA). TODAS AS OUTRAS DROGAS CLASSICAS PARA TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA CARDIACA OTIMIZADO FAZEM PARTE DA MINHA EXPERIENCIA CLINCA.COM ESSA MELHORA CLINICA DA CLASSE FUNCIONAL , REDUÇÃO DE DOSES DE ANTIHIPERTENSIVOS E MELHORA DA FRAÇÃO DE EJEÇÃO, Positivo: MELHORA CLINICA DA CLASSE FUNCIONAL , REDUÇÃO DE DOSES DE ANTIHIPERTENSIVOS E MELHORA DA FRAÇÃO DE EJEÇÃO, MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE , Negativo: HIPOTENSAO ARTERIAL AS VEZES NECESSITANDO ADEQUAR AS DOSES, EPIGASTRALGIA REVERTIDA NA 2 SEMANA DE MEDICAÇÃO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os IECA, BRA, DIURETICOS POUPADORES DE POTASSIO, DE ALÇA, ESPIROLACTONA , BETA BLOQUEADORES , VASODILATADORES, IVABRADINA, , TRIMETAZIDINA, Positivo: MELHORA DA CLASSE FUNCIONAL E COMPENSAÇÃO DA PATOLOGIA , Negativo: IECA - E BRA- TOSSE, REAÇÃO ALERGICAS CUTANAS, , DISTURBIOS GASTRICO , DIURETICOS, CAIMBRAS, HIPOTENSAO ARTERIAL, FRAQUEZA, E ESPIROLACTONA - GINECOMASTIA , GALACTOREEIA BETA BLOQUEADORES - DISPNEIA, INSONIA , PESADELOS ,FADIGAVASODILATARORES CEFALeia , LINDEFEMA . DEMAIS SEM EFEITOS COLATERAIS OBSERVADOS .</p>
10/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deveria seguir as atuais Diretrizes de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril Valsartana nas doses de 24/26mg, 49/51mg e 97/103 mg! , Positivo: Houve Melhora substancial da qualidade de vida dos pacientes, melhorando os seus respectivos NYHA. Tenho pacientes que saíram de NYHA IV para NYHA II., Negativo: O preço é excessivo e uma vez estando no rol de distribuição pelo SUS , preferíamos beneficiar muitos outros pacientes que não tem condições financeiras para comprar a referida medicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta bloqueadores cardio seletivos, diuréticos, Ivabradina, BRAS, IECAS, digital, etc! , Positivo: Estabilizam e até melhoram a Insuficiência Cardíaca nos seus respectivos NYHAs., Negativo: Temos que usar varias substâncias para alcançarmos bons resultados, se tornando o tratamento também honeroso e às vezes com adesão precária devido à varias tomadas diárias!</p>
10/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O entresto me deu uma melhora que os outros remédios já não estavam resolvendo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Menos cansaço e bem estar geral, Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, Positivo: No começo ajudou mas não estava mais resolvendo meu cansaço , Negativo: Sem fazer efeito</p>
10/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse remédio está me ajudando muito</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Agora não sinto mais cansaço para tomar banho e andar, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril , Positivo: Não resolveu , Negativo: Não resolveu</p>
10/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Benefício comprovado para paciente, com redução do número de internação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Redução do número de internações hospitalares, redução do número de descompensação clínica e mortslidade, Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol, Positivo: Redução do número de internações hospitalares, redução do número de mortalidade , Negativo: Redução da frequência cardíaca</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos têm direito a tratamento e o governo tem obrigação de fornecer isso a qualquer cidadão.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Redução da falta de ar, melhoria nas atividades diárias... etc, Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento mostrou maior eficácia no controle da haste com efeitos colaterais menores. Entretanto o alto custo de aquisição está dificultando o acesso com a dose terapêutica correto. Por vezes acaba a medicação e não possui dinheiro para repor de imediato.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entretanto 24/26, Positivo: No meu caso eu possuo anemia severa devido a é de cirrose biliar primária e síndrome mielodisplásicas. O medicamento anterior - o monocórdil - não estava regulando minha pressão , Alem de me dar dor de cabeça, náusea e me debilitar muito. Com entresto24 não fico mais edemaciada, sinto menos dor no coração e menos câimbras., Negativo: Úrino mais vezes</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Propanolol 40mg ,monocórdil, aldactone, Positivo: Custo era menor, Negativo: Muito inchada, dispnéia constante e muita taquicardia</p>
09/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é um remédio muito bom porem de alto custo mas ele salva vidas</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eliquis e Entresto, Positivo: eles salvam vidas, Negativo: o valor</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto e Eliquis, Positivo: estes medicamentos salvaram a vida da mi ha mãe, Negativo: não tem nenhum ponto negativo a não ser o alto custo</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: muitas melhoras , Negativo: nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: entresto , Positivo: muitas melhoras, Negativo: nenhum ponto negativo</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Depois que comecei a tomar o entresto meu cansaço diminuiu bastante me possibilitando fazer mais atividades diárias. , Negativo: No começo sentia enjoos mais agora não sinto mais nada.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana Caverdilol, Positivo: Controle da pressão arterial , Negativo: O losartana controlava minha pressão porém não diminuía meu cansaço</p>
09/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo dessa preliminar pq esse medicamento foi muito bom para o meu esposo, porém ele tem um preço muito elevado, e muitos pacientes não tem condições de comprar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Meu esposo estava muito debilitado e inchado, com um mês de experiência ele ficou totalmente desinchado, Negativo: Não conheço nenhum até agora, pois já faz 3 meses que ele está tomando esse medicamento e só tem melhorar</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou usando o medicamento e tenho tido bom resultado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vários , Positivo: Melhoria na qualidade de vida , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários , Positivo: Melhorou a qualidade de vida , Negativo: Não há</p>
09/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Recomendo, baseado nas experiências como Médico Cardiologista com excelente resposta e melhora dos pacientes com IC, obtida com esta droga.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Valsartana-sacubitril, Positivo: Melhora clínica dos pacientes com IC, além de reversão do padrão ecocardiográfico de cardiomiopatia dilatada., Negativo: Em raros casos, hipotensão arterial, controlada com o ajuste nas doses dos medicamentos em uso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diuréticos, beta bloqueadores, inibidores da ECA, BRAs, vasodilatadores/nitratos, vasopressores., Positivo: Diurético: melhora sintomasBeta bloqueadores: melhora sintomasVasodilatadores: idemIECA/BRA: idemNitratos: idem, Negativo: Diuréticos: hipotensão, câimbras.Beta bloqueadores: impotência sexualIECA/BRA: hipotensão, tosseNitratos: hipotensão, cefaleia.</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: ., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: naprix, Positivo: ., Negativo: nenhum</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O cardiopata tem alta carga financeira na compra de medicamentos e seria um alívio para a classe.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto nas três dosagens oferecidas, sendo a que mais me adaptei foi a de 49/51mg, Positivo: O cansasso diminuiu consideravelmente.Melhor disposição.Melhorou o chiado no peito., Negativo: Diarréia nas dosagens mais altas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aspirina, clopidogrel, provocaram, carvedilol, furosemida, aluporinol, lipitor.Atentamente e pontes de safena, Positivo: Resumindo, é o que me mantém viva., Negativo: Os normais relatados em efeitos colaterais</p>
09/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Benefícios já provado por estudos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vasopril, Positivo: Melhora da função cardíaca , Negativo: Hipotensão</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Melhorou muito minha vida, pois estou conseguindo respirar mais e melhor. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não tenho conflito de interesses com a industria e trabalho no SUS e gostaria que os nossos pacientes com ICC tivessem acesso a esta medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril,carvedilol,espironolactona,nitrato e hidralazina, Positivo: redução de morbimortalidade cardiovascular, Negativo: efeitos colaterais</p>
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Não teve, Negativo: Muita tontura. Meu sogro teve uma síncope.</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Encresto, Positivo: Melhora considerável na arritmia e na fração de ejeção e por consequência na qualidade de vida, Negativo: Não percebi nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, selozok, , Positivo: Não foi percebido efeito positivo , Negativo: Agravamento do quadro por não estabilizar a condição patológica</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessito deste medicamento para viver mais alguns anos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento muito caro para um aposentado comprar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto., Positivo: Resultado positivo para recuperação, Negativo: Não ha efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Bom, Negativo: Abaixa a pressão</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Deve ser realizado um melhor levantamento sobre o aspecto financeiro. Não existe dúvidas sobre o real benefício clínico da medicação em comparação com Enalapril. Com a redução de hospitalização com uso do Sacubitril é de esperar uma economia enorme aos cofres públicos. Insuficiência Cardíaca é uma patologia de alta gravidade, complexa e com altíssima taxa de hospitalização.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartan, Positivo: Melhora da qualidade de vidaMelhora dos sintomasMenos hospitalização , Negativo: Hipotensão porém facilmente controlada. Sem danos ao paciente</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Concordo que essa medicação Seja recomendada para outros pacientes com insuficiência cardíaca, pois fez mto bem para o meu pai</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Este mesmo, entresto, Positivo: Salvou a vida do meu pai., Negativo: Nenhum, não ser ofertado na rede sus e termos que pagar tão caro.</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação de alto custo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Informação que reduz risco de internações., Negativo: Não notei negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xarelto 20 mg e Carvedilol 12,5 mg, Positivo: Redução de sintomas e intercorrências., Negativo: Não observei.</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu comecei a fazer uso desse medicamento antes de ser lançado no mercado, e minha melhora foi muito significativa.Estou tomando no momento a dose mais alta e em fevereiro farei uma nova eco para saber o qto melhorou.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu só vi melhora qdo no meu ecocardiograma a fração de ejecao estava 30 e meu cardiologista começou a me dar amostra grátis para eu tentar uma melhora e o resultado foi e está sendo muito melhor do que eu esperava., Positivo: Carvedilol 25mg 2xao dia.Furosemida40.Esperinolactona100.Amidarona 200, trayenta 2.5.Entresto 97/103 mg.Puran 100mg.Omeprazol 20mg, Negativo: Faz doze anos que tomo todos e a melhora eu senti tomando o Entresto que comecei com a dose mínima e estou na máxima.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já foi citado acima, Positivo: Já foi citado acima, Negativo: Já foi citado acima</p>
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na experencia clinica observamos melhora significativa com a medicacao.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betabloqueador, diuretico, IECA/BRA, nitrato, Positivo: Melhora da dispneia e limitacao fisica mesmo com medicacoes classicas em dose otimizada., Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betabloqueador, diuretico, IECA/BRA, nitratoRessincronizacao, Positivo: Melhora de sintomas e qualidade de vida, Negativo: Efeitos colaterais limitando uso e preço.</p>
11/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tive relatos de excelentes resultados com improdutiva por parte de pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DE ACORDO COM O ESTUDO PARADIGM-HF, QUE MOSTROU REDUÇÃO NO DESFECHO PRIMÁRIO DA ORDEM DE 20%, EM COMPARAÇÃO COM O ENALAPRIL, QUE ERA O PADRÃO OURO PARA TAL, FICA MAIS QUE OBRIGATÓRIO O USO DE UMA MEDICAÇÃO COMO SACUBITRIL/VALSARTANA NA PRÁTICA DO DIA A DIA. É IMPORTANTE RELATAR QUE ESTE BENEFÍCIO É VISTO NA PRÁTICA CLÍNICA DIÁRIA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO, Positivo: REDUÇÃO DE MORTALIDADE, REDUÇÃO DE SINTOMAS COM MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA, MELHORA DA FRAÇÃO D EEJEÇÃO, DENTRE OUTROS., Negativo: EVENTUALMENTE POUCOS CASOS DE HIPOTENSÃO.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CARVEDILOL, BRA, IECA, ESPIRONOLACTONA, IVABRADINA,,..., Positivo: MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA, DIMINUIÇÃO DA MORBI-MORTALIDADE, Negativo: TOSSE, HIPOTENSÃO, ETC</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entresto tem recomendação grau 1 nas diretrizes, Americana, Européia e Brasileira. Entresto melhora a qualidade de vida do paciente, aumentando fração de ejeção, reduzindo o risco de morte Cardiovascular em 20%, 29% menos hospitalizações e 38% menos re-hospitalizações em 30 dias. Comparando a Insuficiência Cardíaca a outras doenças como o Câncer (que é fornecido tratamento pelo SUS), a IC mata mais que muitos cânceres. É inconcebível que a comissão avalie o custo de Sacubitril/Valsartana (que é muito menor quando comparado a medicamentos de câncer) como uma barreira. Estudos como Paradigm-HF, Pionner, entre outros, mostram a superioridade da medicação vs o que temos de terapia padrão disponível antes de Sacubitril/Valsartana. Como médico, pesquisador e professor, tenho que ser a favor da inclusão de Entresto no âmbito do SUS para o benefício dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ..., Positivo: ..., Negativo: ...</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ..., Positivo: ..., Negativo: ...</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho necessidade deste medicamento e não tenho condições financeiras para comprar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Recomendo, baseado nas experiências como Médico Cardiologista com excelente resposta e melhora dos pacientes com IC, obtida com esta droga.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Valsartana-sacubitril, Positivo: Melhora clínica dos pacientes com IC, além de reversão do padrão ecocardiográfico de cardiomiopatia dilatada., Negativo: Em raros casos, hipotensão arterial, controlada com o ajuste nas doses dos medicamentos em uso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diuréticos, beta bloqueadores, inibidores da ECA, BRAs, vasodilatadores/nitratos, vasopressores., Positivo: Diurético: melhora sintomas Beta bloqueadores: melhora sintomas Vasodilatadores: idem IECA/BRA: idem Nitratos: idem, Negativo: Diuréticos: hipotensão, câimbras. Beta bloqueadores: impotência sexual IECA/BRA: hipotensão, tosse Nitratos: hipotensão, cefaleia.</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: sentindo melhor, Negativo: nada a declarar</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da classe funcional, Negativo: Hipotensão grave em alguns pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betabloqueador, diurético, IECA, losartan, Positivo: Melhora da classe funcional, Negativo: Melhora lenta e às vezes não tão melhor que o Entresto</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O entresto deveria sim ser distribuído gratuitamente pelo SUS porque é um remédio caro como eu que sou aposentado e recebo um salário mínimo tenho que pedir ajuda para familiares e no meu caso esse é o único remédio que está controlando a doença pois já tomei todos e não surtiram efeito</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Todos inclusive ainda tomo o carvedilol 25 mg duas vezes ao dia, Positivo: O entresto foi o único que está controlando a insuficiência cardíaca, Negativo: Não há nada de negativo só positivo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana carvedilol 25 mg duas vezes ao dia varfarina furosemida e agora o entresto 97/103 duas vezes ao dia tomo todos esses remédios diariamente, Positivo: Todos os outros que tomo ajuda mas não foi suficiente somente o entresto 97/103 duas vezes ao dia que esta fazendo efeito, Negativo: Não há nada de negativos só positivo</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes precisam deste medicamento e ele é muito caro. Mais de 300,00.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Endestro, Positivo: Ele salvou a minha vida., Negativo: Baixa a pressão.</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu tomo este medicamento h2 um ano com bons resultados para cardiopatia congestiva crônica grave.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora condição de vida, Negativo: Caro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Captopril, Positivo: Reduz pressão, Negativo: Não melhora circulação. Brocha</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque deveria ter na rede pública SUS, Principalmente para as pessoas de baixa renda.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é muito caro</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Me ajuda a controlar insuficiência cardíaca, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, Positivo: Já não estava obtendo resultados esperados, Negativo: Não controlava mais a insuficiência cardíaca</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É necessário a distribuição</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Me sinto bem melhor, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, bisoprolol, ramipril, furosemida, Burinax..., Positivo: Desde a utilização tenho tido vida normal novamente, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento tem sido fundamental no tratamento da insuficiência cardíaca que meu pai apresenta. Tem sido o único medicamento até o momento que está gerando uma melhor qualidade de vida e melhora dos sintomas que ele apresentara antes do uso desse medicamento. Porém, esse medicamento tem um alto custo, e se o mesmo fosse fornecido pelo SUS gratuitamente com certeza seria um benefício ímpar tanto na vida do meu pai, bem como, nas vidas dos pacientes portadores da insuficiência cardíaca crônica que possuem baixa renda e não tem condições de pagar o medicamento. Assim como meu pai que tem baixa renda e está com dificuldades para comprar o medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o medicamento em avaliação. Meu pai que possui insuficiência cardíaca com 2 semanas de uso apresentou melhora no sintomas da patologia ICC., Positivo: Melhora para caminhar e realizar atividades como tomar banho, pentear o cabelo sem se cansar. Até mesmo para dormir. Reduziu bastante a dispneia., Negativo: Não apresentou nenhum até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o medicamento Vastarel., Positivo: Não surtiu efeito para melhora dos sintomas da insuficiência cardíaca., Negativo: Apresentou muita coceira no corpo.</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um novo remédio que pode ajudar muito as pessoas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto., Positivo: Regulou a pressão., Negativo: Tosse persistente e fadiga.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto., Positivo: Regulou a pressão., Negativo: Tosse persistente e fadiga.</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento mostra-se de essencial importância para o tratamento de Insuficiência Cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril e Valsartana., Positivo: Melhora da classe funcional, Negativo: Não observei até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, Espironolactona, betabloqueador, diurético., Positivo: Melhora classe funcional., Negativo: Hipotensão, hipo e hipercalemia.</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu não concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Sessou a falta de fôlego durante o sono e quando o estou sem atividade., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Ajudou com a falta de fôlego , Negativo: Dor de barriga.</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como usuário continuo desse medicamento estou prejudicando meu tratamento devido ao custo elevado do medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Baixa da pressão , Negativo: Nenhum</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97 mg/103 mg, Positivo: Me sinto bem e não sinto cansaço., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol 25mg, Positivo: Me sinto bem., Negativo: Nenhum</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97 mg/103 mg, Positivo: Me sinto bem e não sinto cansaço., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol 25mg, Positivo: Me sinto bem., Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Medicamento Entresto tem mudado minha qualidade de vida para melhor! E poderia ajudar a muitos pacientes portadores da Insuficiência cardíaca que não possuem condições para comprar o medicamento. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto Procorolan, Positivo: Diminuição da frequência cardíaca e conseqüentemente do cansaço diário. , Negativo: O preço do medicamento. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Diminuí a pressão sanguínea e é barato., Negativo: Não diminuía a frequência cardíaca e conseqüentemente o cansaço.
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora significativa no funcionamento cardíaco!, Negativo: Não observado 3ª - Não
07/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um remédio tão eficaz deve ser disponibilizado pelo sus 2ª - Não 3ª - Não
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preço altíssimo nas farmácias 2ª - Não 3ª - Não
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SEU VALOR É MUITO ALTO PARA MAIORIA DA POPULAÇÃO 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: NÃO RECORDO OS NOMES, Positivo: Diifícil especificvar, Negativo: Não me recordo
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu médico indicou outro remédio com melhor resultado. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril e Valsartana, Positivo: Desinchar o coração , Negativo: Não se sabe 3ª - Não
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bem estar social 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Recuperação insuficiência cardíaca, Negativo: Nenhum 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sem condições de comprar a medicação 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou muito, Negativo: Não tem 3ª - Não
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, bisoprolol, ramipril, furosemida, Burinax..., Positivo: Desde a utilização tenho tido vida normal novamente, Negativo: Nenhum 3ª - Não
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quero o medicamento distribuído sem custos na rede publica . 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97.43 mg, Positivo: Menor numero de internação , menos cansaso, Negativo: Pressão muito baixa 3ª - Sim, como paciente, Qual: Procolaram, Positivo: Me senti bem com ele, Negativo: Pressão abaixava
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tomava anteriormente Digoxina 0,25 mg a qual me sentia mal. Passei a Tomar essa medicação Entresto , agora dou outra pessoa. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Digoxina , Positivo: Não me adaptei a Digoxina (muitas náuseas, tonturas sensação de cansaço físico , Negativo: Náuseas, Sudoreses, cansaso e mal estar constante(Digoxina) 3ª - Sim, como paciente, Qual: Digoxina , Positivo: Entresto, me sinto muito bem, Negativo: Nenhum
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento foi eficaz para o tratamento da saúde de minha mãe e por ser muito caro, o único meio de chegar a população toda é pelo SUS, sem sombra de dúvida. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O Entresto 40mg, Positivo: Melhoraram os batimentos cardíacos, a respiração ofegante, diminuiu a arretmia, enfim, o quadro agora é outro, graças ao entresto., Negativo: Nenhum. 3ª - Não
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Qualidade de vida, Negativo: Financeiros 3ª - Não
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apresentei considerável melhora dos sintomas. Mas é medicação custo elevado 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril,selozok,ritmonorm, Positivo: Melhora das arritmias, e frequência cardíaca, Negativo: Leve queda da pressão já estavel
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remedio é ótimo para insuficiência cardíaca não entendo porque a Conitec foi contra. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, selozock, Positivo: Aumentam a capacidade respiratória e diminuem a insuficiência cardíaca., Negativo: Não tem efeitos negativos. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Selozock, Positivo: Aumenta a capacidade respiratória e diminui a insuficiência cardíaca, Negativo: Não existe

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Carvidelol, ramapril, ecasil, ancoran e furozemida., Positivo: Todos os medicamentos apresentaram um bom resultado., Negativo: Não há efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvidelol, ramapril, ecasil, ancoran e furozemida., Positivo: Todos os medicamentos apresentaram um bom resultado., Negativo: Não há efeitos negativos.</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Ainda estou em tratamento, Negativo: No momento o tratamento está sendo favorável</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Estou em tratamento ainda com entresto 49/51, Positivo: Redução dos batimentos cardíacos , Negativo: Inchaço na garganta</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Produto eficaz no tratamento de insuficiência cardíaca. O resultado obtido é notadamente superior aos demais disponíveis para o mesmo tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Facilita a circulação com menor esforço do coração., Negativo: Não foi detectado efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Valsartana isoladamente.Ramipril, Positivo: auxílio da circulação sanguínea., Negativo: seus efeitos vão diminuindo com o passar do tempo e adaptação ao organismo.</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação em questão, foi a única que até o presente momento durante 25 anos deu utilização de medicamentos de controle de pressão arterial que teve eficácia total no controle de minha pressão arterial.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Diovan 320/5 anlofix , Positivo: Minha pressão arterial estabilizou em 12/8 a partir do uso desta medicação Eu fazia uso do Diovan 320/5 anlofix e tinha a pressão média de 15/10, Negativo: Não tive efeito negativo com o Produto em questão.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diovan anlofix 320/5 mg , Positivo: O produto em questão estabilizou minha pressão arterial em níveis satisfatórios , Negativo: No caso do Diovan ao consegui os níveis de pressão arterial dentro dos padrões aceitáveis</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu faço uso do medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos não tem condições financeiras de comprar seus medicamentos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Melhora insuficiência cardíaca , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Melhora insuficiência cardíaca , Negativo: Nenhum</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Usado no tratamento de meu pai. Excelente medicamento. Indispensável sua administração, Negativo: Não foi observado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Restabeleceu a saúde do coração, Negativo: Não foi observado</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto cardivilol xarelto, Positivo: Me senti melhor, Negativo: Nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xarelto entresto cardivilol, Positivo: Me senti satisfação, Negativo: Nenhum</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Faz bem para minha saúde , Negativo: Nao tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nao tive, Positivo: Nao tive, Negativo: Nao tive</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quero o medicamento distribuído sem custos na rede publica .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97.43 mg, Positivo: Menor numero de internação , menos cansado, Negativo: Pressão muito baixa</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Procolaram, Positivo: Me senti bem com ele, Negativo: Pressão abaixava</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o entresto é o remédio que revolucionou o tratamento da ICC de fração de ejeção baixa, doença com alta incapacidade e mortalidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: entresto, Positivo: redução da pressão e melhora do remodelamento cardiaco com diminuição da queixas do paciente com ICC, Negativo: reduz pressão tão bem que é preciso reajustar a dose de outras medicações</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: iECAS, BRA, espirolactona, atenolol,..., Positivo: melhora discreta dos sintomas, Negativo: hipotensão, bradicardia, disfunção eretil,...</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, RESULTADOS EXCELENTES EM PACIENTES EM QUEM NADA MAIS PODERIA SER ACRESCENTADO.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO, Positivo: MELHORA DOS SINTOMAS E DA QUALIDADE DE VIDA, Negativo: HIPOTENSÃO ARTERIAL LEVE.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INIBIDORES DA ECA, BETA BLOQUEADORES, BRAS., Positivo: MELHORA DO QUADRO CLÍNICO, Negativo: LIMITAÇÃO DA REMISSÃO DOS SINTOMAS.</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Tenho pacientes com ICC rebeldes aos tratamentos clássicos que responderam bem ao uso do sacubitril com melhora clínica e avaliação ecocardiografica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto , Positivo: Melhora sintomática referida pelos pacientes alem de sinais clinicos e ecocardiograficos confirmatorios, Negativo: Deve-se tomar cuidados na introdução. Suspensão previa de inibidores de ECA. No inicio do uso muita precaução no acompanhamento clínico que deve ser semanal devido o risco de hipotensão.</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso deste medicamento e as vezes passo aperto para comprá -lo. Ele é um ótimo medicamento. Deveria ser fornecido pelo sus.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26, Positivo: Controlou meu coração, minha pressão me sinto muito melhor com ele. , Negativo: Não vi nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartanacardivilol digoxcina furosemida, Positivo: Não tive. Usando meus medicamentos não eficiente como o entresto. , Negativo: Meu coração descompensou usando esses medicamentos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Este medicamento veio pra mudar minha vida, más utimamen vem ficando caro no meu orçamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 20/26, Positivo: Minha fração mudou de 47% melhorou pra 57% em 8 meses ., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estresto, Positivo: Maravilhoso. Não conseguia fazer as coisas, cansava muito. Agora não, Negativo: Muitíssimo caro o medicamento</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quero q inclua a medicação totalmente gratuita pelo sus.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Insuficiência controlada, Negativo: Pressão muito baixa</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto,espirolactona e furosemida., Positivo: Insuficiência cardíaca controlada e sem inchaços. , Negativo: Pressão baixa.</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Meu cansaço diminuiu significativamente, hj não canso como antes de começar toma o Entresto, Negativo: Só o preço mesmo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Aumento da condição física , Negativo: nenhum</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso da medicação com ótimos resultados</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: A minha avaliação médica após utilizar o Entresto melhorou consideravelmente., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana , Positivo: Minha condição física estava relativamente boa., Negativo: A pressão arterial estava um pouco instável</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação é a melhor opção nos dias atuais para o tratamento dos pacientes com Insuficiência cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/ValsartanaEnalaprilBRA, Positivo: Sacubitril/Valsartana- Reduz hospitalização , melhora sintomas e a vida no geral.Enalapril- Acesso ao tratamentoBRA - Acesso ao tratamento, Negativo: Sacubitril/ Valsartana- As apresentações do produtoEnalapril - Tosse, dificulta a adesão ao tratamento, não melhora os sintomasBRA- Não melhora o sintomas</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Controle das complicações no coração decorrente de quimioterapia. , Negativo: Não tive nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente porque o medicamento se mostrou mais eficaz que outros tentados anteriormente e não apresenta indesejáveis efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26mg, Positivo: Redução do cansaço e da falta de ar, que inclusive sumiram após o uso do medicamento. Pude retomar o trabalho e a pressão está controlada., Negativo: Em cerca de um ano de uso do Entresto, não percebi nenhum efeito colateral.</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se há a possibilidade de se facilitar o acesso da população a um medicamento tão caro pra maioria, é dever dos responsáveis pela saúde colocar a disposição via SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Grande melhora no quadro de insuficiência cardíaca. , Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Enalapril, atenolol e losartana potassica., Positivo: Todos agiam conforme suas funções. , Negativo: Seus efeitos são temporários.</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO, Positivo: MELHORA DOS SINTOMAS NA ICC, DIMINUIÇÃO DAS INTERNAÇÕES POR ICC., Negativo: HIPOTENSAO ARTERIAL</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BETABLOQUEADOR, IECA, BRA..., Positivo: MELHORA DA ICC, Negativo: TOSSE, HIPOTENSÃO ARTERIAL...</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: com ENTRESTO, Positivo: DIMINUI ACENTUADAMENTE A CANSEIRA, Negativo: DÁ DESINTERIAS. TENDO QUE TOMAR LONIUM E PROLIVE PARA SEGURAR.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: DIJOVAN, Positivo: NÃO ME LEMBRO MAIS, Negativo: TAMBÉM NÃO</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Diminuiu um pouco a sensação de aperto no peito, Negativo: Aumento de cansaiva . Falta de ar .</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Valsartana, Positivo: Nao teve o resultado esperado, Negativo: Houve avanço do quadro clinico</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Valsartana, Positivo: Não tive, Negativo: O quadro clínico com valsartana avançou</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento eficiente, foi importante para minha recuperação, mas tive que pedir auxílio a família para o tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Captopril, losartana, , Positivo: era necessário a intervenção com outros medicamentos para estabilizar.e o processo era difícil, pq acertava um o outro dava problema, Negativo: tanto um como outros tinha dificuldade para manter-me estavel, hora pressão baixava demais.as vezes picos.ultima entrada no CTI, ia para baixo e para cima em poucos minutos. com início do tratamento com entresto ficou estavel em poucos dias.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Captoprillosartanaos dois associados ao Bisoprolol, Positivo: Manteve a situação estável por alguns anos, Negativo: começou a ter picos de pressão alta e, logo em seguida baixa.fui para o CTI, onde essa situação mudava em minutos e o batimento cardiaco nao se estabilizava tbm, o entresto, mudou isso e estabilizou a situação.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que ser liberado para o SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhoras significativas, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, provocaram, esperinolactona, Positivo: Todos , Negativo: Esperinolactona, aumento do peito direito</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação contribui com o prolongamento da vida e qualidade da vida do paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou a qualidade geral de vida e diminui as internações , Negativo: O preço torna a medicação de difícil acesso</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, eliquis e carvedilol, Positivo: Em todos houve uma melhora temporária , Negativo: Pradaxa deu azia. Eliquis rendeu uma hemorragia seguida de internação de 15 dias, por anemia profunda. E o carvedilol exigia exames mensais no Ame, que fica a 100 km. Da cidade que reside, exigindo de um paciente idoso , esforço desumano.</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com Entresto , Positivo: Melhor qualidade da saúde não tive mais internação , Negativo: Valor muito alto</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Espirolatocona, Positivo: ia ao medico uma vez por mês , Negativo: Antes eu vivia internado</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Ajuda a manter viva , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Zetia, Positivo: Manter viva , Negativo: Não tem</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Valor muito alto do medicamento, impossibilitando que pessoas de menor poder aquisitivo cuidem da saúde.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Fortalecimento do coração. Sou infartado., Negativo: Tontura.</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa droga tem se mostrado, pelo mundo, altamente eficaz, reduzindo internação e morte. Só isso já justifica seu uso. Em a população tendo acesso, a economia nos gastos hospitalares compensará.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacobitril-valsartana, Positivo: Pacientes graves, com FE abaixo de 30, mesmo com tratamento convencional em doses otimizadas, ao tomar sacobitril-valsartana, experimentaram sensível melhora, com grande ganho em sua qualidade de vida., Negativo: Até o presente momento, todos os pacientes aos quais prescrevi essa droga, toleraram-na muito bem. Não tive necessidade de interromper a medicação em nenhum deles. Não ocorreram efeitos adversos relevantes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Na ICC as diretrizes preconizam o uso de inibidores da ECA ou BRAs, mais um betabloqueador, seja carvedilol, metoprolol ou bisoprolol, mais diurético e espirolactona. Meus pacientes sempre recebem essas drogas, mas os mais graves nem sempre respondem adequadamente, necessitando, com frequência, cuidados hospitalares, com alto custo para a qualidade de vida., Positivo: Todas as drogas citadas, bem usadas são ótimas e mudaram a história natural dessa terrível doença. A diferença é que com mais essa nova droga, demos um grande passo adiante., Negativo: Nem todos os pacientes, mesmo com tratamento otimizado se beneficiam com melhora significativa da qualidade de vida e são reinternados com frequência, por descompensação.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remédio que nem todo paciente recondução de comprá-lo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto., Positivo: Não consigo especificar tecnicamente os efeitos positivos, só sei que me sinto bem melhor depois que passei a usá-lo., Negativo: Não consegui até o presente momento v sentir algum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: No momento não consigo lembrar o nome., Positivo: Melhoras no sintomas apresentados antes de passar a usar o medicamento, Negativo: Não consegui identificar efeitos negativos.</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A associação sacubitril/valsartana tem se mostrado extremamente útil na melhora de qualidade de vida dos pacientes com insuficiência cardíaca, alguns tendo resultados tão positivos que saem da fila de transplante cardíaco.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com sacubitril/valsartana em paciente com insuficiência cardíaca devido à insuficiência coronariana, Positivo: Paciente passou de classe IV para classe II com sacubitril/valsartana, Negativo: Houve queda de pressão arterial quanto tentei chegar à dosagem mais elevada dessas drogas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidor da enzima de conversão da angiotensina (IECA) com diuréticos de alça, com antagonista da aldosterona, betabloqueador , Positivo: Os IECA são medicamentos reduzem hospitalização e morte, os diuréticos são os medicamentos de eleição para reduzir os sintomas dos pacientes congestos e dispnêicos, os antagonistas da aldosterona estão indicados em pacientes em classe funcional III e IV, reduzindo remodelamento de arteríolas de resistência, evitando fibrose miocárdica, entre outros efeitos, os betabloqueadores também atuando com melhora de qualidade de vida, com redução de hospitalização e mortalidade., Negativo: Eventualmente, o pior efeito colateral é a hipotensão. A rigorosa avaliação renal se faz necessária, bem como hipocalemia. Nos pacientes renais em uso de IECA foi necessária reavaliação.</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O remedio poderia ser colocado a disposição dos pacientes pois o valor dele é muito caro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entrestol, Positivo: Ele o entresto é um medicamento completo, Negativo: Ele mexe muito com a dor no estomago.?</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Procedimento cateterismo , Positivo: Me manter viva , Negativo: Custo alto</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Procedimento cateterismo , Positivo: Me manter viva , Negativo: Custo alto</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento tem feito grande diferença no meu tratamento para insuficiência cardíaca</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entres tô em todas as dosagem , Positivo: Não me canso como antes, Negativo: Não houve até o momento efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O fármaco em questão tem se mostrado muito útil no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca, melhorando a qualidade de vida e reduzindo desfechos graves.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora da fadiga, da tolerância ao exercício, da capacidade laborativa, da auto-confiança, da sobrevida. Reduz internações, complicações CV e mortes., Negativo: Hipotensão, custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diuréticos, ieca, bra, beta-bloqueadores, mineracorticoides, cardiotonicos., Positivo: Em conjunto melhoram o desempenho cardiovascular, Negativo: Tem limitações da eficácia com progressão da doença.</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque depois que comecei a tomar a medicao em questao melhorei muito a minha qualidade de vida. Não me sinto mais cansado e estou dormindo bem. Sem falar das condições financeiras dos aposentados para fazer uso contínuo de medicação de custo tão alto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26, Positivo: Acima ja descrito, Negativo: Não percebi nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Naprix, Positivo: Controlava a pressao, Negativo: Mas ficava ainda cansado.</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há diminuição de mortalidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os que foram usados até hoje, Positivo: Melhora sintomática e aumento de sobrevida, Negativo: Os da classe dos BRA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Captopril, enalapril, losartan, espirolactona, AAS, estatinas, digital, diuréticos, amiodarona, quinidina, propaganda, xilocaina, mexiletine, etc, Positivo: Sintomático e no caso dos iecas diminuição de mortalidade em estatinas diminuição de reinfartos, Negativo: Varios deles aumento de mortalidade.</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remedio carissimo que nao esta ao alcance da maioria da populacao</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: 1-Entresto 2-Pradaxa 150g3-Omic oras 4-CARVEDILOL 25, Positivo: 1-Fortalecimento coracao. 2-Em casos de arritmia evita formação de trombos. 3-HPB hiperplasia prostática. 4-Fortalecimento do coração., Negativo: Até o momento nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento mostrou maior eficácia no controle da haste com efeitos colaterais menores. Entretanto o alto custo de aquisição está dificultando o acesso com a dose terapêutica correto. Por vezes acaba a medicação e não possui dinheiro para repor de imediato.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entretanto 24/26, Positivo: No meu caso eu possuo anemia severa devido a é de cirrose biliar primária e síndrome mielodisplásicas. O medicamento anterior - o monocórdil - não estava regulando minha pressão, Além de me dar dor de cabeça, náusea e me debilitar muito. Com entresto 24 não fico mais edemaciada, sinto menos dor no coração e menos câimbras., Negativo: Úrino mais vezes</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Propanolol 40mg, monocórdil, aldactone, Positivo: Custo era menor, Negativo: Muito inchada, dispnéia constante e muita taquicardia</p>
08/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: - Entresto 97 mg/103mg, Positivo: Me sinto bem tomando Entresto, faço todas as atividades na academia sem sentir cansada., Negativo: Tosse, desânimo, tontura quando me levanto rápido, Enjoo (de vez em quando), leve dor de cabeça quando levanto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu faço uso contínuo de outros medicamentos como: Brilinta, Concardio, Rusovas, Somalgin cardio, Espironolactona., Positivo: Os efeitos foram todos positivo, Negativo: Não houve efeitos negativos, meu organismo se adaptou bem com esses medicamentos. (graças a Deus).</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tomo este medicamento ele e muito caro e tive uma melhora no meu tratamento 2ª - Não 3ª - Não
07/12/2018	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na disposição após qualquer atividade física por menor que seja, Negativo: Nenhum 3ª - Não
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E um medicamento eficiente que mantém lo paciente controlado. 2ª - Não 3ª - Não
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou a qualidade de vida, Negativo: No inicio do tratamento com o medicamento houveram alguns efeitos colaterais. 3ª - Não
07/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Resolveu meu coração inchado. Fez bem para mim como paciente. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto --sacubitril/valsartana, Positivo: Diminuiu inchaço no meu coração., Negativo: Não observei 3ª - Não
07/12/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/12/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Só quem precisa usar a medicação,sabe o quanto é difícil ficar alguns dias sem tomar por falta de dinheiro 2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: Melhora na qualidade de Vida, Negativo: O único efeito.negativo é o preço 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicamento prolonga e melhora a qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO, Positivo: DIMINUI AS INTERNAÇÕES E DIMINUI AS MORTALIDADES, Negativo: HIPOTENSÃO ARTERIAL</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LOSARTANA E ENALAPRIL, Positivo: DIMINUIÇÃO DOS SINTOMAS COMO CANSAÇO E INTERNAÇÕES HOSPITALARES, Negativo: TOSSE, INSUFICIÊNCIA RENAL</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso contínuo dp medicamento Entresto é um excelente medicamento porem o seu custo e muito alto.Gostaria muito que fosse liberado pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tomo os medicamentos CARVEDILOL aldactone Aspirina Prevent, Positivo: Dentre todos medicamentos o único que consegui estabilizar minha pressão arterial foi o Entresto. N, Negativo: Não tive nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CARVEDILOL ALDACTONE ENTRESTO, Positivo: SO OBTIVE O EFEITO POSITIVO COM O ENTRESTO, Negativo: SEM O ENTRESTO A MINHA PRESSÃO ARTERIAL ESTAVA MUITO DESCONTROLADA</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento parece bom porem nao há relato medico de quando ou em qual momento a dose deve ser modificada</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Nao ha relato de alergia ou mal estar, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Monocordil, Positivo: Preço, Negativo: Cefaleia</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso a medicação há 2 anos e tive melhora importante é não precisei ir mais ao hospital</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril com valsartana, Positivo: Melhora dos sintomasMenos internação , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: LosartanaCarvedilolEspironolactona, Positivo: Apesar de todo tratamento continuava muito sintomática , Negativo: Ainda tinha muita falta d3 ar e ia várias vezes a emergência</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alivio e controle imediato , Positivo: ..., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual:, Positivo:, Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitas pessoas com esta insuficiencia não tem acesso a este otimo medicamento que mudou minha, eu só tenho acesso a ele porque meu filho está comprando, se ficar sem com certeza morrerei, e não sao muitas pessoas que são bancadas, por isso a importância da rede pública oferecer o medicamento, pois o simular não faz o mesmo efeito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto 50/49, Positivo: com o entresto minha vida mudou da água pro vinho, a disposição é outra e consigo ter uma qualidade de vida muito superior, Negativo: Não senti efeito colateral, só melhora no meu estado de saude</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Naprix, Positivo: Tomei nariz por muitos anos, mas chegou a uns 02 anos atrás, não me sentia bem e a médica comentou que havia um novo medicamento no Brasil, foi então que entrei no programa do entresto, e foi tão bom que uso até hoje. , Negativo: Nariz não resolvia mais o problema do cansaço e prostração em que me encontrava, porém e entresto deu mais força para meu coração, que em mais ou menos 10 anos, o exame feito de ecodopler mostrou que após o uso do entresto meu coração apresentou maior força em relação a todos os outros exames anteriores.</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente se sente muito bem tomando esse medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Positivo: A pressão que era baixa se estabilizou, Negativo: Com Carvedilol a pressão era muito baixa.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Positivo: Indicado pela cardiologista, por ser um medicamento mais eficiente e que provoca menos efeitos colaterais., Negativo: Abaixava muito a pressão.</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto,ezetimiba,rusovastatina,carvedilol, Positivo: Entresto para insuficiência cardíaca,diminuiu meu cansaso melhorou pressão,ezetimiba diminuiu bem meu colesterol,rusovastatina também auxiliou na diminuição do colesterol e triglicéres,carvedilol menos dor no peito., Negativo: Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana,sinvastatina, Positivo: Não teve, Negativo: Losartana não estava melhorando a insuficiência .sinvastatina acabou minha massa muscular dor no corpo nos músculos dor de cabeça</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O SUS deveria sim fornecer o remédio pois é uma doença gravíssima e o remédio melhora muito as condições do paciente e muitos não conseguem pagar pelo remédio</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Foram muitos medicamentos que meu esposo teve experiência mas o resultado melhor foi com o entresto, Positivo: Diminuiu o inchaço falta de ar mantém a pressão arterial controlada excelente qualidade de vida em vista de qndo ele não fazia o uso desse medicamento, Negativo: Muitos não davam o resultado esperado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Atorvastatina Losartana aldactone furosemida aminofilina entre outros..., Positivo: Controle razoável do cansaço diminuía um pouco a falta de ar mantinha a pressão arterial mais ou menos controlada mas às vezes oscilava, Negativo: Tontura fraqueza principalmente depois que meu esposo passou por uma cirurgia cardíaca. Hoje ele é paciente de transplante cardíaco devido a insuficiência cardíaca crônica</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento melhorou muito a minha patologia...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Fortaleceu e estacionou a minha cardiopatia, Negativo: Não houve efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Amiodarona..., Positivo: Frequência cardíaca não diminuiu..., Negativo: Tiroidismo...</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: SENTIU MELHORA COM ESEE MEDICAMENTO , Negativo: Nao tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CAVERDILOU , Positivo: Ajudou a estabilizar meu coração , Negativo: Não teve efeito negativo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Valsartana, Positivo: Melhora na sobrevida e sintomas, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caverdilol, valsartana, espirolactona, digoxina, amiodarona, Positivo: Melhora na qualidade de vida, sobrevida e sintomas, Negativo: Sem efeitos negativos</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso da medicação com ótimos resultados</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: A minha avaliação médica após utilizar o Entresto melhorou consideravelmente., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana , Positivo: Minha condição física estava relativamente boa., Negativo: A pressão arterial estava um pouco instável</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Resposta clinica satisfatoria e superior a outras classes de drogas na insuficiencia cardiaca cronica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da funcao cardiacaRemodelamento reverso, Negativo: .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ., Positivo: ., Negativo: .</p>
07/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tal medicamento representa um ganho no tratamento de paciente com IC, tanto em relação a diminuição das taxas de hospitalização bem como de mortalidade.Importante para hospitais públicos onde a falta de leito é crucial.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Diminuição de taxas de internação e de mortalidade. recomendado pelas diretrizes nacionais e internações., Negativo: Hipotensão arterial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol, Positivo: Diminuição de taxas de internação e de mortalidade. recomendado pelas diretrizes nacionais e internações.Em mais de 10 anos de utilização não há mais dúvida de sua utilidade, Negativo: Bradicardia, broncoespasmo</p>
10/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo e avho de extrema necessidade ja que o médico recomendou e a paciente super se adptou. So que a medicação é mt cara de assim como ela acredito que muitas pessoas que precisam não tem condições de comprar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na retenção de líquidos, mais forcas nos mebros inferiores e controle da pressão aeterial. Melhoras nos episódios de falta de ar., Negativo: Nao tove nenhum eceito indesejado</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Não me senti mais cansado, com insuficiência cardiaca, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lasix,aldactone,corus e ictus, Positivo: Eram bons, mas continuava sentindo cansaço e sendo hospitalizado, Negativo: Era hospitalizado com frequência</p>
12/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Diminuição do sintoma, Negativo: Pressão mais baixa</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, devido a uma serie de efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Para diabetes, colesterol., Positivo: Controle total., Negativo: Não houve.</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou os sintomas, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seloseck, Positivo: Sem efeito, Negativo: Sem efeitos</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Diminuição da insuficiência cardíaca , Negativo: Pressão arterial baixa</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Pressão arterial baixa</p>
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com qualquer tipo de problema de saúde grave usa vários medicamentos para melhorar sua saúde, se o governo ajudar com um deles ao menos ajudaria muito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Muitos foram os efeitos positivos, tais quais diminuição de dor no peito , Negativo: Não observeo 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não me recordo , Positivo: S, Negativo: S
12/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sem comentários 2ª - Sim, como paciente, Qual: Sem comentários, Positivo: Sem comentários, Negativo: Sem comentários 3ª - Sim, como paciente, Qual: Sem comentários, Positivo: Sem comentários, Negativo: Sem comentários
12/12/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou usuario do Entresto, Positivo: Melhora nos sintomas de lcc, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Amidarona, Positivo: Funcionou por pouco tempo , Negativo: Apos algum tempo não surtiu mais efeito
12/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento muito importante e que tem melhorado a minha qualidade de vida 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51 mg (sacubitril/valsartana), Positivo: Melhorou muito minha qualidade de vida, não conseguia caminhar por 100 metros e hoje consigo andar 1 a 2 km por dia , Negativo: Não tive efeitos negativos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, espirolactona, bisoprolol, Positivo: Melhora de qualidade de vida , Negativo: Hipotensão arterial e anemia
12/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é muito caro. Gostaria de ter o tratamento sem pagar nada mais já que pago muitos impostos. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Durmo melhor. Tenho o meu dia a dia bem melhor com essa medicação. , Negativo: Não tive efeitos negativos. 3ª - Não
12/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ja tomo o medicamento a 1 ano e houve melhiras exprecivas 2ª - Sim, como paciente, Qual: As tres dosagens de entresto, Positivo: Contre de pressao e arritmias, Negativo: Por enquanto sem efeitoa negativos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Atenalol, enalapril, Positivo: Nada a declarat, Negativo: Nenhum
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: MELHORA AMPLA DO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE, Negativo: Desconheço 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cateterismo, colocação de stent, Positivo: Melhora geral, Negativo: Desconheço

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ótimo medicamento porém e caro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Bom, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento e caro pra quem recebe um salário mínimo. E o caso do meu pai.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu pai fez cirurgia cardíaca, já tomou Losartana e ainda toma carvedilol., Positivo: Depois da cirurgia manteve estável ,com ajuda dos medicamentos., Negativo: O médico trocou o medicamento porque o coração está com o dobro do tamanho normal, a troca e pra ver se melhora este aspecto.</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Diovan entresto, Positivo: Aumentou minha qualidade de vida, Negativo: Valor dos medicamwntos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diovan, Positivo: Qualidade de vida, Negativo: Sempre o valor</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: É muito bom pra quem tem insuficiência cardíaca, e merecia ser dado de graça pelo SUS, pois o custo é alto., Negativo: Minha mãe que usa, não sei bem os efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já respondido na pergunta 8.1., Positivo: Já respondido na pergunta 8.2., Negativo: Já respondido na pergunta 8.3.</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: EntrestoConcorAnlo, Positivo: Minha pressão está controlada efeitos do anlo e concorFunção de bomba do coração melhor efeito do entresto, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: EntrestoConcorAnlo, Positivo: Todos possíveis, Negativo: Preço</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento novo com patente e devido a isto o preço é alto</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem paciente que de fato precisam da medicação e não tem condições de pagar, a saúde pública precisa suprir todos os tipos de medicamentos e não somente alguns, pois não é possível selecionar uma doença, então, deve se ter todos os medicamentos a disposição da população. Observando que este que está em discussão é de alto custo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Estabilizou a paciente com suficiência cardíaca, Negativo: Não observamos efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sim, e estou me sentindo muito bem, Positivo: Disposição , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Positivo: Aparentemente nenhum, Negativo: Mau estar</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vejo muita necessidade desse medicamento pelo SUS pois vejo q dificuldade da minha vó em comprá-lo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 97/103, Positivo: Realmente cumpre a função de insuficiência cardíaca. Esse medicamento salvou vida, Negativo: Desconheço os efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por ser de auto custo e muitos não teria condições para comprar,O medicamento é ótimo e todos têm o direito de ter acesso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vários, carvedilol, atorvastatina, Ass, furosemida, carvedilol,vastarel, procoloran espirolactona e Entresto. , Positivo: Todos foram e são fundamentais para minha saúde,após 2 enfartes., Negativo: Nao obtive.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Revoxicabana , Positivo: Todos ótimos para mim. , Negativo: Não obtive efeitos negativos.</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, Positivo: Melhora do quadro clínico , Negativo: Efeito colateral: tosse</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, Positivo: Melhora do quadro clínico , Negativo: Efeito colateral : tosse</p>
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem evidências clínicas e científicas que a medicação melhora os sintomas. Alem de reduzir internação e reinternacao além de mortalidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora clinica significativa, Negativo: Hipotensao</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ivabradina, bisoprolol, caverdilol, propranolol, atenolol, nebivolol, Losartana, Candesartana, olmesartana, valsartana, enalapril, captopril, ramipril, perindopril, furosemida,digoxina, Positivo: Razoáveis , Negativo: Limitações em pacientes diabeticoa, com problemas pulmonares e vascular</p>
10/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: resolução da insuficiência cardíaca pós IAM, Negativo: não observei nenhum 3ª - Não
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, após ver a melhora de qualidade de vida do meu pai, após o tratamento com o referido medicamento, tenho que discordar da recomendação preliminar. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: sacubitril/valsartana, Positivo: Qualidade de vida, deixou de utilizar 3 outros medicamentos após o tratamento com o sacubitril/valsartana, foi notável a melhora física e através de exames., Negativo: não teve. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: losartana, hidralazina, isordil, Positivo: controlava a doença mas sem qualidade de vida, tinha cansaço e inchaço nas pernas., Negativo: cansaço, inchaço e perda de apetite como efeitos colaterais.
11/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: sacubitril/valsartana, Positivo: minha qualidade de vida melhorou demais, Negativo: só positivo 3ª - Sim, como paciente, Qual: losartan, isordil, Positivo: não me sentia bem, Negativo: não me sentia bem
11/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, RESULTADOS DOS ESTUDOS PARADIGM E PIONNER REFORÇAM A NECESSIDADE DE USO DE ENTRESTO AO INVÉS DE IECAS. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, IECAS, Brás, Espironolactona, Diuréticos, nitratos., Positivo: Entresto é superior na redução de mortalidade e hospitalização frente aos iecas. Avaliar estudos PARADIGM e PIONNER., Negativo: IECAS além de ser inferior ao Entresto na redução de mortalidade e hospitalização, apresentam alteração da função renal maior que Entresto, efeito grave. Alteração de POTÁCIO dos IECAS são superiores ao Entresto. 3ª - Não
11/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Não ficava tão cansada, Negativo: Sem efeitos negativos 3ª - Não
11/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos e experiência clínica mostram grande melhora clínica e diminuição da mortalidade com o uso da droga 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Observei importante melhora clínica, com queda da classe funcional e aumento da fração de ejeção, Negativo: Tive apenas 01 caso de hipotensão 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores de enzima de conversão. Bloqueadores do sistema renina-angiotensina, antagonista da aldosterona, beta bloqueadores., Positivo: Todas as drogas citadas acima foram benéficas no tratamento das ICFER, Negativo: Tosse com IECABradirritmia com betabloqueadores Hiperpotassemia e ginecomastia com espironolactona Hiperpotassemia com BRA

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora clinica, Negativo: Hipotensao 3ª - Não
11/12/2018	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O medicamento é caro mas meu organismo não aceitou outro substituto. Sou obrigada a adquiri-lo. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Comecei a tomar o medicamento em setembro e os exames em dezembro já apresentaram melhora significativa no quadro cardiológico como também no digestivo., Negativo: Ainda não foi observado nenhum efeito negativo. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Divalol, Micardis e Aldactone. , Positivo: O Micardis até fez alguma diferença para melhor., Negativo: Se foi benéfico para o coração não sei. Provocavam taquicardia e um problema digestivo grave., principalmente o Aldactone.
11/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para mim está fazendo muito bem esse medicamento 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Sinto mais disposição ao caminhar, Negativo: nehum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Naprix 5 mg, Positivo: No inicio funcionou bem, Negativo: Depois comecei a me sentir inchado sem forças para caminhar
12/12/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora qualidade de vida, Negativo: Não tem no meu caso
11/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26, Positivo: Melhoras na função cardíaca,na respiração e no cansaço e fraqueza, Negativo: A unica coisa foi tosse seca 3ª - Não
11/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou usuária deste medicamento e valor cobrado fica muito alto para uma professora aposentada, do ensino primario. 2ª - Sim, como paciente, Qual: atenolol e não lembro outros, Positivo: Com o Entresto minha pressão arterial e frequência cardiaca normalizaram., Negativo: NÃO LEMBRO OS NOMES. MAS MINHA PRESSÃO SEMPRE ALTERADA , BEM COMO A FREQUÊNCIA CARDIACA 3ª - Sim, como paciente, Qual: NÃO LEMBRO, Positivo: NÃO LEMBRO , Negativo: JÁ DESCREVI ACIMA
11/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: tratamento Insuficiencia carfdiaca, Negativo: preço elevado 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação em questão proporciona ao paciente portador de Insuficiência cardíaca crônica sintomática grande alívio dos sintomas, com expressiva melhora da qualidade de vida, redução das internações hospitalares e aumento da sobrevida. Representa uma valiosa ferramenta no manejo clínico desses pacientes, com importante redução de custos com cuidados de grande risco (internações).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECAs, BRAs, BETABLOQUEADORES, DIURÉTICOS, ANTAGONISTAS DE CANAIS DE CÁLCIO, NITRATOS, DIGITALICOS, Positivo: Reduzem congestão, resistência vascular sistêmica, atividade adrenérgica, consumo de oxigênio, entre outras ações. , Negativo: Bloqueiam também os efeitos positivos do Peltideo Natriuretico.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENALAPRIL, LOSARTANA, CARVEDILOL, BISOPROLOL, METOLROLOL, FUROSEMIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, INDAPAMIDA, ESPIRONOLACTOBA, ETC. , Positivo: Já descritos acima. , Negativo: Já descritos acima.</p>
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diante das evidências demonstradas de que o uso do novo medicamento frente a um padrão já consagrado que foi altamente relevante considerando redução de mortalidade seria racional pelo menos incorporar o medicamento para uso a partir do primeiro episódio de internação por descompensação da IC, o que limitaria significativamente o uso aos paciente que mais se beneficiariam do mesmo. Afinal aumentar chance de sobrevida deve ser o alvo de qualquer tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o tratamento já consagrado com uso de diuréticos, digoxina e beta bloqueadores, inibidores da enzima de conversão da angiotensina e bloqueadores do sistema renina-angiotensina, Positivo: No início do tratamento o paciente responde satisfatoriamente, mas com o passar do tempo a função cardíaca vai deteriorando com piora dos sintomas mesmo com aumento da dose desses medicamentos., Negativo: distúrbios hidroeletrólitos pelo diurético, intoxicação digitalica, tosse persistente pelo IECA.</p>
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta associação sacubitril /valsartan tem estudos que corroboram amplamente seu uso clínico na ICC.Exemplo:Estudo ParadigmReducao de internacao e mortalidade por ICCRedução dos custos por ICC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da coasse funcional da ICC, Negativo: Cuidados com hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Digital ,Furosemide,captopril/enalapril/Ramipril/Losartan/valsartan/espironolactona/carvedilol, Positivo: Reducao de mortalidade e internacao por ICC, Negativo: Tosse,hipercalemia,hipotensao,bradicardia</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo para o SUS do Entresto por cinco anos é menor que o custo das internações pelo não uso do medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso do entresto apos ter um infarto que deixou comp sequels a dilatação do ventriculo esquerdo., Positivo: Do Entresto: melhora significativa de qualidade de vida. Na, Negativo: Não já</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concor e Diovan, Positivo: Nenhum, pois ambos não evitaram o infarto, Negativo: Não efeitos negativos nem positivos.</p>
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Para melhorar a situação (cansaço) da minha esposa que sofre de Cardiopatia Dilatada Crônica e Arritmia Cardíaca. o Cardiologista trocou a Losartana Potássica pelo Entresto, que teve o efeito desejado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 24/26 , Positivo: Houve melhora na área cardíaca q antes do remédio era de 34 %com o uso contínuo melhorou para 55% , Negativo: Npercebi efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Houve melhora significativa , Negativo: N foi observado</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um produto novo e caro . Deve sim ser distribuído gratuitamente pelo SUS para que mais pessoas tenham a possibilidade de serem tratadas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Maior controle da PA , Negativo: Cansaço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vasopril, Procoralan, Aldactone, Positivo: Melhor disposição, controle PA, , Negativo: Não houve</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ampliar numero de pessoas beneficiadas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: estabilização de insuficiência cardíaca, Negativo: baixar pressao</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: amiodarona, caverdilol,, Positivo: mantem estável o coração, evitem arritmia, Negativo: sem comentarios</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é extremamente necessário para alívio da doença e possui um custo elevado para o paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Alivio do sintomas e melhoria da qualidade de vida, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo ajuda sus pois esse medicamento muito caro tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103 mg, Positivo: Melhora andamento tratamento batimentos cardíacos e melhorou a pressão, Negativo: Única coisa muito caro mas excelente</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Ajudava pressão, Negativo: Como tomava muito tempo remédio já não tava fazendo efeito necessário passava mal direto</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Sou cardiologista e responsável por um serviço de insuficiência cardíaca e transplante de coração em Curitiba. Tenho contato com mais de 1.000 pacientes com IC atendidos pelo SUS. Frequentemente nos deparamos com situações onde a otimização do tratamento clínico com os remédios disponíveis pela rede pública não é mais capaz de atenuar os sintomas ou oferecer melhor qualidade e expectativa de vida. Em muitos desses pacientes tive a oportunidade de iniciar Entresto (quando o paciente ou familiar pode pagar pelo medicamento). É clara a melhora dos sintomas, redução de hospitalização e melhora da qualidade de vida que esses pacientes experimentam. Alguns inclusive com remodelamento reverso e melhora de função ventricular. Também é clara a redução de hospitalização e necessidades de busca ao PS do hospital e às UPAS. Infelizmente nem todos os pacientes que precisam podem pagar pelo medicamento. Muitos estão optando por judicializar via Ministério Público. Sou a favor da incorporação do mesmo pelo SUS não apenas pelo benefício que trará aos pacientes (expectativa e qualidade de vida), mas também pela redução de hospitalizações em um sistema sobrecarregado como o nosso onde não há condições de oferecer internamento de qualidade a todos que precisam.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartana, Positivo: Melhora da dispnéia, da tolerância ao exercício, da qualidade de vida.Redução de hospitalizações e descompensaçõesMelhora de função ventricular, Negativo: Hipotensão (facilmente contornada com manejo das doses)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os medicamentos disponíveis no SUS para tratamento de IC como IECA, BRA, Betabloqueadores, espirolactona. Também com medicamentos não disponíveis como Ivabradina., Positivo: Todos os medicamentos são utilizados no manejo de IC, e até pouco tempo eram nossas únicas opções terapêuticas disponíveis. Melhora morbidade e mortalidade., Negativo: Hipotensão, broncoespasmo, insuficiência renal, bradicardia - inerentes ao mecanismo de ação de cada droga, que devem ser manejados de acordo com a necessidade.</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remedio caro que muitos precisam e nao tem conficoes de pagar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois para mim esse medicamento se mostrou mais eficaz do que os usados anteriormente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora no trato estomacal não causa nenhum desconfortoNenhuma reação alérgica ou de secura na bocaE se mostrou muito eficaz pois os exames de acompanhamento mostram um quadro estável do coração , Negativo: Comigo não há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Tomava obrigado solicitei ao medico um outro medicamento, Negativo: Problemas de dores de estômago náuseas e em algumas vezes vômito perdi 7 kilos em 3 meses tinha medo de comer pois passava mal.</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de medicamento moderno e parece ser eficiente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Houve estabilização do problema., Negativo: Não notei nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio caro, porém com excepcional efeito positivo em minha saúde</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51, Positivo: Melhor disposição, bem estar é melhor comportamento geral, Negativo: Não notei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, aldactone, aspirina, clopidogrel, proximax, glifage, rosuvastatina , Positivo: Todos trabalham em conjunto permitindo a sobrevivência após grave enfarto , Negativo: Não notei efeitos negativos da medicação, somente as sequelas do infarto</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o medicamento Entresto é de alto custo sendo necessário que seja distribuído através da rede pública, principalmente para os pacientes que são portadores de doença coronária.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora de 70% da insuficiência cardíaca , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não me recordo os nomes, Positivo: Nenhum, Negativo: Não houve melhora</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento muito caro</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Sintomas melhoraram e a alegria pelo medicamento dar um pouco mais de esperança de sobrevivência., Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cardilol, Entresto, Aldactone, Ancoron, Ziprol, Synthroid. Tratamento anterior: Lasix, Digoxina, Reconter, Positivo: Todos contribuíram, dentro de seu tempo, positivamente para meu tratamento., Negativo: Nada</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhoras na qualidade de vida e bem estar., Negativo: Não tive problemas.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Marevan, Positivo: Melhoras pontuais, Negativo: Não tive</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diivan, Positivo: Controla parcial a pressão arterial, Negativo: Por controlar parcial a pressão arterial, o coração acaba trabalhando descompassado, engrossando a parede, prejudicando a irrigação</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esse medicamento é ótimo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Positivo: Não sei, Negativo: Medicamento para pessoas com 80 kg o carvedilol</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento tem dado uma sobrevida a minha mãe. Ela estava com débito abaixo de 30 (incompatível com a vida) mas melhorou muito com o medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Administração do entresto., Positivo: Minha mãe estava com débito cardíaco abaixo 30. A FC chegava a 22 BPM mas após administração do entresto ela é outra pessoa. Vamos repetir os exames para comprovar a melhora nos laudos. Pois na prática já está confirmado., Negativo: Ainda não percebemos nenhum. (Apenas o preço que custa 20% do que ela ganha.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: CarvedilolProprafenona, Positivo: Carvedilol ajuda, mas precisa de um adjunto. Tentamos o ritmonorm mas apenas piorou.Quando a médica passou o entresto mudou o quadro para muito melhor., Negativo: Ritmonorm baixava demais os batimentos. Assim como o Carvedilol, apenas</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhora muito a qualidade de vida do paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sacubitril/valsartana , Positivo: Melhora muito a qualidade de vida para atividades básicas do dia e atividade física , Negativo: Perda de peso</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Carvedilol e bisoprolol, Positivo: Melhora de qualidade de vida acompanhados do sacubitril e da valsartana , Negativo: Hipotensão arterial, anêmica e redução de plaquetas sanguíneas</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os medicamentos são muito caros</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou muito meus batimentos , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na falta de ar., Negativo: Não houve nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na falta de ar., Negativo: Não foi observado nem efeito negativo.</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento muito importante para o coraçãoTive uma melhora em 3 meses em 95 % de melhora apenas com o remédio Porem e de alto custo e aperta o orçamento de muita gente necessitada</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto vastarel ancorom selozok aas aldactone clopin, Positivo: Melhora em.95 % em 3 meses, Negativo: Queda de pressão</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto vastarel ancorom selozok aas aldactone clopin, Positivo: Melhora em.95 % em meses de tratamento, Negativo: Queda de pressão</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou tomando esse remédio há 1 ano e tive uma melhora incrível , tenho Cardiopatia Grave e a melhora depois do uso foi excelente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micardes, Ecocardiograma de Doppler, Positivo: Micardes 80 não teve efeito esperado., Negativo: Micardes 80 não apresentou nenhuma melhora minha taxa de ejeção caiu para 26, com o Entresto em 1 ano já está em 50.</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Geralmente, quem mais precisa do medicamento, são idosos e aposentados. que a cada dia veêm sua renda definhar perante os altos reajustes de planos de saúde e custo de vida em geral. Seu poder de compra a cada ano, reduz drasticamente. Só Deus sabe, o esforço que faço para adquirir os remédios e manter a saúde estável, tentando ter uma vida mais duradoura. E desumano a forma pela qual os idosos são tratados pelos políticos brasileiros!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26 mg, Positivo: Controle da insuficiência cardíaca e manutenção de uma saúde estável, sem grandes riscos., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vastarel 35 mg, Concor 5 mg, Monocordil 50 mg, Positivo: Manutenção e preservação da vida., Negativo: Altos custos, principalmente tratando-se de aposentada pensionista que a cada ano vê sua aposentadoria diminuindo consideravelmente o poder de compra. Eu que com ela, no passado, sustentei meus 4 filhos viúva desde os 49 anos, hoje não consigo sequer pagar meus remédios, energia ,água e esgoto e plano de saúde! É lamentável como os idosos são tratados pela classe política brasileira.</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso continuo, sou aposentado e o remédio é caro comprometendo meu orçamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É de grande importância que venha ser distribuídos, porque é uma revolução no tratamento, e qualquer esperança para o paciente deverá ser atendida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Com o uso do Entresto , diminui a fibrializacao , Negativo: Azia</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso continuo, sou aposentado e o remédio é caro comprometendo meu orçamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou a qualidade de vida, Negativo: Queda de pressão! E o valor do produto novo mercado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Divelol, Positivo: Tomei por anos! , Negativo: Sem</p>
12/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhora clínica significativa dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto sacubitril/ Valsartana , Positivo: Melhora dos sintomas e na qualidade de vida, Negativo: Nenhum importante</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta bloqueador, aldactone e IECA, Positivo: Melhora os sintomas, Negativo: Falta de respostas e efeitos colaterais.</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remédio extremamente eficaz no tratamento da insuficiência cardíaca do meu pai, mas tem um alto custo. Devido à sua eficiência e alto custo, acredito que ele deva ser incluído no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: melhora da respiração, fadiga, diminuição do inchaço causado pelo acúmulo de líquidos no corpo, melhora da auto estima, melhora do apetite., Negativo: sem relatos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, &#278; uma droga nova, aprovada e que tem ajudado muito, inclusive a mim!! É de alto custo, comparado a renda que possuo!! Prefiro a comprar, pagar e não depender de um governo incompetente com sempre tivemos!!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103mg, Positivo: Diminuiu a minha variação de pressão e equalizou meu batimentos cardíacos., Negativo: Com Entresto nenhum!!!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Salário 25 mg, Positivo: Funcionou durante algum tempo, Negativo: Perde a eficácia</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por se tratar de um medicamento de auto custo e algumas pessoas não ter condições de estar comprando o mesmo...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49mg/51mg, Positivo: Desinchou o coração e diminuição da falta de ar ao dormir..., Negativo: Náuseas , tontura, diarreia, dor de estômago, leve vertigem ao se levantar da cama ou onde estiver deitado...</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos nós brasileiros honramos com nossas obrigações fiscais, tanto municipais qto estaduais e federais, nada mais justo q o governo devolva essas contribuições recolhidas em forma de benefício p os contribuintes/população .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Redução na dosagem de remédios, pois o Entresto já possui diurético e melhora o desempenho cardíaco., Negativo: Não tem efeitos negativos além do preço!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhor desempenho cardíaco., Negativo: Nenhum. Além do preço.</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo ajuda sus pois esse medicamento muito caro tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103 mg, Positivo: Melhora andamento tratamento batimentos cardíacos e melhorou a pressão, Negativo: Única coisa muito caro mas excelente</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Ajudava pressão, Negativo: Como tomava muito tempo remédio já não tava fazendo efeito necessário passava mal direto</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio é caríssimo. Minha mãe toma há quatro meses e ficou assustada com o gasto só com remédios, mas fiquei curiosa do porquê a CONITEC discorda.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por tratar-se de um medicamento necessario e muito caro, nem todos podem ter acesso a ele...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Houve uma grande melhora na minha qualidade de vida..., Negativo: Nada a dizer...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caverdilol, Positivo: Os efeitos eram bons, porém com Entresto foi mais satisfatório..., Negativo: Nada a dizer...</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por tratar-se de um medicamento necessario e muito caro, nem todos podem ter acesso a ele...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Houve uma grande melhora na minha qualidade de vida..., Negativo: Nada a dizer...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caverdilol, Positivo: Os efeitos eram bons, porém com Entresto foi mais satisfatório..., Negativo: Nada a dizer...</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Creio sim que o governo deva doar esse medicamento que é de alto custo. Eu mesma me beneficieei melhorando insuficiência em 70% .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Tive uma melhora significativa. , Negativo: Nenhum efeito negativo. Pelo contrário, um ótimo resultado.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol é Atacand, Positivo: Sem efeitos positivos , Negativo: Sem energia, pressão baixa e indisposição.</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vejo muita necessidade desse medicamento pelo SUS pois vejo q dificuldade da minha vó em comprá-lo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 97/103, Positivo: Realmente cumpre a função de insuficiência cardíaca. Esse medicamento salvou vida, Negativo: Desconheço os efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favoravel a incorporação pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto., Positivo: Melhora no ritmo diario, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nao recordo nome, Positivo: Menos cansaço. , Negativo: Nenhum.</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicamento ótimo para o meu tratamento mas com muito elevado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina xulttiphy, Positivo: Monha diabete estava meio descontrolado, com este produto foi controlado, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro no momento, Positivo: Não sinto mais cansasso, Negativo: Não tem</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na falta de ar e na disposição para exercícios físicos., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ancoron., Positivo: Controle da pressão., Negativo: Manchas na pele.</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, &#278; um medicamento muito eficiente porém com um preço muito alto inacessível para pessoas de baixa renda</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entesto , Positivo: Mantém os níveis de presao baixos, Negativo: Tontura</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Clopidogrel, Positivo: Melhora nos coagulos saguineos, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Brilinta, Positivo: Melhora sistema cardio vascular, Negativo: Nenhum</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO 97/103mg, Positivo: MELHORAS CONSIDERÁVEIS, Negativo: NÃO</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E um excelente medicamento e auxiliar muita gente no tratamento da insuficiência cardíaca 2ª - Sim, como paciente, Qual: Sim estou me tratando com o medicamento a um e senti uma melhora na minha qualidade de vida, Positivo: Eu utilizo o Entresto 24/26 eu desmaiava com muita frequência e o Entresto resolveu, Negativo: Não tive 3ª - Sim, como paciente, Qual: Brilinta stotvastatina carvedilol, Positivo: Entresto eu tinha muitos desmaios com frequência isto agora não acontece, Negativo: Não tem
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Defendo apenas um controle melhor e consciente do medicamento. 2ª - Não 3ª - Não
12/12/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103mg, Positivo: Diminuiu a ida aos hospitais, Negativo: Medicamento muito caro! 3ª - Sim, como paciente, Qual: Micardis, Positivo: Tomei por vários anos, até 2017 qdo passei um mês na UTI e o medicamento começou a não fazer mais o efeito desejado., Negativo: Não deu mais certo é teve que ser trocado pelo entresto.
12/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do medicamento e não tenho condições financeiras para adquirir o mesmo. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Estou me sentindo bem melhor com o uso e feliz em saber que medicamento me dá um pouco mais de esperança no tratamento., Negativo: Nada negativo. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Cardiolol, Aldactone, Ancoron, Entresto, Synthroid,, Ziprol, Lasix, Digoxina, , Positivo: Em seus períodos de uso todos contribuíram positivamente para meu tratamento, Negativo: Só tive experiências positivas durante o tratamento
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento que está fazendo a diferença na qualidade de vida da minha mãe, porém é caro para uma pessoa que não tem nenhuma fonte de renda e é dependente do esposo que é aposentado com renda de 1,5 salário e também faz uso de medicamentos, já para o estado vai sair mais barato do que manter um paciente hospitalizado, o que é um dos benefícios do medicamento 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ambos, Positivo: Melhora na qualidade de vida, diminuindo os internamentos, Negativo: A falta de recursos para aquisição 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Carvedilol, monitorato de isosorbina, mas na questão de internamentos, diminuíram significativamente, Positivo: Controle da pressão e melhora nos batimentos cardíacos, Negativo: Somente eles os internamentos eram frequentes, de duas a três vezes por mês
12/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de um medicamento importante para o tratamento de muitas pessoas que não possuem condições financeiras para comprar. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Não possui nenhuma restrição com alimentos, nem precisa do controle semanal do INR, Negativo: Preço muito alto 3ª - Sim, como paciente, Qual: Marevan, Positivo: Gratuito no posto de saúde, Negativo: Precisa de dieta alimentar, e controle semanal do INR

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o governo distribuir este medicamento irá economizar em internações e tratamentos hospitalares com diagnosticos cardiacos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto 24/26 mg, Positivo: melhora a disposição, ficamos menos ofegantes, alem da circulação de sangue melhorar consideravelmente.. Conforme constatados em exames feitos antes e depois de começar a tomar o medicamento, Negativo: até o momento não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Motivo financeiro...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cardovilol, Positivo: Fortaleceu e estabilizou o crescimento do coração , Negativo: Dor nas juntas e sistema muscular...</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é bom, porem tem custo alto para a maioria da população e deveria ser gratuito para os que precisam na rede pública</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora em muito a qualidade de vida de quem tem insuficiência cardíaca , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Combinação de varios outros., Positivo: Estabilizou a falta de ar., Negativo: Não teve.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aldactone., Positivo: Não estabilizou., Negativo: Nao estabilizou.</p>
12/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Além de ser uma medicação eficaz,podendo salvar muitas vidas a gratuidade dessa medicação irá facilitar para os profissionais ,pois muitos profissionais, não consegue chegar a eficácia do tratamento por falta de medicamentos tão bom quanto ao Entresto.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha mãe teve uma melhora de 90%com o Entresto,menos palpitações, menos desânimo,menos cansaço,menos mal estar., Positivo: Menos cansaço, menos mal estar, Negativo: Ela tem reclamações quanto a medicação</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro., Positivo: Não lembro, Negativo: Não lembro</p>
12/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação é a melhor opção nos dias atuais para o tratamento dos pacientes com Insuficiência cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/ValsartanaEnalaprilBRA, Positivo: Sacubitril/Valsartana- Reduz hospitalização , melhora sintomas e a vida no geral.Enalapril- Acesso ao tratamentoBRA - Acesso ao tratamento, Negativo: Sacubitril/ Valsartana- As apresentações do produtoEnalapril - Tosse, dificulta a adesão ao tratamento, não melhora os sintomasBRA- Não melhora o sintomas</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicação cara estou penando p comprar 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto e nebilet, Positivo: Esta me ajudando muito c minha doença, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana e ancoron, Positivo: Melhorou muito pouco, Negativo: Nenhum
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento importante para a sobrevida do paciente , porem com alto custo , limitando assim grande parte da população aos beneficios deste medicamento. 2ª - Não 3ª - Não
10/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 103, Positivo: Sem cansaço e sem falta de ar e sem pé inchado, Negativo: Azia 3ª - Não
10/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubutril/valsartana, Positivo: Os efeitos positivos são melhora de classe funcional, redução de internação e mortalidade !!! , Negativo: Hipotensão ocasional 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betabloqueador + espiroactona + IECA OU BRA e todas as demais , Positivo: Vide superior , Negativo: Ndn
10/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A minha experiência no nível hospitalar e ambulatorial desde fev /2017(medicação importada) foi até aqui satisfatória ,com melhora da classe funcional clinica. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: entresto em diferentes dosagens, Positivo: melhora da classe funcional., Negativo: hipotensão arterialfarmacodermia.insuficiencia renal. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos., Positivo: melhora da classe funcional., Negativo: tosse,hipotensão arterial,farmacodermia,agio-edema
10/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol , Positivo: Entresto melhorou a insuficiência cardíaca , Negativo: Nenhum
10/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Captopril, Positivo: Regula a pressão, Negativo: Não senti 3ª - Não
10/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Houve um excelente efeito no tratamento da insuficiência cardíaca., Negativo: Pressão muito alta. 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento deve ser distribuído gratuitamente pelo SUS 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Rapida melhora dos sintomas da insuficiência cardíaca , Negativo: Pressão baixa 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Inalapril, Positivo: Melhora dos sintomas , Negativo: Pressão baixa
10/12/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os benefícios que essa combinação oferece para os pacientes são de extrema relevância. 2ª - Não 3ª - Não
10/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Redução de internação , Negativo: Hipotensão em alguns casos. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, Losartana, Positivo: Redução de internação , Negativo: Distúrbios hidroeletrólitos
10/12/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento salva vidas e é melhor do que os existentes no sistema público 2ª - Não 3ª - Não
11/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque os estudos e diretrizes apresentou resultados significativos para melhora dos pacientes nos quais acompanho em meu Consultório bem como tratamento com meu pai. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sacubitril/Vasartana 49 mg/51 mg, Positivo: Meu pai de 80 anos com fração de ejeção de 21 dia a 31 % teve melhora significativa respondendo bem ao tratamento., Negativo: Não há 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empresto 49 mg por 51 mg, Positivo: Melhora de meu pai em 70 % da condição de sua saúde., Negativo: Não há
11/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento fantástico e que está fazendo a maior diferença na minha qualidade de vida 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Maior qualidade de vida, melhora no cansaço, sinto meu batimentos cardíacos normalizados, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: não me lembro do nome, Positivo: pequena e quase imperceptível melhora, Negativo: continuava me sentindo sem energia e cansado
11/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, eu discordo, pois recebo apenas um salario minimo e mais da metade do salario se vai pra comprar meus remedios alem que tenho que comprar o do meu marido que esta sem poder trabalhar porque sofreu um avc 2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: o medicamento é muito bom alivia minha tontura, e para com minhas dores no peito, Negativo: deixa cansada 3ª - Não
10/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Produto reduziu mortalidade 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Diminuição de mortalidade , Negativo: Não houve 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aldactone, losartan, carvedilol, Positivo: Diminui mortalidade, Negativo: Hipotensao

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai faz tratamento e ele está se sentindo muito bem, contudo, o valor do medicamento é muito elevado e ele, como aposentado, não tem condições financeiras para arcar com as custas do medicamento. João Máximo Cabral dos Santos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: vários, Positivo: Alguns, Negativo: Alguns</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alguns, Positivo: Alguns, Negativo: Alguns</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento de bons resultados p os pacientes com problema de insuficiência cardíaca e de preço muito alto</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Selozoc, espartana e várias outros., Positivo: Consegui controlar minha pressão arterial e depois de seu uso na tive nenhuma crise, Negativo: Confesso q aí da não senti, aliás passei a dormir menos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Selozoc, espartana e outros q não me lembro nome no momento, Positivo: Não me lembro., Negativo: Os medicamentos citados não controlavam minha pressão e me deixavam sem ânimo.</p>
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, pois os resultados de qualidade de vida dos meus pacientes com ENTRESTRO são imensuráveis. Estudos Pioneer e Paradigm mostram esses dados. Economia para o governo, pois o Estudo Pioneer, mostra uma redução de 38% menos hospitalização. Pacientes fora do hospital por mais tempo com ENTRESTRO verso IECAS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTRO, IECAS, BRÁS, DIURÉTICOS E ESPIRONOLACTONA., Positivo: Entrsto é superior ao IECAS na redução de morte e hospitalização. Entresto reduz morte súbita., Negativo: IECAS na9 reduzem a morte súbita, ENTRETO REDUZ A MORTE SÚBITA EM MAIS DE 20%</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, REMÉDIO MUITO EFICIENTE MAS COM UM CUSTO CARO PARA CERTAS FAIXAS SALARIAL.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: MEU CORAÇÃO MELHOROU A FUNCIONALIDADE (EJEÇÃO) EM 50% NOS PRIMEIROS 6 MESES DE USO., Negativo: NÃO TEM</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Angioplastia, Positivo: 5 STENTS JÁ ADAPTADO HÁ DOIS ANOS E CICATRIZAÇÃO NORMAL, Negativo: NIHIL</p>
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta medicação esta fazendo a diferença na vida de quem possui insuficiência cardíaca</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Melhora na qualidade dr vida, voltar a fazer coisas que antes nao fazia, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nao, Positivo: Melhora geral, Negativo: Nenhum</p>
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma doença que atinge uma imensidão de brasileiros, que mata mais que a maioria dos casos de câncer, com prognóstico pior que câncer , que entope os Pronto socorros, emergências com os pacientes descompensados, que custará na faixa de R\$3000,00/mês ao Governo, enquanto os tratamentos cancerígenos com custo superior r\$ 4000,00/mês ... por que não proporcionar isso para este perfil de paciente ?? Tenho familiares tomando, tias, tenho vizinho tomando... pacientes estes com dificuldades para dar continuidade ao tratamento, mesmo ficando R\$200/mês... mas a qualidade de vida deles mudou substancialmente hoje minha vizinha pode ir ao banheiro sozinha fazer suas necessidades... antes dependia de alguém para isso. já está andando sozinha de ônibus... a resposta deste medicamento foi quase que instantânea ... Pergunto : Por que não este , e outros sim ????</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio de suma importância para a insuficiência cardíaca, que veio dar sobrevida aos pacientes, bem como reduzir as internações, de alto custo e que a maioria da população não tem condições de arcar com o valor do mesmo. Dever do Estado dar, entre outras coisas de igual importância, saúde à população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Liptor e Aspirina Prevent, Positivo: Diminuição da pressão arterial e batimentos cardíacos, menos cansaço físico e mais disposição no dia-a-dia., Negativo: Nenhum efeito negativo.</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento extremamente importante para o tratamento da IC e para diminuição do risco de morte</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacumbitril/valsartana (entresto), Positivo: Melhora nas condições de vida cotidiana, diminui os efeitos da IC. A gente fica mais compensado com este medicamento., Negativo: Irrisórios frente aos efeitos positivos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, Positivo: Baixa a pressão arterial, Negativo: Irrisórios também</p>
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ENTRESTO, Positivo: MEU ESTAVA MUITO MAL....MELHOROU SIGNIFICATIVAMENTE...ESTA VIVO...GRAÇAS A DEUS, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da qualidade de vida. , Negativo: Nenhum, somente o valor.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dogoxina, Positivo: Custo., Negativo: Não é a droga de eleição para a doença de meu familiar, mas o medicamento oferecido pelo SUS. Não foi efetivo a longo prazo.</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é muito caro e deveria estar disponível a todos que necessitam</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a negativa nós pacientes teremos que arcar com grande custo sem nenhuma ajuda do governo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Ajuda no controle de minha insuficiência cardíaca. , Negativo: Até o momento nada a declarar.</p> <p>3ª - Não</p>
10/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Controle, Negativo: Sonolencia</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, tenho diversos pacientes que dependem desta medicação para sobreviver.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO, Positivo: MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E MELHORA NA CONDIÇÃO HEMODINÂMICA CARDÍACA , Negativo: NÃO TEM.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENALAPRIL, CONCOR, VALSARTANA., Positivo: MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E CONDIÇÃO CARDÍACA, Negativo: NÃO TEM.</p>
10/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Passei dificuldades para comprar o medicamento. Meu pai usava. Mas devido a dificuldade, não tivemos como comprar, o que adiantou a morte do meu pai.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: O entresto ajudou muito o meu pai. Ele ficou bem mais forte quando começou a usar., Negativo: Entresto é muito caro.</p> <p>3ª - Não</p>
10/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na medicina baseada em evidências há provas de que a medicação diminui número de internações nos pacientes com insuficiência cardíaca classe NYHA II a IV</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartana, Positivo: Paciente melhora a classe funcional, diminui internações e houve suspensão de diureticoterapia, Negativo: Hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Irosas as medicações que constam na diretriz brasileira de insuficiência cardíaca, Positivo: Diminuiu mortalidade, melhora classe funcional, Negativo: Pacientes com poligênicos de difícil aderência, hipotensão impedindo progressão até a dose ótima da medicação, internações por não aderência as medicações.</p>
10/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuário do medicamento e não tenho condições de comprar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril/ valsartana, Positivo: Tem me ajudado em questão de sobrevivência mesmo, Negativo: Não percebi</p> <p>3ª - Não</p>
10/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma medicação que traz a possibilidade de qualidade de vida aos portadores desta doença mas tem um alto custo, nem todos podem adquiri-la.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Concor 10mg, Positivo: Consigo trabalhar normalmente e faço minha atividade física recomendada sem me sentir cansado., Negativo: Não senti efeitos negativos, porém meus exames pioraram, quando o médico receitou o Entresto.</p> <p>3ª - Não</p>
10/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A associação sacubitril/valsartan, diminuiu a mortalidade de pacientes com insuficiência cardíaca sintomática e fração de ejeção baixa, assim como hospitalizações por insuficiência cardíaca, essas hospitalizações além de diminuir a sobrevida dos pacientes, gera um alto custo, justificando a prescrição em pacientes selecionados.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: a associação sacubitril/valsartan em pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção diminuída., Positivo: melhora dos sintomas e sobrevida, diminuição de internação por insuficiência cardíaca, Negativo: Pode cursar com hipotensão, principalmente nos pacientes com pressão arterial mais baixa.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA - enalapril, ramipril e perindopril, Positivo: São eficazes, porém com resultados inferiores em comparação com sacubitril / valsartan, Negativo: Também podem cursar com hipotensão, principalmente nos pacientes com pressão arterial mais baixa.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As evidências mostram que a medicação reduz a mortalidade e a hospitalização por insuficiência cardíaca e já que esta afecção é uma das principais responsáveis por hospitalização em idosos arcada em 75% pelo SUS o acesso a medicação poderia reduzir o custo e aumentar a sobrevida dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com Sacubitril/valsartana., Positivo: Reduziu a mortalidade,a hospitalização e melhorou a qualidade de vida dos pacientes., Negativo: Pode provocar hipotensão arterial que deve ser monitorada e adequadamente manuseada.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, Positivo: Reduz mortalidade e hospitalização, porém abaixo do Sacubitril/valsartana, Negativo: Tosse, piora da função renal e hiperpotassemia</p>
10/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aldactone, Selozok, Losartana Potássica, Positivo: Diminuição nas taxas , Negativo: Não tive</p>
10/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem diversas evidencias científicas (principal delas é o estudo PARADIGM-HF) sobre os benefícios desta medicação tanto para melhora da qualidade de vida (sintomas) quanto da quantidade de vida (redução de mortalidade). Por diminuir intercorrências e mortalidade esta droga já demonstrou em outros estudos ser custo-efetiva. Seria muito bom ter essa droga à disposição para uso em pacientes do SUS. Nós médicos, vocês governo e, principalmente, eles pacientes - ficariam gratos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o citado na discussão - sacubitril-valsartana., Positivo: Melhora de class funcional (sintomas) e redução de desfechos (mortalidade e internações por IC)., Negativo: Causa um pouco mais de hipotensão que os iECA`s.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: iECA`s e BRA`s., Positivo: Estao disponiveis para o sistema unico. Utilizados em larga escala., Negativo: Menos eficientes que o medicamento em questao.</p>
10/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação com resultados que evitam internação por insuficiência cardíaca</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: entresto, Positivo: redução de sintomas de dispneia e aumento de fração de ejeção ventricular, Negativo: não teve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: vários, Positivo: menores do que com entresto, Negativo: intoxicação</p>
10/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É decepcionante o Ministério da Saúde dar um parecer negativo a um medicamento com tantas evidências empíricas de sucesso no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca. Tenho conhecimento de diversos pacientes que utilizaram o medicamento e melhoraram substancialmente. Espero que o Ministério da Saúde repense a posição e faça a incorporação da droga.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente com quadro clínico de insuficiência cardíaca diagnosticado há 2 anos e com o uso da medicação desde 2017 tenho obtido resultados satisfatórios melhorando minha qualidade de vida e a melhoria desse quadro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51mg, Positivo: Não tendo cansaço físicoMelhoria na fração da força que antes era de 21% e hoje estou com 54%, Negativo: Não senti nenhum e espero não ter efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é de suma importância para o tratamento da insuficiência cardíaca crônica</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora nas atividades do dia a dia, menos cansaço, mais disposição, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
10/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da qualidade de vida e função ventricular e internações, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: B bloqueadores, espironolactona, Positivo: Melhora de qualidade de vida e diminuição de internações e de função cardíaca, em ambos., Negativo: Tolerância dos b bloqueadores em relação à pressão arterial e frequência cardíaca.</p>
10/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, PACIENTES COM TAL COMORBIDADE SERIAM BENEFICIADOS, TENDO EM VISTA SER ESTA MEDICAÇÃO A MAIS RECENTE LANÇADA E COM BENEFÍCIOS COMPROVADOS MUNDIALMENTE, ALÉM DE REDUÇÃO NO NÚMERO DE INTERNAÇÕES E REDUÇÃO DE 20% NA MORTALIDADE TOTAL.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SACUBITRIL/VALSARTANA, Positivo: REDUÇÃO DE MORTALIDADE EM 20%, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Não</p>
10/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, E um ótimo medicamento eu uso a meses tem sido excelente porém e muito caro sou aposentado gostaria se possível de pegar farmácia gratuita</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto que tomo atualmente, Positivo: Tomei pois estava com insuficiência cardíaca e com passar dos meses e das miligramas fui melhorando ótimo medicamento, Negativo: Nenhum foi eficaz</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Coloquei marca passo recentemente, Positivo: Tem sido muito bom, Negativo: Nenhum</p>
10/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Evidências robustas favoráveis e boa experiência clínica com a medicação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: ICC com compensação efetiva e redução de internação hospitalar, Negativo: Ndn</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, Betabloqueador, ivabradina, espironactona, diurético de alça, digital, Positivo: Controle de ICC, Negativo: Tosse, câimbras, etc</p>
10/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o entresto é um medicamento necessário para os pacientes que tem alguma anomalia no coração especialmente insuficiência cardíaca, inclusive o medicamento tem um alto custo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: MELhora significativa dos sintomas e FE, melhora de sobrevida em ensaio clínico, on top enalapril, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril, Positivo: MELhora da função ventricular, controle de TA, Negativo: TOSSE</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora respiração,cansaso, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
10/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, tenho prescrito para paciente classe funcional III e IV de INSUFICIENCIA CARDIACA com melhora clinica importante</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENTRESTO, Positivo: MELHORA CLINICA IMPORTANTE EM PACIENTES REFATARIOS AO TRATAMENTO CONVENCIONAL , Negativo: HIPOTENSÃO EM ALGUNS PACIENTES</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: COM OUTRAS CALSSSE DE MEDICAMENTOS USADOS EM INSUFICIENCIA CARDIACA, Positivo: MELHORA CLINICA DE DE SOBREVIVENCIA COM USO DOS BETABLOQUEADORES INDICADOS E DOS BRAS E ECAS, Negativo: HIPOTENSÃO EM ALGUNS PACIENTES</p>
10/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Obtive melhora significativa depois do uso do entreato, por exemplo: consigo subir escadas após o uso, e durmo melhor, Negativo: Não identifiquei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, apresolina, isossorbida, Positivo: Não obtive efeitos positivos, Negativo: Tontura, falta de ar e fadiga</p>
10/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Me sinto mais disposta, foi recomendacao do medico e entao ja é essencial pra mim, Negativo: Ainda nao tem efeitos negatuvos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ja nao me lembro mais o nomes, Positivo: Nao percebia sintomas positivos, Negativo: Idem</p>
10/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes de Insuficiência cardíaca, como o meu pai, merecem o melhor tratamento disponibilizado gratuitamente pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente,pois após o inicio do uso do Entresto,minha saúde melhorou muito,minha condição fisica melhorou o cansaço diminuiu bastante e consigo levar uma vida praticamente normal apesar da minha insuficiencia cardiaca crônica,e o preço ser bastante alto para o uso continuo sem interrupção.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103, Positivo: Após o início do tratamento com o Entresto,minha vida melhorou imensamente,tenho disposição,o cansaço praticamente desapareceu,consigo levar uma vida praticamente normal., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: foram varios medicamentos,como já faz mais de 1 ano que uso Entresto,não guardei o nome dessas medicações anteriores, Positivo: continuava com muito cansaço e indisposição, Negativo: ~continuava com muito cansaço ew indisposição</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou, hoje, dependente deste medicamento, tenho processo judicial para recebimento de medicamentos pelo SUS, embora nunca tenham usado 11 medicamentos que utilizo. Este medicamento foi o que restabeleceu, em parte, melhoras em minha qualidade de vida, Apoio totalmente a inclusão no sistema SUS, gratuitamente fornecido!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril/ Valsartana, Positivo: Melhoras no cansaço extremo, nas anginas, frequentes e na qualidade de vida!, Negativo: Nada a relatar!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metoprolol, Positivo: Melhoras no funcionamento cardíaco, tal como regulação dos batimentos cardíacos e regulação da pressão arterial!, Negativo: Parestesia passageira!</p>
10/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A IC mata milhares de pessoas todo ano no Brasil. Fornecer um remédio que irá ajudar a tratar pacientes com essa doença é garantir um dos princípios básicos da nossa Constituição Federal: o direito universal à saúde</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido ao custo do remédio</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o entresto, Positivo: Ainda está utilizando e o cardiologista está analisando os efeitos, Negativo: No uso do entresto mal estar e queda de pressão</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o entresto, uso diário, Positivo: a pessoa ainda está em fase de análise do uso do medicamento, Negativo: queda de pressão</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora o estado geral e ameniza os efeitos da insuficiência cardíaca, Negativo: Não identifiquei, além do alto preço.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Apressolina, carvedilol, , Positivo: Os mesmos em menor intensidade, Negativo: Não identifiquei</p>
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O medicamento é caro, minha mãe tem insuficiência cardíaca avançada e faz uso do medicamento, ela deu uma boa melhorada ao fazer o uso do medicamento, não temos condições de comprar o medicamento ela vive a base de amostra grátis, eu sou a favor que implante esse medicamento aos mais necessitados, até porque ela faz uso de aproximadamente dez medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Minha mãe se sente muito bem com o medicamento (entresto, Negativo: Nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, clopidogrel, atorvastatina, concorido, furosemida, aldactone, aspirina presente, bromazepam, deciprax, omeprazol, Positivo: Todos são bons, Negativo: O concor abaixa de mais a pressão arterial</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se comprovada como uma medicação revolucionária para insuficiência cardíaca por que não utilizarmos como primeira opção</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nebilet e espirolactona, Positivo: diminuição da pressão arterial e do ritmo cardíaco, Negativo: nunca tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Nebilet e espirolactona, Positivo: Já relatei acima, Negativo: nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação tem se mostrado de muitos benefícios, melhora dos sintomas e da função sistólica ventricular</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartan, Positivo: Melhora dos sintomas e da função sistólica ventricular, mais importante do que outros tratamentos., Negativo: Inicialmente queda da pressão arterial, porém sem comprometer clinicamente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores de enzima conversora e de bloqueadores do angiotensinogenio, Positivo: Melhora dos sintomas e de função cardíaca, Negativo: Intolerância ao IECA, hipercalcemia</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora meu bem estar, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Naprix, Positivo: Melhora o bem estar, Negativo: Nenhum</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, este é um remédio muito caro e seria ótimo se o SUS o custeasse</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: me sinto mais ativa. mais disposta, Negativo: sem o entresto me sinto mais devagar</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio essencial de uso contínuo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26, Positivo: Melhora no quadro geral, Negativo: Custo do medicamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sinvastatina, Positivo: Certo controle do quadro, Negativo: Prostração</p>
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelo simples fato de que há um sem-número de pessoas muito pobres que NECESSITAM do medicamento. Eu sou contribuinte e quero que parte do produto da arrecadação seja destinada a esse fim.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 49/51, Positivo: A qualidade de vida é muitíssimo superior. Evidente!!!, Negativo: Não constatei.</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O mesmo., Positivo: Meu pai se sentiu melhor. Menos cansado., Negativo: Nada a declarar.</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é muito caro e muitas pessoas não teriam condições de adquirir.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51, Positivo: Estou me sentindo muito bem e os exames periódicos prescritos pelo meu cardiologista o confirmam., Negativo: Não há efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Maleato de enalapril, Positivo: Nada contra o maleato de enalapril. A substituição por Entresto se deu por orientação do meu cardiologista., Negativo: Não tenho registro de efeitos negativos.</p>
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: A qualidade do paciente aumentou substancialmente. , Negativo: Não ocorreu</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não me lembro, Positivo: Mantinha o paciente vivo, Negativo: Paciente na maioria das vezes retornava ao hospital ou tinha que mudar a dose do remédio.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de um excelente medicamento para o caso indicado, porém, como não poderia deixar de ser muito caro sobretudo para um aposentado de 87 anos, que percebe um salário mínimo mensal.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não entendi. Aqui está se falando do entresto que eu uso (49mg/51mg., Positivo: De todos da espécie que eu conheço, acredito ser o entresto o melhor. Tomo dois ao dia., Negativo: Não saberei avaliar. Fui enfartado em agosto de 1914, recebendo quatro pontes de safena.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Procoralan, losartana e muitos outros., Positivo: Sempre me dei bem com todos., Negativo: Não saberei dizer.</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Está sendo bem eficaz para o tratamento mas o preço que se paga nas farmácias mesmo com uma porcentagem de desconto é caro, não são todos que conseguem comprar e acho que todos nós como pacientes precisa de ajuda para ter uma vida mais longa.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103mg, Positivo: melhora da função do coração, ficou mais forte a pulsação do coração, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103mg, Positivo: Mesmo resposta acima, Negativo: Nenhum</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO, Positivo: NÃO IDENTIFIQUEI, Negativo: NÃO IDENTIFIQUEI</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto - 10 pacientes, Positivo: 10 paciente com fração de ejeção reduzida com melhora significativa de sintomas e melhora da fração de ejeção ao eco; diminuição da reinternação hospitalar, Negativo: Dificuldades titulação dose devido hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IEca/ betabloqueador/ aldactone /, Positivo: Melhora dos sintomas da INsuficiência cardíaca porém limitado para determinados paciente que ainda permanecem sintomáticos mesmo com dose máxima dos medicamentos, Negativo: limitado para determinados paciente que ainda permanecem sintomáticos mesmo com dose máxima dos medicamentos</p>
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O CUSTO DESTE MEDICAMENTO E MUITO ALTO E SENDO DISTRIBUIDO PELO SUS AJUDA MUITO A SUPORTAR AS OUTRAS DESPESAS INCLUSIVE COM OUTROS MEDICAMENTOS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2018	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A recomendação preliminar da Conitec foi de que o medicamento em debate não apresenta benefícios condizentes com o preço proposto no Brasil. Cumpre destacar aqui alguns pontos: 1- no relatório, é ressaltado que o demandante leva em consideração o limiar de custo-efetividade da OMS de até 3 PIB per capita, mas que este não é um limiar utilizado pelo Brasil. Em decorrência da ausência de limiar definido, qual seria a solução proposta para este caso? Considerar um limiar definido de acordo com cada composição da plenária? Qual é a solução para nortear as proposições dos demandantes e estudos apresentados, então? Qual é o limiar adotado para esta recomendação? 2- o relatório também informa que a economia seria de APENAS R\$49,8 milhões. Considera-se, então, que a economia não é válida? Que a melhor solução seria não economizar? 3- à economia projetada, deve-se destacar também que o custo de reingresso hospitalar é muito superior ao custo de uma hospitalização usual, devido à sua imprevisibilidade e impossibilidade de projeção; 4- em havendo robustez das evidências, recomendações de outras agências internacionais (ainda que com pequenas ressalvas), por que a solução proposta não foi a definição de um novo limiar e de critérios para dispensação? 5- foi calculada nessa "pequena" economia de quase R\$50 milhões o impacto com judicialização no caso de não incorporação? Sim, porque, como manifestado pela sociedade médica em consulta pública do protocolo de IC, o produto já vem sendo utilizado e apresentado resultados no mundo real. E, por esta razão, certamente os profissionais continuarão incrementando a sua prescrição. Em decorrência dos argumentos supra apresentados, nossa manifestação é no sentido de solicitar a alteração da recomendação preliminar, para que seja incorporado o medicamento ao SUS e, assim, sejam considerados os aspectos econômicos (que foram o único ponto de debate do relatório): - economia de R\$49 milhões; - economia com reingresso hospitalar; - economia com gastos em judicialização.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação de uso contínuo para cardíacos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: sacubitril/valsartana para insuficiência cardíaca crônica sintomática (NYHA classe II-IV, Positivo: Melhora na qualidade de vida., Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: sacubitril/valsartana para insuficiência cardíaca crônica sintomática (NYHA classe II-IV, Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: Não há.</p>
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, além dos estudos mostrando a diminuição absurda de mortalidade e sintomas cardiovascular não posso deixar de mostrar minha experiência. TODOS os meus pacientes com ICC sem exceção tiveram melhora clínica em diversos graus mas a maioria, muito importante além da diminuição da internação e reinternação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril e valsartana, Positivo: melhora da dispnéia, melhor tolerância aos esforços, diminuição de internação. , Negativo: não tenho</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: espirolactona, carvedilol e outros da mesma classe, inibidores de ECA, digoxina, Positivo: espirolactona: melhora da dispnéia, porém não igual ao sacubitril/carvedilol : melhora da frequência cardíaca/digoxina: melhora da dispnéia, Negativo: espirolactona: mastalgia em alguns pacientes carvedilol : não tolerado por todos digoxina: risco de intoxicação digitalica</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresro, Positivo: Melhor disposição, melhoria do estado clínico comprovado com exames, Negativo: Não apresentou</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Revascularização, Positivo: Melhora da qualidade de vida, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento comprovadamente, melhorar de forma inequívoco milhares de brasileiros, que cedo morrem, ou tem uma qualidade de vida diminuída pela INSUFICIÊNCIA CARDÍACA!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENALAPRIL/ESPIROLACTONA, caverdilol, Positivo: Medicamentos sintomático , Negativo: Custo elevado da medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ENALAPRIL, Positivo: Melhora extraordinária com uso do SACUBITRI VALSARTANA, Negativo: Não observei</p>
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: A minha mãe é aposentada e esse medicamento é muito caro pois não é disponível na rede pública., Negativo: Caro esse remédio</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A minha mãe é aposentada o medicamento é muito caro (entresto), pois é o único medicamento que ela deu certo., Positivo: Deu certo o entresto para a minha mãe tomar mas como ela é aposentada esse remédio é muito caro., Negativo: Caro esse remédio</p>
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, este medicamento é extremamente eficaz</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Meu pai é outra pessoa após passar a fazer uso do medicamento., Negativo: nada a declarar</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Antes eu recebia o medicamento de graça direto com o meu cardiologista, conforme fiz cadastro com o laboratório fabricante, depois tive que passar à comprar; só que eu estou aposentado por invalidez com um (1) salário mínimo. Está difícil para mim.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamento: Lizinopril, que foi substituído pelo Entresto. Procedimentos:Ótimos., Positivo: Bons., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AAS infantil, Carvedilol, Lazix, Cilostazol, Clopidogrel, Líptor, Entresto,e Procoralan. Dois Cateterismos com implante de stentes e balão., Positivo: Ótimos., Negativo: Nenhum.</p>
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vejo que este remédio tem melhorado muito a vida da minha mãe , ela sempre ficava no hospital , e agora fica mais em casa . E vejo os médicos falando super bem . Minha família aprova este remédio, e nos devolveu a paz em minha casa.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 24/26, Positivo: Minha mãe dorme bem a noite, caminha melhor , e brinca mais com meu filho., Negativo: Não teve efeitos negativos , só o preço que é um pouco caro.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril , Positivo: Também deixava ela bem , porém sempre no Hospital. , Negativo: Tosse , muita tosse.</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Depois que comecei a tomar melhorei 100 por cento ., Negativo: Não notei nem um efeito colateral</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo totalmente em ser distribuído pela rede pública (SUS), pois minha mãe tomou no primeiro trimestre desse ano, enquanto estava tendo descontos no remédio, depois o custo do remédio ficou muito alto para ela continuar comprando, pois ela se sentia muito bem com o remédio</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: No caso minha mãe que usou, ela estava se sentindo muito bem quando estava usando esses dois medicamentos juntos, sem palpitações, sem cansado, sem pernas inchadas, dormia muito melhor, e até conseguiria fazer os serviços de casa., Negativo: O único efeito negativo que tenho a descrever e o auto custo do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: EntrestoVastarel, Positivo: Como citei acima, foram os melhores medicamentos que minha mãe já tomou para seus problemas do coração, Negativo: Como citei acima, o único efeito negativo e o auto custo do medicamento</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preciso muito desse medicamento para ter uma qualidade de vida melhor, mas o custo é muito alto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Meu médico me receitou esse remédio há um pouco mais de um ano e melhorei muito com ele, Negativo: Não tive efeitos negativos com o Entresto</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: melhora significativa do quadro de insuficiência cardíaca, Negativo: Preço muito elevado</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, custo elevado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto , Positivo: ., Negativo: tosse, demais...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: diovcan , Positivo: diminuiu a tosse , Negativo: .</p>
11/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, pois o remédio é necessário para aumentar o tempo de vida do paciente e a não internação do mesmo, que no caso, várias internações causam mais gastos à saúde pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ENALAPRIL E CAVERDILOL, Positivo: O Enalapril foi trocado pois não estava funcionando muito bem.Ele está com a capacidade cardíaca muito baixa, 22%. Toma 25mg de Caverdilol pela manhã e 25 mg à noite, metformina, sinvastatina, espirolactona e Entresto.Meu marido já tomou Losartana., Negativo: Sente falta de ar, fraqueza, dor em algumas partes do corpo, sonolência, cansaço. Não sei se devido ao tamanho do coração ou de remédios.</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO (sacubitril/valsartana), Positivo: CONTROLE DO CANSAÇO DEVIDO AO PROBLEMA NA VALVULA DO CORAÇÃO, SENTINDO UMA BOA MELHORA NA DISPOSIÇÃO FÍSICA, Negativo: INSUFICIÊNCIA RENAL</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, GASO MUITO NA COMPRA DESSE REMÉDIO. SOU CARDÍACA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: VÁRIOS, Positivo: SINTO-ME MELHOR COM ESTE MEDICAMENTO., Negativo: NÃO TENHO ALCANCE PARA TANTO.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: VÁRIO ATÉ CHEGAR NESTE., Positivo: MANTIDO PELO MÉDICO., Negativo: IGNORO.</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por ser um medicamento do e alto custo e muito eficaz, segundo estudos europeus, deveria ser fornecida escudo pelo sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Na, Positivo: Melhora na insuficiência., Negativo: Hipotensão, aumento de uréia e creatinina.</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E um tratamento muito caro, tornando se impossível p maioria das pessoas sujeitas ao tratamento com este medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO 97/103, Positivo: MELHOR CONTROLE NA PRESSAO ARTERIAL E FUNCIONAMENTO CARDIACO, Negativo: NADA A INFORMAR</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: LOZARTANA, Positivo: MELHORAS NO SINTOMA, Negativo: UM POUCO MAIS FRACO QUE O ENTRESTO</p>
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é eficaz e melhora consideravelmente as condições de saúde do paciente com ICC.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhoras na qualidade de vida, diminuição dos episódios de internação e sintomas da doença., Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril /valsartana, Positivo: Diminuicao de mortallidade e reinternacao , morte subita segundo o estudo paradigm, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ieca betabloquuradores ivabradina espirolactona, Positivo: Melhora da classe funcional , Negativo: Hipercalemia disfunção renal</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: nao me lembro, Positivo: nao me lembro, Negativo: nao me lembro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: nao me lembro, Positivo: nao me lembro, Negativo: nao me lembro</p>
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Comprovação de benefício da medicação nos casos de insuficiência cardíaca. Comprovação científica, estudo PARADIGM-HF</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sacubitril valsartana, Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA, BRA, bloqueador do canal de calcio, Positivo: Melhora de classe funcional, Negativo: Custo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu marido é usuário deste medicamento, e sua qualidade de vida aumentou significativamente como o uso deste!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: LOSARTANA, Positivo: EQUILIBRA A PRESSÃO, Negativo: NÃO HÁ</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NÃO LEMBRO, Positivo: NÃO ME LEMBRO, Negativo: NÃO LEMBRO</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do medicamento e constato a melhora produzida por ele.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Disposição, Negativo: Não encontrei</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Haverá diminuição dos custos com internação hospitalar</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Melhora de classe funcional dos pacientes e diminuição do número de internações , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamentos para icc no geral, Positivo: Melhora de classe funcional, Negativo: Número grande de internações</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: a ejeção do meu coração passou de 32 para 48 me dando mais disposição no dia dia, Negativo: NO caso do entresto eventuais desarranjos intestinais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ictus , monocordil retard, crestor aldactone, Positivo: me beneficiam no conjunto mas não trazem o resultado que o entresto trouxe. A melhora da ejeção só aconteceu após um período de 6 meses da utilização do Entresto, Negativo: não identifiquei</p>
11/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na qualidade de vida do paciente, pois eliminou a falta de ar que sentia e ajudou a regular a pressão, pois ele sofre de hipertensão e insuficiência cardíaca., Negativo: Não houveram efeitos negativos na saúde.</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou médico e este medicamento viria contribuir para sobrevida com padrão e qualidade de vida dos pacientes , com redução de mortalidade e de reinternações</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril / valsartana no tratamento de insuficiência cardíaca crônica , Positivo: Maior sobrevida com qualidade de vida, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do medicamento e os resultados são positivos e satisfatórios.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26, Positivo: Melhora na disposição para atividades diárias., Negativo: Não registrei nenhum tipo de efeito negativo durante o uso do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vastarel (mr)., Positivo: Melhora na disposição na realização de tarefas do dia dia . , Negativo: Não senti nenhum tipo de reação negativa no uso do medicamento.</p>
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sacubitril-valsartana, Positivo: Redução em mortalidade cardiovascular e geral, melhora de classe funcional e sobrevida, redução de morte súbita , Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betabloqueadores, IECA/BRA, antagonista da aldosterona , Positivo: As mesmas do sacubitril-valsartana porem com menos impacto, Negativo: Maiores efeitos colaterais como piora de função renal, hipercalemia</p>
11/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Baseado no estudo paradigm</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora de classe funcional, resucao de reinternacao, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IECA , BRA, Positivo: Melhora de classe funcional, Negativo: Hipercalemia, insuficiencia renal</p>
07/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai usa esse medicamento há 3 anos e vem só melhorando da insuficiência cardíaca crônica</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Deixa o paciente menos cansado e mais disposto, Negativo: Caro demais</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eliquis, concardio, Positivo: Os exames melhoram comprovadamente em 3 meses, Negativo: Caros</p>
11/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: furosemida, losatana, Positivo: nao tive reacao como o lasix, Negativo: urinar muito e dor de cabeca</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: lasix, Positivo: urinar muito, Negativo: urinar muito</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, PRECISO DO MEDICAMENTO. CUSTO ELEVADO. VAI FACILITAR SE FOR ENTREGUE PELO SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: sacubitril/valsartana , Positivo: ME SINTO MELHOR, Negativo: NÃO EXISTE ATÉ AGORA</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se podemos beneficiar o doente com fornecimento gratuito é bem melhor. Lembrar que é muito caro a gama toda de remédios que fazemos uso</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Melhoria da qualidade cardiaca, Negativo: —</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol. Procoralam, Positivo: Ajudaram mas o entresto foi dem melhor , Negativo: —</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por ser medicamento com custo alto, e administrado de forma contínua, deveria ser fornecido pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO 97X103, ADMINISTRADO DE FORMA CONTÍNUA., Positivo: APÓS SUA INDICAÇÃO, HOUVE MELHORIA GERAL NO QUADRO CLÍNICO., Negativo: NÃO FOI OBSERVADO EFEITOS NEGATIVOS COM EFEITOS ADVERSOS.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: diovan-hct 320x25mg, Positivo: Após período de aproximadamente 12 meses de uso do diovan, houve melhora relativa dos sintomas clínicos da Insuficiência Cardíaca. Após a mudança para o Entresto, houve ganho na disposição geral e sintomas como cansaço constante., Negativo: Não houve efeitos negativos.</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser distribuído na farmácia de alto custo, pois é um medicamento muito caro, porém seu resultado é fantástico. Minha mãe é exemplo deste resultado fantástico do entresto, porém ela só recebe um salário mínimo e o compra com muita dificuldade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O entresto 49/51, Positivo: Minha mãe em 2017 teve várias internações devido a insuficiência cardíaca, chegando a internar em intervalos de 1 mês de uma para outra. Na última que foi em dezembro/2017 o seu cardiologista falou sobre o entresto e passou para minha mãe tomar. O quadro melhorou muito e daí então nunca mais internou. , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha mãe tomou vários . Enalapril, Losartana entre outros, Positivo: No início dava certo, mas o quadro foi se agravando e não faziam mais efeitos, Negativo: Com o tempo não faziam mais efeitos</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26, Positivo: Melhora positiva em exames clínicos , Negativo: Ainda necessito continuar o tratamento para melhorar mais</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Porque sou paciente e uso esse medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto., Positivo: Faz bem, me sinto mais disposta., Negativo: Não tenho o que relatar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não me recordo dia nomes dos medicamentos, mas já tive experiência com outros, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma medicação muito cara. A população carente que necessita dessa medicação para ter uma vida melhor, falando de saúde, não tem como comprar. Portanto, o fornecimento do sacubitril/valsartana pelo SUS, trará uma vida mais digna para os a população com insuficiência cardíaca e suas famílias.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sacubitril/valsartana 49/51mg e 97/103mg, Positivo: Melhora do cansaço, diminuição da tosse, mais energia para fazer alguma tarefa que antes não conseguia, sono mais regular e tranquilo e o fim dos frequentes internamentos causados por fortes crises., Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Condor, Olmesartana, losartana..., Positivo: Não se percebeu efeitos positivos, apenas um quadro de estabilidade., Negativo: Apesar de manter um quadro de estabilidade, a paciente, constantemente, dava entrada em urgências médicas decidi a graves crises de insuficiência cardíaca.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, muito caro</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois sou paciente e preciso do remédio, nem sempre a gente tem condição de comprar 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Está me ajudando muito em todos os sentidos, Negativo: Nada a declarar 3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, procedimento cateterismo, Positivo: Me ajuda muito no meu problema, Negativo: Nada a declarar
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não conheço a proposta 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Proporcionou maior vitalidade ao meu pai, Negativo: Desconheço 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muito caro 2ª - Não 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo medicamento comprovado que melhora a vida do paciente, seja a curto, médio ou longo prazo deve ser disponibilizado pelo ministério da saúde, pois quando lançado pelos laboratórios os mesmos possuem um alto valor de venda o que impossibilita o uso pela classe de poder aquisitivo menor . 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Entresto melhorou minha FE de 39 % após infarto para 43% após 60 dias., Negativo: ate o momento nenhum efeito negativo, somente o valor de aquisição. 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deveria ser favorável. 2ª - Não 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas não ligam para que os outros sentem 2ª - Sim, como paciente, Qual: Apresolina, naprix, Carvedilol, adalctone, Positivo: Sem cansar, Negativo: Com o tempo o naprix não estava adiantado 3ª - Sim, como paciente, Qual: Carnitina- doía minhas pernas Coenzima Q10 - dor de cabeça , Positivo: Entresto 49/51- deixou mais disposto no dia a dia, Negativo: Não teve aquela melhora que eu esperava
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sc 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Aumento da fração de ejeção, Negativo: Sc 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ictus, Positivo: Proteção , Negativo: Sc

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Enalapril, Positivo: Melhora do cansaço , Negativo: Hipotensão, tonturas frequentes</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhoria na qualidade de vida , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Varios, Positivo: Varios, Negativo: VÁRIOS</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Absurdo, tem sim incorporar entresto ao SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Minha saúde teve uma melhora de 100% com Entresto, Negativo: Não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, Losartana., Positivo: Não houve melhora, Negativo: Pressão não regularizava</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nenhum, Positivo: Nenhum, Negativo: Cansaço, falta de ar</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Me sinto menos inchada, Negativo: Valor</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável a incorporação do medicamento na rede pública</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não me lembro , Positivo: Não me lembro , Negativo: Não lembro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não me lembro , Positivo: Nenhum , Negativo: Mal estar,cansaço</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai melhorou em 80% o seu problema cardíaco após o Entresto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enalapril Procoralam, Positivo: Melhora parcial dos sintomas, Negativo: Hipotensão TonturasNão bloqueou piora do FE-VE</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Além de comprovada eficácia, a doação quando se for utilizada uma forma séria para aquisição para a rede sus, vai ser muito bom devido sus efcácia em tratamento, e a sua baixa acessibilidade devido ao preço pela menos favorecido.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: entresto tenho um membro da saúde, que utiliza o mesmo para inchaço da área cardíaca e tem sido bom., Positivo: esta tendo uma diminuição da area cardíaca., Negativo: o paciente cita quanto de administra o medicamento de manhã sente uma leve tontura logo se estabiliza.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu faço uso do medicamento e ajudaria muito se fosse distribuído pela rede pública.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Me ajuda no tratamento com insuficiência cardíaca, Negativo: Não tive nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora importante da Sintomatologia e qualidade de vida, Negativo: Não observei efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51, Positivo: Diminuiu consideravelmente a insuficiencia, Negativo: Tive um pouco de mau estar no começo. Com o tempo nao mais</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existe muitos pacientes sem condição para comprar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 24/26, Positivo: Melhorou o estado geral de minha mãe. , Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 24/26., Positivo: Melhorou o estado geral, com a melhora da circulação e do coração. , Negativo: Não tenho.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe tem 80 anos e faz uso desse medicamento há 1 ano e 5 meses, o custo é muito alto, só ele sai por 400,00 por mês, fora os outros. Seria ótimo a redução do preço. Boa tarde.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Minha mãe faz uso de 2 CX por mês de entresto 97mg 103mg., Positivo: Teve infarto e a saúde está bem com acompanhamento de cardiologista, Negativo: Sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 97/103, Positivo: Sem falta de ar ou dores no peito., Negativo: Sem efeitos negativos</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remedio traz resultado e é de alto custo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: melhora na sobrevivência, Negativo: desconheço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: varios, Positivo: nenhum, Negativo: inchaço no pé e cansaço</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ABSURDO. ESPERAR O QUE DESSES CORRUPTOS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO 97/103MG, Positivo: VOLTEI A ME SENTIR BEM, Negativo: NÃO HÁ COM O ENTRESTO</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ANCORON 100MG E ARADOIS H 100MG, Positivo: ENQUANTO FEZ EFWITO TUDO BEM..., Negativo: TORNOU-SE INEFICIENTE</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhor resposta ao controle da pressão, Negativo: Provoca tosse</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hyzaar, Positivo: Não provocam tosse, Negativo: Não controlava a pressão</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deveria ser favorável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse remédio fez muito bem pra mim que sofro de insuficiência cardíaca</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51, Positivo: Sou cardíaca a mais de 40 anos, minha fração de ejeção vem melhorando com o uso contínuo do medicamento, Negativo: Negativo é o alto custo do medicamento para mim que vivo com um salário mínimo do INSS por invalidez</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Amidarona, Carvedilol e muito que não lembro, Positivo: Conseguia pegar no posto de saúde, Negativo: os efeitos do amidarona elevou a minha tireoide, e tomei muito anos e não tive grande melhora</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: sacubitril/valsartana, Positivo: melhora na respiração, Negativo: nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai é usuario deste medicamento , so que é muito caro, a fracão de ejeção dele era muito baixa, e com esse medicameto conseguiu aumentar um pouco, so que o custo é muito alto pra um aposentado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 49/51mg, Positivo: Meu pai é cardiaca, usa CDI, tem a fração de ejeção muito baixa e com o uso continuo desse remedio, ja vimos resultados ., Negativo: O efeito negativo é o alto custo do remédio</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Amiodarona, caverdilol, e outros que nao me recordo, Positivo: O preço é mais em conta, mas meu pai tomando a tantos anos, não nos deu uma resposta satisfatória., Negativo: Amiodarona fez meu pai desencadeou os hormonios da tireode,</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51, Positivo: Eu estou tendo uma melhora bem positiva na minha insuficiência cardíaca e respiratória , Negativo: Ate o momento nao tive efeito negativo com o remédio</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, O entresto foi muito bem aceito até agora pelas pessoas que usaram, inclusive no meu caso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Foi fundamental para minha recuperação após infarto em agosto 2017. Com um ano de uso recuperei parte da função cardíaca que havia ficado comprometida, graças ao uso do Entresto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto., Positivo: Recuperação da função cardíaca., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque é um remédio bom que auxilia muito no tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, valsartana , Positivo: Tomo ele a mais de 8 meses e me sinto bem, Negativo: Não tive nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, valsartana , Positivo: Tomo ele a mais de 8 meses e me sinto muito bem, Negativo: Nenhum</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ele tem dado melgores resultados no caso sa minga Mae de 88 anos e está ficando difícil comprar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Losartam, Positivo: Todos foram trocados pois não sutil efeito desejado, Negativo: Tontura, falta de ar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Digoxina, Positivo: Foi trocada pelo Entresto, Negativo: Não sutil efeito esperado no caso dela</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de fundamental importância para quem tem problemas cardíacos e é muito caro</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Losartana potassica , Positivo: Normalizou a frequência cardíaca, Negativo: Não teve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aradois, Positivo: Normalizou a frequência cardíaca, Negativo: Não teve efeitos negativos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O gasto econômico com o medicamento é altíssimo, nem sempre temos o dinheiro para continuar o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: A médica da minha filha avaliou os resultados e ficou muito satisfeita., Negativo: Não houve efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois o remédio foi um ótimo medicamento para o paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Captopril, Positivo: bom medicamento para o tratamento, Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lozartana captopril , Positivo: Foram bons medicamentos por ter insuficiência cardíaca , Negativo: Não tem efeito colateral nenhum</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas sem condições financeiras para adquirit os medicamentos e realmente doentes. Muito alto o valor. Dever do Estado cuidar do seu povo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Melhora dos efeitos, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tive uma melhora considerável, na qualidade de vida, depois do uso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Mais disposição. , Negativo: Sonolência momentânea.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou Brasileiro, estou com 86 anos de idade, trabalhei a vida inteira gerando impostos para este país, acho justo ter este medicamento fornecido gratuitamente pelo rede SUS pelo curto período de vida que ainda me resta. Preciso me abster de muitas outras coisas para poder comprá-lo, não acho justo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51, Positivo: Melhorou muito o meu estado clínico, insuficiencia cardíaca, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro, Positivo: ., Negativo: .</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o medicamento proposto melhorou minha falta de ar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril / Valsartana , Positivo: Melhorou minha falta de ar, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, Positivo: Melhorou minha falta de ar mas perdemos o efeito, Negativo: minha falta voltou</p>
17/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu trato de insuficiência cardíaca , e os remédios são muito caros .O entrego por exemplo e 315 reais, pra quem ganha um salário mínimo , e muito caro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu tomo 5 remédios , e não sei se algum tem esse componente ., Positivo: Os que eu tomo São bons, caverdilol , aldactone , vastarel , sinvastatina , ancoron., Negativo: Alguns da o um pouco de tontura.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vasrarel , aldactone , caverdilol , sinvastatina , ancoron e entresto, Positivo: São bons , com resultados otimos, Negativo: Só as tonturas</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diminui as internações e melhora a qualidade de vida do paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Melhora geral do paciente , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, eliquis e carvedilol, Positivo: Houve uma melhora parcial no paciente , Negativo: Pradaxa. .. crise de queimação forteEliquis. .. internação por hemorragia internaCarvedilol...viagens mensal de 100 k. Pra controle sanguíneo</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Gostaria que o SUS fornecesse o medicamento gratuito</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto sacubitril/valsartana , Positivo: Esta funcionando perfeitamente com minha pessoa, Negativo: Não apresentou efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro o nome , Positivo: Sacubitril é excelente , Negativo: Não tem</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu marido e aposentado, ganha pouco e um remédio de alto custo e isso pesa no orçamento, mas somente com esse medicamento que meu coração melhorou após infarto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Valsartana (entresto), Positivo: Apos infarto meu coração necrosou uma parede e com esse remédio fortaleceu meu coração e seus batimentos melhoraram. Não posso parar de tomar esse remédio. , Negativo: Não existem pontos negativos para a valsartana.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Valsartana (entresto), Positivo: Meu coração melhorou os batimentos e fortaleceu após começar a tomar a Valsartana, Negativo: Não existem pontos negativos</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Insuficiencia cardiaca, Negativo: Nao senti</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O marido de uma amiga minha toma um medicamento chamado Entresto (sacubitril/valsartana). Ele precisa deste medicamento para se manter vivo, visto que ele tem Insuficiência Cardíaca grave. No entanto, o custo do medicamento é extremamente alto, e ele toma 2 caixas por mês.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente tem o direito de ter o tratamento gratuito</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26, Positivo: Controle de arritmia , Negativo: Não observei nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atenolol, Positivo: Controle de arritmia, Negativo: Não observei nenhum</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse novo tratamento trouxe uma nova perspectiva de vida para meu pai. Fazendo ele viver melhor e com mais qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu pai estar usando o Entresto e os resultados São maravilhosos , Positivo: Dorme melhor, não tem mais dispneia.Já toma banho sozinhoE sente-se bem melhor , Negativo: Não vi.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Enalapril, Positivo: Não vi melhora, Negativo: Muita tosse</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dificil aquisição</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Amiodarona, Positivo: Não houve, só negativo , Negativo: Tiroidismo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Maravilhoso...melhorei noventa po centob, Negativo: Aumento do potássio</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Muito eficaz no tratamento da insuficiência cardíaca , Negativo: Não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CarvedilollvabradinaSinvastatina Furosemida, Positivo: Está respondendo favorável de acordo ao tratamento. , Negativo: Não houve efeitos negativos</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Melhoria em minha saude, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Procoralan, Positivo: Melhoria, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, É comprovado que a medicação proporciona melhoria e diminui a taxa de mortalidade, mas pelo seu custo, fica inviável o uso da maioria da população que sofre de insuficiência cardíaca. Poderiam ser adotados critérios para a distribuição e, assim, permitir que pessoas sem poder financeiro possam usufruir de algo que traga mais conforto e qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: sacubitril/valsartana , Positivo: Melhorou o inchaço, dores e cansaço nas pernas. Facilidade de respiração e melhoria ao executar atividades no trabalho, diminuindo o cansaço. Podendo fazer pequenas caminhadas., Negativo: Em um ano de uso só estou apresentando melhorias.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: losartana potássica, Positivo: Diminuiu o aumento da pressão, mas não apresentou melhorias na falta de ar nem no cansaço constante ao menor esforço., Negativo: Não ter apresentado melhorias na falta de ar e no cansaço.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento necessário a cardiacos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vastarel, aldactone, Ass, termine zinpass, Positivo: Sente-se bem. , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nessecito desse remédio para me manter viva e o custo é muito alto, por esse motivo discordo totalmente da recomendação preliminar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto , Positivo: Está garantido o funcionamento do meu coração , Negativo: O valor que é muito alto</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26Vastarel MRDorelol 12.5Aldactone 25Rosucor 20 Aspirina prevet 100, Positivo: Entresto 24/26 ajuda a não infarta mais Vastarel MR ajuda um bom funcionamento do coração Dorelol 12.5 ajuda a manter a pressão arterial normalizada Aldactone 20 a liberar os líquidos Aspirina prevet ajuda na circulação sanguínea e o Rosucor 20 para eliminar as gorduras do sangue , Negativo: Até o momento não tenho efeitos negativos de todos os medicamentos que eu tomo</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nao precisa comentar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Ajuda em meu tratamento, Negativo: Muito caro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Procolaram, Positivo: Ajuda na insuficiência, Negativo: Nenhum</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O REMÉDIO EU JÁ FAÇO USO E É MUITO BOM O RESULTADO.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: O próprio ENTRESTO, Positivo: ENTRESTO FAZ UMA ENORME DIFERENCIA, Negativo: PARA MIM, NÃO HÁ</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora da musculatura cardiaca, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Angioplastia com stent , Positivo: Melhora do quadro em geral, Negativo: Não havia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ramipril, monocordil, procoralam, Positivo: Foram bem poucos , eu continuava com desconforto respiratório não conseguia me alimentar e nem dormir, Negativo: Hipotensão é bradicardia</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por recomendação médica estou tomando esse medicamento e não tive reações adversas até o presente momento. ATUALMENTE foi alterada a dosagem para 49mg/51mg.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: sacubitril/valsartana 39/41 e atualmente 49/51mg. , Positivo: Ainda estou em uso e não tenho como emitir um parecer., Negativo: Ainda estou em uso e não tenho como emitir um parecer.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mononitrato de Isossorbita (Monocordil); Selozok; Bissulfato de Clopidogrel (Plavix); Atorvastatina Cálcica (Ílipitor); Besilato de anlodipino (Roxflan); Hemifumarato de Bisoprolol (Concárdio), Brasart HCT. É o que recorde e sem estar em ordem cronológica. Todos por orientação médica. , Positivo: Sempre me senti bem e disposto com os medicamentos anteriores. Mudei para sacubitril/valsartana por orientação médica (cardiologista)., Negativo: Nenhum sintoma negativo foi por mim apurado.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O cardiologista que me acompanha afirma que os resultados obtidos com tal medicamento é satisfatório para o tipo de insuficiência cardíaca que fui acometido.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 51/49 e o Entresto 103/97, Positivo: Controle satisfatório da pressão arterial., Negativo: Sem relatos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana potássica 50mg, Positivo: Controle da pressão arterial., Negativo: Sem relatos.</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio de alto custo e necessário aos portadores de insuficiência cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Mantém a doença estável e até melhora a insuficiência , Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acertil, Positivo: Usei pouco tempo, Negativo: Acho que não evita descompensação da doença e dos sintomas</p>
17/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E um medicamento custo muito alto. Nem todos pacientes têm acesso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sim como pacientes com entreato 49/51 mg., Positivo: Menos conceitua , Negativo: Até agora não teve efeito negativo, só custo muito alto.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E um medicamento custo muito alto. Nem todos pacientes têm acesso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sim como pacientes com entreato 49/51 mg., Positivo: Menos conceitua , Negativo: Até agora não teve efeito negativo, só custo muito alto.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Familiares sem condições de comprarem medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento custa caro e dependemos dele para que meu pai tenha uma melhor condição de vida. Junto com outras medicações que também não tem um preço acessível</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Ele passou a se sentir mais confortável com a medicação, Negativo: Não identificamos</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio entresto bom custo muito alto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26 é atualmente entresto 49/51mg, Positivo: Percebi uma pequena melhora na insuficiência cardíaca., Negativo: Quem sofre de miocardiopatia dilata tem muitos sintomas. Insuficiência cardíaca, angina, tonturas , cansaço. Esses sintomas não desapareceram com o remédio.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Renitec, condor 5mg, aldactone 50mg, Positivo: Não percebi nenhum., Negativo: Inchaço, tonturas , muito cansaço e demais sintomas da doença.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A concessão do medicamento, no médio e longo prazo, constitui-se em fator de expressiva economia ao S.U.S, por extensão, aos cofres públicos, eis que os pacientes que o utilizam continuamente por certo estarão menos suscetíveis aos acidentes cardiovasculares, logo, prescindirão de novos procedimentos médicos-hospitalares, sabidamente excessivamente onerosos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Diversos, entretanto, a estabilização só foi alcançada após o uso contínuo do entresto., Positivo: Não saberia especificá-los. Conforme anteriormente informado, após a prescrição do medicamento pelo cardiologista Fábio Cordel, em face de intercorrências pós-operatório, houve a estabilização das funções cardíacas., Negativo: As anteriormente informadas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prejudicado, em face das pretéritas informações., Positivo: Idem a anterior., Negativo: Idem a anterior</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Mais disposição e menos cansaço físico, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Captopril, Positivo: Nenhum, Negativo: Indisposição e fadiga</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, E uma medicação muito cara que comecei a fazer uso e deu muito certo com ela tem mês que fica muito apertado para comprar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou consideravelmente o cansado que tinha aos pequenos esforços, aí fazer ecocardiograma melhorou a fração de ejeção do meu coração , Negativo: No início tinha tonteiras</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Procoralan, Positivo: Melhorou parcialmente os cansacos , Negativo: Muita tontura, cansava muito facilmente aos pequenos esforços.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Sou paciente e uso o medicamento podendo atestar seus benefícios.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora significativa no bem estar, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável a distribuição desse medicamento pelo SUS, uma vez que o mesmo tem custo bastante elevado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora significativa na questão cardíaca., Negativo: Até agora não apresentou nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diovan, Atensina e outros, mas, não tava controlando o problema cardíaco, Positivo: Não tem pois foram substituídos., Negativo: Não controlou meu problema de saúde, no que diz respeito à questão cardíaca</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sacubitril/valsartana apresenta resultados muito relevantes na cura dos pacientes e adotar sua distribuição gratuita como política pública seria muito benéfico para a população, já que o remédio nas farmácias, mesmo com desconto, é muito caro.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ENTRESTO, Positivo: Tenho uma filha que foi acometida de miocardiopatia periparto, muito grave, e o sacubitril/valsartana está sendo fundamental para sua recuperação. Em poucos meses a evolução é visível e as chances de cura segundo o médico que nos assiste aumentaram significativamente., Negativo: Minha filha não relatou efeitos negativos relevantes</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: CARVEDILOL, Positivo: Melhora do cansaço, Negativo: Minha filha não relatou efeitos negativos relevantes</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tudo que puder fazer pra diminuir financeiramente os gastos da família com doenças crônicas são sempre bem vindas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: O medicamento se mostrou extremamente eficaz para o meu problema de insuficiência cardíaca., Negativo: O valor do medicamento e sua quantidade de uso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Captopril 12,5mg, Positivo: No meu caso esse medicamento era indicado pra insuficiência cardíaca., Negativo: No meu caso esse medicamento se tornou insatisfatório para o meu problema clínico.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação é de muita importância para todos nós pacientes com insuficiência cardíaca. Mas ele é caro e a distribuição gratuita é extremamente necessária.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sacubitril/valsartana, Positivo: Tive uma excelente melhora na função cardíaca. Diminuindo em muito o cansaço diante de pequenos esforços., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol 25mg, Ivabradina 5mg, AAS 100mg e o espirolactona 25mg, Positivo: Os 3 primeiros ajudam a melhorar a função cardíaca, o último evita que eu possa ter trombose pelo fato do coração não ter força suficiente para bombear sangue., Negativo: Nenhum</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicação necessária.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembrol, Positivo: Não sei., Negativo: Não sei.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E um medicamento custo muito alto. Nem todos pacientes têm acesso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sim como pacientes com entresto 49/51 mg., Positivo: Menos conceitua , Negativo: Até agora não teve efeito negativo, só custo muito alto.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Varios, Positivo: ., Negativo: .</p>
17/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Insuficiência Cardíaca com FE reduzida, tratada apenas com IECAs (ou BRA, losartana) + BB (Carvedilol) + Espironolactona (essa última como 2ª linha), não está alinhada às diretrizes de tratamento das principais Sociedades Médicas, como a Diretriz Européia, Americana e a Brasileira, que recomendam classes terapêuticas inovadoras, como por exemplo, o sacubitril valsartana. Dessa forma, pacientes de ICFer que se mantem sintomáticos em tratamento com IECA ou BRA + BB + Antagonista do Mineralocorticoide, não teria outra opção de droga modificadora de prognóstico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril Valsartana (Entresto), Positivo: Melhora importante da qualidade de vidaRedução do número de reinternaçõesDiminuição da mortalidade, Negativo: Lamento ainda não ser possível utilizar em pacientes com clearance de creatinina abaixo de 30</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nenhum, mas minha mãe., Positivo: Estabilização do quadro clínico., Negativo: Insônia.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio entresto tem um preço alto. Difícil de pagar todo mês.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26mg é entresto 49/51mg, Positivo: Obtive pequena melhora na insuficiência cardíaca. Melhor que os demais medicamentos., Negativo: Para meu problema que é de miocardiopatia dilatada os sintomas são inúmeros. Continuo com muita fadiga e tonturas. Fração de ejeção reduzido.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vasopril , concor é aldactone, Positivo: Não tive efeitos positivos com esses medicamentos, Negativo: Não melhoraram meu problema de miocardiopatia .</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O valor do medicamento, somado aos outros que preciso tomar, torna praticamente impossível que eu consiga adquirir todos que os médicos receitaram.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103, Positivo: Melhora significativa no bem estar. Estabilização da pressão arterial nos níveis esperados. Redução significativa do cansaço. Redução significativa do "peso" nas pernas. Retomada do ânimo para prática de exercícios físicos., Negativo: Ainda não tenho certeza se decorre do medicamento ou da doença. A retenção de líquido parece ter aumentado, bem como inchaço nos pés. Porém, como o uso do medicamento é recente, e o calor em Bariri é "absurdo", ainda estou observando e avaliando inclusive a quantidade de líquido que devo ingerir diariamente. Inciei drenagem linfática semana retrasada.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos têm o direito de se beneficiar do medicamento principalmente pessoas idosas ou que não tem renda pra poder comprar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 25/26, Positivo: Após 15 dias de uso, voltei a ter qualidade de vida acabou a falta de ar e meu organismo se recuperou da descompensação que estava tendo., Negativo: Não teve.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol 12,5, Positivo: Melhorou a força do coração e os batimentos sé regularizaram., Negativo: Tive queda de pressão.</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Melhorou a qualidade de vida, cansaço e edema dos membros inferiores , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Digoxina, Positivo: Ajuda a força de contração do coração , Negativo: Não foi muitoeficaz</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O motivo é que nem todas as pessoas que tem condições de comprar o medicamento devido o seu valor . Uma vez esse medicamento sendo distribuído pela rede pública de saúde todos terão acesso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora na fração de ejeção ., Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora do coração, Negativo: O preço muito caro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora do coração, Negativo: O preço muito caro</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai faz uso contínuo de 02 comprimidos por dia, é o custo dele é alto pra nós q somos classe baixa, por isso apoio a distribuição pela sus</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Diminuiu meu cansado durante a respiração , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atacand 16 mg. Venzer 16 mg. Candessa 16 mgne, Positivo: Nenhum efeito colateral, Negativo: Nenhum</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: O medicamento está controlando muito bem o meu problema. , Negativo: Não percebi nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Benicar, concor., Positivo: Melhora no quadro de saúde. , Negativo: Não percebi nenhum.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Entresto é um medicamento caro, e para que tem insuficiência cardíaca, é um medicamento de resposta imediata, mas nem todos podem comprá-lo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Positivo: São muitos medicamentos, agora tomo também Procorolam (muito caro) e foram positivos os resultados:CarvedilolEspironaltonaFurosemida, Sinvastatina, Negativo: A queda de pressão, a minha pressão arterial é baixa e algumas vezes algum medicamento a fez ficar mais baix, chegando a 8x5</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, espironolactona, furosemida, sinvastatina, Positivo: Tirou o cansaço que sentia, e desinchei, Negativo: Pressão mais baixa, ate acostumar com os medicamentos</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Mais disposição, andando melhor, dormindo melhor, Negativo: - baixa a pressão</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caverdilol, espironolactona, varfarina e AAS e tem marca passo e fez angioplastia, Positivo: O paciente não consegue definir, Negativo: O paciente não consegue definir</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este remédio está me mantendo vivo ...compro 2 caixas por mês fora os outros que preciso tomar pois minha doença é o Miocárdio não Compactado.... precisamos de ajuda sim do SUS ou pelo menos que revejam o preço pois está muito difícil p continuar comprando e manter meu tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Ele ajuda muito a controlar minha Arritmia e mantém minha pressão no nível certo., Negativo: Fico um pouco tonto pois mantém a pressão bem baixa</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vastarel/angiopril,/carvedilol não me adaptei com estes , Positivo: Aldactone minha fração aumento de 20 para 45/Entresto controla minha Arritmia /Concardio p angina do peito, Negativo: Todos eles mantêm a pressão muito baixa levando a gente se sentir mal</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: EntrestoCarvedilolFurosemida, Positivo: Favorável, Negativo: Não obtive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CarvedilolFurosemida, Positivo: MelhorasMenos cansaçoDesinchaco, Negativo: Pouca tonturaEnjôo</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, De acordo com a organização mundial da saúde, a insuficiência cardíaca crônica sintomática afeta uma 2,8 milhões de brasileiros, logo uma quantidade grande de pacientes seriam beneficiados com está recomendação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26 mg, Positivo: Não tem efeitos colaterais, praticidade na dosagem, sua associação com outras drogas cardiotônicas traz uma melhoria na qualidade de vida do paciente., Negativo: apenas o valor muito oneroso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caverdilol, furosemida, losartana, Positivo: Caverdilol: melhora os sintomas clínicos .Furosemida: diurético que melhora a patologia referida.Losartana: hipotensor ., Negativo: Caverdilol: Não há.Furosemida: Não há.Losartana: Não há.</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Têm que ser incorporado como medicamento fornecido pelo Sus. É muito caro!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 24/26 mg, Positivo: Faz 7 meses que minha mãe não teve edema pulmonar , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Selozok, espironactona e varfarina, Positivo: Selozok: estabilizou a arritmia, , Negativo: Nenhum</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou minha saude, Negativo: Nao teve efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou minha saude, Negativo: Nao teve efeitos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou minha saúde, Negativo: Não teve efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhorou minha saúde, Negativo: Não teve efeitos</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria muito importante ter o medicamento disponível na rede pública, pois tem um custo muito alto .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Muito bom, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora rápida, Negativo: Nenhum</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Foi o que melhor se adaptou para a doença cardíaca, Negativo: Não melhorou a arritmia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Losartana, Positivo: Losartana ajudou até um certo ponto e o entresto melhorou bastante, Negativo: Losartana parou de fazer efeito</p>
17/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Provado que é Indicação Classe I - diminui mortalidade e internação comparado com a terapia padrão</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Melhora qualidade de vida , classe funcional, diminui internamento e mortalidade , Negativo: Menos efeitos colaterais que enalapril</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os IECAS e BRAs, Positivo: Melhora clínica , Negativo: Hiperpotassemia e hipotensão</p>
17/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apesar de ainda possuir experiência pessoal com o produto, lendo estudos sobre o produto, constatei dados relevantes sobre o produto</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carvedilol, inibidores da ECA, Espironolactona, Positivo: reduz a resistência vascular periférica determinando vasodilatação periférica através bloqueio alfa 1; promove o bloqueio do sistema RAA por meio do bloqueio beta; reduz PA; tem ação antitrombótica a DAC. , Negativo: Cefaléia, tonturas, cansaço, náuseas, etc. Piora a ICC descompensada. Piora o controle glicêmico. Pode mascarar os sintomas de hipoglicemia. Contra indicado em pacientes portadores de asma ou DPOC c/ broncoespasmo, bloqueio AV de 2º e 3º grau, bradicardia.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Normaliza a pressão arterial e fortalece o coração., Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou aposentada e não consigo pagar por todos os medicamentos que preciso</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Diminuição da insuficiência cardíaca, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, concor, xarelto, Positivo: Diminuição da fadiga e da falta de ar. Aumento da qualidade de vida., Negativo: Alto custo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitas pessoas precisam muito dessa ajuda. Deixam de usar por ser caro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: É fundamental o uso para meu bem estar. Deixei de usar uns dias e tive dificuldade para redpurar e água no pulmão. , Negativo: Sem problemas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: EntrestoConcardio , Positivo: Me senti muito melhor. Menos cansado., Negativo: Sem problemas</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Melhorei significativamente após 10 meses de uso. FE 23 passou para 38% (Simpson)</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Tive uma melhora significativa depois de seis meses de uso do medicamento. , Negativo: Não teve efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Estou fazendo uso e me sentindo bem</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ótimo, Positivo: Nem um, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não sei responder, Positivo: Não sei responder, Negativo: Não sei responder</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessito dessa medicação e meu salário de aposentada fica comprometido necessitando da ajuda de terceiros para comprar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: O entresto diminuiu minha insuficiência cardíaca., Negativo: Alto custo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concor, xarelto, entresto., Positivo: No geral houve diminuição da fadiga e falta de ar. Aumento da qualidade de vida., Negativo: O custo para manter esses medicamentos é grande</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por se tratar de um medicamento caro.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto., Positivo: Melhora sensível para o tratamento da insuficiência cardíaca., Negativo: Não foram verificados.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro., Positivo: Prejudicado., Negativo: Prejudicado.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97mg/ 103mgSacubitril/ valsartana, Positivo: Minha saúde melhorou muito usando este medicamento, Negativo: Único defeito é que o valor do medicamento é muito alto. E eu não posso ficar sem ele.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97mg/ 103mg, Positivo: Minha saúde melhorou bastante com esse medicamento , Negativo: Único defeito é que esse medicamento é muito caro e eu não posso ficar sem ele.</p>
17/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento tem sido de total ajuda a pacientes que tratam ICC, e tem uma ação rápida e resultados satisfatórios.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26, Positivo: A melhora já foi notada nos primeiros trinta dias de uso do medicamento. Consegui voltar a fazer caminhada e andar de bicicleta, coisas aparentemente simples, mas que tive que deixar de fazer por conta da insuficiência na respiração que eu sentia. , Negativo: Não percebi nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, valsartana, carvedilol, Positivo: Não obtive resultado satisfatório, tomei altas doses dos medicamentos citados e cada vez pulava para o próximo., Negativo: Mesmo com o uso dos diuréticos, tive muita retenção de líquidos, alta concentração de de resíduos dos medicamentos nos rins.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Entresto é um remédio classificado como o melhor para tratamento da insuficiência cardíaca, e diante de tantos impostos que pagamos em nosso país, o mínimo que o governo deveria fazer, seria distribuí-lo gratuitamente pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhoria total nos sintomas cardíacos , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, Positivo: Nenhum , Negativo: Náuseas, tontura, queda de pressão.</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não foi utilizado outros medicamentos, Positivo: Qualidade de vida mudou muito, pernas não ficam mais inchadas, Negativo: Não foi utilizado outros medicamentos.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação de custo elevado, porém super eficiente no tratamento da insuficiência cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto., Positivo: Redução da quantidade de medicamento por apenas um o entresto., Negativo: Inicialmente tive problemas com a redução da pressão arterial.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Isordil, Apresolina, espinolactona , Positivo: Medicamento que auxiliava na insuficiência, porém todos substituídos por apenas um comprimido de entresto., Negativo: Redução da pressão arterial</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, caverdilol,spirilactolona,benzetacil, Positivo: Sou paciente crônico de insuficiência cardíaca , e após fazer um cirurgia de troca de válvula, estava fazendo uso de enalapril, porém meu coração não estava reagindo no que tange a sua função cardíaca normal , após iniciar o tratamento com o uso do ENTRESTO, a minha função cardíaca melhorou 80% a sua função me trazendo um melhor qualidade de cardiorespiratória., Negativo: nem hum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enalapril, caverdilol,spirilactolona,benzetacil, Positivo: Melhor controle , da função cardíaca, melhor qualidade de vida , Negativo: nem hum</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto concor, Positivo: Tem me ajudado, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tem me ajudado , Positivo: Tem me ajudado , Negativo: Não tem</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Bom para insuficiência cardíaca , Negativo: Aumento de pressão arterial.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aradois, Positivo: Refil ou minha pressão arterial, Negativo: Devido muitos remédios que tomo. Queimação no estômago. E preciso tomar nexium.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento foi fundamental para reestabelecer a minhas condições de saúde com ele melhorei muito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, obtive uma melhora significativa desde a respiração como no inchaso., Positivo: Melhora de respiração inchaso., Negativo: Não observei.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26 mg., Positivo: Melhora no inchaso e na respiração., Negativo: Não observei.</p>
17/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento reduz o risco de hospitalização por IC e morte cardiovascular em 20%. Melhora dos sintomas e da limitação física, melhorando, consideravelmente, a qualidade de vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/Valsartana, Positivo: O medicamento reduz o risco de hospitalização por IC e morte cardiovascular em 20%. Melhora dos sintomas e da limitação física, melhorando, consideravelmente, a qualidade de vida dos pacientes., Negativo: Pode causar hipotensão arterial em alguns pacientes, principalmente nos que estão em uso de diuréticos; nestes casos, a dose do diurético deve ser reduzida.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Captopril e Maleato de Enalapril, Positivo: Atuam no eixo neuro-hormonal melhorando a performance cardíaca e reduzindo mortalidade porém, 20% a menos que o Sacubitril/Valsartana., Negativo: O grande impedimento ao uso do Enalapril e do Captopril é que causam tosse em grande número de pessoas, o que inviabiliza a continuidade do tratamento.</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Desde que comecei a usar entresto consigo viver bem melhor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto.apresolina.caverdilol, Positivo: Disposição, vontade de fazer as coisas,peso melhor .dormir bem., Negativo: Efeito negativo nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caverdilol,apresolina, Positivo: Menos cansaco.cbem..caverdilol .e.ea pressao controlada.estes medicamento deu uma condicao de vida bem melhor., Negativo: Nao tem</p>
17/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Entresto, Positivo: Vi mudança nas atividades dos pacientes., Negativo: Não vi nenhum, apenas em casos em que o uso não estava corretamente sendo feito com os diuréticos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quase todos os medicamentos para tratamento de doenças cardíacas. , Positivo: Os efeitos foram retardando com o uso contínuo. , Negativo: Os efeitos foram retardando com o uso contínuo.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sim</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum , Positivo: . , Negativo: ...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Tudo de bom para meu problema, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O governo pode comprar o remédio a um custo bem menor</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: O produto permite realizar as atividades diárias inclusive academia com tranquilidade, Negativo: As vezes Leve tontura</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carvedilol, Positivo: Mantém a pressão estavel, Negativo: Nenhum</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de um medicamento MUITO caro e que tem melhorado muito a condição cardiológica do meu pai.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto., Positivo: Melhora nos sintomas de insuficiência cardíaca., Negativo: Vertigem.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro dos nomes., Positivo: Meu pai não melhorava., Negativo: Falta de ar, cansaço.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido a importância do medicamento para o tratamento da insuficiência cardíaca, é fundamental que todos tenham acesso a ele.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que todos temos direito a qualidade digna de vida,e governo pode proporcionar isso,cortando gastos indevidos em outras áreas e investindo melhor na saúde!afinal a política deve acontecer pro Bem Comum,especial dos carentes e necessitados!:</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este remédio é vital para os portadores de " insuficiência cardíaca" e é muito caro SUS tem o dever de fornecer e o paciente o direito de receber ! É vida , é preciso!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto , Positivo: Longevidade à pessoa ,sem sofrimento desnecessário!, Negativo: Alto custo (medicamento)</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Maior leveza ,bem estar !, Negativo: Nada à descrever</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou fazendo uso da medicação e está me fazendo super bem</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103, Positivo: Me sinto muito melhor, sem sintomas, não frequento mais UPAs, Negativo: nos primeiros dias tive tontura. porem passou.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Captopril, Enalapril, Lozartana, Positivo: nenhum fez tão bem quanto o Entresto, Negativo: mantive os sintomas, sempre estava voltando ao medico</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é de extrema importancia para pacientes com insuficiência cardíaca, no entanto é de alto custo. Para pacientes de baixa renda é muito importante que o mesmo seja distribuído na rede pública, pois assim teriam acesso e condições de darem continuidade no tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 49/51, Positivo: Pressão arterial diminuiu, houve diminuição significativa na falta de ar diária, melhora no sono, melhora na hipertensão noturna , Negativo: Não houve observações quanto ao medicamento, apenas com o preço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corus, losartana, , Positivo: Não foram observados , Negativo: Inchaços dores no peito pressão alta</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Naprix, Positivo: Diminui a dor de cabeça, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Naprix, Positivo: Eliminação dor de cabeça, Negativo: O preço</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Eu faço uso do medicamento é me sinto bem</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu faço uso de entresto e me sinto bem não tenho mas fadiga,cansaço., Positivo: Me sinto muito bem com entresto., Negativo: Não tenho.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, eu gostaria essa medicação fosse distribuída pelo sus</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: entresto, Positivo: melhora da fração ejeção, Negativo: nada a declara</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Gostaria que o SUS fornecesse o medicamento gratuito</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto sacubitril/valsartana , Positivo: Esta funcionando perfeitamente com minha pessoa, Negativo: Não apresentou efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro o nome , Positivo: Sacubitril é excelente , Negativo: Não tem</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Pois necessito da minha medição pois não tenho condições de comprar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um ótimo remédio, mas tem um alto custo. Tem que ser distribuído pelo SUS, as pessoas que não tem condições de comprar, merecem um tratamento eficaz contra a insuficiência cardíaca crônica.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o Entresto., Positivo: O meu pai melhorou 90%, Negativo: Não sentiu nenhum efeito colateral.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Tive grande melhora no fortalecimento do coração e parte respiratória , Negativo: No momento ainda não tive nem um efeito considerado negativo</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Caverdilol, Positivo: Melhora no estado cardíaco, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum, Positivo: Entresto, Negativo: Preço
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nem sei fala 2ª - Sim, como paciente, Qual: Muito bom, Positivo: Me ajuda bastante , Negativo: Nao 3ª - Sim, como paciente, Qual: A primeira vem.com esse medicanto, Positivo: Me ajuda muito, Negativo: Nao.tenho nenhum até agr
17/12/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pq é um remedio muito bom e quase ninguém pode comprar devido.o preço ser muito alto ..tem q ser gratuito 2ª - Sim, como paciente, Qual: losartana sumples, Positivo: a losartana não tava fazem efeito para mim, Negativo: nem sei descreve los 3ª - Sim, como paciente, Qual: losartana, Positivo: o ENTRESTO DEU UM UP NA MINHA VIDA DE CARDIACA , Negativo: não sei descrever
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu salário não é adequado pelo preço do produto 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24/26 mg, Positivo: Diminui a quantidade de outros medicamentos, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana, concardio, Positivo: Diminui a quantidade de medicamentos tomados, Negativo: Nenhum
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: O uso do medicamento melhorou a qualidade de vida do paciente, reduzindo o inchaço nas pernas e pés, acabando com a retenção de líquidos., Negativo: Não notamos. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Captopril., Positivo: Nada a declarar., Negativo: Meu sogro não teve, com o uso do Captopril, o efeito desejado. Teve palpitações e palpitações.
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédios muito caro, e muitos não podem comprar. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto., Positivo: Batimentos cardíacos mas tranquilo., Negativo: Não tive. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto., Positivo: Mais tranquilo a respiração, Negativo: Não tive.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remedio é muito eficaz e tem custo alto, 2ª - Sim, como paciente, Qual: 97/103 parece um milagre com o remedio os meus resultados foram altamente positivos., Positivo: Tudo, Negativo: nenhum 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, melhorou e muito minha saude, Positivo: Reduziu o risco de morte súbita., Negativo: Nao houve 3ª - Sim, como paciente, Qual: Acertil, Positivo: Baixou a pressao arterialMelhorou minha frequencia cardiaca, Negativo: Nao houve
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que entrar no Susana funciona e é muito oneroso para pacientes com baixa renda 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97/103 mg, Positivo: Melhor respiração e menos fadiga, Negativo: Nenhuma só no caso como falei anteriormente é muito oneroso 3ª - Sim, como paciente, Qual: Clopidogrel , Positivo: Continuei com falta de ar e fadiga, Negativo: Nenhum a não ser que não me ajudou muito
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, FAÇO USO INDISPENSÁVEL DO MEDICAMENTO. SENDO QUE DUAS DOSES DIÁRIAS. 2ª - Sim, como paciente, Qual: ENTRESTO 24mg/26mg (SACUBITRIL/VALSARTANA), Positivo: APÓS UM INFARTO DITO COMO FULMINANTE, TENHO QUE FAZER USO DIARIAMENTE DO MEDICAMENTO, ELE É INDISPENSÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DA MINHA VIDA., Negativo: FOI O UNICO COM ESSA FUNÇÃO QUE COMECEI A TOMAR. 3ª - Não
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto 49/51, Positivo: O medicamento causou bem estar ao paciente, diminuindo o inchaço nos pés e pernas reduzindo o acúmulo de líquido., Negativo: Não percebi pontos negativos. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Captopril., Positivo: Nada a informar., Negativo: O uso do medicamento provocou taquicardia, dores no peito e palpitação.
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Necessário para o tratamento da insuficiência cardíaca que padeço, Negativo: Não há 3ª - Sim, como paciente, Qual: Divelol, furosemida, espironolactona, Positivo: Necessários para o tratamento da insuficiência cardíaca que padeço, Negativo: Não há
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Entresto, Positivo: Hipertensão e cardiopatia, Negativo: Nenhum
17/12/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana , Positivo: Melhora clínica em pacientes com insuficiência cardíaca refratários ao tratamento clínico com leca/bra, betabloqueador e espironoclatona , Negativo: Não apresentou 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 51/49, Positivo: Menos efeitos colaterais como mal estar, hipotensão, menos tontura e provável aumento de força no coração, Negativo: Não acaba a hipotensão mas é menor que com Losartana</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana 50 mg, Positivo: Somente permaceu meus 40% de fração de ejeção, Negativo: Além de não melhorar a força do coração causa maos tontura, indisposição e hipotensão</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O valor alto do medicamento impede a possibilidade de tratamento para muitos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Tive melhora consideravel apos uso do medicamento, Negativo: O alto valor do medicamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lasix, procoloran, Positivo: Todos auxiliam a melhora do meu quadro clínico, Negativo: Custo dos medicamentos</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 24 mg/26mg, 49 mg/51 mg. No momento estou tomando o Entresto 97mg/103mg (sacubitril/valsartana), Positivo: Melhora dos sintomas, dor no peito, cansaço, mal estar, falta de ar, inchaço, Negativo: Apesar do medicamento ser mto bom, efeito negativo é o preço que é caro, p quem faz uso contínuo do medicamento fica difícil.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse remedio eo que me faz, ter uma vida controlada sem infartos pode ate msm fazer exercios. Hoje em dia so meu marido trabalha e so esse remedio chega a quais 400 reais por mes. Tenho certeza q nao ajudaria so eu pois sem q tbm tem muitas pessoas doentes que também bem passam por dificuldades e nos ajudaria muito</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Ele me ajuda a nao infartarE poder ter uma vida mais normal poder ate fazer uma camihada, Negativo: Abaixa muito minha preçao</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu tomo 11 comprimidos por dia e infelismente o unico que consigo pegar na farmacia do sus sao 3, Positivo: Me ajudam tambem na presao diabetes tireode colesterol e rins, Negativo: O valor total e bruto de todos que chega ate a 1200 por mes</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio muito caro</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97mg 102mg, Positivo: Controle pressão, Negativo: Pressão alta</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Crestor, furosemida, Positivo: Controle pressão, Negativo: Pressão</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entresto deve ser oferecido no SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51, Positivo: Régulo minha pressão arterial, sem muito efeito colateral, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inalaprol, captropil, Positivo: Foram úteis por algum tempo, Negativo: Não atendia todas as minhas necessidades</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O entresto é o remédio fundamental para mim. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Monocordil, Positivo: O entresto melhorou muito para meu bem estar , Negativo: Não me sentia bem 3ª - Sim, como paciente, Qual: Todos, Positivo: Me sinto bem , Negativo: Não me sentia bem
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portador de arritmia e necessito de duas dosagens distintas por dia 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 49/51 e 97/103, Positivo: Em associação com cloridrato de sultá-los -120- houve uma redução de 95% da arritmia maligna, como também a recuperação da capacidade cardíaca., Negativo: Esporadicamente tontura 3ª - Não
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou totalmente favorável à proposta de incorporação de sacubitril para insuficiência cardíaca pois além de melhorar a qualidade de vida do paciente também ao ser incorporado ao sus põem fornecer gratuitamente aos pacientes.ĺĺĺ 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Somente com entresto, Positivo: Melhorou respiração arritmia , Negativo: Sonolencia 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Caro 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto 97mg103mg, Positivo: Controle da pressão, Negativo: Pressão 3ª - Sim, como paciente, Qual: Furosemida, Crestor, , Positivo: Controle pressão, Negativo: Pressão
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso o remédio Entresto e estou me sentindo muito bem. 2ª - Sim, como paciente, Qual: remédio Entresto, Positivo: por exemplo melhora para dormir; diminuição do peso do estomago., Negativo: no caso do remédio Entresto não tenho que reclamar. 3ª - Não
17/12/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/12/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Nao, Negativo: Canseira e falta de ar 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preciso diariamente, é muito caro, sou aposentado</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Empresto 97mg/103mg, Positivo: Controle da pressão arterial, Negativo: Não controle da pressão</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Furosemida e crespol, Positivo: Ajuda pressão, Negativo: Pressão controlada</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pôr se tratar de medicamento de alto custo. O paciente já está sobrecarregado de despesas para tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto e Selosox., Positivo: Um ótimo controle cardíaco. Muito positivo o tratamento com estes medicamentos., Negativo: Não tenho nenhuma reclamação a fazer.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Amidarona. Espiralactona., Positivo: Controle cardíaco muito bom., Negativo: Somente no quesito falta de ereção.</p>
17/12/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois se trata de um medicamento muito caro, porém necessário e sendo incorporado do SUS seria muito mais acessível à todos os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entresto, Positivo: Melhora do coração. , Negativo: Não obtive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2018	Instituição de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O atual relatório escreve "As evidências elencadas no presente relatório, em sua maioria de boa qualidade, indicam que o uso de sacubitril/valsartana, em esquema triplo de tratamento, é eficaz e potencialmente seguro para pacientes com IC classe NYHA II sintomáticos, com fração de ejeção ventricular esquerda menor ou igual a 35%, refratários ao tratamento com IECA e/ou BRA" e que " As evidências provenientes desses estudos demonstram que, em comparação ao enalapril, o sacubitril/valsartana reduziu em cerca de 20% as mortes por causas cardiovasculares ou hospitalização por insuficiência cardíaca, e em cerca de 16% as mortes por qualquer causa." Lembramos que o medicamento espirolactona tem sua indicação baseada em apenas um grande estudo clínico – estudo RALES para o tratamento da IC classe funcional III e IV, assim como o sacubitril/valsartana para classe funcional II e III. Não existe medicamento na literatura atual que conseguiu estes resultados na IC em cima da melhor terapia existente e preconizada, que seria o esquema triplo com IECA ou BRA, betabloqueador e espirolactona. No cenário brasileiro da IC temos a maior mortalidade hospitalar do mundo de acordo com as Diretrizes Brasileira de IC de 2018 da SBC. Representa que o que estamos disponibilizando para a nossa população está sendo insuficiente e ineficaz para a redução de mortalidade, hospitalização e melhora na qualidade de vida. O tratamento da IC é um tratamento de longo prazo que exige a disponibilidade de medicamentos que reduzem a mortalidade e internação no SUS, aderência às recomendações da terapia por parte dos pacientes, avaliação multiprofissional e terapias mais avançadas conforme a IC progride. A análise custo efetividade apresentada "demonstra a robustez do modelo empregado" e que "Apesar de o demandante concluir que o tratamento é custo-efetivo baseado no limiar de custo-efetividade da OMS de RCEI até três PIB per capita, este conceito não é aplicado a este relatório, visto que o Brasil não define nenhum limiar de custo-efetividade e que este limiar pode ser superestimado para a realidade brasileira". " o impacto variou de R\$467.961.138,46 a R\$ 1.169.902.846,16 ao longo de 5 anos." Pacientes elegíveis em 2018--309.963. Surge neste parágrafo a falta de um conceito para se demonstrar o que é custo-efetividade no Brasil, talvez por nossa economia não permitir um valor de corte, mas a utilização de medicamentos que possam reduzir a hospitalização e morte com certeza a longo prazo deve demonstrar redução de custo. A literatura mostra que a IC mata mais que câncer, perdendo apenas para o de pulmão. A CONITEC aprovou medicamentos para tratamento de câncer (como exemplo citamos o pertuzumabe no tratamento do câncer de mama HER2-positivo com SBOC: R\$ 343.151,78 /ano de vida extra no cenário-base e R\$ 150.124,40 /ano de vida extra para a avaliação adotando os descontos negociados com o fabricante; Roche: R\$ 260.440,00 /ano de vida extra num horizonte temporal de 10 anos em 2017) muito mais caros e menos custo efetivo que o sacubitril/valsartana (RCEI de R\$ 25.832,89 por AVAQ e de R\$ 22.769,82 por AVG). A IC vai aumentar sua incidência e gravidade com o aumento da idade. Dados do SUS (tabnet.datasus.gov.br) mostram que existem menos internações no SUS por IC (CID I.50) nos últimos 20 anos no Brasil com aumento concomitante na taxa de mortalidade por IC. A falta de leitos hospitalares para tratamento da IC, associada ao aumento na incidência de IC avançada justificam a utilização de um medicamento que pode reduzir tanto os óbitos como as internações por IC em nosso país. As internações por IC demonstram o caráter progressivo IC e a cada internação por IC a viabilidade do coração vai diminuindo, aumento o risco de óbito. Entendemos que o sacubitril/valsartana não é para todos os pacientes com IC e deve ser indicado para &#8805;18 anos de idade, classe II, III ou IV da NYHA, disfunção sistólica (fração de ejeção do ventrículo esquerdo &#8804;35%), nível de peptídeo natriurético do tipo B (BNP) &#8805;150 pg / mL, ou nível de NT-proBNP &#8805; 600 pg / mL, ou se eles tivessem sido hospitalizados por insuficiência cardíaca nos últimos 12 meses, BNP &#8805; 100 pg / mL ou NT-proBNP &#8805;400 pg / mL e finalmente em uso prévio de enalapril. Está aprovado para uso nas principais Diretrizes internacionais para IC. Assim como nos caso de medicamentos para cancer nos parece mais correto que a decisão da CONITEC deveria ter sido por recomendar a incorporação do sacubitril/valsartana no SUS condicionado à negociação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sacubitril/valsartana , Positivo: Melhora clínica importante, melhora no teste de caminha de 6 minutos e redução dos níveis de NT-proBNP com a utilização de doses 49/51 até 97/103 em pacientes com IC que permaneciam sintomáticos. Retirada da fila de transplante 3 pacientes que estavam em avaliação para o transplante e em uso de enalapril, carvedilol e espirolactona por melhora clínica importante. Possibilidade de iniciar após estabilização de um quadro agudo de descompensação, o sacubitril/valsartana conforme publicação recente do estudo TRANSITION. Devido ao pouco tempo de uso, ainda estamos observando a redução de mortalidade e hospitalização por IC. , Negativo: Em pacientes mais graves e hipotensos, retornos breves e avaliações clínica e laboratorial devem ser realizadas. Na nossa experiência, hipotensão sintomática que necessitou interromper o tratamento com sacubitril/valsartana foi pequena (<5%). Apenas um óbito em nossa experiência com uso de sacubitril/valsartana. Pode haver hipotensão, hipotensão sintomática, insuficiência renal e hiperpotassemia Sacubitril/valsartana deve ser iniciado somente após 36 horas da suspensão da última dose de enalapril (ou outro IECA) por risco de</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
		<p>angioedema.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Utilização do tratamento para IC com IECA ou BRA, betabloqueador, espironolactona, furosemida, hidroclorotiazida, terapia de ressincronização cardíaca, implante de cardiodesfibrilador e transplante de coração., Positivo: Quando disponíveis, estes tratamentos para IC conseguem melhorar a sobrevida, mas existe uma grande parcela destes pacientes que hospitalizam, reinternam com frequência e morrem seja de morte súbita ou por progressão da IC. Tanto os pacientes pouco sintomáticos (CF II) como os mais sintomáticos (CF III e IV) apresentam risco de morte mesmo em uso da medicação existente para o tratamento da IC., Negativo: Principais efeitos colaterais IECA/BRA = hipotensão e hipotensão sintomática, insuficiência renal, hiperpotassemia, angioedema (mais com IECA) e tosse (mais com IECA). Betabloqueador = hipotensão, bradicardia sintomática e broncoespasmo Espironolactona + hipotensão, insuficiência renal, hiperpotassemia, ginecomastia Diuréticos (furosemida e hidroclorotiazida) = hipopotassemia Terapia de ressincronizador = piora da IC em alguns pacientes e 30% de não respondedores Cardiodesfibrilador = choques inapropriados Transplante de coração = falta de doadores compatíveis, efeitos colaterais dos imunossupressores, rejeição do enxerto, retransplante, infecções</p>
17/12/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos tem direito ao tratamento a saude</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>