

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Insulinas análogas de ação longa para o tratamento de diabetes mellitus tipo II - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/01/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fui usuária de insulina lenta análoga Glarnina por mais de dez anos pois a NPH não fazia o efeito esperado. Infelizmente apenas a NPH é fornecida pela rede pública o que acarreta a vários médicos a prescreverem inicialmente. Como alternativa ao tratamento que não estava sendo eficaz, foi prescrita a Glarnina associada à lispro. Foi a base do meu tratamento por muito tempo até que alterei para bomba de insulina, utilizando apenas a lispro. A insulina de ação lenta é primordial para a base do tratamento e ser limitada à NPH é uma vergonha, pois impede que os pacientes tenham acesso à medicação adequada, generalizando como um todo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina glargina , Positivo: O fato da glargina não ter altos picos de ação facilita o controle da hipoglicemia. Além de muitos casos ser possível a aplicação de dose única por dia. , Negativo: O negativo é que nem todos os pacientes se adaptam, contudo, é preciso testar e na comprovação da eficácia geram mais efeitos positivos do que negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz uso da NPH por seis anos e não era eficaz. , Positivo: Não tem pontos positivos na minha experiência com a NPH , Negativo: Os pontos negativos são inúmeras crises de hipoglicemia com vários quadros de hiperglicemia rebote, gerando um ciclo vicioso de descontrole.</p>
05/01/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Possibilidade de menos hipoglicemia especialmente a noturna e maior flexibilidade nos horários de aplicação. Hipoglicemias em pacientes com DN2 aumentam o risco de mortalidade cardiovascular nos pacientes diabéticos 2.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina Glargina U 100, insulina glargina U300, insulina detemir insulina degludeca , Positivo: Os pacientes tem uma maior aderência ao tratamento. Menos hipoglicemia, e maior flexibilidade de aplicação das insulinas. Resultam em melhor controle glicêmico. , Negativo: Ainda custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores da dpp4, inibidores do sgl-2, analogos do GLp-1, Positivo: Menos hipoglicemia, perda de peso, benefício cardiovascular, Negativo: Custo</p>
15/01/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor que tenha insulina análoga para todos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Tresiba, Novorapis , Lantus e Apidra, Positivo: São insulinas mais práticas, modernas e traz uma melhor praticidade principalmente quando é usado em canetas. O paciente já tem uma rotina tão voltada para a dedicação em estar sempre controlando sua glicemia que, no mínimo, o paciente merece uma praticidade e modernidade com eficácia dos procedimentos que são utilizados por eles., Negativo: Se não fizer a contagem de carboidrato corretamente, pode haver hipo ou hiper, mas tudo depende da orientação do paciente. Ma isso pode ocorrer tanto com insulinas análogas como com a nph e regular</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sensor Libre, Positivo: Praticidade e modernidade em verificar a glicemia., Negativo: não vejo nenhum efeito negativo</p>
15/01/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Já usei a Tressiba. Foi muito bom minha glicemia estava ótima. Por motivos financeiros passei a usar a NPH. HOJE minha glicemia está altíssima .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tressiba, Positivo: Minha glicemia estava sempre na média do normal, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Victoza, Positivo: Glicemia normal, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/01/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os Pacientes necessitam do medicamento ate pq e um cuato alto e existem muitos pacientes de baixa renda q fazem uso da medicacao</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus /tresiba /Apidra /humalog/e novorapid , Positivo: Melhor controle glicemico para pacientes com Dm1, Negativo: Complicacoes cardiacas /hipoglicemias e hiperglicemias ..amputação de membros .</p> <p>3ª - Não</p>
15/01/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da insulina e vital para os pacientes de siabetes tipo 1</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tresiba, , Positivo: Melhora significativa no dia da minha filha. Sem este medicamento ela corre o risco de vida., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tujeo, Positivo: Melhoria de vida. Impossível sobreviver sem este medicamento, Negativo: Nenhum</p>
15/01/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina de base e insulina rápida.... ambas de fundamental importância para o tratamento da Diabetes tipo 1 e 2, Positivo: Melhor controle!, Negativo: Verifico somente pontos positivos, já que se torna fator importante para a sobrevivência.</p>
13/01/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Porque a leve ir, a lantes, a Teresina são melhores que a NPH.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina regular e NPH, Positivo: Regular o efeito e mais rápida quando a glicemia está alta.Nph seu efeito baixa com duas HS depois., Negativo: Efeito negativo da regula: baixa muito e pode chegar a uma hipo sem menos perceber ao dormir.". " " Nph: porque sua ação só vem depois de duas horas.Alerta nas duas direto.</p>
13/01/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E muito importante para os diabéticos essas insulinas</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus, Positivo: É muito eficaz pois não há picos de efeitos durante as 24 horas, Negativo: A insulina NPH tinha picos de ação que batia com as de ação rápida ocorrendo quadros de hipoglicemias</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH , Regular, hoje comLsntus e Humalog, Positivo: A lantus manteve melhor controle se picos de ação , Negativo: NPH hipoglicemias</p>
15/01/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: A insulina Tresiba, Positivo: Melhorei significativamente o meu controle glicemico, reduzi as hipoglicemias e estou tendo uma melhor qualidade de vida , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Trayenta e Jardiance , Positivo: Como medicamentos coadjuvantes no meu tratamento auxiliou no meu excelente controle glicemico , Negativo: Não houve</p>
13/01/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só quem tem um filho com esta doença sabe das dificuldades!Alto custo do medicamento alimentação e etc</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/01/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/01/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Existem paciente diabéticos tipo 2 que têm grande risco cardiovascular frente a hipoglicemia. Também há os que não tem condições familiares e pessoais de usar a NPH três vezes ao dia ou autoaplicação, Em todos estes casos os cuidadores/familiares podem fazer a aplicação uma vez ao dia associada a medicações orais e melhora do controle, com menor risco de hipoglicemia em relação ao uso de NPH.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas glargina, detemir, degludeca e NPH. Cenário de ambulatórios e consultórios. Diariamente., Positivo: Análogos de insulina de ação longa: facilidade posológica para uso de cuidadores, em unidades de saúde próximas ao paciente ou auto-cuidado. Devido ao uso de caneta facilidade em titular a dose. Maior conforto pelo uso de equipamento menos sujeito a variações de qualidade (caneta x seringa e agulha). , Negativo: Análogos de ação longa podem ter sua titulação incorreta aumentando risco de hipoglicemia, sequelas e aumento do risco CV. A NPH também.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: liraglutida, dulaglutida, medicações orais (todas) pioglitazona, sulfas, iSGLT2, iDPP4, acarbose. Associação de NPH ou análogos longos a insulina regular e análogos de curta ação em múltiplas doses. , Positivo: Melhora do controle glicêmico. , Negativo: Aumento da complexidade do tratamento, com redução da aderência e perda da proteção do paciente à hiperglicemia. Aumento da exposição a hipoglicemia. Aumento da demanda familiar e do serviço de saúde local para cobertuda das neessidade de esquema complexo.</p>
11/01/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apesar do estudo ter mostrado um resultado parecido com o da insulina já utilizada pelo SUS, aparentemente não está sendo levado em consideração que este tipo de insulina proporciona ao paciente uma glicemia mais estável, evitando picos de glicose e crises de hipoglicemia severas, que são coisas que não aparecem no exame de hemoglobina glicolisada mas fazem toda a diferença na vida e na saúde do paciente. Investir em medicamentos modernos acaba trazendo economia a longo prazo para o SUS, ou estou enganada?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: GlibenclamidaMetforminaGlicazidaInsulina , Positivo: Todos cumpriram suas funções hipoglicemiantes Porém a diabetes somente ficou sob controle com a combinação Metformina+glicazida , Negativo: A glibenclamida é um medicamento antigo, que causa ganho de peso e tem efeitos colaterais desagradáveis.Minha médica substituiu pela glicazida, que realmente controla a doença e já deveria estar sendo fornecida pelo SUS há muito tempo.Junto.com.as fitas de controle glicêmico para pacientes tipo 2</p>
09/01/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Em alguns pacientes com diabetes tipo 2, magros, com pouca resistência insulínica e baixas doses de insulina por quilo de peso, a utilização de análogos é benéfica para redução dos eventos de hipoglicemia. Também na população mais idosa com essas características, a hipoglicemia pode estar relacionada a quedas. Dessa forma, semelhantemente ao que vemos no tipo 1, os pacientes com diabetes tipo 2 que tem pouca secreção pancreática de insulina e idosos frágeis, a utilização de análogos são medicamentos importantes no arsenal terapêutico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: insulina glargina , Positivo: menores taxas de hipoglicemia , Negativo: custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina NPH , Positivo: Disponível na rede pública, Negativo: variabilidade de ação e risco de hipoglicemia em pacientes mais susceptíveis</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/01/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A diabetes é uma doença controlável com uma excelente qualidade de vida ao paciente quando usadas as insulinas análogas, que hoje são padrão ouro nesta terapia.Caso contrário, as consequências da diabetes descontrolada onera muito mais os cofres públicos:um episódio de hipoglicemia custa 3 diárias em hospitais, o descontrole da diabetes resulta em cegueira, falência renal e consequentes aposentadorias por invalidez e tratamentos com hemodiálise... havendo um impacto social altíssimo!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/01/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o custo da insulina de ação prolongada é alto, sei disso pois faço uso e sei o quanto é difícil carregar esse ônus</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: já usei a insulina levemir, atualmente uso a tresiba, Positivo: usando a insulina de ação prolongada faço uso um menor número de vezes da insulina de ação rápida, Negativo: para mim os efeitos são positivos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: por muito tempo fiz uso de hipoglicemiantes via oral, ate quando tive que fazer uso de corticóides por um tempo prolongado, Positivo: os hipoglicemiantes via oral são mais confortáveis, pois não existe a "picada", Negativo: para mim não houve</p>
07/01/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: GLIFAGE XR500MGTRAYENTA 5mg, Positivo: Diminuição do índice glicêmico , Negativo: Nenhum</p>
07/01/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É necessário a inclusão dessas insulinas para nós pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e apidra., Positivo: Controle total da diabetes., Negativo: Não existe.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu preciso comprar a lantus e a apidra para controle., Positivo: Melhora no controle., Negativo:</p>
07/01/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao meu ver todos os insumos para os dm1deveriam ser fornecidos pelo SUS ,até mesmo sem ter que implorar para a justiça.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas nph humana e regular, Positivo: Não tem, Negativo: As duas tem muitos picos</p>
07/01/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Visando a melhor qualidade de vida do paciente afastando muutas vezes as graves consequências da doença que é tão difícil de ser controlada, já que é algo que não é uma questão só de alimentação e atividade física, mas o psicológico também interfere.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph , Positivo: De positivo nada infelizmente, Negativo: Não tinha uma qualidade de vida boa... Muitas hiper</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/01/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos., Positivo: Melhora do controle glicêmico e evitar ocorrência de hipoglicemia., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Análogos de insulina ultra rápida., Positivo: Melhora do controle glicêmico., Negativo: Nenhum.</p>
12/01/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitas pessoas não tem condições de comprar.. tem tanto político bandido que rouba o dinheiro público, pelo menos no nosso caso está sendo utilizado para a nossa saúde, se tirar o dinheiro da nossa insulina ele ira servir alguém que irá roubar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus, Positivo: O efeito positivo é que funciona bem, imita a insulina do corpo de 24 horas.. quando eu não tomo a lantus, minha glicemia fica alta, Negativo: Não vejo..</p> <p>3ª - Não</p>
12/01/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A insulina NPH não é mais recomendada pelos médicos. A diabetes tipo II normalmente é receitado a Lantus.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso contínuo de Lantus., Positivo: Utilizei NPH e Novomix, só tive melhores resultados com Lantus, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH e Novomix, Positivo: Nada a declarar, Negativo: Nada a declarar</p>
12/01/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há pessoas que como minha mãe que não possuem condições de arcar com os custos dessa insulina, pois, além dela usa inúmeros outros medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Toureou 300, Positivo: Controla bem a insulina, Negativo: Não foi percebido</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: HumalogNovomix, Positivo: Toureou - controla razoavelmente bem a insulinaHumalog - ainda utilizado como complementoNovomix - não controlou a insulina, Negativo: Sem comentarios</p>
17/01/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, É possível delimitar público de usuários com maior potencial de benefícios com uso de insulinas mais estáveis como a população idosa ou em situação de vulnerabilidade por outras condições associadas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas glargina, detemir e degludeca, Positivo: Todas as insulinas possibilitaram mais facilidade de manejo com menor número de aplicações, simplicidade no manuseio das aplicações, mais segurança e maior aderência., Negativo: Custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina NPH, Regular e antidiabéticos orais, Positivo: A associação de antidiabéticos orais e injetáveis, especialmente inibidores da DPP4 e da SGLT2, além dos análogos do GLP1 são seguros e de fácil uso nesta população, com maior aderência e melhores resultados, associados ou não a Metformina e insulina NPH.A gliclazida associada ou não a metformina promove o alcance de metas e é de fácil uso., Negativo: Pacientes tipo 2 idosos ou com outras comorbidades e situações de vulnerabilidade com o uso de insulina humana NPH tem maior risco de hipoglicemia, dificuldade na aplicação adequada ou omissão de doses, o que prejudica o alcance de metas e estabilidade no controle glicêmico.Os riscos de potencialização da hipoglicemia especialmente em associação com a glibenclamida nesta população impedem o uso e contribuem para manutenção do mau controle glicêmico e potencialização das complicações.Os inibidores da DPP4 e SGLT2, bem como os análogos do GLP1 tem custo elevado.</p>
17/01/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina glargina u100, u300 e degludeca, Positivo: Menor risco de hipoglicemia, comodidade podológica, menos variabilidade glicêmica, Negativo: Custo alto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Antidiabéticos orais, Positivo: Controle glicêmico, Negativo: Atuam até a falência pancreática</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como presidente da Associação dos Diabéticos do Piauí acompanho a rotina de muitos portadores de diabetes que só conquistaram a estabilidade glicêmica com o uso de insulinas de ação longa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu uso a lantus e acho q todos deveriam usar.controla perfeitamente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus, Positivo: Efeito positivo demais... hemoglobina glicada minha era 11 baixou para 7.5, Negativo: Nenhum.a lantus é ótima</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metiformina muito bom medicamento, Positivo: Metiformina ajuda a controlar bastante juntamente com a lantus e a insulina de efeito rápido.Faço contagem de carboidratos. , Negativo: Insulina N P H so faz hipoglicemia bruta. Um horror.</p>
17/01/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/01/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina glagirna, Positivo: Diminuiu as hipoglicemias, Negativo: O preço não acessível para todos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH, Positivo: Acessível pelo Sus, Negativo: Não consegui um bom controle da DM</p>
16/01/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na minha opinião se houver prescrição médica para esses tipos de insulina, pois não se deu bem com a insulina nph e a regular deve ser distribuída pelo sus.Sabendo que a diabetes quando não bem controlada trás complicações ao longo prazo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina,Diamicron,Insulina nph e regular., Positivo: Ajudou a controlar a minha glicemia e a parar de ter infecções frequentes que eu tinha desde meus 12 anos de idade por causa da diabetes., Negativo: O único efeito negativo é que no início do tratamento com metformina sentia muito enjoo.</p>
13/01/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é um investimento, pois mantém os pacientes ativos e não encostados no INSS.Este medicamento evita do governo gastar com cirurgia de amputações, internações em UTI, aplicação oculares, hemodiálise;</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: glargina, detemir, e degludeca, Positivo: Redução de hipoglicemias, oscilações glicêmicas (picos e vales) e tempo na meta (alvo glicêmico fixado pelo médico, que representa o tempo em que a glicemia se mantém estável e dentro do controle planejado: no meu caso seria entre 70 mg/dl e 120 mg/dl); Exame de hemoglobina glicada dentro da meta estabelecida, evitando complicações futuras;Ajuda a pessoa com diabetes a viver melhor e sem medo de ter um mal súbito;Mantem a pessoa como trabalhador ativo no mercado;Evita gastos previdenciários, em caso de afastamento do trabalho;, Negativo: glargina, detemir, e degludeca : nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH, Positivo: Apenas mantém vivo, porem sem qualidade de vida, Negativo: Alta variação da glicemia, com diversas hipoglicemias e hiperglicemias;Elevação do resultado do exame de hemoglobina glicada, assim ficando mais propicio as complicações da diabetes;Aumento de dores, pois deve-se aplicar mais vezes durante o dia;Falta no trabalho, com diversos atestados médicos apresentadosDemissão do trabalho.Muitos mal súbitos, devido as oscilações das glicemia, assim necessitando do serviço de emergência.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/01/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glicosímetro, Positivo: Conseguimos saber quando a glicose está alta ou baixa através desse aparelho, Negativo: O único efeito negativo é a falta de fitas que não são disponibilizados para os pacientes.</p>
16/01/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/01/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Cada organismo tem uma forma de metabolizar, utilizei NPH e não surtiu efeito, apenas quando mudei para lantus que ficou sob controle</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus, apidra e xiduo 10/1000, Positivo: Mantêm a glicemia abaixo de 200, Negativo: Muitos caro o tratamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH regular e rápida , Positivo: Não surtiu efeito , Negativo: Ineficaz</p>
16/01/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ajudaria muito na qualidade de vida dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, Positivo: Otima aplicaçãoApenas uma vez ao diaControle total da doença, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPHMetforminaGlibenglamida, Positivo: Controle, mas não muito adequado da doença, Negativo: A insulina tem q aplicar 2x ao diaMetformina tem.muitos efeitos colaterais, como os no TGIA glg ja deu hipoglicemia</p>
16/01/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/01/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Por não está por dentro deste assunto</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus e apart, Positivo: Controla minha glicose, Negativo: No momento está tudo certo.</p>
16/01/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes precisam dessa medicação, eles ja sofrem demais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/01/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse tipo de insulina faz parte do tratamento da diabetes, e ninguém toma insulina por vontade própria, sempre tem o aval de um médico, que acompanha e sugere o melhor tratamento. A diabetes, quando mal controlada, leva a óbito ou a diversas lesões irreversíveis, como cegueira ou imputação de membros, o que pode acabar gerando mais gastos ao SUS com tratamento, internações, etc. O que se deveria fazer é uma ação preventiva, mas não deixar de cuidar das pessoas que já tem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, Positivo: Por uns 5 anos o controle era feito somente com esse tipo de insulina, o uso era em pequenas quantidades, e a glicada era mantida sob controle, evitando assim maiores danos ou outras agravações do diabetes., Negativo: Não me recorde de pontos negativos.</p>
16/01/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um produto que oferece menor risco de hipoglicemias tem de ser disponibilizado. A população precisa deste benefícios. Nossos impostos são para isto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Degludeca, Positivo: Só uma vez ao dia e sem hipoglicemias., Negativo: Não teve.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nph, Positivo: Nada, Negativo: Hipoglicemia e duas picadas por dia.</p>
17/01/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É necessário e direito de qualquer cidadão ter acesso de medicamentos de qualidade, principalmente de doenças que infelizmente não tem cura, passar a vida tomando medicamento é horrível, portanto devem ser incorporados medicamentos de ação rápida, que melhorem as condições dessas pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>