

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Técnico - Clindamicina_rifampicina para hidradenite - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Todos tem direito de lutar pela vida, e se tem um meio de se tratar uma doença para que se cure ou amenize as consequências, tem que ser feito todos os meios para se garantir a vida de todos que dele precise. Assim conta na Constituição. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
27/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
27/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. precisamos desse medicamento. O estado deve garantir o direito a vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
27/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. a incorporação deve ser ampla, segundo recomendação da bula, sem restrições ao tipo de AME ou idade do paciente. Todos tem o direito ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
27/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
27/03/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
27/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. A incorporação deve ser ampla, seguindo a recomendação da bula, não fazendo restrições ao tipo de AME ou idade do paciente. todos tem que ter direito ao tratamento sim! 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
27/03/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
27/03/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Há relatos de melhoras significativas o uso do medicamento, em crianças acima de 7meses... 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
27/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
27/03/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Pois quase ninguém será tratado com essa proposta. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. porque todos tem direito a vida independente da idade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
27/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. porque todos tem direito a vida independente da idade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
27/03/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Parcialmente, pois o direito à medicação não deve ser limitado à idade e nem tipo da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
27/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Eu acredito que a incorporação deve ser ampla, seguindo a recomendação da bula, não fazendo restrições ao tipo de AME ou idade do paciente. Todos tem direito ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
28/03/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
28/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
28/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
28/03/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Concordo parcialmente pois quase ninguém será tratado nessa proposta 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/03/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
28/03/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. TODOS OS PACIETES COM AME ! TODOS TEM DIREITO AO TRATAMENTO IDEPENDENTE DA IDADE E DOD TIPO DA AME! CHEGA DE VER ESSES CRIANÇAS MORRENDO COM ESSA DOENÇA! 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
28/03/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Toda criança deve ter o acesso ao tratamento ao nascer. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
28/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Independente do tipo de ame, e da idade, todos têm direito ao tratamento. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. concordo com a incorporação e descordo das restrições</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
28/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Concordo com a incorporação e descordo das restrições.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
28/03/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar. A prescrição do medicamento deve ser avaliada individualmente por profissional experiente em doenças neuromusculares e é indicada para pacientes de outros tipos de AME e com idade superior há sete meses. Já existe evidência clínica suficiente que respalde a prescrição do medicamento para esses grupos, excluídos no parecer atual na atual. Estudo publicado por Karolina Aragon-gawiska e colaboradores em 2018, mostrou que a aplicação do nusinersena em pacientes maiores de 8 meses demonstrou ganhos na evolução motora. Bem como o estudo de Pane, que também apontou melhora na função motora de pacientes com AME 1 com mais de 7 meses após a medicação. Outro estudo importante, o CHERISH, realizado com pacientes tipo 2 e 3, também mostrou bons resultados. Como fisioterapeuta, observação pessoal dos casos acompanhados em Recife, posso destacar e importante evolução motora de 2 pacientes com AME tipo 2, que iniciaram o medicamento aos 2 anos ,apresentando importante evolução, com melhora da postura sentada, recuperação da postura de gatas, da capacidade de rolar e seguem melhorando na postura de pé realizando marcha com apoio e uso de órteses.Outro caso relevante é o de um paciente tipo 1 que iniciou tratamento aos 5 anos e ganhou força nos MMss e melhorou o controle cervical. E Se mantém estável em ventilação não invasiva. Diante das evidências científicas e práticas, torna-se imprescindível a revisão do relatório da conitec para que não registra tanto a viabilidade do remédio.</p> <p>2ª - Sim, Estudo CHERISH</p> <p>3ª - Sim, Resposta Canadense à agencia Nacional de drogas e Tecnologia.</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, Recente o grupo de trabalho composto por neurologistas brasileiros especialistas em doenças neuromusculares publicou nota sobre os critérios de indicação do medicamento.</p>	<p>Clique aqui</p> <p>Clique aqui</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. O remedio Spinraza deve ser oferecido a todos pacientes independente da idade, o remédio significa vida!!!! acompanho muitos casos e a melhora dos pacientes é notória. Conitec Saúde e vida para todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
28/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. pois quase ninguem sera tratado com essa proposta!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
28/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. A incorporação deve ser ampla, seguindo a recomendação da bula, não fazendo restrição ao tipo de AME ou idade do paciente. Todos tem direito ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
28/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Minha sobrinha precisa para viver.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
28/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. a incorporação deve ser ampla , seguindo a recomendação da bula, não fazendo restrições ao tipo de AME ou idade do paciente.todos tem direito ao tratamento 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
28/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. A incorporação deve ser ampla, sem restrição do tipo de AME 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
06/04/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A Doença causa muito desconforto, já tentei outro tratamento experimental mas não obtive resultado positivo, e gostaria de tentar esse medicamento 2ª - Sim, Me disponho ha relatar todo meu tratamento, com fotos relatorios. Junto ao meu tratamento oral, me comprometo a adotar habitos mais saudaveis. Não sou obeso, não tenho historico familiar de HS. 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/04/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
13/04/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, 3ª - Sim, 4ª - Sim, 5ª - Sim,	
13/04/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, Estudo que mostra em que fase da fisiopatogenia age cada agente, a clindamicina diminui TNF, IL-6 e IL8 reduzindo o sinal e sintoma clínico inflamatório e a rifampicina age na diferenciação da via Th 17, importante via na hidradenite supurativa 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	Clique aqui
15/04/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A hidradenite supurativa é uma doença de difícil tratamento e a associação clindamicina com rifampicina tem respaldo na literatura médica, podendo ser empregada por período não superior a 12 ou 16 semanas no tratamento de formas resistentes ao tratamento com as ciclinas. Faz parte do protocolo de tratamento de diversos países. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Sim, Sou médica dermatologista com residência e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e 30 anos de prática. Há 20 anos trato portadores de HS em ambulatório dedicado ao tema.A combinação clindamicina e rifampicina pode ser empregada em parte dos casos de HS não responsiva aos tratamentos., por período não superior a 12 ou 16 semanas. Caso não haja resposta satisfatória (redução do HiSCR) outra modalidade de tratamento deve ser instituída. A combinação pode ser reintroduzida se tiver sido previamente eficaz,(Hambly 2019) Clindamicina isolada também pode ser indicada.(Rosi2018;Caposienacaro 2018)	Clique aqui

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/04/2019	Secretaria Estadual de Saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. É necessário cautela quanto ao uso dessa tecnologia, mesmo ela já sendo recomendada por diversos guidelines. Atentando para o correto acompanhamento médico e de farmacêutico para o correto uso com risco para resistência bacteriana, sabendo que o mesmo também é usado para hanseníase e tuberculose.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
15/04/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
15/04/2019	Sociedade médica	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A associação clindamicina com rifampicina é indicada nos protocolos de tratamento da hidradenite supurativa nos casos moderados a graves como segunda linha de tratamento, após a falha de uma ciclina. A disponibilização no SUS viabilizará o acesso a tratamento para significativo número de portadores. Entretanto, a duração desse tratamento deve ser limitada a 12-16 semanas. O tratamento pode ser repetido no futuro caso tenha sido bem sucedido. Em caso de falha, outras opções devem ser consideradas.</p> <p>2ª - Sim,</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	<p>Clique aqui</p>