

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Testes diagnósticos - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: COM o Exame PCR, Positivo: Os medicamentos são específicos para a doença que eu tenho, a LMC. o imatinibe eu usei por mais de uma ano e enquanto foi útil ao meu tratamento foi muito bom, depois tive que passar a usar o nilotinibe, o a resposta com o imatinibe não foi satisfatória. atualmente o nilotinibe esta me ajudando bastante no tratamento. Em relação ao EXAME PCR é positivo porque através dele conseguimos ver exatamente como esta o tratamento da doença., Negativo: Os efeitos negativos em relação ao PCR é o alto valor para conseguir fazer, e de difícil acesso, pois são poucos laboratórios que fazem este tipo de exame</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Imatinibe E Nilotinibe. Exames de sangue, hemograma e exames específicos com coleta direto da medula óssea. fiz o exame PCR a cada 6 meses para verificar a situação da LMC, este exame é de fundamental importância para quem faz tratamento para esta doença., Positivo: Os medicamentos são específicos para a doença que eu tenho, a LMC. o imatinibe eu usei por mais de uma ano e enquanto foi útil ao meu tratamento foi muito bom, depois tive que passar a usar o nilotinibe, o a resposta com o imatinibe não foi satisfatória. atualmente o nilotinibe esta me ajudando bastante no tratamento. Em relação ao EXAME PCR é positivo porque através dele conseguimos ver exatamente como esta o tratamento da doença., Negativo: Os efeitos negativos em relação ao PCR é o alto valor para conseguir fazer, e de difícil acesso, pois são poucos laboratórios que fazem este tipo de exame</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PCR, Positivo: Para saber a evolução da LMC, Negativo: ...</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: HYDREA, INTERFERON, GLIVEC, Positivo: REMISSÃO DA DOENÇA., Negativo: ENJOO.</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Este exame aumenta a velocidade do diagnostico</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Exame PCR, Positivo: Acompanhamento da Evolução do tratamento. e diagnostico inicial., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nilotinibe, Positivo: Não permite que a doença avance! Expectativa de curaEsperança, Negativo: Dores nas articulações e musculares, náusea, emagrecimento.</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Ambas doenças necessitam de exames ao diagnóstico e para controle. Considerando que o SUS contempla o tratamento, não faz nenhum sentido econômico não contemplar o controle</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinib, Dasatinib, Nilotinib, Positivo: Todos apresentam bons resultados quando bem indicados, principalmente na LMC,, Negativo: toxicidade inerente a cada tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Transplante de medula, Positivo: Curativo, Negativo: Efeitos colaterais como GVHD</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, o PCR é indispensável para o monitoramento da LMC e tendo a oportunidade de realizar o exame, paciente e médico podem se antecipar a qq tomada de decisão quanto ao protocolo de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glivec, Positivo: inibidor do philadelfia, qualidade de vida e expectativa maior de uma vida longa, PCR regularmente para monitorar a lmc., Negativo: Glivec aumento de peso e dores ocasionais nos ossos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: interferon, Positivo: não houve resposta, Negativo: dores de cabeça intesas, irritabilidade, falta de apetite e emagrecimento.</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O custo do exame é alto e às vezes não temos condições de fazer.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PCR, Positivo: Exame esclarecedor para monitoramento da leucemia, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Graças a este exame , fui diagnostiicado a tempo, para tratamento, e estou "curado " ate entao,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: imatinibe, Positivo: estagnação do crescimento, aparecimento de celulas canceriginas., Negativo: CAimbras.</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Como profissional da área, realmente sei a necessidade do PCR qualitativo para monitorar tratamento dessas leucemioas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinib, Positivo: boa tolerância e boa resposta, Negativo: dores musculares, alguns pacientes não toleram</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: desatinib, Positivo: boa resposta, Negativo: efeitos gastrointestinais</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sem o PCR o monitoramento não ocorre.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PCR, Positivo: MONITORAMENTO ADEQUADO, Negativo: N/A</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Importante para identificação e controle do tratamento, podendo assim ajudar muito no tratamento com maior rapidez e assim aumentando as chances de sucesso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Hydrea, Glivec, procedimentos qualitativos e quantitativos, genéticos para comprovação do tipo da doença , Positivo: Hydrea, baixou os Leucócitos, após a comprovação da doença através desses exames citados acima, estou fazendo uso do Glivec, que é o específico para doença., Negativo: nenhum até o momento</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Este exame é essencial para o monitoramento do câncer e deve ser feito para o resto da vida. Somente é necessário uma coleta de sangue. Infelizmente é muito caro em laboratórios privados e nem toda população tem condições de pagar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Remédios: Imatinibe, Dasatinibe, Nilotinibe Procedimento: PCR, Positivo: Imatinibe, Dasatinibe, Nilotinibe -- remédios para controlar a doença, porém não funcionaram devida a uma mutação PCR: essencial para verificar o nível da doença, principalmente na tomada de decisão para troca do remédio e indicação para transplante de medula, Negativo: Imatinibe, Dasatinibe, Nilotinibe -- efeitos colaterais indesejáveis PCR: demora no resultado</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PCR, Positivo: Acompanhamento da evolução do tratamento, Negativo: Se não fizer o exame não tenho como acompanhar a evolução do tratamento</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Importante para nós, pacientes necessitamos desse exame</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: 1, Positivo: Vida que eu tenho e normal, tenho reações como qualquer paciente , Negativo: Imatinibe tontura em outros</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Some te um imatinibe , Positivo: Vida notmal, Negativo: Tonturas e outros efeitos</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Importante para o acompanhamento do tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PCR, Positivo: normal, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Monitorar a quantidade de resposta ao tratamento dos pacientes com LMC e LLA Ph+ por meio do exame de PCR quantitativo é vital para eles!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a leitura dos resultados dos exames de PCR quantitativo, Positivo: Ele mede o quanto o paciente está respondendo a terapia, mostrando o nível sérico do gene mutado BCR-ABL. Isso permite intervir precocemente nos casos de progressão da doença evitando que ela se agudize e leve o paciente a óbito., Negativo: Não há efeitos negativos, pois o exame pode também ser realizado em amostra de sangue periférico. Se, contudo, o exame for realizado com amostra de medula-óssea, podem ocorrer complicações relacionadas à anestesia e à coleta propriamente dita, como dor local, que é facilmente controlada com analgésicos comuns, e anemia, relacionada ao volume retirado, mas que em geral é leve e de fácil controle.</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz exames de PCR para confirmar e monitorar a doença., Positivo: Melhor controle e acompanhamento da doença., Negativo: Não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dastinibe e Nilotilibe., Positivo: Os medicamentos fizeram o controle e avanço da doença, Negativo: Os efeitos são os inerentes ao uso de quimioterapia.</p>
03/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RT-PCR, Positivo: Diagnóstico correto, monitoramento de tratamento com possibilidade de descoberta precoce de recaída!!, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Monitoramento somente com hemogramas seriados , Positivo: Avaliação de recaída, mesmo que tardia, Negativo: Avaliação mto tardia de recaída da doença, geralmente sem muita possibilidade de reversão do quadro clínico</p>
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, No SUS temos disponíveis as medicações ITk imatinibe, dasatinib e nilotinibe, mas não temos atualmente como avaliar se o paciente está respondendo ao tratamento, para tanto é essencial termos o BCR-ABL para monitoramento. Além disso, se o paciente apresentar BCR-ABL com resposta profunda (<0,0032%IS) sustentado por pelo menos 2 anos possível a suspensão do ITK desde que o paciente seja monitorado, m pelo BCR-ABL, o que pode representar uma enorme economia para o SUS e mais qualidade de vida para os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR qualitativo para BCR ABL PCR quantitativo para BCR ABL, Positivo: Permite diagnóstico e monitoramento da doença LMC e LLA PH+ Permite suspensão da medicação na Lmc se resposta molecular profunda (BCRABL < 0,0032) e monitoramento , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citogenética de medula óssea , Positivo: Ajuda no monitoramento, mas com um menor nível de profundidade de resposta , Negativo: Não permite parar a medicação Tem menor nível de sensibilidade</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Importantíssimo para os pacientes dom LMC. 2ª - Não 3ª - Não
02/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Muito Importante para os pacientes com Leucemia Mieloide Cronica LMC, familiares , Médicos e pesquisadores. 2ª - Não 3ª - Não
02/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os testes moleculares são essenciais para o diagnóstico e monitoramento dessa doença. Os pacientes do sistema único de Saúde estão desassistidos 2ª - Não 3ª - Não
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Exames fundamentais para o diagnóstico e monitoramento da LMC 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RT-PCR qualitativo e quantitativo, Positivo: Exames fundamentais para o diagnóstico e monitoramento da LMC, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RT-PCR qualitativo e quantitativo, Positivo: Exames fundamentais para o diagnóstico e monitoramento da LMC, Negativo: Nenhum

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou farmacêutico clínico e acompanho pacientes com LMC em tratamento com ITK. , Positivo: Os exames laboratoriais propostos nesta consulta são fundamentais para condutas clínicas, quando não realizados conforme protocolos internacionais tem impacto negativo clínico e conseqüentemente farmacoeconômico, especialmente no contexto do SUS. Há um artigo bem interessante realizado na Holanda que traduz o impacto farmacoeconômico negativo quando tais exames não são realizados!, Negativo: Nenhum!</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinibe, dasatinibe e nilotinibe (ITK`s), Positivo: Os IKT`s mudaram o histórico da doença LMC, especialmente. Tem custo significativo para o SUS. Perder os benefícios destes por falta de exame significa desperdiçar os recursos do SUS!., Negativo: Há alguns efeitos colaterais, porém em sua maioria manejáveis.</p>
03/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Monitoramento por RQ-PCR do Bcr/Abl., Positivo: Detecção de falhas precoces ao tratamento instituído, visando troca da medicação., Negativo: Não há efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Monitoramento por RQ-PCR do Bcr/Abl., Positivo: Detecção de falhas precoces ao tratamento instituído, visando troca da medicação., Negativo: Não há efeitos negativos.</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Preciso fazer periodicamente o exame de PCR BCR quantitativo para monitorar a evolução do tratamento. , Positivo: Saber com precisão como está o controle das células com mutação., Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço tratamento com Nilotinibe , Positivo: Após tratamento com o medicamento, tenho uma vida normal, sem limitações drásticas e a doença vem controlada por vários anos., Negativo: Algumas manchas no corpo, mais nada que impeça uma vida normal.</p>
03/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinibe, Dasatinibe, Nilotinibe, Positivo: Avaliação segura de respota ao tratamento ou identificação precoce da perda deste, Negativo: custo</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PCR quantitativo e qualitativo , Positivo: Importante para monitorar a doença, se o medicamento está fazendo o efeito desejado, Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: O PCR é importante, para monitoramento da doença. , Positivo: Importante para nós pacientes, , Negativo: Nao tem.</p>
03/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Essencial para diagnóstico e controle de tto</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinibe. Dasatinibe, nilotinibe, Positivo: Controle das enfermidades relacionadas , Negativo: Possibilidade de efeito adverso ou intolerância</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os acima mencionados, Positivo: Controle da doença , Negativo: Derrame pleural</p>
03/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Exame muito importante no diagnóstico e acompanhamento do paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glivec, Positivo: Eficacia e segurança no tratamento , Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinib, nilotinib, dasatinib.Exames complementares de diagnostico e avaliacao de resposta ao tratamento com PFR para BCR ABL, Positivo: Controle cronico da doenca. Aumento de sobrevida global, Negativo: Efeitos colaterais como citopenias leves, caimbras, derrame pleural</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinib, nilotinib, dasatinib.Exames complementares de diagnostico e avaliacao de resposta ao tratamento com PCR para BCR ABL, Positivo: Controle da doença e aumento da sobrevida global, Negativo: Nao ha</p>
03/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Extremamente importante a incorporação dos testes diagnósticos e de acompanhamento dos pacientes com LMC e LLA Ph+</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR e FISH para LMC e LLA Ph+, Positivo: Diagnóstico e monitoramento correto dos pacientes com essas doenças permitindo a identificação da resposta ao tratamento e troca de medicamento em caso de falha, evitando a progressão da doença e óbito dos pacientes. , Negativo: Não há efeitos negativos na realização de exames imprescindíveis ao monitoramento dos pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cariótipo , Positivo: Importante para identificação de pacientes com alterações cromossômiais adicionais, Negativo: Nenhum efeito negativo em monitorizar corretamente os pacientes.</p>
03/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Trabalho com diagnóstico e monitoramento de leucemias agudas e crônicas e como tal sei da importância da confirmação genética e molecular destas doenças</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rt pcr para diagnóstico e monitoramento de leucemias mieloide crônica e LLA , Positivo: Diagnóstico precoce e preciso com tratamento direcionado levam a melhor sobrevida, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citometria de fluxo para monitoramento de lla, mas não de lmc, Positivo: DRM por Citometria pode ser associada a rt pcr, Negativo: Não tem ação no diagnóstico de lmc</p>
03/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: testes Reação em cadeia da polimerase - Transcriptase reversa qualitativa (RT-PCR) e quantitativa (RT-qPCR) e Hibridização in situ (ISH) para o diagnóstico e monitoramento da Leucemia Mieloide Crônica (LMC) , Positivo: Estes testes permitem o monitoramento adequado da doença, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Extremamente importante a incorporação dos testes diagnósticos e de acompanhamento dos pacientes com LMC e LLA Ph+</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR e FISH para LMC e LLA Ph+, Positivo: Diagnóstico e monitoramento correto dos pacientes com essas doenças permitindo a identificação da resposta ao tratamento e troca de medicamento em caso de falha, evitando a progressão da doença e óbito dos pacientes. , Negativo: Não há efeitos negativos na realização de exames imprescindíveis ao monitoramento dos pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cariótipo , Positivo: Importante para identificação de pacientes com alterações cromossômiais adicionais, Negativo: Nenhum efeito negativo em monitorizar corretamente os pacientes.</p>
05/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamentos: Imatinibe, Interferon, Metotrexato, Ciclofosfamida, Prednisona, Dexametasona, Mercaptopurina, Citarabina. Teste de PCR., Positivo: Tratamentos quimioterápicos com eficácia comprovada, de boa resposta terapêutica, auxiliando na expectativa de vida dos pacientes com essas doenças. Teste de PCR permite um diagnóstico mais preciso e com maior rapidez de resultados, possibilitando que o tratamento seja iniciado o quanto antes, dando maior chance de cura ao paciente., Negativo: Medicamentos quimioterápicos levam a efeitos adversos devido a morte de células de rápida renovação, causando problemas digestivos, queda de cabelo, mal estar geral. Esses efeitos adversos podem levar o paciente a óbito caso sejam administrados na dose, via e ao pacientes incorretos. Por isso os testes que estão em debate agora são muito importantes na identificação mais específica da doença, fazendo com que o tratamento seja direcionado à doença detectada.</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Essencial</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RT-PCR E FISH BCR ABL PARA LMC E LLA-PH, Positivo: IMPRESSINDIVEL PARA O TRATAMENTO ADEQUADO DESSAS PATOLOGIAS POTENCIALMENTE LETAIS., Negativo: Tratamento inadequado e progressão da doença aumentando o custo por necessidade de tratamento ainda mais caro e risco de morte.</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PCR Quantitativo, Positivo: Exame para monitoramento do tratamento de LMC, Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paciente de MC desde nov/2016 e o monitoramento do tratamento é extremamente importante para nós pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso Mesilato de Imatinibe, Positivo: Após 2 anos e meio de tratamento, levo uma vida normal., Negativo: No início do tratamento sofri com alguns efeitos colaterais, tais como inchaços no rosto, pés e pernas, muita diarreia.</p>
05/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Recomendado internacionalmente. Permite mudar a orientação terapêutica de forma precoce, nos casos de falha terapêutica. Sugere, através do controle de resposta, a identificação pacientes com falha de adesão.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinibe, Dasatinibe e Nilotinibe, Positivo: Imatinibe - primeiro inibidor de tirosina-quinase. Mais conhecido, em uso no Brasil como primeira linha desde junho/2008. Nilotinibe e Dasatinibe - inibidores de segunda geração. Medicamentos mais potentes. Respostas mais profundas e precoces. , Negativo: Imatinibe - Maior incidência de resistência terapêutica. Nilotinibe e Dasatinibe - Perfil de segurança de longo prazo associado com maior incidência de eventos adversos cardiovasculares.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferon, Positivo: Controle de doença na gestação, quando estão contra-indicados os inibidores de tirosina-quinase, Negativo: Efeito flu-like - febre, adinamia, mialgia e artralgia.</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou portadora de LMC e tenho que fazer o exame de PCR trimestralmente. É muito importante para o controle e monitoramento do tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço o exame de PCR trimestralmente., Positivo: O exame de PCR faz parte do meu tratamento. Não sei se há outro maneira de monitorar a LMC., Negativo: Não há efeito colateral.</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, sou paciente e necessito fazer o exame regularmente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: glivec, Positivo: praticidade de quimioterapia oral e em domicilio, e remissão, Negativo: dor muscularedema oculardiarreia, enjojo, ultra sensibilidade dermatologica,</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Imatinibe, Positivo: Aumento das plaquetas, Negativo: Dor nas articulações, enjojo, tontura , vômito e diarreia.</p>
05/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paciente de leucemia mileoide crônica e preciso fazer esse exame para monitorar a doença</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Pcr Bcr-abl quantitativo , Positivo: Necessário para monitorar minha doença, lmc, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pcr quantitativo bcr/abl., Positivo: Com exame podemos saber se a medicação esta sendo eficaz com o tratamento da doença. , Negativo: Pcr no mes de abril tive que pagar o procedimento mesmo sem condições financeiras.</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: imatinibe dasatinibe nilotinibe ponatinibe bosutinibe , Positivo: alcance da resposta molecular maiorresgate dos pacientes intolerantes/ resistentes a imatinibe , Negativo: efeitos adversos graus 1 e 2.toleraveis.Baixa incidência de EA graus 3 e 4</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: exame de PCR é mandatorio para monitoramento e bom controle da LMC, Positivo: melhor monitoramento, com menor possibilidade de evolucao para fase acelerada e crise blastica, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR para pesquisa BCABL, Positivo: monitoramento correto com menor chance de evolucao para fase acelerada e crise blastiva, Negativo: nenhum</p>
05/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A monitorização é a única forma de sabermos se o tratamento está funcionando e qual o inibidos de tirosina quinase ideal. São medicamentos dispendiosos, muito mais caros que o exame. Não basta um hemograma normal, o paciente tem que atingir remissões moleculares evidenciadas RT-PCR. Outra necessidade seria com a incorporação da suspensão do tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ISH e RT-PCR para monitoramento de LMC, Positivo: ISH - permite a avaliação do cariótipo mesmo que não haja mitose. Muito útil para pacientes em tratamento com medulas muito fragilizadas. A remissão citogenética determinada por cariótipo e por ISH é o padrão-ouro de resposta terapêutica nestas doenças.RT-PCR - fundamental para acompanhamento já que é feito no sangue periférico sem necessidade de coleta de medula óssea. Importante para detecção de resposta molecular profunda., Negativo: Não vejo nenhum já que o custo é altamente compensador diante do custo da própria medicação e da progressão da doença.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: determinação de mutação tirosina quinase na LMC por sequenciamento de sanger, Positivo: Permite a escolha do melhor tratamento de segunda linha no caso de falha a primeira linha em um ambiente SUS onde o governo não fornece inibidor de tirosina quinase para terceira linha.Além disto, pode determinar a indicação de transplante de medula óssea no caso da presença de mutação t315i, Negativo: É exame custoso.</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mensilato de imatinibe, Positivo: Efeito positivo,Disposição , Negativo: Náuseas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mensilato de imatinibe, Positivo: Mais disposição , Negativo: Náuseas</p>
05/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Para agilizar os resulta 2ª - Não 3ª - Não
05/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A disponibilização destes testes é fundamental para diagnóstico e correto monitoramento da patologia. 2ª - Não 3ª - Não
05/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O exame de PCR BCRABL É EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA ACOMPANHAMENTO E REMISSÃO DA DOENÇA 2ª - Não 3ª - Não
05/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Inatinibe 400, Positivo: Estou em remissao, Negativo: Caimbras 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, FUNDAMENTAL A MONITORIZAÇÃO MOLECULAR DA DOENÇA LMC E LLA PH POSITIVO POR MEIO DO PCR QUANTITATIVO BCR-ABL PARA AVALIAR RESPOSTA À MEDICAÇÃO DO INIBIDOR TIROSINA QUINASE, POIS SE NÃO APRESENTAR RESPOSTA PRECOCE MOLECULAR E AO LONGO DE UM ANO , DEVERÁ TROCAR A MEDICAÇÃO DEVIDO AO RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA E MORTE . TAMBÉM, A MONITORIZAÇÃO DEVERÁ SER PERIODICA AO LONGO DO TRATAMENTO DA DOENÇA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MESILATO DE IMATINIBE, NILOTINIBE E DASATINIBE, Positivo: EFEITOS POSITIVOS DE CONTROLE DA DOENÇA, EVITAR PROGRESSÃO E MORTE, MUDANÇA DA HISTÓRIA NATURAL DA LMC, Negativo: EFEITOS ADVERSOS RELACIONADOS À MEDICAÇÃO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MESILATO DE IMATINIBE, NILOTINIBE E DASATINIBE, Positivo: EFEITOS POSITIVOS DE CONTROLE DA DOENÇA, EVITAR PROGRESSÃO E MORTE, MUDANÇA DA HISTÓRIA NATURAL DA LMC, Negativo: EFEITOS ADVERSOS RELACIONADOS À MEDICAÇÃO, FALHA OU INTOLERÂNCIA</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: HydreaMesilato de Imatinibe, Positivo: Resposta Hematológica, Negativo: Efeitos colaterais</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PCR quantitativo e qualitativo , Positivo: Importante para monitorar a doença, se o medicamento está fazendo o efeito desejado, Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: O PCR é importante, para monitoramento da doença. , Positivo: Importante para nós pacientes, , Negativo: Nao tem.</p>
05/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR qualitativo (bcr-abl) para diagnóstico de LMC e LLA Ph+, e PCR quantitativo para monitoramento de tratamento de tais doenças., Positivo: Possibilidade de realizar o diagnóstico correto e instituir a terapêutica e monitoramento adequados para os pacientes., Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Importante</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Essencial para os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: MESILATO DE IMATINIBE, Positivo: LEUCOGRAMA NORMALIZADO, HEMOGRAMA NORMALIZADO., Negativo: CAIMBRAS, EDEMA NOS OLHOS, FADIGA MUSCULAR</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paciente do SUS e não tenho condições financeira para pagar esse exame.E sei a extrema necessitada desse exame para meu tratamento de LCM.Um exame que vai monitora se meu organismo está respondendo a medicação que estou fazendo uso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou fazendo uso do Imatinibe. , Positivo: Iniciei meu tratamento com Imatinibe ,não houve necessidade em mudar de medicação., Negativo: Alguns efeitos colaterais que temos.Mas com ajudas do médico hematologista eu tenho conseguido sobreviver.</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Quanto mais cedo for diagnosticado, menos danos à saúde o paciente sofrerá.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RT-PCR., Positivo: Diagnóstico preciso do tipo de leucemia., Negativo: Demora o resultado.</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Indispensável no diagnóstico e monitoramento das neoplasias citadas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pcr p rearrajo Bcr Abl Mediação p LMC LLA, Positivo: Exame indispensável para o diagnóstico e monitoramento das neoplasias citadas acima. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não se aplica , Positivo: Não se aplica , Negativo: Não se aplica</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Exame importantissimo para controle doença agora com advento do imatinibe paciente passou a ter sobrevida . Facilitara a vida de muitos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: mesilato imatinibe, Positivo: Estou em remissão molecular, Negativo: Não há até agora</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon, Positivo: Ajudou-me por cerca de 1,5 ano. Mas não resolveu . , Negativo: reações muito severa.</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho uma sobrinha com LMC.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A incorporação do exame ao sus ira facilitar o tratamento dos pacientes visto que além de caro nem todos os laboratórios realizam o exame.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Inicialmente fui medicada com o Imatinibe, atualmente faço uso do dasatinibe. A cada seis meses realizo o exame PCR Quantitativo que atualmente custa o valor de R\$ 700 reais. , Positivo: Quanto ao medicamento que utilizo alcancei a remissão completa assim continuo em uso da medicação para manter a estabilidade da resposta citopatológica, Negativo: Os efeitos negativos da medicação foi a indução da menopausa precoce e fadiga.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: A medicação Glivec (imatinibe), Positivo: Fui diagnosticada com Leucemia Mielóide Crônica e com o Glivec foi contido o avanço da doença, Negativo: Fique mutio cansada e os enjoos eram mais frequentes</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Remédio Mesilato de Imatinibe Exame PCR ABL , Positivo: Após o iniciar o tratamento em 02.03.2019 com o Mesilato de Imatinibe, voltei ao peso normal, as plaquetas e os leucócitos e o baço voltaram ao normal. O PCR ABL reduziu de 56% para 46%. , Negativo: Não tive efeitos colaterais. Consigo levar uma vida normal.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hydrea, Positivo: Os Leucócitos caíram radicalmente , Negativo: Não tive efeitos negativos.</p>
05/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mesilato de imatinibe , Positivo: Aumento do apetite, Negativo: Sonolência</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Glivec, Positivo: Teve resposta positiva, Negativo: Náuseas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nilotinibe e Dasatinibe, Positivo: Melhor resposta, Negativo: Náuseas e falta de ar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Imatinibe, Positivo: Redução das taxas., Negativo: Enjoou.</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PCR, Positivo: Monitoramento do índice de infecção no tratamento para Leucemia Meliodie Aguda, Negativo: Não teve efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia, Positivo: Colocou doença em regressão, Negativo: Febre.</p>
08/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fundamental para o adequado acompanhamento dos pacientes , Positivo: Conduz adequadamente as tomadas de decisões , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, PRIMORDIAL PARA SEGUIMENTO E TOMADA DE CONDUTA NA LMC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BCR ABL QUALITATIVO E QUANTITATIVO, Positivo: MELHOR PARA TOMADA DE DECISÕES PARA MUDANÇA DO TKI UTILIZADO. IMATINIB >> DASATINIB >> NILOTINIBIMATINIB >>NILOTINIB >> DASATINIB, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BCR ABL QUALITATIVO E QUANTITATIVO, Positivo: MELHOR PARA TOMADA DE DECISÕES PARA MUDANÇA DO TKI UTILIZADO. IMATINIB >> DASATINIB >> NILOTINIBIMATINIB >>NILOTINIB >> DASATINIB, Negativo: NENHUM</p>
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fisioterapia, Positivo: Melhora da qualidade de vidaMelhora da funcionalidade, Negativo: Nenhum</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Imatinibe e Nilotinibe, Positivo: Nilotinibe controlou a Lmc que tenho, Negativo: são varias as reações negativas dos medicamentos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PROCEDIMENTO, PCR, Positivo: COM ELE, O PCR NO INICIO FOI DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA CONFIRMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO. E AGORA MAIS AINDA PARA ACOMPANHAMENTO, SABERMOS SE O INIBIDOR ESTA TENDO RESULTADOS... , Negativo: O EFEITO NEGATIVO QUE VEJO, NO NOSSO CASO AQUI EM PERNAMBUCO NÃO É SOBRE O PROCEDIMENTO EM SI, POI É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA. E SIM O PONTO NEGATIVO É A DEMORA , A BUROCRACIA QUE SOFREMOS PARA REALIZAR ESSE EXAME. MUITAS DAS VEZES LEVANDO ANOS PARA SE FAZER UM PCR.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: INIBIDOR, MESILATO DE IMATINIBEMIELOGRAMA, Positivo: A ELIMINAÇÃO DAS CÉLULAS QUE CONTÉM O CROMOSSOMO... DEIXAR O PACIENTE UM POUCO ALIVIADO, COM ESPERANÇA DE DIAS MELHORES, DE VIDA "NORMAL" E PRINCIPALMENTE POR SE UMA QUIMIOTERAPIA VIA ORAL., Negativo: EFEITO NEGATIVO!! A DEPENDÊNCIA A FALTA DELE NAS FARMÁCIAS A INCERTEZA, QUE POR ESSES MOTIVOS O PACIENTE CONVIVE DIARIAMENTE, ELE E TODA A FAMÍLIA.LEVANDO A UM DESGASTE EMOCIONAL</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Este é o exame que mede a quantidade de células doentes. Sem ele não existe o acompanhamento da doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: IMATINIBEDASATINIBENILOTINIBE, Positivo: IMATINIBE: controle da doença. Indetectável Dasatinibe BCR/ABL INDETECTAVELNILOTINIBE BCR/ANO INDETECTAVEL , Negativo: Imatinibe: tonturas grau 3 Dasatinibe: lesão pulmonar intersticial NILOTINIBE Ok</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hydrea, Positivo: Controle dos leucócitos , Negativo: Usei por 40 dias enquanto aguardava a liberação do IMATINIBE.</p>
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Hoje em dia não se faz tratamento das leucemias Ph e outras, sem monitoramento da doença residual.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho larga experiência com PCR quantitativo e com análise da doença residual mínima nas leucemias, Positivo: O monitoramento da doença residual permite ajustar dose terapêutica, antecipar recaída e indicar mudança de inibidor de BCR-ABL., Negativo: Não vejo efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Análise de doença residual por PCR quantitativo de rearranjos VDJ de genes IgH e TCR, Positivo: Permite monitorar a doença residual permite ajustar dose terapêutica, antecipar recaída e indicar mudança de inibidor de BCR-ABL., Negativo: Não vejo efeito negativo.</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A MINHA CONCORDÂNCIA É POIS EXISTE PESSOAS QUE NÃO TEM PLANO DE SAÚDE E NEM MEIOS PARA PAGAR</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PCR-ABL, Positivo: UMA MELHOR ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO PELO MÉDICO, Negativo: NÃO CONHEÇO</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O exame pelo SUS é necessário porque é muito cara para os pacientes. Considerando que é preciso fazer diversas vezes ao ano...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Hoje tenho que esperar ser chamada via voucher do Laboratório que fabrica a medicação, faz mais de 7 meses que não realizo o exame e ele particular além de caro necessito viajar 500km para fazer a coleta! Se tornando insustentável!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Pcr,, Positivo: O pcr me tranquiliza e orienta minha médica de como está o desenvolvimento da doença. Ajuda a regular a medicação quando a resposta demora a zerar, e dá um consolo para nós pacientes de como está se desenvolvendo a doença , Negativo: Exame que demora pra sair o resultado, não tem em cidades próximas, e a muita divergência de resultado entre um laboratório e outro, que acaba deixando a gente (paciente) inseguro com o resultado!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glivec e Nilotinibe , Positivo: glivec foi uma medicação que iniciei o tratamento causava muitos efeitos colaterais e meu organismo acabou nao mais reagindo vem a ele é meus exames não estavam sendo zerados. Com o Nilotinibe tenho quase nenhum efeito colateral e meus exames respondem bem!, Negativo: Glivec: vomitava todos os dias depois de 1h de ingestão do comprimido!Tinha a pele fina e pálida com um aspecto nada saudável, estava sempre com retenção de líquido e indisposta! Nilotinibe: tenho erupções cutâneas e queda brusca de cabelo, além de me deixar com retenção de líquido</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Como paciente sei da importância de se fazer esse exame</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz bcr, tomo glivec, tomei hydreia , Positivo: Minha leucemia foi controlada, Negativo: Problemas de estomago</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hydrea, Positivo: Controle , Negativo: Estomagi</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paciente de LMC e seu o quanto esse exame é importante para nós, é mais um respiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Imatinibe, Positivo: Teve uma melhora, Negativo: Tontura vômitos</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o exame de pcr para monitoramento da leucemia, Positivo: O exame é essencial para continuidade no tratamento da leicemia mielóide crônica, uma vez que somente ele faz a contagem das células., Negativo: Não ha.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A implementação dos diagnósticos no SUS é de suma importância, posto que trará aos pacientes maior controle da patologia, evitando, assim, o agravamento da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o exame PCR, Positivo: É de suma importância para o controle da LMC, Negativo: Infelizmente tive que custear o procedimento que é de alto custo no meu Estado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos: Imatinibe 400mg e Dasatinibe 100 mgProcedimentos: Mielograma, Cariótipo, Imunofenotipagem e PCR, Positivo: As medicações ajudaram no controle da doença, almejando a cura médica!Os procedimentos são essenciais para monitorar a doença!, Negativo: Os efeitos colaterais do medicamento!O mielograma é extremamente dolorido! Fazemos porque é obrigatório!</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Em 2016, assinei o manifesto a favor do PCR quantitativo feito pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (abrale). Até que enfim a CONITEC ouviu este chamado da sociedade civil e deu uma recomendação preliminar a favor da cobertura do exame molecular no SUS. O PCDT já recomendava, porém infelizmente pouquíssimos pacientes de LmC tinham acesso a este exame. Que conquista! Parabéns ao Ministério da Saúde e a ABRALÉ por terem acatado os clamores do povo!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR QUANTITATIVO PARA O MONITORAMENTO E PCR QUALITATIVO PARA O DIAGNOSTICO, Positivo: O EFEITO POSITIVO DO TESTE PCR QUANTITATIVO É UM MELHOR MONITORAMENTO DO TRATAMENTO EVITANDO ASSIM A NÃO ADERÊNCIA AO TRATAMENTO. O PCR QUALITATIVO É IMPORTANTE NO DIAGNÓSTICO E NA CARACTERIZAÇÃO DA QUEBRA NA TRANSLOCAÇÃO QUE CARACTERIZA O CROMOSSOMO FILADELFIA., Negativo: NÃO HÁ EFEITOS NEGATIVOS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR QUANTITATIVO PARA O MONITORAMENTO E PCR QUALITATIVO PARA O DIAGNOSTICO, Positivo: O EFEITO POSITIVO DO TESTE PCR QUANTITATIVO É UM MELHOR MONITORAMENTO DO TRATAMENTO EVITANDO ASSIM A NÃO ADERÊNCIA AO TRATAMENTO. O PCR QUALITATIVO É IMPORTANTE NO DIAGNÓSTICO E NA CARACTERIZAÇÃO DA QUEBRA NA TRANSLOCAÇÃO QUE CARACTERIZA O CROMOSSOMO FILADELFIA., Negativo: NÃO HÁ EFEITOS NEGATIVOS.</p>
06/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Uso de TKI e PCR para monitoramento de resposta moleculares em LMC, Positivo: Acompanhamento e identificação precoce de falha no tratamento., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RTPCR qualitativo e quantitativo., Positivo: Indispensáveis para o adequado diagnóstico e monitoramento dessas doenças., Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A incorporação do exame vai ajudar muito os pacientes com LMC</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acredito que a incorporação desses exames irá beneficiar muitos pacientes que não possuem acesso atualmente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nilotinibe, Imatinibe, Dasatinibe, Positivo: Controle da Doença, redução de transcritos BCR/ABL a níveis mínimos ou indetectáveis apenas identificados pelo exame RT-PCR., Negativo: não há efeitos negativos. A dificuldade está só no custeio dos exames</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Exames essenciais para definição de risco e proposta terapêutica!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rt-PcR para BCR-ABL, Positivo: Nos casos de LMC respalda uso do Gleevec e nos casos de LLA tem grande impacto na escolha do tratamento e definição de Indicação de transplante, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros marcadores moleculares como o MLL e cariotipo, Positivo: Novamente, alterações moleculares e citogenética são essenciais para definição de tratamento adequado, inclusive otimização dos recursos públicos , Negativo: Desconheço</p>
24/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os exames são indispensáveis ao monitoramento da resposta ao tratamento na LMC e no diagnóstico tanto da LMC/mieloproliferativas crônicas quanto da LLA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR BCR/ABL em pacientes em uso de imatinibe, nilotinibe, dasatinibe., Positivo: Auxiliou na troca adequada da medicação e ajudaria na avaliação de suspensão da mesma. Exame realizado em sangue periférico, não em medula óssea., Negativo: Não possui.</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, o PCR para bcr-abl é fundamental para diagnóstico e acompanhamento de pacientes com LMC e LLA Ph, guia totalmente o tratamento e é um critério para indicação de transplante de medula óssea</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BCR-ABL p210 e p190 qualitativo e quantitativo, Positivo: fundamentais para diagnóstico e avaliação de resposta, Negativo: talvez o custo, mas acredito que seja mais custoso não avaliar o paciente adequadamente e deixar a doença progredir para uma fase mais avançada</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esses testes são fundamentais para monitoramento de respostas ao tratamento e decisões terapêuticas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pcr para bcr abl quantitativo.Fish para bcr abl. , Positivo: Pcr- monitorar resposta ao tratamento com identificação precoce de falha primária ou Perda de resposta ao tratamento e intervenção precoce como troca de inibidores de tirosina kinase(itk)ou mesmo indicação de transplante(paciente elegíveis com falha a 2 tkis), conforme recomendações do european leukemia net. , Negativo: Importante especificar que o pcr seja validado com o fator de correção internacional como pré requisito essencial para um monitoramento adequado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pesquisa de mutação no dominio abl, Positivo: Essencial para detectar presença de mutação nos casos de falha ao tratamento e que pode guiar qual melhor itk de segunda geração a ser usado no caso, já que algumas mutações podem ter perfis de sensibilidades diferentes aos itk. Dessa forma, auxilia na indicação da medicação mais adequada ao caso. Esse exame tb pode identificar mutação t315i que é resistente aos itk disponíveis no Brasil , com indicação de transplante., Negativo: Nenhum.</p>
08/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glivec , Teste de Pcr, Positivo: Importante este teste para evitar que a doença progrida, Negativo: Não observados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nilotinibe e Dasatinibe, Positivo: Mwdicações para segunda linha de tratamento de LMc, Negativo: Não observado</p>
25/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É imprescindível para o tratamento correto dos pacientes com LMC/ LLA ph+ o uso do exame PCR BCR-ABL quantitativo. É a única maneira de saber se o tratamento está adequado ou não. Inclusive em breve haverá o protocolo de descontinuação das drogas com base neste exame.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eu utilizo o exame PCR BCR-ABL quantitativo para monitorar o tratamento dos pacientes com LMC/ LLA ph+ quando eu possuo voucher da indústria farmacêutica, que são limitados., Positivo: É a única maneira descrita de monitorar o tratamento destes paciente com LMC/ LLA ph+., Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A monitorização molecular é imprescindível para o tratamento do paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pcr e IHS, Positivo: Monitorização adequada, proporcionando avaliação da melhor resposta molecular ou falta desta, com necessidade de troca terapêutica , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cariotipo, Positivo: Monitorização genética com controle de doença , Negativo: A resposta Citogenetica não indica necessariamente que temos resposta molecular, pois esta é uma avaliação mais profunda , sendo ideal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com Monitorização com PCR para tratamento adequado dos pacientes, Positivo: Permite o tratamento adequado dos pacientes portadores de LMC. Não fazer significa má prática clínica, Negativo: Desconforto da Coleta para realização do teste</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rt pcr, Positivo: Indispensável no tratamento correto da Leucemia mieloide crônica, Negativo: Necessidade de fazer 2 testes, para diferenciar o p190 e o 210</p>
24/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medida importantíssima para o tratamento de LMC</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Imatinibe é Nilotinibe, Positivo: Avaliação do PCR quantitativo para definir troca de medicamento, Negativo: N</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: N, Positivo: N, Negativo: N</p>
24/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esse exame é essencial para o diagnóstico e monitoramento dos pacientes LMC e LLA Ph positivo, definindo o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FISH e RT-PCR qualitativo e quantitativo, Positivo: Utilizamos o qualitativo para diagnosticar o paciente e caso positivo tem indicação de realizar os inibidores de tirosina quinase, medicações que já são oferecidas pelo SUS, mas só podem ser iniciadas caso o paciente apresente BCR ABL positivo. O quantitativo é importante para monitorar resposta, caso não seja adequada, tratamento deve ser modificado. Ou seja, não tem como se diagnosticar nem tratar pacientes com LMC e LLA sem realizar esses exames., Negativo: Não há efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A incorporação destes exames é de fundamental importância para o diagnóstico de tratamento de paciente com diagnóstico de leucemia mieloide crônica e leucemia linfóide aguda pois permite iniciar a terapia com inibidor tirosina quinase precocemente aumentando as chances de resposta, bem como permitir o monitoramento e identificar uma recidiva precocemente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FISH-RT-PCR, Positivo: Identificou precocemente casos de leucemia linfóide aguda t(9;22), permitindo iniciar terapia específica e melhor resposta, Negativo: não há</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mesilato de imatinibe, desatinibe e nilotinibe., Positivo: Manutenção do paciente na fase crônica da LMC com resposta molecular maior, Negativo: Intolerância medicamentosa e falta de acesso aos exames de controle (PCR).</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É através desse exame que a resposta ao tratamento é monitorada.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR quantitativo., Positivo: É possível avaliar a resposta ao tratamento de forma rápida e acurada, o que torna a metodologia uma ferramenta importante para o clínico tomar decisões em relação ao tratamento do paciente., Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR QUALITATIVO E CITOGENÉTICA., Positivo: Através da citogenética é possível avaliar as alterações adicionais que o paciente possa ter além do cromossomo Ph, Negativo: Mais demorado e menos sensível.</p>
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Testes importantes para o diagnóstico e monitoramento de pacientes com doenças oncohematológicas tanto em crianças ou adultos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: trabalho com o teste ISH aonde pode avaliar a eficácia do medicamento., Positivo: os efeitos positivos é avaliação mais rápida do procedimento ISH para o paciente em relação ao medicamento., Negativo: efeito negativo alta sensibilidade do teste.</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, muito importante</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FISH e cariótipo com Banda G em medula óssea, Positivo: Muito importante FISH para detecção de rearranjo BCR ABL, Negativo: Não é disponível para todos que precisam</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RT-PCR e RT-qPCR, Positivo: Estes procedimentos são essenciais para o monitoramento das LMCs e LLAs, pois são procedimentos sensíveis e específicos e de rápido diagnóstico para o paciente ter o acompanhamento correto da doença e assim, aumentar a sobrevida e a qualidade de vida dos mesmos., Negativo: São procedimentos relativamente caros se não realizados pelo SUS, sendo que muitas vezes, muitos dos pacientes não tem condições de pagar por este tratamento, o que pode agravar seu estado dependendo do diagnóstico que não está sendo acompanhado de forma correta e específica.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FISH, Positivo: FISH exame rápido que auxilia diretamente no diagnóstico, prognóstico e tratamento de pacientes com LMC e LLA, Negativo: Permite verificar apenas um tipo de alteração genética específica.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citogenética onco-hematológica, Positivo: Baixo custoPermiti visualizar outras alterações genéticas que podem está presentes ., Negativo: Ausência de crescimento celular (ausência de metáfases para análise)</p>
30/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, E um exame necessário para monitorar a Leucemia, sem esse controle a doença pode evoluir sem chance de mudar o tratamento no tempo certo, pode se salvar vidas com a possibilidade em realizar o exame conforme os prazos estabelecidos pelo médico.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Teste de monitoramento de PCR ABL , meu familiar possui LMC., Positivo: Com este exame sabemos se a doença está evoluindo de forma positiva ou negativa para o tratamento. E dependendo do resultado o médico muda o tratamento para que a doença não evolua para ter menor risco de morte., Negativo: Quando não realizado o exame por não ter na rede pública, meu familiar sofreu internações pois a LMC não estava monitorada de forma adequada e a doença progrediu de forma negativa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu familiar já utilizou Imatinibe e até o momento faz uso do Nilotinibe, teve que fazer os testes de PCR, mas só consegui poucas vezes quando o inca disponibilizava para o hospital que ela era tratada., Positivo: Saber se a doença está controlada. Deixa o paciente em segurança com seu tratamento., Negativo: Não ter o teste de PCR ABL bem como a falta Eventual dos medicamentos para LMC Atrapalham o tratamento, fazendo o paciente piorar, internar e em outros casos causa morte pela progressão da LMC.</p>
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinibe, dasatinibe e nilotinibe, Positivo: Regressão da esplenomegalia e da leucocitose, negatificação molecular daDoença, Negativo: Edema, mal estar diarreia</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinibe Dasatinibe Nilotinibe , Positivo: Imatinibe - primeira linha. Maior parte dos pacientes usaDasatinibe - segunda linha. Facilidade na adesão ao tratamento Nilotinibe- segunda linha. Menos efeitos colaterais , Negativo: Imatinibe- alergias ao coranteDasatinibe- derrame pluralNilotinibe- posologia complicada para o paciente</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu pai de LMC e sei o quanto é importante realizar o exame de PCR para o monitoramento dos resultados.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Imatinibe e PCR, Positivo: Para o meu pai, tanto o medicamento, quanto o acompanhamento, ajudaram em 100% no tratamento da LMC. , Negativo: Por enquanto, sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinibe, dasatinibe e nilotinibe, Positivo: Regressão da esplenomegalia e da leucocitose, negatificação molecular daDoença, Negativo: Edema, mal estar diarreia</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rt pcr. É fundamental sua utilização. , Positivo: É a única maneira de saber se o tratamento está dando resultado. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pcr mutação , Positivo: Em pacientes não respondedores, é a única maneira de saber ajustar e especificar o tratamento. , Negativo: Não.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: imatinibe dasatimibe rnilotinibe , Positivo: Controle de doença , Negativo: Toxicidade</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinibe, dasatinibr, milotinibr, Positivo: Controle da doença , Negativo: Toxicidade</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os referidos testes diagnósticos são muito importantes para o paciente oncológico; tanto no momento do diagnóstico, para que possamos receber os medicamentos, como durante todo o tratamento, para que seja possível acompanhar o andamento do mesmo. Como não conseguimos fazer gratuitamente pelo SUS, ficamos "reféns" dos laboratórios dos medicamentos, porém a cada dia mais percebemos que existe uma demora para que os exames sejam realizados, o que ocasiona em transtornos para os pacientes, pois ficamos sempre com a dúvida sobre a eficácia do tratamento, sendo a outra opção arcarmos com o pagamento em laboratórios particulares, que atualmente são maiores do que o salário mínimo do brasileiro, o que impede que uma boa parte da população realize o exame.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Exame RT-PCR., Positivo: Diagnóstico e acompanhamento da LMC., Negativo: Não existem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesilato de Imatinibe., Positivo: Impede o avanço da doença., Negativo: Náuseas, cãibras, formigamentos, entre outros.</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Poucos pacientes conseguem vagas para realizarem seus exames, pois só são disponibilizados pelos HCs de São Paulo e Curitiba, deixando de assistir a evolução ou a remissão da doença, muito importante para um prognóstico. Pode salvar muitas vidas com apenas boa vontade! Obrigado!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: RT PCR BCR ABL. Para monitoramento da Leucemia., Positivo: Graças ao monitoramento mudei minha medicação em tempo hábil pois a primeira não estava mais controlando a doença. Passei do Glivec para o Dasatinib., Negativo: Não há efeitos negativos! Ao contrário, salvam vidas!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Iniciei com o medicamento Hidrea, em seguida passei para o mesilato de imatinib e na atualidade estou tomando o Dasatinib., Positivo: Todos possuem efeitos positivos, pois podem te dar uma sobrevida muito além do que vc esperava ao descobrir que estava doente., Negativo: Todos produtos e procedimentos por mim utilizados foram de grande importância para o sucesso do controle da doença, só vieram a somar para um melhor conforto físico e mental durante o tratamento.</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fish, Positivo: Avaliar melhor a conduta e resposta ao paciente, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O teste é importante para o monitoramento dos pacientes com a doença, além de que com os estudos atuais com possibilidade de suspensão do medicamento, ter o teste para manter monitorização é de grande validade, além de reduzir os custos com o medicamento para o cofres publicos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o mesmo exame. Grande eficiencia, Positivo: Monitorização adequada, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste pcr bcr abl, Positivo: Melhor avaliação da resposta a terapia e mudança precoce do tratamento, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O PCR é um exame fundamental no tratamento da Leucemia Mielóide Crônica (LMC), Muitos hospitais estão deixando de realizar o exame por não haver repasse do Estado. Para que os pacientes não sejam prejudicados por esse empasse, sou a favor da criação da APAC de reembolso do PCR quantitativo. Para que pacientes possam ter uma qualidade de vida melhor e possam ter o tratamento adequado, é necessário que o teste molecular seja garantido a ele. Este teste PCR quantitativo mede no sangue ou medula óssea a quantidade exata do gene BCR-ABL causador da LMC. Reforço que esta é uma demanda de anos já da sociedade civil. Em 2016, a própria Associação Brasileira de Linfoma e leucemia (ABRALE) junto a Sociedade Médica de Hematologia (ABHH) lançou um manifesto para a sociedade civil se posicionar a favor da disponibilização do PCR quantitativo para pacientes de LMC no SUS. Foram coletadas mais de 10000 assinaturas. Parabéns pelo relatório robusto e bem construído da CONITEC. Este teste beneficiará inúmeros pacientes no Brasil.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Exame imprescindível no controle das leucemias</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinib, nilotinib, desatinos, ponatinib - tratamentos que exigem o exame para monitoramento da doença., Positivo: Controle adequado da LMC e LLA ph, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinib, nilotinib, desatinos, ponatinib - tratamentos que exigem o exame para monitoramento da doença., Positivo: Monitoramento e correto tratamento de pacientes com LMC e LLA ph, Negativo: Ausência do exame de monitoramento pelo SUS</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É uma doença inicialmente silenciosa e sintomas em momentos se confunde com o cotidiano, cansaço, dor nas pernas, só quando aparecem manchas pelo corpo o paciente procura um profissional da saúde, por isso a recomendação é de suma importância. Se diagnosticado com antecedência, eu acredito na remissão precoce.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Hidrêia - sem efeitos colaterais Imatinibe - Muito enjojo, mal estar após tomar remédio, após 1 hora da ingestão já estava normal, porém estava sempre inchado no rosto, dor nas pernas, cansado, sonolência. Nilotinibe - Pele ressecada, coceiras na nuca e pequenas erupções, em uso atualmente. Procedimentos - Punção, dor desconfortável mas necessário., Positivo: Nilotinibe no meu caso, foi mais eficaz em relação a sintomas e doença., Negativo: De negativo é a dependência ao longo da vida de um medicamento que talvez o governo futuramente não mais venha a proporcionar acesso por motivo político ou financeiro. Deveria haver um medicamento que resolvesse esse tema Leucemias na sua íntegra sem manter o paciente mensalmente dependendo de medicamentos mensais.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidrêia - sem efeitos colaterais Imatinibe - Muito enjojo, mal estar após tomar remédio, após 1 hora da ingestão já estava normal. Nilotinibe - Pele ressecada, coceiras na nuca e pequenas erupções, em uso atualmente. Procedimentos - Punção, dor desconfortável mas necessário., Positivo: Nilotinibe no meu caso, foi mais eficaz em relação a sintomas e doença. Minha vida é absolutamente normal, rotina diária tranquila., Negativo: Alguns medicamentos me deixavam enjoado, mal estar, inchaço em torno dos olhos, mãos, me sentia pesado ou fraco, dor nas pernas, sonolência.</p>
08/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR qualitativo para diagnóstico e PCR quantitativo para o monitoramento., Positivo: Exames fundamentais para diagnóstico e monitoramento da LMC, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinibe, Positivo: Controle genético da doença., Negativo: Fogacho e diarreia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Como gestor de um serviço que atende pacientes com LMC em uso de ITQ reporto nossa extrema dificuldade em prover assistência adequada sem o ressarcimento destes testes, que são essencias para o manejo destes pacientes. O SUS já libera um tratamento de alto custo cujo uso adequado exige este monitoramento. Portanto, entendo ser essencial este passo para melhoria da assistência a estes pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com ambos (PCRq e FISH), Positivo: O PCRq é uma ferramenta essencial para saber se os pacientes estão ou não respondendo ao tratamento, que fica virtualmente cego sem este parâmetro. , Negativo: Não há, desde que feitos de forma criteriosa.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os medicamentos disponíveis no SUS. , Positivo: Geram excelentes respostas, com impacto imenso na sobrevida. , Negativo: Apenas os esperados em bula, com ampla vantagem nos benefícios.</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, é um direito do cidadão o atendimento à saúde</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: pcr, Positivo: monitoramento da lmc, Negativo: Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RT-PCR PARA BCR -ABL , Positivo: Diagnóstico, monitoramento de resposta pós tratamento. Avaliação de recidiva , Negativo: Quando indicado ã há efeito negativo, só é limitado à identificação de outras anormalidades moleculares, devendo ter como exame conjuntamente a realização de cariotipo, pois este identifica outras alterações genéticas, quando presentes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cariotipo e Fish, Positivo: O Cariotipo é essencial para diagnsotico e identificação e outras anormalidades citogenética, que ã somente avaliação do cromossoma Filadélfia , Negativo: Desconheço</p>
25/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A incorporação destes testes diagnósticos para diagnóstico e acompanhamento das leucemia Ph positivas são de extrema importância, haja vista a necessidade de comprovação da translocação t(9;22) ou do gene BCR-ABL para o início do tratamento com inibidor de tirosino-quinase. Pacientes chegam a ficar meses sem ter acesso a esta medicação, mesmo diante da forte suspeita clínica com estudo de medula óssea comprovando doença mieloproliferativa crônica.Quanto ao monitoramento, é possível troca de medicação ou início do preparo para um transplante de medula óssea alogênico muito tempo antes de que o paciente apresente algum sintoma, acarretando em melhor qualidade de vida e sobrevida global.Faço a ressalva também da importância do exame de pesquisa de mutação, pois possibilita a eleição de uma droga com ação específica para aquele paciente que apresenta mutação resistente ao de uso tradicional.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Testes diagnósticos ISH e RT-PCR., Positivo: Diagnóstico rápido e melhor monitoramento da doença., Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, EXAMES FUNDAMENTAIS PARA A MONITORIZAÇÃO DE RESPOSTA, DECISÃO TERAPEUTICA E VERIFICAÇÃO DE ADESÃO AO TRATAMENTO</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR QUANTITATIVO PARA BCR-ABL, Positivo: IMPRESCINDÍVEL NA AVALIAÇÃO DA RESPOSTA AO TRATAMENTO E DECISÃO DE TROCA DE MEDICAÇÃO OU TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA, Negativo: NECESSARIA PADRONIZAÇÃO DO METODO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR QUALITATIVO, Positivo: UTIL APENAS PARA DIAGNOSTICO, Negativo: NÃO SERVE COMO MONITORAMENTO DE RESPOSTA</p>
25/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Testes completamente necessários para devido diagnóstico, escolha de tratamento, monitoramento de resultados do tratamento, e direcionamento de novas terapias . Implicação direta no curso do diagnóstico, tratamento e evolução da doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinibe, Dasatinibe, Nilotinibe, além de realização de PCR qualitativo ao diagnóstico e quantitativo nos monitoramentos, Positivo: Vide campo 7, Negativo: Vide campo 7</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim.Em casos onde estão indisponíveis o PCR, tentamos a realização de citogenética, exame mais demorado, com necessidade de realização de aspirado de medula óssea, com possibilidade grande de não haver número de mitoses para análise devida. Todos os grandes estudos acerca da LMC se baseiam na resposta molecular ´para direcionamento terapêutico, Positivo: Com uso do PCR quantitativo, tem-se certeza de que o inibidor de TK em uso está fazendo o efeito desejado, desta forma diminuindo muito a possibilidade de evolução para crise blástica e óbito, Negativo: Na ausência do PCR, ficamos sem rumo quanto à eficácia do tratamento escolhido. E na ausência do PCR qualitativo, nem temos como iniciar inibidor de TK</p>
25/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A disponibilização do exame RT-qPCR para o monitoramento dos pacientes com LMC é fundamental e urgente. Sem esse exame não é possível acompanhar corretamente o paciente que pode vir a progredir na doença e ir a óbito. Esse exame faz parte do tratamento integral ao paciente com LMC.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Para os pacientes tratados com Leucemia no SUS é fundamental a realização dos testes ao diagnóstico para receberem o tratamento adequado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rt-PCR, Positivo: São positivos ao diagnóstico, na confirmação da doença, e no monitoramento da resposta ao tratamento., Negativo: O efeito negativo é caso não seja realizado o teste ao longo do tratamento não é possível observar a resposta molecular da doença residual mínima.</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O diagnostico ágil é fundamental para que o paciente receba o tratamento adequado. Não adianta ter o medicamento, se os exames não estão disponíveis no sistema.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Com a prevenção reduz os custos ao Sus no tratamento e aumenta a chance de vida do paciente. Minha filha foi detectada com Lmc com 9 anos pelo exame de sangue de rotina.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glivec, Positivo: Minha filha permanece saudável e viva por causa deste remédio. , Negativo: Dores nas juntas nos 10 primeiros dias. Depois passou e não dói mais nada</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glivec, Positivo: Minha filha está viva e saudável , Negativo: Dores nas juntas nos 10 primeiros dias. Depois melhorou e não dói mais nada.</p>
26/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paciente, portador de Leucemia Mieloide Crônica e ativista. OS TESTES DIAGNÓSTICOS/EXAMES SÃO FUNDAMENTAIS!!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: RT-PCR, Positivo: Com o RT-PCR conseguimos acompanhar/monitorar a Leucemia Mieloide Cronica de forma residual. Avaliamos se o quimioterápico oral, inibidor de tirosino quinase está fazendo efeito ou se poderemos ter a leucemia em fase mais avançada. E´um procedimento essencial., Negativo: Não existe efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, exames extremamente necessários para auxiliar no diagnóstico e avaliação de resposta ao tratamento medicamentoso já disponibilizado pelo SUS, racionalizando o seu uso. Como exame sensível também dá informações precoces sobre mudança de rumo da doença, ganhando tempo na mudança de tratamento. Não faz sentido ter disponíveis medicamentos caros sem os exames necessários para auxiliar no seu uso mais adequado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trabalho diretamente no atendimento a pacientes com leucemia mieloide crônica, onde é mais necessário esse exame, Positivo: Agiliza o diagnóstico. Agiliza a mudança de tratamento, caso seja necessário. Acaba tornando o tratamento mais econômico, porque dá a informação precocemente, economizando meses de uso de medicamentos caros que já não estariam mais dando resultado e com outros exames só vamos ver isso mais tarde., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Em recente levantamento com 357 pacientes de LMC de todo o país, realizado pela ABRALE – Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia trabalha, foi identificado que 36% dos pacientes que fazem o tratamento no SUS tiveram dificuldade para realizar o PCR. Destes, 50% foi pela indisponibilidade do exame em seu centro de tratamento, seguido de 40% que relata que o centro de tratamento tem uma cota muito pequena de exames que podem ser realizados. Constatou-se que 18% dos pacientes realizam o exame apenas 1 vez ao ano e 6% realizam 1 vez a cada 2 anos ou mais. Neste tempo, para o paciente que não está com controlado e/ou com resposta molecular maior, pode haver um agravamento considerável da doença, com o risco de passar para uma fase aguda se não houver intervenção terapêutica a tempo. Em decorrência deste achado e das dificuldades para a realização do exame relatadas pelos pacientes, fizemos uma investigação in loco nos 10 principais centros de tratamento do SUS com o maior volume de procedimentos terapêuticos para Leucemia Mieloide Crônica – LMC, com o objetivo de entender como cada um deles faz a solicitação e financia este exame. Para mapear esses centros foram utilizados dados do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e a obtenção de dados sobre a realização do PCR foi feita por meio de entrevista com os médicos especialistas dos referidos centros. Os resultados mostraram que 40% utiliza Recursos Próprios, que incluem verbas de pesquisas realizadas pelos pesquisadores da Instituição, recursos provenientes da realização de exames para rede privada de saúde e ainda outras parcerias da Instituição. Outros 30% dependem exclusivamente de voucher cedido pela Indústria Farmacêutica. Os demais 30% utilizam Recursos Próprios e voucher da Indústria Farmacêutica. Atualmente, o PCR está preconizado para o monitoramento do tratamento da LMC no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Oncologia do Ministério da Saúde, porém, não existe um código padronizado na tabela SUS para que o Centro de Tratamento receba o ressarcimento pelo procedimento realizado. Por esses motivos, além de fundamental, é urgente dar solução ao financiamento do teste molecular (BCR-ABL) para garantir o adequado monitoramento dos pacientes com LMC no SUS. Além disso, a economia que pode ser gerada com pacientes que parariam de tomar a medicação quando monitorados adequadamente, poderia garantir o financiamento do exame.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É muito importante para o portador da doença, que esse exame seja monitora no tempo certo para que seja tratafo no tempo certo, assim tera ganho tempo no tratamento.Eu sei o quanto e doloroso a espera pelo tratamento , desde o achado do diagnostico ate o tratamento.Muitas pessoas morrem por nao terem se tratado como deve ser.O tempo é um aliado e esse exame tem que ser diponibilizado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É um direito à manutenção da qualidade de vida do paciente e ao monitoramento da LMC.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Glivec 400 , Positivo: Manutenção da qualidade de vida com muita saúde. , Negativo: A falta do exame BCR pelo Instituto Hospital de Base de Brasília coloca em risco a qualidade de vida do paciente e causa danos psicológicos e emocionais pois ficamos sem informações sobre o resultado do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Meditação, Yoga e homeopatia. Terapias Integrativas. , Positivo: Equilíbrio emocional para lidar com o tratamento. , Negativo: Nenhum efeito negativo, somente alegria, superação, confiança e esperança na cura.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tem que fazer pcr pra LLa</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Como um médico vai tratar uma doença sem um exame para avaliar como o remédio está atuando no organismo do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Glivec 400, todos os exames., Positivo: Glivec tem atuado positivamente na remissão da doença. Todos os exames que realizei, e realizo mensalmente, são fundamentais para diagnóstico e melhoria da qualidade de vida., Negativo: Ânasia, enjoos... agora mais controlado, devido ao controle da alimentação e fremedioz específicos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glivec, pydomag, vonau, Positivo: Remissão da doença, após 2 anos de tratamento já estou em Rm3, Negativo: Ânasia, enjoos e perda de vitaminas , constatamos pelos exames.</p>
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Já corroborado por guidelines internacionais os alvos terapêuticos a serem atingidos nas doenças Ph positivas. É de grande importância que tenhamos acesso a exame de alta sensibilidade para diagnóstico e acompanhamento de tais doenças para que possamos oferecer o quê há de melhor prática nestas patologias.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tanto PCR quanto FISH para pesquisa de BCL-ABL/Ph, no diagnóstico e acompanhamento de pacientes., Positivo: Exames muito acurados, com alta sensibilidade. Em conformidade com guidelines mundiais., Negativo: Nenhum. Apenas a falta de acesso no SUS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Estudo citogenético., Positivo: Diagnóstico da translocação 9;22, Negativo: Exame mais demorado na execução, com mais limitações técnicas e menos sensível.</p>
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pcr para Ila e Imc, Positivo: Diagnostico preciso e que muda a conduta clinica, Negativo: Nao vejo</p> <p>3ª - Não</p>
11/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acredito que exames são muito importantes para diagnósticos precoce de doenças como essa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Com esse exame muitas vidas serão salvas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, extremamente importante a realização do exame</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: o monitoramento é fundamental, Positivo: Poder saber se o paciente está tendo resposta, importante também para termos condições de suspender a medicação e monitorar a necessidade de reintrodução, Negativo: Com relação aos exames, são simples e o resultado é rápido, o problema é quando não obtemos o resultado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pacientes que tiveram que mudar para outra geração de medicação porque o exame mostrava perda de resposta, Positivo: poder monitorar de forma adequada a resposta dos pacientes, Negativo: O efeito negativo, na verdade, é na ausência do exame, porque neste caso não temos controle e não sabemos se o paciente obteve a resposta desejada</p>
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Houve um enorme avanço no tratamento da LMC e LLA ph com os inibidores da tirosinoquinase, mas para manutenção de uma boa resposta ao tratamento é fundamental o PCR para monitoramento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR qualitativo para o diagnóstico da LMC e LLA ph e PCR quantitativo para o acompanhamento (monitorização) do tratamento, Positivo: Exames fundamentais para o diagnóstico e monitoramento tanto da LMC quanto da LLA com cromossomo filadélfia positivo., Negativo: não tem nenhum efeito negativo na realização dos exames indicados.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: cariotipo de medula óssea, Positivo: Identifica 95 % dos pacientes ao diagnóstico., Negativo: Não identifica todos os pacientes, depende de coleta de medula óssea e não tem sensibilidade para avaliação da resposta profunda.</p>
11/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, São exames essenciais para o monitoramento adequado dessas Leucemias, com comprovação em literatura médica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RT-PCR, Positivo: Controle mais fidedigno, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR qualitativo, Positivo: Detectar presença ou ausência de doença, Negativo: Dificil monitoramento de resposta quantitativa</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tecnicamente, a necessidade de monitorar os paciente com RT-PCR para BCR-ABL dos portadores de Leucemia Mieloide Crônica e Leucemia Linfoblástica Aguda Filadélfia positivo é uma das principais ferramentas produtoras de controle da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com os dois ISH e RT-PCR, Positivo: Melhor controle de doença;Programação terapêutica quanto a manutenção de droga oral ou encaminhamento para transplantes de medula óssea;, Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com os dois ISH e RT-PCR, Positivo: Melhor controle de doença;Programação terapêutica quanto a manutenção de droga oral ou encaminhamento para transplantes de medula óssea;, Negativo: -</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, é um direito do cidadão o atendimento à saúde 2ª - Sim, como paciente, Qual: pcr, Positivo: monitoramento da lmc, Negativo: Não 3ª - Não
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/08/2019	Instituição de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, ATUALMENTE O SERVIÇO DE HEMATATOLOGIA NO TRATAMENTO DA LMC POSSUI MAIS DE 100 PACIENTES, E TODOS PACIENTES NÃO TEM ACESSO PELO SERVIÇO PÚBLICO, APESAR DE ESTAR DESCRITO NO PCDT DO TRATAMENTO DA LEUCEMIA A NECESSIDADE DO MONITORAMENTO 2 X AO ANO PARA PACIENTES JÁ DIAGNOSTICADOS OU 3X AO ANO PARA NOVOS PACIENTES. NÃO TEMOS COMO REALIZAR ESTE EXAME, QUE É PREDITOR NA ESCOLHA DO TRATAMENTO, BEM COMO INFORMA A QUANTIDADE DE CARGA TUMORAL DA DOENÇA, SABENDO ASSIM SE DEVE SER TROCADO A TERAPIA, A FIM DE SE EVITAR PROGRESSOES DA DOENÇA E /OU MORTE. ATUALMENTE O SERVIÇO CONSEGUE QUE PACIENTES REALIZEM O EXAME, QUANDO PAGAM POR CONTA PRÓPRIA NO SERVIÇO PRIVADO, OU POR DOAÇÃO E ALGUNS EXAMES POR FAVORES PRESTADOS PELO INCA, PORÉM NÃO TEMOS O LAUDO, SOMENTE O VALOR DO RESULTADO. SE TIVÉSSEMOS ACESSO AO EXAME DE PCR-ABL PARA OS PACIENTES COM LMC, EVITARÍAMOS INÚMERAS INTERCORRÊNCIAS COM A DOENÇA, BEM COMO NÚMERO DE INTERNAÇÕES. E O BEM ESTAR DO PACIENTE E O MELHOR TRATAMENTO DA LMC SERÁ GARANTIDO.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IMATINIBENILOTINIBEDASATINIBE, Positivo: TRATAMENTO PADRÃO OURO NA LMC, Negativo: EVENTOS ADVERSOS POR SEREM DROGAS QUIMIOTERÁPICAS, FALHA E OU RESISTÊNCIA A LINHA DE TRATAMENTO.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INTERFERONHIDRÓXIUREIA, Positivo: TRATAMENTO ANTERIOR OS TKIs, Negativo: NÃO SÃO POTENTES NO TRATAMENTO</p>
08/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O monitoramento da LMC e da LLA com os testes ISH e RT-PCR vai melhorar o tratamento possibilitando maiores chances de cura, conforme recomendação da CONITEC.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Como um médico vai tratar uma doença sem um exame para avaliar como o remédio está atuando no organismo do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho um tio que foi diagnosticado com a doença, e fazemos acompanhamento dele. Ele tem 50 anos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: meu tio ficou internado 30 dias e ainda esta em acompanhamento, faz uso de dosagem de acido folico e outros., Positivo: sim, melhorou o animo, disposição., Negativo: moleza e desanimo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: acido fólico. vitamina B9 melhorou a depressão, o sangue esta muito anemico., Positivo: com o uso do medicamento ele ficou mais animados, as dores diminuíram, ele teve os olhos arramarelados pela falta da vitamina., Negativo: muita sonolencia.</p>
09/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tudo que envolva a melhoria do sistema de saúde e colabore de alguma forma para a saúde do paciente é válido e importante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RT-PCR, para o diagnóstico e o monitoramento das leucemias Ph (LMC e LLA Ph), Positivo: Melhor controle da resposta só tratamento empregado garantindo o sucesso do mesmo. , Negativo: A não realização do exame aumentam as chances de progressão da doença e está é detectada em casa estágio avançado diminuindo as chances de controle.</p> <p>3ª - Não</p>
09/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Exencial para o sucesso do tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Desatinib , Positivo: Diminuição da doença , Negativo: Aftas só no início.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: bclabr, Positivo: Acompanhamento da doença , Negativo: Nem um</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sempre haverá a necessidade de criar novos medicamento para as Novas doenças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Imatinibe, Positivo: Ele tem mantido a leucemia sob controle., Negativo: Diarreia, náuseas ,dores musculares.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É muito importante para nós portadores de Leucemia , que seja feito pelo SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Hematinibe, Positivo: Estou vivendo por causa destes remédios pois tenho LMC e dependo totalmente deles . , Negativo: Diarreia , náusea e alergia no corpo .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dasatinibe , Positivo: Não tenho mais diarreia nem náuseas e o médico me prescreveu este porque o outro não estava mais fazendo o efeito desejado ., Negativo: Alergia no corpo</p>
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acredito que os testes diagnósticos são de grande valia para poder determinar o melhor tratamento, dosagem e acompanhamento/monitoramento dos pacientes leucêmicos, permitindo tratamentos mais individualizados e assertivos e menos tóxicos para os mesmos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: IMATINIBE NILOTINIBE, Positivo: MELHORA DA DOENÇA DE BASE , Negativo: PLAQUETOPENIA</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: IMATINIBENILOTINIBE, Positivo: CURAR MINHA DOENÇA , Negativo: DEPENDO DO EXAME PARA MONITORAR A DOENÇA</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR, Positivo: Com o exame os pacientes conseguem monitorar a situação de saúde deles., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O PCR através de convênio particular, Positivo: Para acompanhamento da doença , Negativo: Com estes dados os médicos conseguem observar a progressão ou diminuição da doença, complemento importante do diagnóstico</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exame de controle de uso de inibidor de tirosinaquinase em LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA, Positivo: Controle e decisão terapêutica , Negativo: Na ha</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicação somente de controle do número de leucócitos , agora temos os inibidores de Tirosinoquinase e necessitamos de controle molecular para controle e decisão terapeutica, Positivo: Controle leucometria, Negativo: Apenas controle de leucometria</p>
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todo paciente tem que ter os exames para acompanhar s evolução.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Imatinibe Generico, Positivo: Baixos efeitos iniciais., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glimatin , Positivo: Sobrevida., Negativo: Nenhum.</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A incorporação proporcionará o acompanhamento e evolução da doença e com isso a possibilidade de não tratar mais o paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É desumano o que os políticos fazem com a população, precisamos de mais recursos e mais promocionais na área de exames. Temos tantos profissionais capacitados, médicos, biomédicos, enfermeiros e outros mais, não podemos ficar a mercer da indústria farmacêutica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Técnicas de RT-PCR, Positivo: Essencial para o manejo clínico dos pacientes oque acarreta em um benefício superior ao custo da implementação da tecnologia, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exame morfologia celular, Positivo: Baixo custos, Negativo: Baixa especificidade e sensibilidade e não identifica a translocação necessária para o manejo clínico do paciente</p>
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Toda e qualquer ferramenta que auxilie de forma a estabelecer de uma forma mais contundente qualquer diagnóstico deve ser direito do usuário do SUS, pois sabemos que grande parte da população não tem acesso aos serviços adequados de saúde. O diagnóstico rápido e precoce aumenta as chances de remissão e cura do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pcr bcr abIDisk bcr abl , Positivo: Diagnóstico e Monitorização de resposta ao tratamento , Negativo: Sem efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citogenetica , Positivo: Avaliação diagnóstica e monitorização de resposta , Negativo: Sem efeitos negativos</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bcr-abl, Positivo: Diagnóstico e avaliação de resposta, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR quantitativo para monitoramento da LMC e qualitativo para o diagnostico de LMC e LLA PH1 +., Positivo: Monitoramento da LMC em pacientes em uso de glivec, nilotinibe e Dasatinibe em busca de Resposta Molecular Maior., Negativo: nao houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: glivec, nilotinibe, dasatinibe, Positivo: Busca de resposta molecular maior na LMC., Negativo: Nao houve</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento de Leucemia Mielóide Crônica e Leucemia Linfoblástica Aguda PH1 positivo. , Positivo: Importância para monitorização das doenças e definição terapêutica. , Negativo: Não há efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste em questão , Positivo: Essencial para diagnóstico e seguimento , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores de tirosino quinase , Positivo: Controle da doença , Negativo: Efeitos adversos</p>
12/08/2019	Grupos/associação/organi-zação de pacientes	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Brentuximabe , Positivo: Tratamento realizado em 2013 Pos 2ª recidiva e TMO Autólogo atualmente em remissão e sendo acompanhado por equipe médica., Negativo: Não ha</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É de extrema importância o diagnóstico precoce juntamente com o acompanhamento adequado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cirurgia, Radioterapia e Quimioterapia., Positivo: Curada., Negativo: Não tive efeitos negativos.</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Monitorização de pacientes tanto com LMC quanto LLA Ph e o diagnostico molecular sequencial é fundamental para determinar estratégias terapêuticas e aumentar a chance de controle da doença. , Positivo: Chance de controle da doença, sobrevida próxima de pacientes normais e possibilidade de evitar a necessidade de transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas e a morte., Negativo: Nenhum efeito negativo associado à monitorização sequencial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiência com todos os níveis de monitorização da LMC e LLA Ph+, Positivo: Segurança no controle da doença com PCR quantitativo, Negativo: Nao há nenhum aspecto negativo na monitorização sequencial molecular</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O PCR é um exame essencial para acompanhamento desse tipo de leucemia, os pacientes têm muita dificuldade para realizar devido ao alto valor.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinibe, nilotinibe para acompanhar como a doença está se manifestando no paciente e se esses medicamentos estão sendo eficazes ou não., Positivo: Eficácia da medicação e diminuição com mudança de medicamentos, assim diminuindo os custos para o SUS., Negativo: Dificuldade em realizar esse controle e assim a doença progredir, além de maior custo para o SUS, principalmente a sobrevida do paciente</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR, Positivo: Pacientes podem monitorar da melhor maneira a doença, Negativo: Sem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR, Positivo: Pacientes podem ter monitoramento de sua doença, Negativo: Não há</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, è necessario ter o acompanhamento pelo mapeamento de exames para cercar as doenças.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com o acido folico., Positivo: foi positivo no primeiro momento, melhorou a disposição, animou, melhorou a depressão., Negativo: muita sonolencia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: acido folico ajudou a melhorar as taxas que estavam muito baixo., Positivo: com a medicação fomos vendo a melhorara gradativa, olhos eram bem cansados, depois ficaram mais espertos, a depressão diminuiu., Negativo: dar um pouco sonolencia.</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Muito importante que seja incorporado ao SUS, sou paciente do Instituto Hospital de Base-DF, no IHB/DF não faz o exame BCR ABL P210 quantitativo, Sangue, e particular e muito caro, a cada dia mais difícil de se pagar devido ao alto custo. atualmente faço o exame particular no Hospital das Clinicas em SP por que e o único lugar mais barato e que e referencia. (mando amostra do sangue via correio).</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Hidroxiureia, Imatinibe 400 mg que atualmente faço uso continuo. , Positivo: Efeito positivo do Imatinibe que tem controlando os leucócitos., Negativo: São vários efeitos colaterais comuns dos tratamento que são negativo, segundo o meu medico dentro da normalidade da medicação. (que ao meu ver não e nada de normal).Quero deixa uma sugestão quando medicamento Imatinibe que na bula tem duas formas de se tomar o medicamento porem a melhor forma de tomar e o comprimido via oral. minha sugestão e que o fabricante EMS faça o comprimido mais compactado a sim sendo melhor para tomar.o imatinibe distribuído pelo a Farmanguinhos e mais compactado e menos muito melhor de se tomar.Porque EMS faz os comprimidos tão grande ? bem que eles poderia fazer comprimidos mais compactado e menores conforme a Farmanguinhos faz.</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR qualitativo para diagnóstico e PCR quantitativo para monitoramento. , Positivo: Exames de fundamental importância para diagnóstico e monitoramento da LMC/ LLA. assim como, para determinação de prognóstico para indicação de trasplante na LLA, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR qualitativo para diagnóstico e PCR quantitativo para monitoramento. , Positivo: Exames de fundamental importância para diagnóstico e monitoramento da LMC/ LLA. assim como, para determinação de prognóstico para indicação de trasplante na LLA, Negativo: nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O diagnóstico e acompanhamento da LMC com testes de PCR São imprescindíveis para esta doença. Sem estes exames subtratamos o paciente. Esta doença já teve muito avanço científico em relação ao seu tratamento, é realmente um absurdo o SUS não cobrir estes exames frente a tanta comprovação científica referente ao seu benefício.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a solicitação dos exames necessários para diagnóstico e acompanhamento, com os inibidores de tirosina quinase e transplante de medula óssea., Positivo: Essas medicações (Nilotinibe e Dasatinibe) elevam muito a sobrevida dos pacientes quando há refratariedade ao Imatinibe. Não conseguimos tratar adequadamente esses pacientes se não houverem os exames para seguimento., Negativo: Claro que há efeitos colaterais, porém quando usados adequadamente aumentam muito a sobrevida e qualidade de vida dos pacientes</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Pcr, Positivo: Muitissimo importante para controle da doenca. Indispensável, Negativo: Muito difícil conseguir através do sus e muito caro para fazer particular</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: PCRHidreaGlivec, Positivo: Todos para controle de lmc, Negativo: Muitos efeitos colaterais</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ImatinibeNilotinibeDasatinibe, Positivo: Estou bem agora com dasatinibe, Negativo: Passei mal.com imatinibe</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Não há como fazer a monitorização do tratamento dos pacientes com tais patologias, sobretudo LMC, sem essas ferramentas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos s inibidores de tirosino quinasetodos os exames, Positivo: identificaãpo precoce de falha de tratamentoindicação precisa de transplante, Negativo: não ha</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu , como muitos pacientes não estamos conseguindo a liberação do exame PCR para acompanhamento da evolução do tratamento da LMC</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o exame PCR, Positivo: Fazer o exame PCR é muito importante para controle da LMC , Negativo: Sem o exame PCR que não está sendo liberado pelos hospitais, os pacientes ficam sem saber se o medicamento está controlando a LMC</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exame de PCR para BCR-ABL, Positivo: Muito útil e necessário para monitorização de DRM em LLA Ph +, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ImunofenotipagemMielograma Inibidor de tirosinoquinaseAsparaginase, Positivo: Avaliação de DRMMelhores taxas de remissão molecular, Negativo: Sensibilidade do método</p>
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: imatinib, dasatinib, nilotinib, Positivo: Imatinib, nilo e dasa - excelente resposta precoce, sobrevida longa, Negativo: Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bussulfan e hidroxiureia, Positivo: normaliza hemograma e reduz esplenomegalia por 2- 3 anos , Negativo: progressão posterior</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: imatinibe, dasatinibe e nilotinibe, Positivo: estabilização da doença e evitar progressão, Negativo: citopeniascardiotoxicidade</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: hidroxiureia, interferon, Positivo: apenas citorredução, Negativo: nao controle da doença nao melhora da sobrevida</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Com a possibilidade deMonitoramento, pacientes no resposta profunda poderão suspender a medicação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pcr para monitoramento , Positivo: Controle adequado doença , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paciente oncológica e sei o quanto isso representa para os que dela necessitam. É uma questão de humanidade, olhar por aqueles que depositam suas esperanças no atendimento, principalmente, via Saúde Pública. É extremamente sofrido, digo, desesperador ver suas chances diminuídas pelo que não se encontra ao alcance.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Imprescindível para o diagnostico e monitoramento do tratamento , podendo até suspender a medicação depois de remissão molecular completa</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinibe, dasatinibe , nilotinibe FISH , PCR quantitativo , Positivo: Diagnostico preciso , monitoramento da resposta , orientação para troca do medicamento , Negativo: Melhor utilização do recurso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinibe, nilotinibe , dasatinibeFISH PCR , Positivo: Diagnostico preciso , monitoramento da resposta Avaliação da necessidade de troca do medicamento ou suspensão , Negativo: Nenhum</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diagnóstico e monitoramento de resposta ao tratamento com o apoio dos exames em questão ., Positivo: Exame imprescindível para diagnóstico e monitoramento de resposta ao tratamento., Negativo: Sem efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cariótipo de medula ossea, Positivo: Avaliação complementar para diagnóstico e monitoramento de resposta , Negativo: Sem efeitos negativos</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Imprescindível para o diagnóstico e seguimento do tratamento dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pcr tempo realquantitativo e qualitativo para BCR Abl , Positivo: Nao temos como tratar sem saber o resultado. Este é o exame mais sensível e específico., Negativo: Nao existem</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fish e Pcr, Positivo: Melhor diagnóstico e acompanhamento, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo plenamente.pois nós que possuímos a Leucemia precisamos deste exame de PCR a ser realizado a cada três meses.para nós ajudar.pois é este exame que indica como a doença está. Se os inibidores estão fazendo efeito .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Imatinibe 400mg, Positivo: Imatinibe :ajuda a reduzir números das plaquetas,eu estava em cima de uma cama com dores pelos ossos sem a medição, comecei a tomar em cinco dia já senti uma melhora ótima. , Negativo: Enjoos, dores abdominais,problemas gástricos e outros...</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo plenamente.pois nós que possuímos a Leucemia precisamos deste exame de PCR a ser realizado a cada três meses.para nós ajudar.pois é este exame que indica como a doença está. Se os inibidores estão fazendo efeito .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Imatinibe 400mg, Positivo: Imatinibe :ajuda a reduzir números das plaquetas,eu estava em cima de uma cama com dores pelos ossos sem a medição, comecei a tomar em cinco dia já senti uma melhora ótima. , Negativo: Enjoos, dores abdominais,problemas gástricos e outros...</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A qualidade de um tratamento se dá ao conjunto paciente e metodologia científica de aprimoramento em exames e respostas satisfatório imediata, a espera lava o caos para muitas pessoas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PCR, mielograma e uso do imatinibe , Positivo: Os exames permitiram o controle sobre a dosagem da medicação. , Negativo: A espera para realizar alguns exames como PCR, imatinibe traz alguns efeitos negativos mas nada q eu não tenha me acostumado a conviver.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidreia mas o favorável tem sido imatinibe , Positivo: Resposta molecular satisfatório , Negativo: Cãibras, inchaços, aumento de peso, sonolência, enjoos e diarreia.</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Um exame importante para pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Imatinib, Positivo: Resposta. Hematologica maior, Negativo: Fadiga desconforto baço</p>
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nilotinibe, Positivo: Melhora nos resultados dos exames, Negativo: Efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Imagino e, dasatinibe, Positivo: Melhora nos resultados dos exames, Negativo: Não obtive melhora depois de um tempo de uso</p>
06/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Ao meu ponto de vista concordo plenamente com recomendação preliminar e assim fazendo com que a pessoa comece a fazer o tratamento mais rápido possível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Imprescindível para o diagnóstico e seguimento do tratamento dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pcr tempo real quantitativo e qualitativo para BCR Abl , Positivo: Não temos como tratar sem saber o resultado. Este é o exame mais sensível e específico., Negativo: Não existem</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou funcionária da genética médica e acho de suma importância a inclusão de testes moleculares no auxílio ao diagnóstico e tratamento de leucemias</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cariótipo de medula óssea, Positivo: Baixo custo, Negativo: Técnica artesanal, demanda tempo, análise morosa</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pcr, Positivo: Não utilizei, mas esse procedimento é importante para os pacientes que fazem tratamento e auxiliam no controle , Negativo: Não ter de forma acessível no sus</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Na minha região não é oferecido pelo SUS esse exame, de três em três meses devo realiza-lo custeando o exame que é bastante caro, em tono de R\$ 1.00000</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamento Imatinib., Positivo: Controla para que a LMC não avance. , Negativo: Efeitos colaterais, inchaço, caimbras, enjoos, dores nas pernas.</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, UM EXAME PRIMORDIAL NO DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DA LMC DE ALTO CUSTO PARA A MAIORIA DOS PACIENTES E QUE NÃO É OFERECIDO PELO SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: RT-PCR PARA DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DE LMC., Positivo: SABER SE O MEDICAMENTO QUE FAÇO USO ESTÁ SERVINDO PARA O TRATAMENTO E CONTROLANDO A LMC., Negativo: NÃO EXISTEM EFEITOS NEGATIVOS.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: IMUNOFENOTIPAGEM. IMATINIBE. HEMOGRAMA., Positivo: NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO DA LMC., Negativo: NÃO EXISTEM EFEITOS NEGATIVOS.</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Imatinibe dasatinibe , Positivo: Melhoras , Negativo: Sem efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dasatinibe , Positivo: Melhoras, Negativo: Sem efeito negativo</p>
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Como paciente de outro tipo de neoplasia, apoio totalmente o projeto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Há anos que os guidelines no mundo colocam esses exames como diagnóstico e monitoramento de resposta para doenças tão graves, que se não monitoradas adequadamente podem progredir e evoluir com o óbito. Esses exames são essenciais!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com PCR para BCR-ABL tanto qualitativo como quantitativo , tanto p190 como p210., Positivo: com esses PCR podem ser dados os diagnósticos de Leucemia Mielóide Crônica e Leucemia Linfóide Aguda com a possibilidade de uso de medicações específicas que mudam o curso da doença. E o monitoramento serve para avaliar a resposta ao tratamento e se houver perda de resposta mudar a droga utilizada., Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Exame importante para diagnóstico e monitoramento do tratamento da doença, isso fará redução de recursos caso o tratamento escolhido antes do exame não seja o ideal. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mesilato de imatinibe e pcr abl, Positivo: Monitoramento do tratamento e alteração de posologia do medicamento., Negativo: Não houve efeito negativo.
06/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Imatinibe, Positivo: Com esse remédio a doença está controlada , Negativo: Não tem 3ª - Não
06/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Imatinib, Dasatinib, Nilotinib e Blinatumumabe , Positivo: Todos me ajudaram de alguma forma durante tratamento da LMC. , Negativo: Nenhum efeito que mereça ser destacado 3ª - Não
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PCR, Positivo: O controle da leucemia mielóide crônica, Negativo: Não há 3ª - Não
06/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Imatinib, Positivo: Controle , Negativo: Nao tenho 3ª - Sim, como paciente, Qual: Imatinibi, Positivo: Controle, Negativo: Nao tem
06/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esse exame é de grande importância para os portados das doenças. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Hydrea e agora estou tomando o imatinibe., Positivo: O hydrea abaixou os meus leucócitos que estavam muito alto, e o imatinibe esta servindo para inibir o cromossomo phidelpa., Negativo: Até agora só tive dor de cabeça, mas só no início do tratamento. 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Mais que um direito, uma necessidade básica para esses pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pcr, Positivo: Acompanhamento ou comotamento da lmc ao medicamento sob o qual o paciente está submetido , Negativo: A falta do mesmo retira a possibilidade de saber sobre a resposta ao tratamento</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rt-Pcr, Positivo: Monitorar controle da doença, Negativo: Custo elevado</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acho justo e correto!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PCR - BCR/ABL Leucemia mielóide crônica, Positivo: Avaliação da resposta à terapia com Imatinibe, Negativo: O exame não causa efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Servem tanto para diagnosticar como para monitorar os resultados de tratamentos das leucemias.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Imunofenotipagem - exame, Positivo: Serve para quantificar a porcentagem de células cancerígenas., Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Imatinibe, Positivo: Inibe o crescimento de células defeituosas., Negativo: No caso do meu filho não houve.</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Realizei o exame., Positivo: Importantíssimo realizar o diagnóstico correto, assim como o monitoramento preciso da doença para que seja definido o melhor tratamento para cada paciente., Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É dever do Estado zelar pela saúde dos cidadãos!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PCR LLA, Positivo: Melhor mapeamento e direcionamento do diagnóstico para a efetivação do protocolo médico., Negativo: Nada a relatar</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou totalmente a favor ,pois pacientes iguais a mim que precisam deste exame encontramos dificuldade é este exame é de grafite Gália para acompanhar o tratamento da LMC.Sou portadora terá doença e precisamos deste recurso o Mas rápido. Pois são vidas !somos muitos com Leucemia é temos que ter este amparo para que possamos nos cuidar..</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a medicação Imatinibe 400mg, Positivo: ImatinibeAjuda a normalizar as plaquetas no meu caso ajudou muito, pois eu estava em cima de uma cama ,com muitas dores nós ossos e hj tomando a medicação já me sinto melhor.mas disposta., Negativo: Imatinibe...no meu caso como possui LMC,sonhos dores nas costas dores abdominais,anciã de vômito. Nem sempre.inchaço.</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Estes exames vão salvar vidas!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sim, pq vem como objetivo facilitar os diagnosticos e ter um retorno mais especifico e transparente para o paciente. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Glivec 400mg, Positivo: Bons resultados nos exames, Negativo: Caimbras, dores nos musculos, diarreia, enjoou e dores de cabeca. 3ª - Não
07/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Para o tratamento da LMC é fundamental o seguimento rigoroso com o PCR dos pacientes em uso dos inibidores de TNK, pois isso muda totalmente o prognostico do paciente., Positivo: melhora da chance sde sobrevida livre de doença e atualmente respostas positivas e rapidas muitas vezes podem permitir a suspensão do medicamento, Negativo: não há - exame laboratorial 3ª - Não
07/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinibe NilotinibeDasatinibe, Positivo: Pacientes com leucemia mieloide crônica para que os mesmos tivessem resposta hematológica citogenética e molecular e que tivesse possibilidade de ^cura^, Negativo: Efeitos colaterais e a ma monitorização devido à falta de acesso dos pacientes 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinibe Nilotinibe Dasatinibe , Positivo: ., Negativo: .
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Se tem como saber se a abordagem está realmente combatendo a doença, muito melhor que se saiba.Isto seria benéfico ao paciente, cuja fragilidade emocional é enorme, assim como sua imunusade, e financeiramente acredito que acabaria saindo em conta para o SUS, pois melhor trocar a abordagem do que custear dois tratamentos. 2ª - Não 3ª - Não
07/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: RT-PCR, Positivo: Esse exame é fundamental para o acompanhamento da evolução e da eficiência do tratamento da LMC. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu tomo Imatinibe 400 diariamente., Positivo: O tratamento funciona., Negativo: Fortes efeitos colaterais - fadiga, enjoo, dores no corpo.</p>
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Abc</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Exame imprescindível para o controle da LMC.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PCR bcr abl, Positivo: Controle efetivo da LMC., Negativo: Demora na autorização do plano de saúde e necessidade do envio do material coletado para outro estado.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Imagino e dasatinib., Positivo: Tratamento da leucemia com bons resultados., Negativo: Muitos efeitos colaterais indesejáveis. Mutaç�o gen�tica necessitando na troca de medicamento.</p>
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - N�o</p> <p>3ª - N�o</p>
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - N�o</p> <p>3ª - N�o</p>
08/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - N�o</p> <p>3ª - N�o</p>
08/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Atra e quimios intravenosas (citarabina), Positivo: A elimina�o das c�dulas cancer�genas., Negativo: Cansaço, imunidade baixa, febres e acabei desenvolvendo um quadro grave de infec�o nos pulm�es.</p> <p>3ª - N�o</p>
08/08/2019	Profissional de sa�de	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, FAZ COM QUE O TRATAMENTO INICIE O MAIS CEDO POSS�VEL .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de sa�de, Qual: QUIMIOTER�PICO , Positivo: PACIENTE DIAGNOSTICADO, E QUE TEVE IN�CIO DO TRATAMENTO TEVE EVETIVIDADE E RESPOSTA POSITIVA., Negativo: DEBILIDADE, PERDA DE APETITE, DEPRESS�O</p> <p>3ª - Sim, como profissional de sa�de, Qual: quimioter�pico , Positivo: a descoberta, E O TRATAMENTO precoce favorece o paciente e a sua sobrevivida aumenta muito mais, Negativo: as rea�o es medicamentosas deixam os pacientes muito debilitado e com depress�o</p>
08/08/2019	Profissional de sa�de	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - N�o</p> <p>3ª - N�o</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho leucemia e acho muito importante este exame aparece nos exames.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia e manter com midostaurina , Positivo: N�useas , Negativo: N�useas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Midostaurina , Positivo: Midostaurina , Negativo: N�useas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os exames supracitados são vitais para o monitoramento das leucemias Ph positivas, pois somente com eles é possível saber se o paciente está respondendo bem ao tratamento proposto, seja ele com inibidores de tirosino-quinase, quimioterápicos ou até mesmo após o transplante de medula óssea. Esses tratamentos são dispendiosos, não realizar os exames para um monitoramento adequado poderia equivaler a perda de tempo e dinheiro com algo que não estaria mais fazendo efeito - sem contar, obviamente, nos riscos (progressão da doença, crise blástica, infiltração de SNC, recidiva, morte) aos quais estaria sendo exposto o paciente, sem um controle efetivo de sua neoplasia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim, já tive experiência como paciente, dos 12 aos 15 anos, fazendo uso de Glivec e monitoramento regular da doença através do PCR para BCR-ABL. Realizei um transplante de medula óssea aos 15 anos, realizei os controles adequadamente para garantir que não haveria recidiva da doença. Hoje sou médica, também tive a experiência como estagiária de hematologia em acompanhar os pacientes com LMC., Positivo: O exame é capaz de auxiliar no diagnóstico, detectar a progressão da doença e a resistência ao tratamento implementado ou detectar uma recidiva após transplante de medula óssea., Negativo: Não existe efeito negativo no monitoramento regular através de exames moleculares em pacientes que necessitam, essa prática é essencial para o sucesso do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tive experiência como paciente e profissional de saúde com diversos medicamentos e procedimentos., Positivo: Esses procedimentos e medicamentos possibilitaram que eu e diversas outras pessoas pudessem estar vivas e saudáveis hoje., Negativo: Efeitos colaterais são tratáveis. O investimento nesses procedimentos e tratamentos valem a pena ao se pesar o sucesso dos resultados em sobrevida e qualidade de vida dos pacientes.</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FISH e RT-PCR, Positivo: Atualmente, o acompanhamento e diagnóstico desses pacientes é feito através do exame chamado cariotipo. Esse teste é subjetivo, pois é analisador dependente e é extremamente artesanal, depende de cultura de células, que no caso de pacientes leucemicos muitas vezes não há crescimento celular. Além disso, existe a possibilidade de resultados falsos negativos, pois não é possível, em muitos casos, a visualização do cromossomo philadelfia pelo analisador devido ao material de cultura. Assim sendo, testes mais modernos, como fish e real time, que não são analisadores dependentes e possuem técnicas menos artesanais, possibilitariam garantir um resultado mais rápido e fidedigno para pacientes que precisam, em muitos casos, iniciar o tratamento o mais rápido possível., Negativo: O preço! Esses testes comparados ao cariotipo são bem mais caros.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cariotipo, Positivo: Preço!! É bem mais barato, Negativo: 1. Técnica extremamente artesanal 2. Depende de cultura de células, que muitas vezes, para pacientes leucemicos não é possível 3. Analisador dependente - análise subjetiva que não garante 100% a presença do cromossomo philadelfia</p>
07/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tudo que possibilite a melhora do paciente, é necessário e louvável. 2ª - Não 3ª - Não
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tudo que possibilite a melhora do paciente, é necessário e louvável. 2ª - Não 3ª - Não
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Pacientes necessitam dessa monitorização para o correto controle do tratamento, preconizado por todos os guidelines que orientam condutas nas doenças citadas. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinib, Nilotinib, Dasatinib., Positivo: Controle sintomático e laboratorial., Negativo: Toxicidade.Impossível avaliação de status de tratamento em pacientes que não tem acesso à quantificação do BCR-ABL. 3ª - Não
07/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Gostaria muito que o sus oferecesse esses exames para as Pessoa que tanto necessitão 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tasigna, Positivo: Alto índice de TRO-Taxa de Resposta Objetiva , Negativo: Custo elevado e acesso não universal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinibe, Positivo: Custo mais acessível e disponibilidade no público e privado , Negativo: Menor TRO</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Realização dos testes PCR , Positivo: Para efeito de diagnóstico , Negativo: Não obtive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidroxiureia , Positivo: Confirmação de diagnóstico , Negativo: Não houve efeitos negativos</p>
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo totalmente pois, desta forma, se consegue monitorar com segurança a remissão da doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mesilato de Imatinibe, Positivo: Remissão rápida da doença , Negativo: Efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nenhum outro medicamento. Procedimentos: PCR-ABL - Cariótipo , Positivo: Diagnóstico , Negativo: Dor e desconforto</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Para o diagnóstico e a monitorização terapêutica se faz necessária a detecção e quantificação do bcr abl para avaliação da efetividade terapêutica e decisão clínica d continuidade ou substituição do tratamento farmacológico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mesilato de imatinibe, Positivo: melhora aparente do paciente com o uso inicial, Negativo: e como não houve a monitorização utiizando a quantificação do bcr abl ocorreu a perda da efetividade e a piora do quadro</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: hidroxiureia, Positivo: melhora do quadro hematológico, redução da leucometria, Negativo: nenhuma remissão medular, com progressão da doença</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A incorporação de exame é de extrema importância uma vez que é através dele que o tratamento da doença é realizado e a resposta a esse tramento é percebida fielmente. O custo dele é muito alto para o paciente, a orientação médica para o paciente é de que devemos realiza-lo a cada 3 meses, para melhor monitoramento. Como o valor é alto, é realizado apenas 2 vezes ao ano.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Realizei o PCR duas vezes e faço uso do Glivec diariamente., Positivo: Glivec, boa resposta em 6 meses de tratamento, apesar de ter ficado 2 meses sem o mesmo por irresponsabilidade administrativa federal., Negativo: Até agora no ha nada negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glivec, 6 meses de tratamento, 4 meses de uso. Fiquei 2 meses sem porque o governo não o disponibilizou , Positivo: Boa resposta ao tratamento., Negativo: Nenhum</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Imatinibe, Positivo: Controle da doença, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: imatinibe, Positivo: controla minha leucemia, Negativo: caimbras</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: medicamento, Positivo: saude, Negativo: mal estar ,nausea e vomitos</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A recomendação está de acordo com os Guidelines de manejo da Leucemia Mielóide Crônica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ISH e RT-PCR, Positivo: Avaliação molecular da resposta terapêutica, adesão ao tratamento e remissão de doença. , Negativo: Não tenho o que relatar.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imatinibe., Positivo: Tratamento revolucionário que transformou prognóstico e expectativa de vida dos pacientes com Leucemia Mielóide Crônica., Negativo: Alguns poucos pacientes não respondem.</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR para Leucemia Mielóide Crônica, Positivo: poder monitorar se o tratamento está atingindo o efeito esperado. , Negativo: o que eu vejo de problema é que muitos pacientes não têm acesso ao exame PCR, então ficam fazendo o tratamento sem saber se está funcionando adequadamente.</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esse exame é de extrema importância para monitorar o paciente em tratamento. Sem ele, o paciente pode progredir devido ao mal acompanhamento e onerar mais o sistema.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já avaliei resposta ao tratamento em pacientes em uso de imatinibe, nilotinibe e dasatinibe. Também trabalhei com PCR enquanto trabalhava no laboratório de biologia molecular da USP , Positivo: Todos os TKIs: aumento da sobrevida. PCR: fundamental para avaliação da resposta e decisor na permanencia ou mudança para um tratamento mais eficaz. , Negativo: Eventos adversos Um ponto importante: qualidade do exame molecular qie será ofertado</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tudo que o que for para diagnosticar enfermidade previamente deve ser incluído</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tive neo de mama,passei por todos processos e sei da importância deste tema.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo totalmente pois, desta forma, se consegue monitorar com segurança a remissão da doença. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mesilato de Imatinibe, Positivo: Remissão rápida da doença , Negativo: Efeitos colaterais 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nenhum outro medicamento. Procedimentos: PCR-ABL - Cariótipo , Positivo: Diagnóstico , Negativo: Dor e desconforto