

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Técnico - Testes diagnósticos - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
24/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, O monitoramento permite melhor controle da doença e a identificação e intervenção precoce em caso de falha da terapia e progressão da doença. 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
24/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
24/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
24/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O teste de PCR para BCR-ABL na LMC é atualmente o que norteia um tratamento que é extremamente eficaz mas que se for mal monitorado pode não atingir o desfecho desejado. Sem este exame o paciente fica mal assistido e corre risco de progressão que pode acarretar em morte além de honerar o sistema com internações e outros tratamentos. Apesar na revolução do mesilato de imatinibe, 30-40% dos pacientes apresentam resistencia e precisam ir para uma 2a linha de tratamento, essa avaliação é feita pelo PCR. A análise citogenética restringe uma sensibilidade de detecção de BCR-ABL até 1%, o que limita o acompanhamento, uma vez que o PCR pode detectar níveis de BCR-ABL de até 0,0032%. O objetivo da LMC é o alcance de respostas moleculares (Baseado em guidelines internacionais da ESMO, NCCN e ELN) que só podem ser observadas por PCR. A recomendação deste monitoramento já consta no PCDT da doença no entanto não existe código sigtap para este procedimento. A incorporação do teste de PCR é fundamental e deve ser universal pelo SUS uma vez que o governo federal paga pelas drogas de 1a e 2a linha mas não fornece a ferramenta de avaliação de resposta.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, O preço considerado no teste parece ser baseado em laboratórios privados. Atualmente este teste é padronizado em diversas universidades federais pelo método in house com validação pela escala internacional o que reduz o custo. O laboratório de biologia tumora da USP é referência e realiza o teste.</p> <p>5ª - Não</p>	
24/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
24/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Necessário o monitoramento molecular para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
24/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
24/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
25/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Como o casos comprovados de que a medicação não é efetiva em situações de manifestação avançada 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
25/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Nao ha possibilidade de acompanhar a resposta ao tratamento sem a avaliacao periodica da mutação pelo PCR 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
25/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Testes completamente necessários para diagnóstico devido, escolha de tratamento, monitoramento da resposta ao tratamento e direcionamento para possíveis trocas, implicando de forma direta na evolução da doença 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Já existem diretrizes bem estabelecidas fora do país p uso do Monitoramento inclusive p controle de pacientes aptos a suspensão da droga</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
27/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Sim, Tanto evidências europeias como americanas recomendam fortemente o uso de Pcr para diagnóstico de monitoramento de lmc.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, O uso de Pcr é a única maneira de saber se o tratamento está adequado. É uma doença muito tratável!</p>	
28/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A incorporação destes testes, em especial o RT PCR, permitirão resultados mais rápido ao paciente, tanto no diagnóstico quanto no monitoramento da doença residual mínima, em casos de LMC, onde se realiza o tratamento com TKI (inibidor de tirosina Quinase).</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, Os testes moleculares, podem ser realizados em coletivo, ou seja, mais de 1 paciente por análise, onde os kits comercializados, permitem que os insumos consumidos obrigatoriamente, como a reação e controles, possam ter seu valor dividido por diversos pacientes (de 16 a 19 por placa), reduzindo o valor gasto em cada paciente.</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, Os testes moleculares como a RT PCR para diagnóstico ou monitoramento de LMC e LLA, possuem alta sensibilidade e especificidade, a técnica utilizada nestes testes é muito amigável, e segura. Este teste sendo incorporados ao SUS, permitirá melhor condição de saúde a população</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Sim, O exame RT-qPCR para BCR-ABL é muito importante para a monitoração do medicamento utilizado no tratamento do paciente, pois conduz a melhor conduta médica para o paciente.	
30/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, O monitoramento correto da LMC, contribui para a permanência do paciente na fase crônica e mantê-lo em remissão da doença. 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
30/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
30/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. EXAMES ESSENCIAIS PARA O TRATAMENTO ADEQUADO DAS PATOLOGIAS 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
30/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Sim, Trata-se de exame de suma importância para o Monitoramento adequado das doenças citadas.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O diagnóstico exige técnicas especiais como FISH ou PCR. O acesso ao tratamento com medicamentos específicos é feito após o diagnóstico. A conclusão é óbvia. Em relação à monitorização, a falta de resposta molecular maior evitaria insistir em um medicamento de elevado custo que não é eficaz.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, (1) A questão fármaco econômica é imperativa nos casos em que o paciente utiliza um medicamento que não produz a resposta necessária e apenas gera custo para o sistema. (2) Além disso, após resposta profunda e prolongada o tratamento da LMC pode ser interrompido, sem prejuízo para o paciente e com enorme economia ao sistema.</p> <p>4ª - Sim, Cada vez mais evidente que interromper o tratamento e fazer a monitoramento regular (hoje impossível exatamente pela falta dos exames complementares) irá gerar um expressivo impacto econômico.</p> <p>5ª - Não</p>	
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O exame é fundamental para o acompanhamento e tratamento de pacientes com LMC. Se adequadamente tratada, o paciente pode viver normalmente como qualquer doença crônica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Sim, 4ª - Sim, 5ª - Sim,	
30/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, 3ª - Sim, 4ª - Sim, 5ª - Sim,	
31/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
31/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
31/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
02/08/2019	Secretaria Estadual de Saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
03/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Todo paciente tem direito a diagnóstico e a informação da sua condição de saúde 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
03/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. È ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIA A MONITORIZAÇÃO PARA QUE POSSAMOS ACOMPANHAR OS DOENTES EM TRATAMENTO. ALÉM DISSO, COM O ACESSO A MONITORIZAÇÃO PODEMOS PENSAR EM SUSPENDER TRATAMENTOS EM PACIENTES EM RESPOSTA MOLECULAR COMPLETA, O QUE SERIA UMA ECONOMIA PARA O ESTADO 2ª - Sim, MONITORIZAÇÃO COM PCR QUANTITATIVO TAMBÉM AO DIAGNÓSTICO UMA VEZ QUE SABEMOS QUE A QUEDA DO BCR-ABL É IMPORTANTE NO PROGNÓSTICO 3ª - Não 4ª - Sim, COM O MONITORAMENTO PODEMOS SUSPENDER MEDICAÇÃO DE PACIENTES EM REPSPOSTA MOLECULAR COMPLETA DURADOURA E ECONOMIZAR A DROIGA, "GASTANDO APENAS COM O EXAME " 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
03/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A monitorização do BCR/ABL por PCR é parte FUNDAMENTAL do tratamento e acompanhamento dos pacientes com LMC e LLA Ph. A monitorização regular, inicialmente a cada 3 meses permite verificar a necessidade precoce de troca da medicação quando não estiver havendo resposta adequada. Isso se traduz em um melhor tratamento para o paciente e economia do sistema público de saúde, evitando administrar medicamentos que não são os mais adequados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, A realização do monitoramento evita desperdício com o uso de medicamentos que podem não estar levando à resposta citogenética e molecular profundas, não sendo, portanto, os mais adequados para o paciente em questão.</p> <p>5ª - Não</p>	
03/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
03/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Exames fundamentais para o seguimento dessas doenças</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
03/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
03/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Sim,	
05/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. pacientes com leucemia mieloide crônica e leucemia linfóide aguda tem total indicação de realizar os exames BCR-ABL para estratificação de risco das doenças e avaliação de resposta a quimioterapia. 2ª - Sim, Pacientes sem realização dos exames acima mencionados tem maior risco de progressão de doença e evolução desfavorável. 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
05/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
05/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Essencial para diagnóstico e controle da doença. 2ª - Sim, O diagnóstico bem feito muda sobrevida globalidade paciente! Aumenta expectativa de vida 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, 3ª - Sim, 4ª - Sim, 5ª - Sim,	
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. controle de LMC 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A realização destes exames é fundamental para controle, definição e mudanças terapêuticas nos pacientes com LMC 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Sim, O pcr qualitativo é essencial para o diagnóstico destas entidades e fundamental para o monitoramento trimestral dos pacientes em tratamento de LMC.	
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. BCR ABL sus 2ª - Sim, BCR-ABL a cada 6 meses 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. SOU MEDICO HEMATOLOGISTA DO SUS E TRATO APROXIMADAMENTE 60 PACIENTE COM LMC. É IMPOSSIVEL ACOMPANHAR ESTES PACIENTE SEM O EXAME DE PCR 2ª - Sim, As evidencias científicas são muitas! já tratamos LMC na pratica clinica com inibidor de tirosina kinase há pelo menos 15 anos. É impossível monitorar o tto sem o exame de Pcr bcr/abl. 3ª - Sim, EM CERCA DE 20% DOS PACIENTES COM LMC EM FASE CRÔNICA (GRANDE MAIORIA) PODERÃO INTERROMPER O USO DO INIBIDOR (IMATINIBE, DASATINIBE OU NILOTINIBE)! PARA FAZER O PROTOCOLO DE INTERRUPTÃO EU PRECISO TER DISPONÍVEL O EXAME DE PCR. ECONOMICAMENTE FALANDO A ECONOMIA É GIGANTESCA, JÁ EXISTE TRABALHOS CIENTIFICOS MOSTRANDO ESTES RESULTADOS. 4ª - Sim, descrito acima 5ª - Não	
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O acompanhamento com PCR-RT é essencial para a melhor condução dos pacientes com diagnóstico de leucemia mieloide crônica e LLA pH+.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O tratamento adequado e seguro da LMC e LLA Ph+ exige o monitoramento regular da resposta molecular, tanto para manter o tratamento instituído como para mudar de inibidor. Inclusive, no futuro, aqueles pacientes candidatos a parar o tratamento necessitam controle e monitoramento rigoroso nos primeiros anos de suspensão do medicamento. O que diminuirá o custo para o estado.</p> <p>2ª - Sim, Sou médica e trato muitos pacientes e o monitoramento adequado evita tratamentos de segunda linha e mesmo transplante, que são muito tóxicos e podem trazer consequências que implicam em outros piora de qualidade de vida.</p> <p>3ª - Sim, Alguns poderiam ser candidatos a suspender o tratamento, mas sem monitoramento é impossível. E a suspensão traria um benefício financeiro bem maior que o custo de manter o tratamento. E, mesmo os que não podem suspender, o controle adequado evita tratamentos de segunda linha , que são mais honerosos.</p> <p>4ª - Sim,</p> <p>5ª - Sim, O mesmo acima</p>	
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O monitoramento é essencial para o tratamento eficaz.</p> <p>2ª - Sim, Sou médica, Onco-Hematologista, e o monitoramento direciona a conduta a ser tomada. Inclusive a de suspensão naqueles que obtiveram resposta molecular profunda mantida.</p> <p>3ª - Sim, O tratamento inadequado determina tratamentos de segunda linha e mesmo transplante de medula óssea, o que se torna mais honeroso pro estado.</p> <p>4ª - Sim, Facilitará o planejamento orçamentário e, aqueles que puderem suspender o tratamento, será um fator positivo na balança orçamentária.</p> <p>5ª - Não</p>	
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Extrema necessidade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. É o mínimo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Já deveria ter sido aprovado, melhorará muito para o paciente e para o médico 2ª - Sim, Diariamente atendo lmc, eventualmente lla ph, vejo e sinto a falta que esses exames fazem tanto para o paciente quanto para o médico 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, A importância do monitoramento Bcr Abl na sobrevida e manejo dos pacientes. 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	Clique aqui
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Imprescindíveis para o diagnóstico e acompanhamento da resposta terapêutica 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. tenho bastante experiência com estas patologias e o monitoramento é fundamental para avaliação de resposta ao tratamento e detecção precoce de falha terapêutica</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, Apesar do custo, a detecção de falha ao tratamento com mudança do esquema terapêutico, com certeza será menor do que a evolução natural da patologia</p> <p>4ª - Sim, já descrito acima</p> <p>5ª - Não</p>	
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Tais exames são de fundamental importância para o diagnóstico e monitoramento do tratamento desses pacientes.</p> <p>2ª - Sim, Não há como tratar ou monitorar o tratamento sem os exames citados.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Os testes moleculares são fundamentais para diagnóstico e manejo terapêutico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Exame fundamental no diagnóstico e tratamento da doença 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
07/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
07/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Sem o controle do bcr ano quantitativo e impossível tratar e inclusive poder curar a leucemia mieloide crônica. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Testes essenciais para controle adequado do tratamento 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
07/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O monitoramento e fundamental nestas doenças 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
07/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. trato de pacientes com TKI há vários anos, e sei que são fundamentais os testes em questão 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Sim, envio artigos publicados pelo nosso grupo a respeito de TKI e monitoramento	Clique aqui
07/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A monitorização é essencial para o ideal preconizado internacionalmente para o correto tratamento dos pacientes com LMC/LLA BCR/ABL positivo. O tratamento da leucemia mielóide crônica (LMC) com inibidores da tirosina quinase avançou para um estágio em que muitos pacientes atingem níveis muito baixos ou indetectáveis da doença, inclusive alguns desses pacientes permanecem em remissão sustentada quando o tratamento é retirado, sugerindo que eles podem estar curados de sua doença. O monitoramento das respostas moleculares profundas é cada vez mais importante para o acompanhamento ideal do paciente inclusive com grande impacto econômico. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O monitoramento da LMC através do RT-PCR é fundamental para analisar a resposta ao tratamento e suspensão da droga quando houver resposta profunda prolongada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. exames fundamentais no diagnóstico e seguimento, trazendo grande benefício no tratamento e cuidado dos paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, Sou médica hematologista e trato de pacientes com LMC há 10 anos no Hospital das Clinicas de SP e ICESP. A monitorização com PCR é fundamental para o tratamento e evitar desperdício com os medicamentos que são de alto custo para o sistema de saúde. Com o monitoramento também será possível descontinuar o tratamento para alguns pacientes, trazendo economia para o estado.</p>	
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Os testes em questão são essenciais para o diagnóstico, avaliação de prognóstico e decisão terapêutica. No monitoramento da LMC a decisão de perda de resposta e mudança da terapia é realizada com esses testes, com impacto na sobrevida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
07/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
07/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. para seguimento e tratamento é imprescindível o monitoramento através de exame quantitativo, e para diagnóstico o exame qualitativo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	Clique aqui
07/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
07/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A doença apesar de não frequente depende para condução do seu tratamento e mudança de opção terapeutica o monitoramento do exame RT PCR.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Sou medico hematologista e trabalho com pacientes com LMC. a Transcriptase reversa qualitativa (RT-PCR) e quantitativa (RT-qPCR) e Hibridização in situ (ISH) são FUNDAMENTAIS para o diagnóstico e monitoramento da Leucemia Mieloide Crônica (LMC) e da Leucemia Linfoblástica Aguda cromossoma Philadelphia positivo (LLA Ph+). Estas são feramentas importantes para FECHAR o diagnostico de LMC e acompanhar a resposta aos inibidores de TKI antes do paciente evoluir com alterações clinico-laboratorias de evolução da doença. No caso da LLA, fundamental para traçar tratamento: se o inibidor de TKI sera associado a quimioterapia ou não, o que muda muito o prognostico e as taxas de cura</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Fundamental para diagnostico e tratamento correto de tais enfermidades 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
07/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
07/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Necessidade de incorporação urgente de exames já amplamente utilizados para o diagnóstico e monitoramento adequado de pacientes com leucemia Mieloide Crônica e com LLA Philadelphia positivo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. São indispensáveis os testes FISH e RT-PCR qualitativo para o diagnóstico e o teste de RT-PCR quantitativo para o monitoramento dos pacientes com diagnóstico de leucemia Ph positivos (LMC e LLA).</p> <p>2ª - Sim, Os maiores centros mundiais e guidelines (LeukemiaNet, NCCN) já recomendam há muito tempo o monitoramento regular desses pacientes, inclusive o PCDT de LMC recomenda o monitoramento com exame de RT-PCR.</p> <p>3ª - Sim, 1) O monitoramento regular desses pacientes nos permite intervir no desfecho de forma precoce e impedir a progressão da doença para fases mais avançadas. Os pacientes que evoluem para fases mais avançadas geram elevados custos, tais como internações, quimioterapia e transplante.2) O monitoramento adequado dos pacientes com LMC nos permite hoje avaliar e selecionar os pacientes que poderiam ter o seu tratamento interrompido, o que resultaria em uma grande economia, além de prevenir eventos adversos tardios provenientes do tratamento.</p> <p>4ª - Sim, Vários estudos já demonstraram o impacto positivo no monitoramento regular desses pacientes.</p> <p>5ª - Não</p>	
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Estes exames são fundamentais para diagnóstico e avaliação de resposta terapêutica</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O Brasil teve a incorporação no SUS de 3 drogas inibidoras de tirosinoquinase, mas não há possibilidade de monitoramento de resposta em nível molecular. A proposta da CONITEC vem ao encontro de um anseio de todos os médicos hematologistas que tratam LMC na rede SUS.</p> <p>2ª - Sim, O impacto econômico está diretamente relacionado aos casos que podem até se beneficiar da suspensão do tratamento, mas que necessitam de um monitoramento mais frequente.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	<p>Clique aqui</p>
08/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Sim, De acordo com literatura, o adequado monitoramento permite tratamento e modificação precoce de terapia, melhorando desfechos dos pacientes.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
08/08/2019	Empresa	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Porque o próprio PCDT já recomenda os testes para diagnóstico e monitoramento das Leucemias Ph(LMC e LLA PH) e existe a necessidade do correto financiamento dos mesmos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, Do ponto de vista econômico do relatório, pode-se observar que os valores incrementais para os próximos cinco anos demonstraram a previsibilidade da incorporação do RT-qPCR no impacto orçamentário na perspectiva do SUS2. Vale ressaltar que, mesmo em simulações no qual os pacientes tratados fossem monitorados em diferentes intervalos ao ano, foi possível observar a viabilidade e aceitabilidade da incorporação das tecnologias no SUS para o monitoramento dos pacientes já existentes no sistema de saúde. O monitoramento adequado do paciente com LMC permite ao sistema de saúde reduzir custos diretos com a progressão da doença, como também custos indiretos relacionados a mortalidade precoce e produtividade.</p> <p>5ª - Não</p>	<p>Clique aqui</p> <p>Clique aqui</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. essencial no manejo terapeutico dos pacientes 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
08/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
08/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
08/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
08/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
08/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
08/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
08/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
08/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Indispensável para o tratamento e acompanhamento da resposta ao tratamento desses pacientes. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
08/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Tratar LMC sem controle quantitativo do bcrabl é inadmissível nos dias de hoje.A profundidade da resposta molecular é avaliação prioritária nesta patologia Manter o paciente em 3log de resposta ou mais garante que o mesmo não evoluirá para fase blastica e óbito.</p> <p>2ª - Sim, Na LMC PH+ atingir 3log de resposta nos primeiros meses de tratamento é fundamental. Todo o tratamento com inibidor tirosinoquinase segue protocolo padrão de obtenção de resposta citogenetica e molecular</p> <p>3ª - Sim, Laboratórios universitários devidamente credenciados para a realização destes exames poderiam receber investimentos além de custeio destes exames</p> <p>4ª - Sim, Há centros universitários cujos laboratórios receberam certificado internacional para realizar o pcr quantitativo do bcrabl P210 e P190Este laboratório poderiam ser remunerados para realizarem estes examesHospital das Clínicas do Paraná, USP</p> <p>5ª - Não</p>	
08/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Tratar LMC sem controle quantitativo do bcrabl é inadmissível nos dias de hoje.A profundidade da resposta molecular é avaliação prioritária nesta patologia Manter o paciente em 3log de resposta ou mais garante que o mesmo não evoluirá para fase blastica e óbito.</p> <p>2ª - Sim, Na LMC PH+ atingir 3log de resposta nos primeiros meses de tratamento é fundamental. Todo o tratamento com inibidor tirosinoquinase segue protocolo padrão de obtenção de resposta citogenetica e molecular</p> <p>3ª - Sim, Laboratórios universitários devidamente credenciados para a realização destes exames poderiam receber investimentos além de custeio destes exames</p> <p>4ª - Sim, Há centros universitários cujos laboratórios receberam certificado internacional para realizar o pcr quantitativo do bcrabl P210 e P190Este laboratório poderiam ser remunerados para realizarem estes examesHospital das Clínicas do Paraná, USP</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Considero o absurdo número 1 na Hematologia atual no SUS a indisponibilidade do PCR para BCR-ABL para diagnóstico e monitoramento. A descoberta do Glivec é o marco da terapia alvo na oncologia e a sobrevivência dos pacientes quase se igualou a da população geral após descoberta da mutação e da terapia alvo. É um absurdo que os pacientes do SUS tenham acesso ao tratamento e não ao diagnóstico e monitoramento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
09/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Os exames que serão incorporados são fundamentais no monitoramento adequado da LMC .</p> <p>2ª - Sim, Seguem as referencias abaixo, de evidencias nacionais do exame de PCR quantitativo no monitoramento da LMC.1: Ribeiro BF, Vergílio BR, Miranda EC, Almeida MH, Delamain MT, da Silveira RA, de Souza CA, Albuquerque DM, Santos AD, Duarte VO, Oliveira-Duarte GB,Lorand-Metze I, Pagnano KB. BCR-ABL1 Transcript Levels at 3 and 6 Months Are Better for Identifying Chronic Myeloid Leukemia Patients with Poor Outcome in Response to Second-Line Second-Generation Tyrosine Kinase Inhibitors after Imatinib Failure: A Report from a Single Institution. Acta Haematol.2015;134(4):248-54. PubMed PMID: 26159458.2: Machado MP, Tomaz JP, Lorand-Metze I, de Souza CA, Vigorito AC, Delamain MT,Bendit I, Pereira NF, Pagnano KB. Monitoring of BCR-ABL levels in chronic myeloidleukemia patients treated with imatinib in the chronic phase - the importance of a major molecular response. Rev Bras Hematol Hemoter. 2011;33(3):211-5. doi:10.5581/1516-8484.20110056. PubMed PMID: 23049298; PubMed Central PMCID:PMC3415739.3.Boquimpani C, Schaffel R, Biasoli I, Bendit I, Spector N. Molecular responses at 3 and 6 months after switching to a second-generation tyrosine kinase inhibitor are complementary and predictive of long-term outcomes in patients with chronic myeloid leukemia who fail imatinib. Leuk Lymphoma. 2015 Jun;56(6):1787-92. doi: 10.3109/10428194.2014.974047. Epub 2014 Nov 20. PubMed PMID: 25311496.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Tais exames são de suma importância para orientar o tratamento dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. É extremamente importante a realização do monitoramento da LMC e LLA Ph positivo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, Inicialmente tem-se um incremento nos custos em relação as LMC contudo com a possibilidade de parada da medicação a suspensão do remédio torna-se mais barata a monitorização do que o uso contínuo do remédio</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. É um exame fundamental para o tratamento dessas doenças</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
09/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
09/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, precisamos ter em mãos o diagnostico mais rápido. 3ª - Sim, 4ª - Não 5ª - Não	
09/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, 3ª - Sim, 4ª - Não 5ª - Não	
09/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Sim, É muito importante para os pacientes a realização desses exames, uma vez que proporciona um diagnostico e tratamento ágil com maior eficacia e uma melhor qualidade de vida.	
09/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Sim,</p> <p>3ª - Sim, o correto monitoramento dos pacientes com LMC é capaz de reduzir o custo do tratamento no primeiro ano em mais de 3000 dólares americanos. Adicionalmente, caso o PCR esteja disponível será possível oferecer a interrupção da medicação a alguns pacientes, o que também terá um impacto considerável na redução do custo do tratamento da LMC no Brasil</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	<p>Clique aqui</p> <p>Clique aqui</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Indispensável para o sucesso dos nossos tratamentos de leucemia.</p> <p>2ª - Sim, Leocemia mieloide crônica.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Extremamente necessário e não faz sentido empregar uma medicação cara , mas eextremamente efetiva, e não saber se está fazendo o efeito desejado. É preciso ter controle da doença e saber se a medicação está fazendo efeito para cada paciente. Ao mesmo tempo é necessário fornecer o teste para pesquisa de mutação do sítio de fosforilação da mutação onde a medicação age na célula, caso o paciente passe a não ter o efeito desejado da medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, A exigência do emprego do teste está delineada nas recomendações das sociedades de Hematologia européia, americana e australiana há vários anos. A Sociedade Brasileira de Hematologia e Hematologia orienta também o controle da doença através deste teste. Portanto é importante que os pacientes SUS possam ter a possibilidade de controle de sua doença através deste teste - rt PCR quantitativo.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O exame em questão é primordial para o monitoramento da resposta a medicação, orientando o momento de troca da medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O exame é fundamental para acompanhamento do paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Sim, O monitoramento dos pacientes tem impacto no prognóstico e tratamento. Portanto, é essencial que o exame seja realizado.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
10/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Sim, A realização deste exames nos respalda de forma inquestionável sobre o diagnóstico da doença de base</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O diagnóstico será preciso e o seguimento pra avaliar resposta ao tratamento dará maior segurança ao paciente e ao profissional médico 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
10/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
10/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
10/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
10/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. permite que todos os pacientes possam beneficiar-se com a monitoramento evolutivo de sua doença ,independendo de sua classes sociais 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
10/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Tem que fazer pcr pra LLa. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
10/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
10/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Acompanhei nas últimas 4 décadas, os avanços da Onco-Hematologia. A quantificação do gene BCR/ABL, a caracterização da presença da translocação (9;22) pela citogenética clássica e método FISH foram marcos que revolucionaram este campo. São imprescindíveis ao diagnóstico e monitoramento após terapia seja ela constituída por inibidores de tirosina quinase e transplante de medula óssea nas mais diversas modalidades. É impossível a resolução dos casos sem estes recursos.</p> <p>2ª - Sim, No serviço de Hematologia do Santa Marcelina do qual fui fundador e responsável , a citogenética pelo método banda G é custeada pela administração a todos os pacientes através de convênio, o QPCR é também custeado pela instituição. Os fornecedores inicialmente contribuíram nesta iniciativa. É importante que tenhamos acesso para continuar prestando a assistência de excelência a todos os pacientes do SUS. Já realizamos mais de 250 transplantes em LMC e o ambulatório temos atualmente mais de 250 pacientes com LMC. Já passou da hora do SUS assumir este custo. Infelizmente há uma enorme defasagem entre o que acontece no SUS e o que acontece na ciência e noutros países da América Latina.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, Estes procedimentos devem ser realizados por Instituições acreditadas internacionalmente e portanto por laboratórios com experiência consagrada com a finalidade de baixar custos. Sugiro urgente cadastro nacional de todos os pacientes. Isto já é parcialmente feito nos APAC de ITK. Sugiro APACs para estes exames, acordos oficializados entre as instituições afins e os laboratórios que já realizam os exames. As contribuições dos fornecedores devem ser incentivadas para cair o custo. Isto também já é feito quando de uma nova droga. Oficializar estas parcerias entre governo e fornecedores para métodos necessários e caros como a pesquisa das mutações do BCR/ABL e quando necessário, o sequenciamento genético. Afinal já lucraram e lucram demais e nada mais justo que contribuam.</p> <p>5ª - Não</p>	
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Teste fundamental para diagnóstico e acompanhamento do resultado ao tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. São exames fundamentais para o diagnóstico e monitoramento destas doenças. Seus resultados definem mudança de tratamento, necessidade de transplante de medula óssea ou mudança de terapia.</p> <p>2ª - Sim, Várias diretrizes publicadas já condicionam tal ou qual terapia de acordo com os resultados dos exames de BCR-ABL: fundamental para comprovação diagnóstica de LMC, para monitoração da eficácia da terapia e para seguimento dos pacientes que atingiram remissão molecular completa e para os quais se tenciona suspender tratamento. Também indispensável para avaliação, tratamento e monitoração dos casos de leucemia linfoblástica aguda.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Acredito um grande benefício para os pacientes portadores de patologias hematológicas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Fundamental para o diagnóstico e tratamento dos pacientes k</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, O diagnóstico e tratamento adequados permitem manter os indivíduos trabalhando e contribuindo para o desenvolvimento do país ou invés de incapacitado e doentes nas filas dos hospitais</p> <p>4ª - Sim, Com os dados dos exames será possível programar o orçamento para o tratamento desses pacientes hoje os medicamentos de alto custo são utilizados sem controle adequado.</p> <p>5ª - Não</p>	
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. a monitorização do BCR-ABL por PCR É FUNDAMENTAL NO TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES COM lmc E LLA PH+</p> <p>2ª - Sim, Na LMC a monitorização do BCR-ABL por pcr monitoria resposta ao tratamento e perda de resposta Na LLA ph+ tmé faz parte do trtamento uma vez que monitora respota e perda de reposta Em ambos os casoso definem tratamento</p> <p>3ª - Sim, Na LMC a possibilidade de monitorização do BCR-ABL por pcr definiá condut futura de para de tratamentp, o que em grande escala economicamente favorecerá as contas pulblicas com relação a verbas em saúde</p> <p>4ª - Sim, Com a possibilidade de monitorização do BRC-ABL a proposta de parada será viavel</p> <p>5ª - Sim, Reitero a necessidade de monitorização do BRC-ABL por PCR como fundamental no tratamento e acompanahmento</p>	
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2019	Instituição de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, Monitoramento adequado traz melhor qualidade no tratamento, qualidade de vida do paciente bem identificação precoce de complicações.</p> <p>4ª - Sim, reconhecimento precoce de falha ou evento adverso traz grande benefício para reduzir complicações, como internações, uso de antibióticos, permanência em terapia intensiva, consequentemente redução de gastos evitáveis.</p> <p>5ª - Não</p>	
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Esse e um exame essencial para o diagnóstico e necessário para iniciar o tratamento específico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A incorporação do FISH e RT PCR qualitativo para diagnóstico e RT PCR quantitativo para monitoração são fundamentais para o acompanhamento de pacientes com LMC e LLA Ph positivos. Seguindo todas as recomendações nacionais e internacionais, as respostas adequadas e falhas de resposta podem assim ser verificadas e tomadas as medidas terapêuticas adequadas 2ª - Sim, A diretriz brasileira de LMC, o NCCN e a European Leukemia net recomendam o RT PCR qualitativo e o FISH para o diagnóstico (este último se não há metafase na citogenética ou na ausência desta), e o RT PCR quantitativo para monitoramento a cada 3 meses destes pacientes, conforme referência abaixo 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	Clique aqui
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, Na LMC o monitoramento do Ph e a única maneira de avaliar a resposta ao tratamento 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Os testes diagnósticos acima são de fundamental importância no momento do diagnóstico, monitoramento do tratamento e em outras fases destas doenças. Assim, não fazê-los significa não oferecer o adequado tratamento aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, Parabéns aos organizadores pela excelente contribuição aos paciente tratados pelo SUS.</p>	
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A DEFINIÇÃO DO CROMOSSOMO PHILADELPHIA TEM IMPACTO ÍMPAR NO PROGNÓSTICO DO PACIENTE ORIENTANDO CONDUTAS E INDICAÇÃO DE TRANSPLANTE MEDULAR.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Sim, publicações científicas</p> <p>3ª - Sim, Enviamos 02 artigos para congressos científicos sobre o tema</p> <p>4ª - Sim, A não realização do exame , impossibilita o monitoramento adequado , impacto na condução clinica e podendo trazer mais custos à médio e longo prazo</p> <p>5ª - Sim, Como especialista , informo que a realização do referido exame é fundamental para monitoramento e adoção do tratamento correto</p>	
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Leukemi Net atual</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/08/2019	Instituição de ensino	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/08/2019	Grupos/associação/orga nização de pacientes	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim,</p>	Clique aqui

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Impossível diagnosticar e acompanhar, adequadamente, os pacientes com LMC e LLA Ph positivos sem as ferramentas diagnósticas de RT PCR e FISH</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Testes cruciais no diagnóstico e seguimento dos pacientes com neoplasias Ph positivas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Este teste é essencial para a avaliação de resposta ao tratamento desses pacientes. Sem ele não é possível identificar os pacientes com falha no tratamento. Estes pacientes que falham necessitam de mudança imediata no tratamento. Se isso não ocorrer, pode haver risco de progressão da doença, evolução para Leucemia Mielóide Aguda, podendo até levar a óbito decorrente da progressão da doença.</p> <p>2ª - Sim, Estudos clínicos e Guidelines que recomendam o exame de PCR BCRABL quantitativo para avaliação da resposta ao tratamento</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	<p>Clique aqui</p> <p>Clique aqui</p> <p>Clique aqui</p> <p>Clique aqui</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. de extrema importancia para o controle da doença 2ª - Sim, aumento da sobrevida dos pacientes e precocidade em evitar agudização da doença 3ª - Não 4ª - Sim, a realização dos exames traz contribuição para evitar agudização da doença e aumento dos gastos com internamentos hospitalares e quimioterapicos venosos 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. MUITO IMPORTANTE O EXAME BCR/ABL PARA A EVOLUÇÃO DO TRATAMENTO 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. São testes necessários para o diagnóstico e seguimento destes pacientes.O custo é elevado do teste e limita o seguimento correto caso o paciente não possa arcar com o custo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Exame imprescindível para diagnóstico e monitoramento do tratamento, podendo inclusive poupar recursos pela utilização mais adequada do medicamento 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Única forma de avaliar o tratamento desse paciente de forma correta 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Benefícios para os pacientes, tanto par o diagnóstico como avalie resposta ao tratamento 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. OS TESTES RECOMENDADOS PARA O DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DOS PACIENTES COM LMC E LLAPH+, SÃO INDISPENSÁVEIS, VISTO QUE EVIDENCIAM COMO O PACIENTE ESTÁ RESPONDENDO AO TRATAMENTO, ATÉ MESMO SE ESTÁ EM USO CORRETO DA MEDICAÇÃO, PERMITINDO ASSIM UMA INTERVENÇÃO PRECOCE. 2ª - Sim, EVIDENCIAS CLÍNICA: MAIS SEGURANÇA AO M`DICO E PACIENTE, QUE AO TER MONITORADO SEU TRATAMENTO. 3ª - Sim, PACIENTES COM MONITORAÇÃO REGULAR E RESPOSTA PROFUNDA (4.5 LOGS) E MANTIDA PODERÃO SER SELECIONADOS PARA SUSPENSÃO DO TRATAMENTO, O QUE SE TRADUZ EM ECONOMIA DE RECURSOS DISPENDIDOS NAS MEDICAÇÕES. JÁ FOI COMPROVADO POR TRABALHOS COM ENFOQUE NA ÁREA ECONOMICA, QUE O RECURSO PARA OS TESTES LABORATORIAIS, SÃO MENORES QUE OS EMPREGADOS NAS MEDICAÇÕES. 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2019	Outra	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O Instituto Oncoguia ratifica o posicionamento da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), referência nacional no tema escopo da presente Consulta Pública, apoiando a incorporação dos exames sob análise, pois contribuirão para o monitoramento adequado da LMC no Brasil.</p> <p>2ª - Sim, O exame de RT-PCR qualitativo é fundamental ao diagnóstico, para se avaliar o tipo de transcrito BCR-ABL que o paciente possui. Este será monitorado posteriormente através do RT-PCR quantitativo (RQ-PCR). A European Leukemia Net (ELN), o NCCN e as diretrizes brasileiras (PCDT) recomendam o teste de RQ-PCR a cada 3 meses até obtenção de resposta molecular maior confirmada e posteriormente a cada 3-6 meses enquanto o paciente estiver mantendo essa resposta. O exame é importante para avaliar precocemente falha de tratamento, o que determinaria mudanças terapêuticas. No cenário atual do tratamento da LMC, permite também detectar os casos com resposta molecular profunda (RM4.5) sustentada que seriam candidatos a suspender o tratamento. Estes casos devem ser monitorados rigorosamente após a suspensão. O exame de FISH por sua vez tem sua importância quando não há metafases suficientes para serem analisadas no cariótipo convencional e quando se suspeita de algum transcrito BCR-ABL atípico.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Teste muito importante para os pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Doença com necessidade de monitorização do tratamento</p> <p>2ª - Sim, Diante do benefício da realização dos exames o custo fica baixo pois um tratamento ineficiente vai custar a vida do paciente</p> <p>3ª - Sim, Benefício maior que o custo</p> <p>4ª - Sim, Benefício maior que o custo</p> <p>5ª - Sim, Tratar adequadamente os pacientes é o pilar para uma boa sobrevivência desses pacientes</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Defendi tese de doutorado dia 29 de Julho sobre o assunto citado, verificando a real necessidade da introdução desses exames no diagnóstico e tratamento da doença em questão. 2ª - Sim, De acordo com a tese os pacientes a maioria tinham poucos exames 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Segurança e eficácia do exame 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2019	Instituição de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Primeiramente salientamos a importância da iniciativa proposta em relação a incorporação dos exames de BCR-ABL para LMC e LLA cromossomo Philadelphia positivo para pacientes do SUS. Neste contexto, acreditamos que seja de suma importância o esclarecimento de alguns aspectos que poderiam contribuir como melhor entendimento da proposta e sucesso da abordagem. Seguem abaixo alguns pontos para discussão:- Na página 3 do documento está definido que "A nova lei estabelece a exigência do registro prévio do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para que este possa ser avaliado para a incorporação no SUS." Neste sentido, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre fez uma busca dos kits comercialmente disponíveis para o uso no diagnóstico e monitoramento de BCR- ABL. Foi constatado que as duas empresas responsáveis pela venda de sondas para FISH (Agilent e CITOGEM) não apresentam seus produtos registrados na ANVISA. Já as empresas responsáveis pela venda de kits de qRT-PCR (Cepheid e Biometrix) apresentam seus produtos registrados. No entanto, após uma análise detalhada dos custos, concluímos que para nenhum dos métodos (seja FISH ou qRT-PCR) foi possível atingir o valor proposto na consulta pública. Os custos para a realização do BCR-ABL por RT-PCR e com kits registrados na ANVISA são pelo menos o dobro do valor proposto.- No documento publicado não fica claro se o valor estabelecido para o teste no momento do diagnóstico refere-se a análise independente de cada um dos transcritos de BRCA-ABL. Caso o FISH ou cariótipo seja o método de escolha no diagnóstico, uma análise posterior para definição do transcrito (p210 ou p190) seria necessária para o adequado monitoramento do paciente. Caso o RT-PCR ou o qRT-PCR seja o método utilizado no diagnóstico e no monitoramento, os custos estimados também seriam significativamente mais elevados do que o valor proposto.Dessa forma, concordamos com a incorporação da tecnologia, conforme as indicações de uso descritas. Porém, ressaltamos a necessidade de considerar valor adequado para os testes, uma vez que a previsão de repasse de valor inferior ao custo dos mesmo acaba por tornar proibitivo o uso real da tecnologia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, Os valores utilizados como preço dos testes estão muito abaixo do valor de mercado dos custos dos reagentes necessários.</p> <p>5ª - Não</p>	<p>Clique aqui</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Este exame é imprescindível no acompanhamento de resposta só tratamento específico para a Leucemia Mieloide Crônica</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, O acompanhamento através de PCR é primordial para verificar se o tratamento está sendo efetivo 3ª - Sim, Pacientes com resposta molecular maior, segundo NCCN, acima de cinco anos e obedecendo outras prerrogativas, são passíveis de suspender tratamento com inibidor de tk 4ª - Sim, Suspendendo o tratamento com inibidor de tk , deve-se acompanharão paciente, conforme NCCN, a cada 3 meses, através de exame PCR, muito mais barato do que manter o tratamento de pacientes com resposta molecular maior por tempo indeterminado 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Importante para decisão terapêutica e seguimento da doença 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. hoje temos as medicações , mas falhamos no seguimento 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O uso da reação de cadeia de polimerase é de fundamental importância para o diagnostico e para o monitoramento de resposta terapêutica , não sendo possível substituir por nenhuma outra técnica com a mesma sensibilidade e especificidade . O seu uso tem importância fundamental na melhoria de sobrevida dos pacientes 2ª - Sim, Acta Haematol. 2015;134(4):248-54 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2019	Instituição de ensino	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Fundamental importância para diagnóstico e acompanhamento dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, O diagnóstico correto e o acompanhamento da resposta é de fundamental importância e segundo estudos clínicos existe inclusive possibilidade de suspender a medicação caso o paciente esteja em resposta molecular profunda e cerca de 50% dos casos de suspensão mantiveram sem medicação com resposta profunda!</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Muito importante o exame para saber o tratamento está funcionando</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim,</p>	
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Exame primordial. Saúde é dever do estado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Esse exame é fundamental para o correto acompanhamento do tratamento e da doença 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Exames de extrema necessidade para diagnóstico e acompanhamento do tratamento 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Parabéns</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, A não realização cuidadosa do exame implica em progressão da doença, necessidade de transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas e risco de morte para os pacientes. Custo humano e monetário infinitamente maiores do que a monitorização. Parabéns pela incorporação</p> <p>4ª - Sim, A não realização cuidadosa do exame implica em progressão da doença, necessidade de transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas e risco de morte para os pacientes. Custo humano e monetário infinitamente maiores do que a monitorização. Parabéns pela incorporação</p> <p>5ª - Sim, Parabens</p>	
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Os testes ISH e RT-PCR são fundamentais para diagnóstico e o RT-PCR é ferramenta para acompanhamento clínico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Sem o monitoramento os pacientes progridem e somente quando estão graves essa progressão é percebida. Com o pcr, se houver progressão ela será precocemente detectada, muitas vezes evitando o óbito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	