

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Técnico - Dolutegravir para pacientes coinfectados com HIV e tuberculose - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
26/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Uma vez que o medicamento é custo-efetivo, não sendo necessário adequação de infraestrutura dentro do SUS. Pode-se também requerer monitorização, alteração da dosagem de fármacos ou do esquema de administração, viabilizando o melhor tratamento para o paciente.</p> <p>2ª - Sim, Dolutegravir em comparação ao Raltegravir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=((HIV%20Infections)%20AND%20Dolutegravir)%20AND%20Raltegravir%20Potassium)%20AND%20Cost-Benefit%20Analysis</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, Deve-se avaliar também a necessidade de monitorização terapêutica na co-administração de Dolutegravir e Rifampicina, uma vez que a rifampicina diminuirá o nível ou efeito do Dolutegravir aumentando o metabolismo. Aumentar a dose de Dolutegravir para 50 mg duas vezes ao dia quando co-administrada com indutores fortes de UGT1A / CYP3A.</p>	Clique aqui
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	