

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Técnico - Ampliação de uso do dolutegravir para o tratamento de gestantes vivendo com HIV - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
16/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. Estudos ratificam a segurança deste medicamento na TARV.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, Considerando o baixo risco na formação de danos no tubo neural em neonatos e o custo menor do dolutegravir em relação ao raltegravir, o questão custo efetividade é razoável.</p> <p>4ª - Sim, Tudo aquilo que vier para reduzir os custos com medicamentos em TARV será de boa aceitação para o Estado que atua no âmbito do SUS.</p> <p>5ª - Não</p>	
17/12/2019	Sociedade médica	<p>1ª - Concordo. Concordamos desde que seja especificada a restrição do uso para mulheres que queiram engravidar ou no primeiro trimestre da gestação</p> <p>2ª - Sim, Há dois casos de DTN em bebês nascidos de gestantes brasileiras no RS, ao contrário do que ocorreu até o IAS 2019, quando foram apresentados os dados Brasileiros até aquele momento.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, Há dois casos de DTN em bebês nascidos de gestantes brasileiras no RS, ao contrário do que ocorreu até o IAS 2019, quando foram apresentados os dados Brasileiros até aquele momento.</p> <p>5ª - Não</p>	<p>Clique aqui</p> <p>Clique aqui</p>
18/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo. A HPTEC é uma doença extremamente grave e que não tem protocolo específico (o PCDT atual contempla apenas HAP e exclui os pacientes com HPTEC). Os estudos clínicos de riociguat demonstram eficácia e segurança, inclusive a longo prazo para pacientes com HPTEC inoperável ou persistente / recorrente, sendo uma ferramenta essencial para o tratamento destes pacientes.</p> <p>2ª - Sim, A HPTEC é uma doença extremamente grave e que não tem protocolo específico (o PCDT atual contempla apenas HAP e exclui os pacientes com HPTEC). Os estudos clínicos de riociguat demonstram eficácia e segurança, inclusive a longo prazo para pacientes com HPTEC inoperável ou persistente / recorrente, sendo uma ferramenta essencial para o tratamento destes pacientes.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/12/2019	Grupos/associação/orga nização de pacientes	1ª - Concordo 2ª - Sim, 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	Clique aqui
26/12/2019	Sociedade médica	1ª - Concordo. Concordamos com incorporação do DTG no segundo e terceiro trimestre da gestação 2ª - Sim, Há dois casos recentes de defeito de tubo neural, no RS em bebês filhos de gestantes em uso de DTG. 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Sim,	Clique aqui
13/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Sim, Três situações em que o Dolutegravir deva ser iniciado imediatamente nas gestantes:1ª Gestantes em que o diagnóstico da infecção pelo HIV ocorra após a 12ª semana de gestação;2ª Gestantes com diagnóstico da infecção pelo HIV e sem TARV com diagnóstico da gestação após a 12ª semana;3ª Gestantes com diagnóstico da infecção pelo HIV e sem TARV e que tenham sua 1ª consulta após a 12ª semana de gestação. 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	