

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Ampliação do uso do teste do pezinho para a detecção da toxoplasmose congênita - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A ampliação do uso do teste do pezinho para a detecção da Toxoplasmose Congênita irá antecipar o diagnóstico para tratamento precoce, com isso proporcionará uma melhor qualidade de vida deste recém-nascido, bem como da mãe e de sua rede de apoio, assim será favorável para evitar possíveis sequelas tardias pois haverá um melhor direcionamento dos profissionais de saúde para cuidar desse RN caso ele tenha Toxoplasmose Congênita.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Extremamente necessária a validação da proposta.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Muitos casos são assintomáticos, mas desenvolvem sintomas graves na evolução... essa triagem poderia amenizar as consequências da doença, possibilitando o tratamento precoce!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diagnóstico por Sorologia, tto e acompanhamento dos pacientes, Positivo: Melhora no prognóstico total do paciente , Negativo: Exames falso positivos ou negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Semelhante aos do teste em questão , Positivo: Semelhantes aos descritos acima , Negativo: Semelhantes aos descritos acima</p>
06/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, É válido que isso seja detectado pelo teste do pezinho, uma forma de detecção o mais precoce possível para que haja o tratamento adequado e em tempo hábil.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim o tratamento de toxoplasmose em gestante para evitar a transmissão congênita. Os medicamentos são usados na gestante até 18 semanas utilizamos a epiramicina. A partir de 18 semanas usamos o esquema tríplice que são os medicamentos: piremítina 25 mg + sulfadiazina 500 mg + ácido fólico., Positivo: Todas essas medicações utilizadas de forma adequada e no período correto evita a transmissão vertical da toxoplasmose para o RN. Já acompanhei várias gestantes que tinham esse agravo na gravidez onde foram tratadas no período da gravidez e as crianças nasceram bem sem nenhuma sequelas ou transmissão congênita. , Negativo: Algumas gestantes, uma minoria e raramente apresentaram emêse ao iniciar a medicação, mas depois foram sanados essa intolerância.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O procedimento adequado quando a sorologia para toxoplasmose IGM for reagente e o teste de avidéz for baixa inicia o tratamento da gestante imediatamente, conforme a idade gestacional direciona a medicação conforme o protocolo Estadual de Rondônia vigente., Positivo: No Município, o qual eu trabalho já avaliamos e solicitamos as sorologias de IGM e IGG para todas as gestantes, se caso IGM for positivo o Laboratório Central já faz o teste de avidéz, então conforme o resultado inicia o tratamento da gestante até o final da gravidez., Negativo: Até o momento não temos nenhum ponto negativo. As gestantes com sorologia IGM reagente são monitoradas e acompanhadas até o final da gravidez. Sendo disponibilizada as medicações pelo SUS através do programa Estadual de Toxoplasmose. E com isso temos diminuído esse agravo de toxoplasmose congênita em nosso Estado desde o ano de 2015.</p>
08/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Pelas repercussões e sequelas que a toxoplasmose pode gerar, sendo uma doença tratável facilmente com antimicrobianos com possibilidade de cura, a identificação precoce poderá beneficiar muitas famílias, não apenas o paciente, visto que as manifestações geram incapacidades crônicas, mudando a dinâmica familiar e inclusive afastando cuidadores de suas atividades empregatícias</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfadiazina, pirimetamina, ácido fólico, sulfametoxazol-trimetropim, diagnósticos presuntivos de imagem e diagnósticos por sorologia, Positivo: Cura e redução de sequelas, Negativo: Aplasia medular, revertida com suspensão temporária e aumento da dose de ácido fólico</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfametoxazol-trimetropim, Positivo: Tratamento em caso de falta da medicação que é primeira escolha, Negativo: Aplasia medular</p>
06/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Concordo pois nem sempre é possível detectar a doença através dos testes durante a gestação, e sem o diagnóstico não há tratamento. É importante destacar que alguns danos gerados por essa doença são irreversíveis, como o prejuízo ocular.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Importantíssimo, eficaz e prático</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pmaq, participante em pesquisas, Positivo: Pmaq-ciclos avaliativos na atenção básica. Efeito positivo: melhor organizacao do processo de trabalho com consequente qualidade da oferta de serviços Participantes em pesquisas científicas: melhor compreensão de conteúdos, novas informações, Negativo: Pmaq - utilizacao inadequada do recurso recebido Pesquisas: n houveram efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
06/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Somos uma região de alto índice de toxoplasmose</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: espiramicina, Positivo: bom controle terapêutico, Negativo: Gestantes não aderem adequadamente ao tratamento.</p>
06/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Acho que diagnósticos precoces são extremamente importantes para reduzir ou evitar as consequências de doenças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, É muito importante detectar doenças o mais precoce possível para evitar danos aos bebês</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Teste do Pezinho, Positivo: Minha filha foi diagnosticada com deficiência de Biotinidase graças ao teste do pezinho. Hoje ela faz a reposição da Biotina exógenas e vive uma vida normal. Se não tivesse sido diagnosticado precocemente, nós provavelmente só saberíamos quando ela já apresentasse sequelas., Negativo: Não acho que tenha efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
06/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Este teste será fundamental para o diagnóstico de crianças cujas mães se infectaram próximo ao parto ou que não tiveram o diagnóstico durante a gestação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Na rede privada já é utilizado há muitos anos, como teste do pezinho ampliado. , Positivo: Diagnóstico precoce, início de tratamento precoce, redução de sequelas oculares e neurológicas., Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sorologia convencional., Positivo: A sorologia convencional é utilizada para seguimento. , Negativo: Demora mais o resultado, depende de busca ativa e garantir o retorno do paciente. Também há varias metodologias, que necessitam maior conhecimento por serem difíceis de interpretação.</p>
07/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Diagnóstico e tratamento precoce são muito importantes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A falta de diagnóstico precoce para RN de mães positivas tem sido um viés no acompanhamento dessas crianças, principalmente, quando nascem sem sintomas. A obrigatoriedade do teste do pezinho, certamente possibilitará a intervenção em tempo de dar qualidade de vida a essas crianças.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Espiramicina é o esquema tríplice., Positivo: A reversão e/ou estacionamento das sequelas da infecção toxoplásmica., Negativo: Com relação a pirimetamina, alguns casos, por falta do ácido fólico, desenvolveram anemias graves.</p> <p>3ª - Não</p>
08/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou farmacêutica e professora de universidade pública. Participo de um grupo de pesquisa sobre Toxoplasmose e temos visto muitos casos de toxoplasmose gestacional. O teste do pezinho seria uma ferramenta diagnóstica útil para detectar a toxoplasmose congênita e permitir o tratamento adequado e precoce do RN, diminuindo assim as sequelas da doença., Positivo: Muitos casos de toxoplasmose congênita não são adequadamente diagnosticados durante a gestação. Muitos casos de toxoplasmose gestacional nem são diagnosticados na gestante, seja por que iniciou o pré natal tardiamente ou por falta as consultas e dificuldades e disponibilidade de testes para diagnóstico. Assim, o teste do pezinho seria uma ferramenta a mais de grande importância, no diagnóstico do RN., Negativo: N/C</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: No grupo de pesquisa que participo, fazemos diagnóstico por PCR do sangue da gestante e do líquido amniótico, qdo possível é permitida a coleta. Também fazemos inoculação em animais de laboratório. Porém são técnicas caras e nem sempre disponíveis. Em muitos casos o diagnóstico da mãe é duvidoso. O diagnóstico da toxoplasmose congênita se torna bem mais difícil de ser realizado durante a gestação., Positivo: NC, Negativo: N/C</p>
08/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o teste do pezinho e com o tratamento de toxoplasmose congênita, quando diagnosticada logo após o nascimento, em função de malformações que levaram à internação do recém-nascido em Uti neonatal., Positivo: A detecção precoce poderá diminuir o impacto da doença em si, mas também terá um efeito positivo para os pais e família do recém-nascido, os quais necessitam de muita orientação e tem o direito de saber o que acontece com seu filho., Negativo: Desconheço.</p> <p>3ª - Não</p>
08/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfadiazina, Pirimetamina, ácido folínico, Positivo: Tratamento adequado da doença, Negativo: efeitos negativos em relação a dificuldade de manipulação das medicações em crianças</p> <p>3ª - Não</p>
07/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A ampliação do teste do pezinho para detecção da toxoplasmose contribuirá muito para diagnosticar e tratar os casos de toxoplasmose congênita que não são diagnósticos no pré-natal devido a problemas como não solicitação das sorologias de todos os trimestres, infecção no último trimestre de gestação e dentre outros problemas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Tenho trabalhado desde o ano de 2003 com toxoplasmose gestacional/congênita , orientando pós graduandos, reciclando profissionais de saúde, criando ambulatório de gestação de alto risco, ambulatório de toxoplasmose na pediatria. enfim, buscando o lado científico alinhava à melhoria do diagnóstico e tratamento dos possíveis infectados. Temos certeza que esta inclusão é muito importante. Ainda que somos de uma universidade pública (UEM), onde realizamos alguns exames que são pesquisa mas que servem para o binômio mãe e filho, como a PCR, PRC real time, sei o quanto é importante incorporar oportunidades de diagnóstico mais rápido ao serviço público de saúde. Estamos à disposição.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: esquema tríplex, espiramicina, e produtos em experimento in vivo como a rosuvastatina e o in vitro Moringa oleifera, Positivo: Espiramicina para quantas vezes o diagnóstico é tardio, a gestante não sabia que estava grávida, procurou tardiamente o serviço. Outras vezes a morosidade do sistema público de saúde em efetuar a coleta, realizar o diagnóstico, então espiramicina, e quando há fraca avides, e até mesmo presença de DNA na gestante ou na criança, o esquema tríplex . Todos parecem contribuir muito na redução de sequelas. Pois nosso ambulatório pediátrico foi montado em agosto de 2018 no HUM/UEM e as crianças que ali são diagnosticadas infectadas não tem vindo das mães que foram acompanhadas diagnosticadas e tratadas em nosso ambulatório do mesmo hospital. Todavia, percebemos nitidamente que estes protegem mais da infecção. O esquema tríplex algumas vezes as mães tem efeito colateral mas acreditamos serem importantes. Um produto que vimos que reduziu a carga de DNA de T. gondii foi a rosuvastatina, em camundongos crônicos , tratados após 50 dias, o que poderia ser promissor com mais estudos a respeito, uma vez que já é de uso no mercado. Precisamos avançar em medicamentos capazes de destruírem os cistos, como em nível ocular, entre outros, Negativo: Alguns efeitos colaterais do esquema tríplex, necessidade de manipulação deste medicamento na forma líquida, para crianças, em curtos períodos de tempo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rosuvastatina, Positivo: redução da carga de DNA em cistos cerebrais de T. gondii. Este artigo está aceito. Fase cônica da doença, o que é um fato interessante. Testes in vitro com outros produtos, Negativo: Dose , custos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A toxoplasmose congênita é uma enfermidade grave e com um grande potencial de deixar sequelas. Se diagnosticada precocemente e tratada reduz sequelas e melhora a qualidade de vida da criança.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exames para diagnóstico e medicamentos para tratamento (sulfadiazina, pirimetamina, espiramicina), Positivo: Os medicamentos impedem a proliferação do protozoário e devolução da doença. , Negativo: Alguns medicamentos podem causar anemia ou outras alterações sanguíneas,mas esses efeitos são minimizados com o uso de ácido folínico</p>
06/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Necessario para prevenção de sequelas nos bebes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Em tratar pacientes com toxoplasmose congenita, Positivo: Necessário fazer teste do pezinho para tratamento precoce para evitar danos futuros, Negativo: Déficit visual, neurológico, auditivo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Em tratar toxoplasmose com sulfa, Positivo: Tratamento precoce evita danos principalmente neurológicos e oftalmologicos, Negativo: Insuficiência renal, hepatica</p>
07/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Testes sorológicos e de avidéz. Espiramicina, e outros, Positivo: Evitaram a transmissão vertical quando feitos em tempo hábil , Negativo: Custo e falta de disponibilidade na rede em alguns momentos</p>
03/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Importante mais este diagnóstico precoce</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, A toxoplasmose pode causar graves danos às pessoas .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a sorologia, Positivo: Fundamental para o diagnóstico precoce da toxoplasmose congênita , Negativo: Não há efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já respondido acima, Positivo: Já respondido acima, Negativo: Já respondido acima</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a sorologia, Positivo: Fundamental para o diagnóstico precoce da toxoplasmose congênita , Negativo: Não há efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já respondido acima, Positivo: Já respondido acima, Negativo: Já respondido acima</p>
04/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Devido às várias complicações graves e sequelas, creio que vale a pena o investimento, visando a identificação e tratamento precoce da enfermidade em questão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Muitas mulheres não realizam o pré natal ou tratamento para a doença oportuna e adequadamente, podendo ter a doença e transmitir ao filho, também não escutam falar das doenças nos serviços de saúde. O teste do pezinho ajudará a encontrar estas crianças a tratá-las mais rapidamente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu primo nasceu com a doença, tratou mas ficou com alterações oculares., Positivo: Ajudará a tratar as crianças mais cedo melhorando a qualidade de vida delas., Negativo: O posto de saúde demorar em dar o resultado para os pais das crianças.</p> <p>3ª - Não</p>
03/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Bom, a toxoplasmose tem sequelas importantes, os tratamentos existem para casos suspeitos e casos confirmados, e são bem ruins já que precisa macerar ou manipular. Se o teste do pezinho já é obrigatório e mais acessível, por favor, seria ideal testar a toxo ali também e já descartar ou confirmar os casos. Seria ótimo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ajudamos a construir a Nota Técnica Estadual de tratamento da toxoplasmose em Santa Catarina, e trabalhamos com a distribuição destes medicamentos às Regiões do Estado. Também, trabalhei na prefeitura, com pacientes e sabemos quanto é difícil que consigam exames, consultas e tudo mais. A toxoplasmose é silenciosa, então, muitas vezes não é cuidada como deveria, na gestação. , Positivo: Não utilizei, só estudamos sobre., Negativo: Sobre o tratamento da toxoplasmose em gestantes, há um importante agravante do MS: o MS disponibiliza somente uma parte do tratamento, o ácido fólico não é disponibilizado e muitos municípios não adquirem, pois o consumo é baixo. Então, as reações adversas esperadas para o esquema com pirimetamina e sulfadiazina é maior, e causa, entre outros, enjoo e mais mal estar em gestantes, o que aumenta muito o risco de abandono do mesmo tratamento e então, nascimento de bebês com toxoplasmose.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A toxoplasmose congênita é doença tratável durante a gravidez. 70% das mulheres jovens em idade fértil, no nosso meio já têm sorologia IgG positiva para toxoplasmose. A primoinfecção na grávida é o tipo de infecção que põem o feto em risco de malformações devido à toxoplasmose. O planejamento familiar deve ser discutido e reforçado em saúde pública. Qual a vantagem de se diagnosticar toxoplasmose congênita em recém nascido com provável sequela estabelecida. Triagem neonatal deve ser reservada a doenças que não apresentam sintomas ao nascimento. Colocar doença infectocontagiosa na triagem neonatal enfraquece o que pode ser feito no pré natal. Enfraquece o discurso sobre melhorias que devem ser implementadas no pré natal e no planejamento familiar. Aproveito para lembrar que o perfil tandem para erros inatos do metabolismo, esse sim, deveria ser implementado na triagem neonatal. Com relação a doenças infectocontagiosas fortalecer o pré natal, o planejamento familiar e a educação sexual.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfadiazina e pirimetamina para tratamento de toxoplasmose congênita, Positivo: O tratamento da toxoplasmose congênita em recém nascidos com poucas sequelas ou no início da progressão da doença pode trazer benefício no sentido de estacionar os sintomas, porém as sequelas instaladas são irreversíveis. Por isso o diagnóstico e tratamento deve ser feito ainda em idade fetal., Negativo: O tratamento da toxoplasmose congênita em recém nascidos com poucas sequelas ou no início da progressão da doença pode trazer benefício no sentido de estacionar os sintomas, porém as sequelas instaladas são irreversíveis. Por isso o diagnóstico e tratamento deve ser feito ainda em idade fetal.</p> <p>3ª - Não</p>
03/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O hiato existente entre a última sorologia diagnóstica do pré-natal e do nascimento que atualmente propicia a não detecção de toxoplasmose congênita será solucionada com a mãe incorporação, assim como para aquelas gestantes que não realizaram seu pré-natal, aumentado a chance de qualidade de vida do RN infectado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico; Rede diagnóstica para realizar sorologia oportuna no SUS Garantia de adesão do RN infectado a rede assistencial capacitada a sua necessidade., Positivo: Disponibilidade do medicamento pirimetamina e sulfadiazina no componente estratégico no SUS para tratar os infectados pelo parasita T.Gondii e reduzindo a ocorrência de sequelas se comparando aos não tratados. Dar maior visibilidade a este tema que já negligenciado a décadas. Comentar a organização dos gestores e rede de serviços de saúde para o tratamento dos doentes diagnosticados., Negativo: Ausência de oferta de formulas magistrais dos medicamentos necessários aos tratamentos dos RN no SUS e também na rede comercial. Ausência de financiamento no SUS para custeio de manipulação dos referidos medicamentos para tratar os RN infectados. Ausência da inclusão do ácido folínico também no componente farmacêutico estratégico. Desarticulação da rede assistencial para tratar os casos diagnosticados. Subfinanciamento de certos métodos diagnósticos no SUS, como teste de avidéz no pré-natal da mãe.</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, É levar à população as pesquisas realizadas pelo Ministério da Saúde .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Espiramicina, Sulfadiazina e Pirimetamina, Positivo: Melhora no tratamento e evitar a toxoplasmose congênita, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
03/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SulfadiazinaEspiramicinaPirimetaminaÁcido fólico, Positivo: Garantir o tratamento dos pacientes e evitar a toxoplasmose congênita, Negativo: Negativo apenas o ácido fólico não ser distribuído pelo Ministério da Saúde, pois muitos municípios não tem esta medicação, mesmo sendo de responsabilidade deles, deixando as vezes o paciente sem o tratamento completo</p> <p>3ª - Não</p>
03/01/2020	Secretaria Estadual de Saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sorologia realizada com a coleta do sangue total para análise do Igg e Igm, Positivo: A técnica utilizada consegue dar o diagnóstico com segurança, Negativo: Demora no resultado da análise</p> <p>3ª - Não</p>
03/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com o teste do pezinho., Positivo: O efeito positivo do teste do pezinho sendo ampliado para toxoplasmose seria ampliação do acesso ao diagnóstico precoce, principalmente nos casos que houve falha da detecção da toxoplasmose durante o pré natal., Negativo: ao meu ver não terá efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
02/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exames laboratoriais para diagnóstico de toxoplasmose, Positivo: Diagnóstico realizado precocemente permitindo o tratamento, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diagnóstico toxoplasmose congênita, Positivo: Precocidade no diagnóstico, Negativo: Sem efeitos negativos</p>
03/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O SUS precisa priorizar a prevenção e o tratamento precoce das doenças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/01/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A toxoplasmose congênita é uma doença infecciosa muito prevalente em território brasileiro. Suas complicações podem ser devastadoras em crianças nascidas com a doença, desse modo a identificação precoce da doença seria de extrema importância para o acompanhamento e tratamento nos nascidos infectados, evitando assim complicações futuras limitantes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Desde recém nascidos devemos ter acesso aos recursos de exames e vacinas, enfim, à medicina preventiva.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O Pre-natal deve cobrir essa avaliação, porém muitas vezes vemos gestantes com Pre-natal extremamente mal feito ou com carteirinha mal preenchida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sorologias para toxoplasmose, Positivo: Podendo saber a situação de infecção da criança podemos auxiliar o mais rapidamente possível, além de poder manejar sequelas e encaminhar para terapias auxiliares, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Poderemos detectar precocemente tantas más formações oriundas da toxoplasmose.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SulfadiazinaPirimetaminaEspiramicina, Positivo: Diminuição dos casos., Negativo: Anemia</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Detecção da toxoplasmose congênita., Positivo: Diagnóstico precoce, oportunidade de tratamento e redução das sequelas., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sorologia sérica para toxoplasmose., Positivo: Diagnóstico precoce, oportunidade de tratamento e redução das sequelas., Negativo: Nenhum</p>
05/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Pois caso a proposta seja aprovada, será possível monitorar e promover tratamento e acompanhamento adequados aos indivíduos acometidos pela doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Pois caso a proposta seja aprovada, será possível monitorar e promover tratamento e acompanhamento adequados aos indivíduos acometidos pela doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Muitas vezes a gestante não tem acesso a sorologia para toxoplasmose e ainda existe dificuldade dos profissionais de saúde em avaliar os testes de avidéz e sobre a conduta e a eficácia do tratamento, por vezes os RNs podem nascer assintomáticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Faz parte da minha rotina profissional trabalhar com prevenção</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não , Positivo: Não , Negativo: Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não , Positivo: Não , Negativo: Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Sou portadora de toxoplasmose congênita, deficiência monocular, digo por experiência própria o quanto é avassalador a infecção, quanto mais cedo o diagnóstico mais fácil a realizar o tratamento evitar os danos piores, cegueira ocular!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona 100 mg Bactrin 800 mg Alguns colírios -dexamentosa , Positivo: Consegui ver com menos dificuldade, Negativo: Retenção de líquidos!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona Bactrim , Positivo: Nitidez na imagem ocular , Negativo: Obesidade</p>
20/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Gostaria apenas de corroborar com a conclusão final do relatório da CONITEC apresentando a experiência do Distrito Federal. Realizamos desde 2012 a triagem para toxoplasmose congênita e diagnosticamos até 2018 146 casos de toxoplasmose congênita. A maioria das mães não realizou as sorologias de acordo com o preconizado pelo protocolo de pré-natal apesar dos exames serem ofertadas na carteira de serviços da atenção primária. Essas crianças são encaminhadas a consulta após o exame confirmatório (sorologia mãe e filho positivas). Na consulta, além do tratamento precoce, realiza-se o Fundo de Olho e a Tomografia de Crânio. Com esse exame, portanto, conseguimos tratar precocemente os casos de toxoplasmose congênita que não são diagnosticados pelo pré-natal e são assintomáticos ao nascimento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Triagem Neonatal para toxoplasmose congênita. , Positivo: A triagem proporcionou aos casos assintomáticos ao nascimento, ou seja, que não tem comprometimento neurológico ou sistêmico significativo, mas que possuem grande risco de lesão ocular, um diagnóstico precoce e prevenção da cegueira. , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
19/01/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Extremamente importante na prevenção de casos congênitos muito frequentes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A toxoplasmose congênita é uma doença negligenciada e de incidência relevante no país</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Espiramicina , Positivo: Triar no nascimento a infecção por toxoplasmose , Negativo: O possível atraso no resultado e na entrega do diagnóstico</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Será de suma importância a ampliação de mais 01 diagnóstico para as crianças.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Acompanhamento no tratamento das pacientes durante o PNRifampicina, Positivo: Diminuição da transmissão da patologia para o feto , Negativo: Que mesmo com o tratamento, tem probabilidade de transmissibilidade.</p> <p>3ª - Não</p>
19/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Doença infecciosa grave que pode ser tratada para evitar sequelas como cegueira</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfadiazina e pirimetamina, Positivo: Nas crianças assintomáticas evita o desenvolvimento de sequelas oftalmológicas e surdez., Negativo: Tratamento prolongado por 1 ano.</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Concordo com o rastreamento neonatal porém da forma como foi pensado penso ser ineficiente pois muitos municípios não tem condições de realizar as provas confirmatórias destes recém nascidos, pois muitos deles não possuem minimamente um laboratório. Sugiro que isto seja revisto e que o SRTN faça pelo menos as provas confirmatórias e só depois encaminhe as recomendações para tratamento na atenção básica e que ele retorne ao SRTN antes da alta do tratamento para ter certeza que esta tudo bem o a criança.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Realizamos triagem Neonatal em todos os recém nascidos de Goiás e já foi realizado um piloto para rastreamentos da toxoplasmose congênita., Positivo: o piloto mostrou que mesmo sendo rastreado a Toxoplasmose na gestante os bebês não eram seguidos nos municípios e muitos deles só foram tratados após o piloto., Negativo: o rastreamento identificou também casos falsos positivos.</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Com ampliação do teste do pezinho acredito que temos muito a ganhar com isso e população também, tendo a chance de ter um diagnóstico precoce e com isso um tratamento correto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Pois possibilita acesso a atendimento precoce.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, É de extrema importância que todas as famílias em especial os de baixa renda, tenham acesso ao exame ampliado para que o diagnóstico seja feito com antecedência junto ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Teste do pezinho ampliado, Positivo: A verificação ao nascer do teste possibilita um tratamento precoce e efetivo, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>
19/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EspiramicinaSulfafiazinaPirimetamina, Positivo: Controle parcial da transmissão vertical da toxoplasmose, Negativo: Náusea VômitoAplasia de medula</p> <p>3ª - Não</p>
21/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfadiazina e pirimetamina, Positivo: Controle da doença e dos agravos, Negativo: Nauseas e vomitos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/01/2020	Instituição de ensino	<p>1ª - Concordo, O Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi/ ISD funciona como centro de referencia para as gestantes com suspeita de toxoplasmose congênita no estado do Rio Grande do Norte desde 2012, e realiza seguimento clinico, exames de ultrassonografia e acompanhamento dos recém nascidos de maes com toxoplasmose provavel ou confirmadas, possuindo ampla experiencia no assunto em questao. Apesar de concordarmos com a ampliacao do rastreo de toxoplasmose congênita para os neonatos, porem fazemos algumas ressalvas sobre o tema: Primeiro, nos preocupa o tempod e realizacao e entrega do teste do pezinho, visto que na maioria dos municípios do RN, o tempo médio de entrega do teste é em torno de 3 a 4 meses, e assim, neste caso os beneficios da triagem seriam inviabilizados pela demora dos resultado dos testes. Não faz sentido ampliar os diagnósticos se nao garantirmos um tempo hábil de entrega dos exames. Acredito, que os estados que realizam os teste ampliado devem ter um tempo de entrega satisfatório visto os benefícios apresentados. Segundo, desde a criação deste serviço para as mães e RNs com toxoplasmose, apresentamos imensa dificuldade em conseguir os exames de avaliação dos recém nascidos possivelmente infectados, como oftalmologicos e exames cerebrais de imagens, o que prejudica o seguimento e tratamento. Também precisa haver a garantia de realizacao dos mesmos em conjunto com a ampliação do teste do pezinho. Terceiro, também enfrentamos imensa dificuldade de acesso ao tratamento para as crianças com possível toxoplasmose congênita ou confirmadas. Apesar da garantia da medicação para as gestantes no estado do RN, não há a garantia para os recém nascidos, além da falta de medicação na formulação farmacêutica adequada, o que leva a atrasos, erros de doses administradas e ate, a impossibilidade de tratamento. Seria necessário junto a ampliação ao diagnóstico, a garantia da medicação com instruções específicas da maceração, diluição e administração da medicação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi/ ISD funciona como centro de referencia para as gestantes com suspeita de toxoplasmose congênita no estado do Rio Grande do Norte desde 2012, e realiza seguimento clinico, exames de ultrassonografia e acompanhamento dos recém nascidos de maes com toxoplasmose provavel ou confirmadas, possuindo ampla experiencia no assunto em questao. Apesar de concordarmos com a ampliacao do rastreo de toxoplasmose congênita para os neonatos, porem fazemos algumas ressalvas sobre o tema: Primeiro, nos preocupa o tempod e realizacao e entrega do teste do pezinho, visto que na maioria dos municípios do RN, o tempo médio de entrega do teste é em torno de 3 a 4 meses, e assim, neste caso os beneficios da triagem seriam inviabilizados pela demora dos resultado dos testes. Não faz sentido ampliar os diagnósticos se nao garantirmos um tempo hábil de entrega dos exames. Acredito, que os estados que realizam os teste ampliado devem ter um tempo de entrega satisfatório visto os benefícios apresentados. Segundo, desde a criação deste serviço para as mães e RNs com toxoplasmose, apresentamos imensa dificuldade em conseguir os exames de avaliação dos recém nascidos possivelmente infectados, como oftalmologicos e exames cerebrais de imagens, o que prejudica o seguimento e tratamento. Também precisa haver a garantia de realizacao dos mesmos em conjunto com a ampliação do teste do pezinho. Terceiro, também enfrentamos imensa dificuldade de acesso ao tratamento para as crianças com possível toxoplasmose congênita ou confirmadas. Apesar da garantia da medicação para as gestantes no estado do RN, não há a garantia para os recém nascidos, além da falta de medicação na formulação farmacêutica adequada, o que leva a atrasos, erros de doses administradas e ate, a impossibilidade de tratamento. Seria necessário junto a ampliação ao diagnóstico, a garantia da medicação com instruções específicas da maceração, diluição e administração da medicação. , Positivo: Ampliar o diagnostico poderia diagnosticar crianças nascidas de mães não diagnosticadas e tratadas na gestação, representando um ganho para os recém nascidos e o sistema público de saúde, Negativo: Como exposto anteriormente, enfrentamos imensa dificuldade de realizar exames nos casos suspeitos, possíveis e confirmados de toxoplasmose congênita e na disponibilização da medicação, fatos que devem ser levados em consideração no planejamento.</p> <p>3ª - Não</p>
21/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
20/01/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
20/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Sim, é mais que necessário ampliar o diagnóstico para identificação o quanto antes do RN com toxoplasmose congênita. O pré-natal infelizmente não cumpre seu papel nesta detecção precoce e prevenção de transmissão vertical, 1) ainda nem todas as gestantes fazem pré-natal, 2) das gestantes que fazem pré-natal, o exame para toxoplasmose não é solicitado em alguns casos, em outros não é realizado oportunamente (ou é realizado apenas um antes da infecção ou no parto) não permitindo oportunidade para o tratamento 3) quando gestantes são detectadas, inúmeras vezes não há interpretação correta, nem tratamento adequado.. A contaminação pelo Toxoplasma Gondii é muito frequente, mas o diagnóstico muito fragilizado e as crianças merecem ser detectadas para definição do tratamento o quanto antes. 2ª - Não 3ª - Não
20/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
20/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EspiramiciaSulfafiazinaPirimetamina, Positivo: Controle parcial da transmissão vertical da toxoplasmose, Negativo: Náusea VômitoAplasia de medula 3ª - Não
20/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, O agravo pode trazer grandes transtornos para a pessoa/família acometida, por isso, o quanto antes é diagnosticado melhor será para propiciar tratamento adequado. 2ª - Não 3ª - Não
20/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EspiramiciaSulfafiazinaPirimetamina, Positivo: Controle parcial da transmissão vertical da toxoplasmose, Negativo: Náusea VômitoAplasia de medula 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Detecção de IgM para toxoplasmose na triagem neonatal em hospital da rede privada de Belo Horizonte. , Positivo: Diagnóstico precoce , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
03/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a sorologia, Positivo: Fundamental para o diagnóstico precoce da toxoplasmose congênita , Negativo: Não há efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já respondido acima, Positivo: Já respondido acima, Negativo: Já respondido acima</p>
03/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Há inúmeras possibilidades de averiguar outras patologias do RN através do teste do pézinho ampliado (10 a +48 doenças). Acredito que a Atenção Básica é a chave para alavancar a qualidade da saúde no Brasil. Logo, o investimento em infraestrutura Laboratorial nas instituições públicas federais seria a médio prazo uma alternativa em oferta o exame mais elaborado e com certificação para o melhoramento desse tratado investigativo por patologias logo ao nascer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Por que é um diagnóstico preciso no período neonatal. Hoje mesmo as mães que são tratadas na gestação para toxoplasmose, independente da idade gestacional e a droga utilizada, os neonatos, sintomáticos ou não, lembrando que a maioria desses serão assintomáticos, tem indicação de tratamento e que caso não tratados podem, ao longo dos primeiros anos de vida podem apresentar graves comprometimentos oftalmológicos e neurológicos entre outros e portanto são submetidos a diversos exames e tratamento pois a confirmação baseada em pesquisa de imunoglobulinas para a não introdução desses procedimentos podem decorrer tempo considerável. Vale lembrar que são drogas altamente agressivas, que precisam de doses eficazes e magistrais e que neonatos que talvez não tenham necessidade de tratamento venham utilizar tais condutas. Portanto um diagnóstico mais precoce e seguro poderia evitar toda essa conduta.O diagnóstico precoce melhora a qualidade de vida das crianças comprometidas, reduzindo a gravidade dos sinais e sintomas, os custos com o tratamento integral dos casos e o número de óbitos. Esse procedimento poderá apoiar a racionalização dos gastos públicos com assistência médico hospitalar e tratamento integral da doença. Vale comentar que o tratamento correto das crianças conduz posteriormente ao aumento da força de trabalho do país enquanto que o adocimento poderá aumentar os gastos públicos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A experiência que estou tento é o conhecimento mais aprofundado sobre a patologia no sentido amplo.É conhecer como estava sendo feito a conduta clínica nas gestantes e em RN e locais de atendimento.A obrigatoriedade das notificaçõesExperiências nas discussões a nível nacional.Na implantação do teste de avidez no nosso LACEN estadual. Enfrentamento nos surtos e condutas nesses casos.Implantação no estado do recebimento, armazenamento e distribuição e controle dos medicamentos: Pirimetamina, Sulfadiazina e Espiramicina aos municípios.Implantação da nota técnica nacional e estadual sobre diagnóstico e tratamento da toxoplasmose gestacional e congênita.Realização da primeira capacitação no estado sobre a patologia., Positivo: Conhecimento adquirido.A organização do trabalho no estado.A melhora no diagnóstico e tratamento da gestante.A melhora nas notificações.O interesse dos profissionais de saúde em manter condutas adequadas., Negativo: Não temos na rede acesso rotineiro, sempre que necessário da pesquisa de toxoplasma em líquido amniótico.Teste de avidez para muitos municípios ainda é um problema.Concentração em doses magistrais e eficiente para neonatos e crianças é o maior problema atualmente principalmente nos hospitais maternidades.O diagnóstico de toxoplasmose em RN também é um grande problema a ser enfrentado.As análises dos resultados laboratoriais e condutas a serem aplicadas em gestantes, neonatos e crianças continuam sendo aplicadas de forma inconsistentes. Os profissionais de saúde ainda não possuem total segurança em utilizá-las. Um medo constante.</p> <p>3ª - Não</p>
15/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ESPIRIMICINA E ACIDO FOLINICO. , Positivo: ESTOU GESTANTE. DESCOBRI A CONTAMINAÇÃO COM 24 SEMANA DE GESTAÇÃO E LOGO INICIEI O TRATAMENTO. PENSO QUE OS EFEITOS SERÃO POSITIVOS PELO FATO DE EVITAR O DIMINUIR A CHANCE DE PASSAR A DOENÇA PARA O BEBE E AFASTAR SEQUELAS FUTURAS., Negativo: ENTENDO NAO TER EFEITOS NEGATIVOS.</p> <p>3ª - Não</p>
20/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Doença de poucos sintomas, mas ao chegar à manifesta-los jase encontra em estágio delicado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A toxoplasmose congênita não se adequa aos critérios clássicos de triagem neonatal. O dano neurológico ocorre anteriormente ao nascimento e o diagnóstico e tratamento devem ser pre-natais (o sistema de saúde pública no Brasil prevê esta triagem no pré-natal, pelo SUS).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Triagem neonatal para toxoplasmose em rede privada, Positivo: Não observados, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diagnóstico pré natal, Positivo: Tratamento da gestante e abordagem imediata do RN ainda na maternidade. Sem atraso de tempo tempestivo para tratamento e sem custos de busca ativa, Negativo: Falso positivo ocasional. Pode também ocorrer na triagem neonatal.</p>
12/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfadiazina, piremetamina, sulfametaxazol, trimetropim e prednisona, Positivo: Cicatrização de retinocoroidite, Negativo: Vários</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfadiazina, piremetamina, sulfametaxazol, trimetropim e prednisona, Positivo: cicatrização de retinocoroidite, Negativo: Vários</p>
11/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Diagnóstico precoce, fase inicial aguda melhora resposta terapêutica evitando cegueira.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Problema grave de saúde pública. Maior prevalência do que muitas outras doenças e muitas vezes de modo assintomático. O diagnóstico precoce dará chance de reabilitação. Brasil é campeão mundial de baixa acuidade visual por toxoplasmose</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Espiramicina. Sulfadiazina. Pírimetamina. Ácido fólico, Positivo: Redução de danos. Com todas as drogas usadas no arsenal terapêutico da toxoplasmose congênita, Negativo: Espiramicina - raros. Esquema triplice sulfadiazina pirimetamina ácido fólico - anemia, alergia.</p> <p>3ª - Não</p>
10/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Menor custo e viabilidade de realização em qualquer maternidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sorologia sanguínea, ecografia cerebral, fundoscopia, Positivo: métodos precisos para diagnóstico., Negativo: Necessário profissionais especialistas para realizar os exames</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eco cerebral, fundoscopia, sorologia, Positivo: Diagnóstico e tratamento, Negativo: Alto custo</p>
10/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A detecção precoce impactará nos custos sociais sobretudo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Espiramicina 1 g 8/8 h até 20 semanas de gestação. sulfadiazina 1 g 6/6h + pirimetamina 50 mg 24/24h + ácido fólico 15 mg a partir da semana 21 de gestação, Positivo: Eficácia terapêutica no adulto, Negativo: Relação diagnóstico/início da terapia</p>
12/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Sabemos que a Saúde Pública em nosso país deixa muito a desejar. Apesar de alguns terem acesso às informações e aos programas de saúde, poderemos diminuir para um grupo de pessoas esses danos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Importante para detecção precoce da toxoplasmose congênita, possibilitando as condutas terapêuticas oportunamente e redução de complicações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Triagem em papel filtro para a gestante., Positivo: Diagnóstico oportuno da toxoplasmose gestacional e tratamento durante a gravidez reduzindo a toxoplasmose congênita., Negativo: Não há.</p>
12/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirazinamoda, Positivo: Tratamento eficaz, Negativo: Dificuldade no diagnostico</p>
09/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Esse teste já deveria ter sido implementado há vários anos.Pois é de suma importância a detecção da toxoplasmose congênita o mais precocemente possível a fim de administrar o tratamento. Desta forma poderão ser evitadas as sequelas da infecção e quiçá evitar óbitos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Quanto mais cedo o diagnostico,mais rapido o tratamento , com isso evitaremos os transtornos decorridos da doença em fase adulta</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A realização favoreceria o acesso dos usuários</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfadiazina, Pirimetamina, Clindamicina. Injeção intravítrea de corticosteroides. , Positivo: Tratamento do agente etiológico com minimização da área de lesão. , Negativo: Plaquetopenia, distúrbios gastrointestinais, entre outros.</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, quanto antes houver a detecção maior a chance de reduzir sequelas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Esse teste possibilitará o diagnóstico precoce dos recém-nascidos e início de tratamento oportuno, quando o tratamento ainda pode oferecer o benefício necessário à regressão das das lesões diagnosticadas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Espiramicina, Pirimetamina, Sulfadiazina, Ácido Fólico Teste de avidéz de IgG Sorologia para Toxoplasmose, Positivo: Essas drogas são eficazes, evitando a proliferação do Toxoplasma. O teste de avidéz auxilia na tomada de decisão, tratando nos casos indicados, evitando o tratamento desnecessário da gestante que contraiu a doença anteriormente à gestação, conforme o período preconizado. Os testes sorológicos permitem o diagnóstico precoce da doença na gestação., Negativo: Quanto à pirimetamina, destacaria o efeito teratogênico que contraindica seu uso antes das 16 semanas de gestação e os efeitos colaterais para os recém-nascidos em tratamento. Quanto aos exames, existem dificuldades na correta interpretação dos resultados. Os testes sorológicos poderiam ser realizados com intervalos menores, principalmente nas gestantes suscetíveis. Por exemplo, se uma gestante suscetível teve uma viragem sorológica não detectada nas últimas semanas de gestação, ela vai chegar na maternidade sem conhecer essa informação. Daí a necessidade do serviço em testar sistematicamente a mãe e o recém-nascido para Toxoplasmose, realizando a triagem neonatal completa, considerando que a Toxoplasmose congênita contempla os requisitos para ser incluída nessa triagem.</p>
15/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Ajudará em muito no apoio as famílias, para o diagnóstico e tratamento se precisar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou gestante, e descobri a infecção da Toxoplasma com aproximadamente 24 semanas de gestação. Iniciei o tratamento com Espiramicina e ácido fólico. , Positivo: Estou sendo encaminhada para gravidez de alto risco, ainda não tive essa avaliação. Penso que o tratamento irá afastar ou diminuir o risco de passar a doença para o meu bebê. , Negativo: Não considero que os medicamentos tenham efeitos negativos. Pelas pesquisas e pareceres médicos eles contribuem para a saúde minha e do feto.</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
12/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Sabemos que a Saúde Pública em nosso país deixa muito a desejar. Apesar de alguns terem acesso as informações e aos programas de saúde, poderemos diminuir para um grupo de pessoas esses danos. 2ª - Não 3ª - Não
14/01/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, Rrelevancia do diagmsotico precoce. 2ª - Não 3ª - Não
16/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isolamento de t. gondii em órgãos de suinos em camundongos, Positivo: Obtivemos resultados de várias cepas de t. gondii no semiárido e com alta virulência. , Negativo: A população está altamente exposta a contaminação pelo protozoário. 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Concordo e apoio a inclusão da sorologia para toxoplasmose ao teste do pezinho. Cabe destacar que a crença de que uma infecção crônica não leva à transmissão congênita tem gerado descaso com gestantes portadoras de infecção crônica, o que não ocorreria se a soroconversão tivesse ocorrido na gestação. Um paradigma da imunidade descrita na infecção por <i>T. gondii</i> está já foi revisto, pois além da reagudização, pode ocorrer também a reinfeção, caracterizada como exposição a um grande número de parasitos da mesma cepa ou cepa com genótipo diferente da primo-infecção. Assim um documento importante como o que esta sendo gerado, não pode manter o falsa e perigosa afirmação que as mulheres sororeagentes estão protegidas. “identificar gestantes que foram infectadas antes da gestação e que não trazem risco para o feto – mulheres imunes podem ser tranquilizadas e não precisam realizar novas sorologias” (39). Pg 15 do relatório técnico.A atenção primaria visando o esclarecimento das ações que devem ser tomadas por todas as gestantes é de suma importância, como o acompanhamento sorológico, pois o aumento das concentrações de IgG, podem ser indicativos de reagutização e/ou reinfeção.Algumas referências sobre o exposto. (GAVIANET et al., 1997; JENSEN et al., 2015; REZENEZHAD, et al., 2017,). GAVIANET M.F.; ROBERT, F.; FIRTION, G.; DELOUVRIER, E.; HENNEQUIN, C.; MAURIN, J. R.; DUPOUY-CAMET, J.; Congenital toxoplasmosis due to maternal reinfection during pregnancy.Journal of clinical microbiology. v. 35, n.5, p.1276–1277, 1997.JENSEN, K.D. C; CAMEJO, A.; MELO, M.B.; CORDEIRO, C.; JULIEN, L.; GROTENBRE, G.M; FRICKEL, E.; PLOEGH, H. L.; YOUNG, L.; SAEJI, J. P. J.; Toxoplasma gondii superinfection and virulence during secondary infection correlate with the exact ROP5/ROP18 allelic combination. American Society for Microbiology, v. 6, p. 02280-14, 2015REZENEZHAD, H.; SAYADI, F.; SHADMAND, E.; NASAB, S.D.M; YAZDI, H.R.; SOLHJOO, K.; KAZEMI, A.; MALEKI, M.; VASMEHJANI, A. A. Seroprevalence of Toxoplasma gondii among HIV Patients in Jahrom, Southern Iran. Korean Journal Parasitology, v. 55, n., p. 99–103, 2017AVELAR JB, REZENDE HHA, STORCHILLO HR, CANDIDO RRL, AMARAL WN, AVELINO MM, CASTRO AM. Reativação da toxoplasmose durante o oitavo mês de gestação. Renome 4: 57-69, 2015.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Concordo plenamente, pois será um teste muito importante para evitar sequelas graves da Toxoplasmose em bebês.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com testes sorológicos para detecção de <i>Toxoplasma gondii</i> em gestantes, Positivo: As técnicas sorológicas e imunológicas são positivas para detectar infecções pelo <i>T. gondii</i> de forma precoce durante a gestação e realizar formas de prevenção, a fim de evitar que a gestante se infecte durante a gestação, diminuindo os riscos de uma infecção congênita., Negativo: Como efeitos negativos poderíamos citar o desconforto da coleta de sangue para os bebês principalmente, por isso a triagem no teste do pezinho seria uma forma de diminuir esses danos.</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Seria muito importante a proposta de ampliação do uso do teste do pezinho para a detecção da toxoplasmose congênita. Seria mais um exame que possibilita a detecção precoce da toxoplasmose congênita para o tratamento em tempo oportuno da criança. Por questões de orçamento estadual, não conseguimos garantir recurso para este exame de rotina para todas as crianças do estado do RS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sou responsavel pela coleta do exame do pezinho no meu municipio, Positivo: muito bom, Negativo: não percebi
13/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento da toxoplasmose, Positivo: Evitar cegueira, Negativo: Retardar diagnostico e tratamento 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trato toxoplasmose incluindo toxo congenita, Positivo: Evitar cegueira, Negativo: Complicacoes
14/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Espiramicina, sulfadiazina, ácido folínico, Positivo: Resolução do quadro da doença , Negativo: não 3ª - Não