

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Rifapentina + isoniazida para Infecção Latente pelo Mycobacterium tuberculosis (ILTB) - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, rifampicina, Positivo: Sem evento adverso, Negativo: Baixa aderencia
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: NHZ, Positivo: Tratamentos de 1 ano e de 6 meses para contatos com bons resultados e poucos efeitos colaterais ( desprezíveis) , Negativo: Desprezíveis 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: NHZ, Positivo: acima , Negativo: Acima
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Vai aumentar a adesão 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Utilizei em profissionais da saúde com TB latente , Negativo: Não tive
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Encurta o tempo de tratamento 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INH, Positivo: Baixa toxicidade , Negativo: Tempo longo de tratamento 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIPE, Positivo: C, Negativo: MUITO TEMPO DE TTO, SENDO QUE MUITOS PCTES PERDEM O SEGUIMENTO
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Reduzir significativamente o tempo de tratamento. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os atuais medicamentos , Positivo: Boa resposta, Negativo: Tempo longo com baixa adesão
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida para ILTB, rifampicina para ILTB , Positivo: Evitar tuberculose , Negativo: Neuropatia , alergia , dificuldade adesão uso diário
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Proporcionará tratamento mais curto da ILTB, com doses semanais, com possível efeito positivo na adesão ao tratamento e prevenção da ativação da TB. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida / Rifampicina no tratamento da ILTB, Positivo: Rifampicina suspensão para crianças - melhor aceitaçãoAmbos os tratamentos quando completos - não houve reativação para tuberculose doença, Negativo: Tempo longo de tratamento com risco maior para abandono. Episódios de reações medicamentosas.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Precisamos tratar a os pacientes urgentemente! 2ª - Sim, como paciente, Qual: TBC vi, Positivo: Resultados de recuperação total da doença!, Negativo: Leve dor epigástrico. 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou infectologista e trabalho com tratamento de TB e HIV, além de TBMDR, Positivo: ..., Negativo: ...
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, O tratamento da infecção latente realizado atualmente é longo e com muitas doses. A incorporação da rifapentina irá melhor a adesão dos pacientes. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicinasoniazida, Positivo: Eficácia, Negativo: Tempo de tratamento logo e com muitas doses.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida,rifapentina, , Positivo: Maior adesão, menor tempo de tratamento, Negativo: Não verifiquei 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida e rifapentina, Positivo: Menor tempo de tratamento e melhor adesao, Negativo: Não verifiquei

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, melhorar a adesão (cai o tempo de tratamento de 180 a 270 doses para 12!) 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Prevenção de tuberculose com bons resultados. E se fizer a associação será melhor ainda, Negativo: Nenhum 3ª - Não
26/03/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, O TRATAMENTO DA ILTB É MUITO IMPORTANTE PARA O CONTROLE DA TUBERCULOSE EM TODO O MUNDO, ESPECIALMENTE NO BRASIL.A RIFAPENTINA ASSOCIADA À ISONIAZIDA ENCURTA O PERÍODO DE TRATAMENTO DA ILTB DE 6 PARA 3 MESES, FACILITANDO A ADESÃO DO PACIENTE E AUMENTANDO A PROPORÇÃO DE PESSOAS COM ILTB QUE COMPLETAM O TRATAMENTO.A INCORPORAÇÃO DA RIFAPENTINA AO ARSENAL TERAPÊUTICO PARA ILTB FOI EXITOSA EM MUITOS PAÍSES QUE A ADOTARAM - PORTANTO HÁ LARGA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL SINALIZANDO A IMPORTÂNCIA DESSE FÁRMACO NA ESTRATÉGIA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ISONIAZIDA - UTILIZADA COMO TRATAMENTO DE ILTB - MAS QUE APRESENTA UM SÉRIO PROBLEMA DE ADESÃO Á COMPLETITUDE DO TRATAMENTO POR NECESSITAR DE 6 A 12 MESES DE USO DIÁRIO DO FÁRMACO.JÁ O REGIME DE TRATAMENTO DA ILTB CONTENDO RIFAPENTINA PERMITE O ENCURTAMENTO DO TEMPO DE USO EM APENAS 12 DOSES DO MEDICAMENTO (UMA VEZ POR SEMANA POR TRÊS MESES., Positivo: A ISONIAZIDA É IMPORTANTE NO TRATAMENTO DA ILTB, MAS JÁ FOI SUPERADA PELAS IMENSAS VANTAGENS DO REGIME CONTENDO RIFAPENTINA. A RIFAPENTINA REVOLUCIONOU O TRATAMENTO DA ILTB - COM A FACILIDADE DE OPERACIONALIZAÇÃO EM PAÍS CONTINENTAL COMO O BRASIL, Negativo: ATUALMENTE, CONSIDERANDO AS IMENSAS VANTAGENS DO REGIME CONTENDO RIFAPENTINA, NÃO É MAIS JUSTIFICÁVEL COM PAÍS CONTINENTAL COMO O BRASIL UTILIZAR A ISONIAZIDA COMO TRATAMENTO ÚNICO PARA ILTB.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhorar adesão do tempo de tratamento 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Melhoras a longo prazo, Negativo: Uso prolongado 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: isoniazida, Positivo: Paviente obteve melhora, Negativo: longo tempo de uso

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Tratamento com tempo encurtado e ter a melhor adesão ao tratamento da ILTB.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida de 100mg, Positivo: Largamente utilizado há décadas. Mas com período de tratamento de 6 meses a 9meses. Portanto adesão baixa ao tratamento ., Negativo: Adesão baixa ao tratamento da ILTB. Pelo período do tempo.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicinalsoniazida EtambutolPirazinamida, Positivo: Tratamento da tuberculose com melhora dos sintomas e diminuição do contagiosa , Negativo: Intolerancia gastrointestinalToxicidade hepática</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida e rifampicina, Positivo: Debelar a infecção e curar 100%, Negativo: Duração prolongada e epigastralgia</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A rifapentina permitirá melhorar a adesão dos pacientes ao tratamento, com a redução do número de doses.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida e Rifampicina., Positivo: Possui perfis de tolerabilidade e segurança bem definidos., Negativo: Longo tempo de uso para a ILTB, de 4 a 9 meses.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Maior adesão ao tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, etambutal, terizidona, capreomicina, moxifloxacino, linezolida, Positivo: Os medicamentos são guisados para cada tipo de tratamento, esquema básico de tratamento da tuberculose a resistência , Negativo: Capreomicina pode estar associado a piora da função renal</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida e rifampicina , Positivo: Tratamento funciona , Negativo: Tempo de tratamento prejudica muito adesão e atrapalha eficácia real</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Para melhor adesao ao tratamento da ILTB.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida 100 mg, Positivo: Tratamento há décadas utilizado , Negativo: O tempo de administração longo 6 meses.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Eficacia, Negativo: Tempo de uso e numero de doses</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rifapentina, Positivo: Melhorar a adesão (cai o tempo de tratamento de 180 a 270 doses para 12!), Negativo: _</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rhze, I, Positivo: 100% de Cura , Negativo: Tempo muito prolongado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RHZE, I, Positivo: 100%cura, Negativo: Tempo muito prolongado</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, isoniazida e pirazinamida e etambutol, Positivo: Tratamento da tuberculose, Negativo: Abandono de tratamento</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ISONIAZIDA , Positivo: Recuperação rápido do paciente, Negativo: Efeito colateral leve</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Penso que com o tratamento da ILTB, poderemos diminuir os futuros casos de TB</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Nenhum paciente queixou reação adversa, Negativo: A isoniazida o tempo de tratamento é longo</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Proporcionará tratamento mais curto da ILTB, com doses semanais, com possível efeito positivo na adesão ao tratamento e prevenção da ativação da TB.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida / Rifampicina no tratamento da ILTB, Positivo: Rifampicina suspensão para crianças - melhor aceitação Ambos os tratamentos quando completos - não houve reativação para tuberculose doença, Negativo: Tempo longo de tratamento com risco maior para abandono. Episódios de reações medicamentosas.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Poucos efeitos colaterais, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Poucos efeitos colaterais, Negativo: Não teve</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com pacientes vivendo com HIV e internados com TB, Positivo: Menor tempo e menos efeitos colaterais., Negativo: Neuropatia periférica. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RHZE, Positivo: Isoniazida., Negativo: Isoniazida.Neuropatia periférica.. Rifampicina.Icterícia
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Bom, Negativo: Nada
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Essa recomendação viabiliza uma redução do tempo de tratamento, otimizando a adesão dos pacientes. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina e Isoniazida, Positivo: Rifampicina: eficaz, mais bem tolerada e tempo menor de tratamento.Isoniazida: eficaz., Negativo: Isoniazida: tempo longo de tratamento, efeitos colaterais frequentes levando muitas vezes a abandono de tratamento, hepatite medicamentosa.Rifampicina: tempo de tratamento longo, embora melhor do que Isoniazida, efeitos colaterais.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Ampliar as opções de drogas na prevenção da ILTB é contribuir diretamente para reduzir a incidência e a mortalidade por uma doença tratável 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida; PPD, Positivo: Isoniazida : droga única, custo baixo. PPD-- custo baixo e acessível para facilitar o diagnóstico de ILTB, Negativo: Isoniazida-- forma farmacêutica única. PPD-- poucos profissionais capacitados para aplicar ler
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida Rifampicina (1 caso de intolerância à Isoniazida)., Positivo: Bem tolerados e com boa resposta., Negativo: Duração prolongada do tratamento com risco de baixa adesão.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Boa tolerância , Negativo: Longo tempo de tratamento e muito abandono

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Boa eficácia na ILTB, Negativo: Poucos efeitos colaterais
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Auxiliaria a adesão ao tratamento 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida isolada para TILTB, Positivo: Poucos efeitos colaterais, Negativo: Pouca adesão devido ao longo tempo de tratamento 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina isoladamente para TILTB, Positivo: Menor tempo de tratamento em relação a isoniazida isolada, Negativo: Efeitos colaterais da medicação
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Tratamento ILTB, Negativo: Hepatotoxicidade, tempo de tratamento 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Importante para o paciente aderir e bons resultados 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inh, Positivo: Boa resposta, Negativo: Tempo prolongado de uso , efeitos secundários
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Diminui o tempo de tratamento, o que melhora a adesão do paciente 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RifampicinaIsoniazida PirazinamidaEtambutol , Positivo: Eficácia no tratamento se boa adesão ao tratamento , Negativo: Demora no tratamento
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Número de doses 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tto pra TBRifampicina + isoniazida, Positivo: A utilização continua diminui a possibilidade de outras doenças oportunistas , Negativo: O longo tempo de uso
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina Isoniazida, Positivo: Eficácia do tratamento , Negativo: Não percebidos 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Adequada eficiência nos pacientes com ILTB, Negativo: Um único episódio de elevação de transaminases com melhora após suspensão do fármaco.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, Positivo: Otimização do tratamento para 4 meses. , Negativo: Não recorde de evento negativo associado ao fármaco.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: o uso de tratamento para ILTB na redução de chances de adoecimento por TB na população mais vulnerável com um tratamento encurtado comparado ao que temos hoje disponível , Negativo: Hetotoxicidade e maior tempo de tratamento</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Melhor adesão ao tratamento por parte dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, isoniazida e pirazinamida , Positivo: Sou pediatra e na minha área não tenho queixas de tanto efeito colateral, apenas de dificuldade na administração , Negativo: Dificuldade na adesão ao tratamento de crianças</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A redução do tempo de tratamento será importante para adesão do tratamento e consequentemente eficácia do tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquemas básico e especiais do tratamento de TB, Positivo: São esquemas com eficácia consolidada., Negativo: Riscos de reação adversa são altos pelo tempo de exposição. Adesão é baixa visto a carga diária de comprimidos diária e o tempo de tratamento prolongado.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RifampicinaIsoniazidaEtambutolPirazinamida, Positivo: Eficacia comprovada, Negativo: Efeitos colateraisTempo de tratamentoNumero elevado de doses necessarias para completar o tratamento</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Tratamento com tempo encurtado e ter a melhor adesão ao tratamento da ILTB.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: É largamente utilizada no tratamento da ILTB, Negativo: Tempo muito prolongada com baixa adesão ao tratamento</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Menor tempo de tratamento, melhorando adesão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, A redução das doses melhora a aderência ao tratamento, garantindo maior êxito para o tratamento completo. 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhorara a adesão (cai o tempo de tratamento de 180 a 270 doses para 12!) do paciente ao tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhora na aderência ao tratamento, tendo em vista doses preconizadas 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Potência , Negativo: Duração do tratamento
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: isoniazida e rifapentina, Positivo: menor tempo de tratamento, menores eventos adversos e maior adesão, Negativo: neuropatia e hepatopatia com isoniazida 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIPE , Positivo: boa respota clínica, Negativo: intolerância gastrointestinal com RIPE
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Reduz tempo de tratamento Melhora a adesão do paciente 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Isoniazida, Negativo: Residência e efeitos colaterais
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, O acesso universal dessas medicações pelo o SUS é muito importante para o tratamentos das pessoas adoecidas. 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Concordo plenamente será um grande avanço para a prevenção da tuberculose 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Efeito positivo medicamento muito eficaz para tratamento preventivo de tuberculose, muito estudado porém tempo muito prolongado para este fim, Negativo: Necessidade de tempo prolongado quando em monoterapia. Associado a rifapentina reduzirá bastante o tempo de tratamento preventivo conseguindo maior adesão e consequentemente maior eficiência e eficácia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquemas utilizados atualmente pois trabalho na referência terciária em controle de tuberculose do meu estado, Positivo: Eficácia dos tratamentos , Negativo: Necessidade de tempo prolongado de terapia tanto para prevenção quanto para tratamento
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Bem mais prático para os pacientes, além da diminuição do número de comprimidos. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pacientes portadores de HIV e ILTB., Positivo: Ótima efetividade( isoniazida)., Negativo: Discreta náusea. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina e Etambutol, Positivo: Eficácia., Negativo: Náuseas.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Irá diminuir bastante o tempo de tratamento para a ILTB, o que vai melhorar muito a adesão ao tratamento. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Boa eficácia ao tratamento. , Negativo: Tempo de tratamento muito prolongado, o que diminui a adesão ao tratamento
14/04/2020	Paciente	1ª - Concordo, Menor toxicidade. 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Eficaz na indicação de profilaxia, Negativo: Dificuldade posológica e náusea 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida sozinha, Positivo: Facil dosagem diaria, Negativo: Longo tempo e efeito colateral
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Redução de tempo de tratamento aumenta a adesao 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida e Rifampicina para tratamento de iltb, Positivo: Bons tratamentos, porem longos o que dificulta a adesao, Negativo: Tratamentos longos
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhora da adesão ao tratamento 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Por diminuir o tempo de tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhor adesao 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rifampicinalsoniazida, Positivo: Tratamento eficaz quando realizado por tempo adequado , Negativo: Tempo prolongado de tratamento

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INH - Na infecção latenteRMP/PZA/EMB/SM/INH / ofloxacino/ Levofloxacino/capreomicina - nas formas de TB , Positivo: Cada uma tem efeitos positivos específicos . , Negativo: Intolerância gástrica / Hepatite medicamentosa/ Alergias/ Resistência
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Facilidade administração , interação Tarv , Negativo: Não tive experiência negativa
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Encurta significativamente o tempo de tratamento 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Reduz sensivelmente o tempo de tratamento 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhora da adesão 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Redução da reativação de micobacterium tuberculosis, Negativo: NeuropatiaTempo de tratamento/ adesão
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Controle da tuberculose latente, Negativo: Hepatite medicamentosa
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Tto de iltb, Negativo: Tempo de tratamento
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Melhora da adesão com rifapentina pela diminuição do número de doses, Negativo: Problemas da adesão com uso do isoniazida isolado pelo tempo de trato 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Diminuição do número de doses com rifanpentina melhorando a dedão do paciente, Negativo: Número elevado de doses com ISONiazida dificultando adesao
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Li o estudo. Pode ser alternativa para adesão ao tto dos pacientes. Geralmente o tratamento da ILTB é abandonado. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a Isoniazida, Positivo: A isoniazida tem bom resultado. O tratamento mínimo de seis meses, diariamente., Negativo: Tratamento longo e muitos comprimidos. Difícil adesão principalmente qdo o paciente é criança.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, É o melhor esquema pra esta prevenção 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Proteção contra doença TB, Negativo: Longo período de tratamento com baixa adesão dos pacientes
14/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhor adesão ao tratamento 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: isoniazida, Positivo: eificacia e melhor adesão, Negativo: hepatotoxicidade 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rifampicina, etambutol, Positivo: eficacia, Negativo: toxicidade e baixa adesão
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Bom porque vais ser bem aproveitoso 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhor opção para indivíduos HIV 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RHZE -, Positivo: Medicação padrão hoje em uso. , Negativo: Tempo de tratamento. Melhora na adesão
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, É fundamental a disponibilização e utilização de novos esquemas mais curtos e efetivos de tratamento da ILTB 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Posologia, Negativo: Tempo prolongado, hepatite medicamentosa
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Recomendo apos conversa esclarecedora com colega que dedica-se a este tema 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Necessário tratar os latentes 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos Tuberculostaticos , Positivo: Tratamento específico , Negativo: Alguns efeitos colaterais 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos citados , Positivo: Tratamento específico , Negativo: Hepatotoxicidade
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Sim. Vários estudos, guidelines ja mostraram eficácia do tto. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina e Isoniazida., Positivo: Isoniazida sempre foi usada e Rifampicina começou a ser usada a pouco tempo no Brasil., Negativo: Aderência e efeitos colaterais.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: A isoniazida tem apresentado bom perfil de tolerabilidade a, Negativo: Existem pacientes que fizeram o tratamento ILTB e mesmo assim tiveram TB doença depois. Esse número tem aumentado nos últimos tempos 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Sem comentário 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ndn, Positivo: Ndn, Negativo: Ndn
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Etambutol, rifampicina, hidrazida e isoniazida, Positivo: Não vi sinal ou sintoma que fizesse com que o paciente pudesse abandonar o tratamento, Negativo: Mal estar geral. Gastrite e desarranjo intestinal 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, etambutol, rifampicina e hidrazida, Positivo: Sem reação adversa, Negativo: Toda essa medicação, deixa um certo mal estar no paciente, as vezes náuseas e vômitos. Tem também de gastrite a as vezes até desenteria
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IsoniazidaRifampicina, Positivo: Controle da doença. , Negativo: HepatotoxicidadeDor epigastrica.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Evita desenvolvimento de Tuberculose ativa, Negativo: Longo período de tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento pra tb latente Tratamento para tb ativa, Positivo: Efetivos para o fim requerido, Negativo: Efeitos adversos Longo período de uso</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, isoniazida, Positivo: Isoniazida como tratamento de TBC latente., Negativo: Alguns pacientes desistem de usar pelo tempo prolongado de tratamento</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Eficaz, Negativo: Difícil adesão por ser muito longo o tratamento</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Facilidade na adesão por ser uma vez por semana. Facilidade no TDO principalmente na população de rua e população carcerária, onde há alto índice de infecção de TB e co-infecção com HIV. (uptodate, revisão março 2020 Tratamento da infecção latente por tuberculose em adultos não gestantes não infectados pelo HIV)</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida. Uso diário. Para TDO, fica ruim de controlar durante fim de semana quando o profissional não trabalha. , Positivo: Resolução do quadro em 6 meses. Pouco efeito colateral., Negativo: Uso diário.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Redução do tempo de tratamento com eficácia</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rituximab no tratamento da púrpura, Positivo: Resposta no aumento do número de plaquetas, considerável. , Negativo: Insuficiência hepática</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifapentina+isoniazida, Positivo: Melhora da adesão, Negativo: Mínimos e comparáveis às medicações já vigentes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Eficácia, Negativo: Hepatotoxicidade e posologia ruim</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Melhora adesão com diminuição das doses.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento tríplex para Tuberculose genito- urinaria., Positivo: Esquema permanece a referência para o tratamento da Tuberculose. , Negativo: Todos com esquemas demorados e sujeitos a disponibilidade na rede pública.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Importante essa associação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Eficaz, barato, bem tolerado , Negativo: Nenhum observado</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Disponibilidade , Negativo: Hepatotoxicidade</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Melhor adesão pela redução no tempo de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina e isoniazida, Positivo: Medicações conhecidas há anos no tratamento da TB latente, Negativo: Necessidade de múltiplas doses</p>
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Não tem efeitos colaterais positivos, Negativo: Intolerância e tempo prolongado de tratamento</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Reduz tempo de tratamento. Diminui numero de consultas gastas com profilaxia. Aumenta chance de adesão</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Eficacia, Negativo: 9 meses de uso é muito para quem esta assiintomatico</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, Positivo: Utilizei em paciente com alergia a isoniazida. Paciente gostou muito do tempo reduzido de tratamento , Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Profilaxia anti TB eficiente , Negativo: Toxicidade hepática</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Diminui o tempo de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, isoniazida e pirametamina, Positivo: Tratamento da doença em si, redução de morbimortalidade., Negativo: Maior tempo de tratamento, baixa adesão.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Etambutol, rifampicina, hidrazida e isoniazida, Positivo: Não vi sinal ou sintoma que fizesse com que o paciente pudesse abandonar o tratamento, Negativo: Mal estar geral. Gastrite e desarranjo intestinal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, etambutol, rifampicina e hidrazida, Positivo: Sem reação adversa, Negativo: Toda essa medicação, deixa um certo mal estar no paciente, as vezes náuseas e vômitos. Tem também de gastrite a as vezes até desenteria</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Facilita a vida dos pçtes coinfectadis Tbc/HIV e ou Hepatites</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A redução do tempo do tratamento da infecção latente da TB de forma segura e efetiva vai aumentar a adesão ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento de casos de TB com RHZE e tratamento de infecção latente com isoniazida por 6 meses em serviço de APS. Na instituição que trabalho o setor de infectologia foi um dos braços da pesquisa de eficácia de rifapentina e isoniazida por 3 meses em comparação com isoniazida 6 meses em pacientes hiv positivo. Resultado da rifapentina e isoniazida por 3 meses foi excelente., Positivo: A adesão e satisfação dos pacientes que fizeram uso do tratamento por 3 meses foi maior., Negativo: Custo mais alto que usar apenas isoniazida</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Aumentaria muito a adesao</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rhze, tto tbc segunda linha, rifabutina, Positivo: Bons para tbc, Negativo: Precisam de muito tempo, princ em iltb qdo o pçte esta sem sintomas</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A redução do tempo do tratamento da infecção latente da TB de forma segura e efetiva vai aumentar a adesão ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento de casos de TB com RHZE e tratamento de infecção latente com isoniazida por 6 meses em serviço de APS. Na instituição que trabalho o setor de infectologia foi um dos braços da pesquisa de eficácia de rifapentina e isoniazida por 3 meses em comparação com isoniazida 6 meses em pacientes hiv positivo. Resultado da rifapentina e isoniazida por 3 meses foi excelente., Positivo: A adesão e satisfação dos pacientes que fizeram uso do tratamento por 3 meses foi maior., Negativo: Custo mais alto que usar apenas isoniazida</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Para melhorar a adesão 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, melhorar o tratamento e diminuir tempo de tratamento com esta associação. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: isoniazida, Positivo: cura da doença, Negativo: tempo prolongado de tratamento, náuseas 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida e rifampicina , Positivo: Tratam a ILTB , Negativo: Tempo longo de tratamento
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Associação com objetivo de controle de tuberculose latente 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida e rifampicina, Positivo: Utilizando na prevenção de tuberculose em HIV, Negativo: Hepatotoxicidade da isoniazida 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida e rifampicina , Positivo: Isoniazida: menos efeitos colaterais , Negativo: Rifapentina : efeitos gástricos
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, MELHOR POSOLOGIA, MENOS EFEITOS COLATERAIS 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ISONIAZIDARIFAMPICINA, Positivo: EFICACIA, Negativo: POSOLOGIA EFEITOS COLATERAIS 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RHZE RH h, Positivo: Medicamento eficiente, Negativo: Muitos medicamentos
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Boa experiência clínica por vários anos., Negativo: Tempo de tratamento prolongado.</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Redução significativa de doses para tratamento da TB latente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Esquema para tratamento de ILTB de menor duração e menor toxicidade, com maiores chances de sucesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RHZE para tratamento de tuberculose e Isoniazida para tratamento de ILTB., Positivo: Medicamentos habitualmente bem toleradas, apesar do tempo prolongado de uso., Negativo: Difícil manter adesão de tratamento de ILTB. Os pacientes são assintomáticos e, muitas vezes, com uso da medicação (duração de 180 a 270 doses) começam a apresentar alguns efeitos adversos e acabam interrompendo a medicação.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida RifampicinaPirimetamina, Positivo: Boa resposta clinica, Negativo: Tempo demorado de tratamento</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Diminuir o tempo de tratamento, principalmente o s TDOs (diretamente observados) Trará maior adesão e menor abandono aos tratamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: 9h (Isoniazida)RIPE (Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol), Positivo: Tratamentos efetivos desde que respeitados os tempos de tratamento., Negativo: Longa duração e dificuldades em manter os TDO (tratamentos diretamente observados) durante os longos períodos.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Melhor reposta clínicaMenos efeito colateral, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Isoniazida, Rifampicina e Pirazinamida., Positivo: Tratamento da infecção após 6 meses de uso., Negativo: Náuseas, vômitos, diarreia e tempo extenso de tratamento.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifapentina, Positivo: Rapido, Negativo: Ndn</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifapentina, Positivo: Rapido, Negativo: Ndn</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RHZE, Positivo: Melhorar a adesão. , Negativo: .</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento de ILTB com as medicações disponíveis atualmente , Positivo: O tempo de tratamento é inferior com a medicação proposta e portanto implicará em redução de custos na saúde pública , Negativo: Efeitos gastrointestinais e hepatotóxicos, tempo prolongado de tratamento</p>
27/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
27/03/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
27/03/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Melhora do quadro clinico, Negativo: Longo prazo
27/03/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhora a adesão e diminuição dos efeitos colaterais. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Isoniazida 300 mg dose única melhora a adesão nos pacientes com PVHIV., Negativo: Hepatotoxicidade ao tratar TB latente com isoniazida 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida e rifampicina, Positivo: Rifampicina: menos tempo de tratamento e aconselhável para > 50 anos e hepatopatias., Negativo: Isoniazida: prurido, exantema, hepatotoxicidade Rifampicina: anemia hemolítica, hepatotoxicidade
27/03/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
27/03/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
26/03/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Efetividade , Negativo: Tempo de tratamento e efeitos colaterais principalmente hepático
26/03/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/03/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Diminuição do tempo de uso das medicações-- maior adesao 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rifapentina + isoniazida, Positivo: menor tempo de uso, Negativo: ndn 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: streptomina , rifampicina, etambutol, psa , Positivo: saneamento lesao, Negativo: hepatotoxicidadealt snc
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida Rifampicina, Positivo: Controle e tratamento da infecção , Negativo: HepatotoxicidadeProblemas digestivos
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: A Rifapentina diminui o tempo de tratamento, Negativo: Nenhum
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Redução do tempo de recuperação 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Vamos poder encurtar em muito e aumentar a aderência ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: InsinuaçõesRifampicinaEtambutol, Positivo: Tem pacientes que curam em 3 meses, se seguirem corretamente o esquema., Negativo: Efeitos colaterais e abandono do tratamento.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Eficaz no controle na latência, Negativo: Hepatotoxicidade</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: controle da Tb nos imunossuprimidos, Negativo: não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rifampicina, etambutol, pirazinamida, Positivo: cura da doença , Negativo: intolerancia gastrointestinal, perda visual</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos, Positivo: Eficazes na erradicação do BK, Negativo: Pacientes com nefropatia tem de ter a dose ajustada pois efeitos colaterais potencializados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos, Positivo: Eficazes na erradicação do BK, Negativo: Em nefropatia efeitos colaterais potencializados</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Vai ser de grande ajuda na aderência à terapêutica</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquema RIPE, Positivo: Efeito terapêutico bom , Negativo: Toxicidade, posologia, duração tratamento</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Acredito que pode contribuir para o arsenal terapêutico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhorar adesao ao tratamento 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida, Positivo: Melhora clinica, Negativo: Hepatotoxicidade
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida., Positivo: Ampla disponibilidade no SUS., Negativo: Necessidade de doses diárias.
31/03/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
26/03/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida Rifampicina , Positivo: Reduz o tempo de tratamento , com menor redução de exposição reduz os efeitos colaterais e aumenta a adesão , Negativo: Vômitos, hepatite
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
11/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
07/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o tratamento da infecção latente: isoniazida em esquema de 3 doses de 100mg diárias de 6 a até 9 meses.e da tuberculose ativa RHZE por 6 meses., Positivo: Apesar de bons, são medicamentos que precisam de um longo período de tempo para que conseguir a cura ou prevenção da doença. , Negativo: O longo período de tratamento e possibilidade de efeitos colaterais prejudicam a adesão ao tratamento aumentando as chances de abandono e de desfechos desfavoráveis.
01/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: isoniazida e rifapentina, Positivo: eficácia das drogas, Negativo: uso prolongado. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: isoniasida e rifapentina em tratamentos de tuberculose e til, Positivo: eficácia das drogas, Negativo: uso prolongado.
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, Precisamos dar mais oportunidades para tratar uma doença que mata tanta gente 2ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro o nome , Positivo: Não senti efeitos, Negativo: Não 3ª - Não
31/03/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim em pacientes com tuberculose latente de diferentes grupos. Monoterapia com isoniazida por 6 meses, Positivo: Conhecimento e experiência com o farmaco , Negativo: Duração do tratamento e adesão
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
30/03/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Concordo, pois a adesão ao tratamento atual da ILTb é uma grande barreira para o termino do mesmo. O que gera um abandono grande e uma perda de proteção aos contatos muito grande perpetuando a cadeia de transmissão da tuberculose</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: A isoniazida é uma droga utilizada a bastante tempo para quimioprofilaxia e redução do risco de adoecer. Droga de fácil manuseio, como médica percebo que a aceitação é moderada com poucos efeitos colaterais, Negativo: Apesar de ter uma baixa taxa de efeitos colaterais além desses efeitos ocorrem normalmente nas primeiras semanas. O sitio de lesão desses efeitos é o fígado (órgão único) sitio de importante função para o ser humano. Em algumas raras situações a hepatite fulminante pode ocorrer (necessidade de transplante). também o uso prolongado com alterações de transaminases e de efeitos gastrointestinais difíceis de lidar principalmente com a tolerância do paciente. O tempo de uso é prolongado sendo que o individuo que faz uso não é considerado estar doente, isto faz sua adesão ser incompreensível para ele mesmo, que tem que ir ao médico pelo menos todo mês. Como geralmente o tratamento de ILTB não é supervisionado não temos a garantia de que o individuo fez a medicação e que efetivamente a proteção contra a doença foi concretizada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina para ILTB atualmente vem sendo utilizado em pacientes com resistência a isoniazida, pirazinamida e etambutol que estão associados a rifampicina e isoniazida para tratamento Amicacina, terizidona, levofloxacina, para tratamento de tuberculose multirresistentes e outras resistências, Positivo: Rifampicina droga esterelizante importante de pouco efeito colateral pirazinamida e etambutol drogas protetoras da rifampicinaamicacina de grande potencia (não utilizada em profilaxias) levofloxacina droga bactericida e de boa eficacia, Negativo: Rifampicina pode causar nefrite intestinal e lesões d epelepirazinamida causa elevação de ácido úrico e o etambutol alteração ocular, não são utilizadas em ILTB Amicacina droga injetável com menos aceitação por isto levofloxacina pode fazer resitência facilmente e causa muita artralgia limitante</p>
28/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Facilitar ao tratamento, melhorando a adesão ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Adesão ao tratamento é boa., Negativo: Aparecimento de RAM.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Boa adesão , Negativo: Aparecimento de reações adversas.</p>
28/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Eficaz no ttto da TB latente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Idrazida 9 meses 300mg/dia, Positivo: Segui o protocolo , Negativo: Não tive</p>
28/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Maior probabilidade de adesão ao tratamento e diminuição da demanda por tantos meses na unidade , bem como a circulação de pacientes com a imunidade prejudicada</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifanentina , Positivo: Rápida Diminuição dos bacilos , Negativo: Demora no tratamento, desistência e reincidência</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Consegui sucesso no tratamento da infecção latente, com boa tolerabilidade dos pacientes , Negativo: Sem grandes efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
27/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, TRATAMENTO DA ILTB É UM DOS PILARES DO CONTROLE DA TUBERCULOSE, E ESQUEMAS MAIS CURTOS MELHORAM MUITO A ADESÃO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ISONIAZIDARIFAMPICINA, Positivo: SÃO EFETIVOS E BEM TOLERADOS NA FAIXA PEDIÁTRICA, Negativo: MAS A TOMADA É DIÁRIA E O TEMPO DE TRATAMENTO É PROLONGADO</p>
31/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Entendo haver evidencias robustas de que o tto proposto não é inferior ao tto padrão, mas tem benefício vultoso na adesão e completude do tratamento. O tto de TBL é pilar fundamental para mitigar a doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prescrevo INH para tto TBL. Em situações especiais, já usei rifampicina. , Positivo: O tratamento com INH é eficaz e altamente tolerável. Não interage com inibidores de protease. , Negativo: O tratamento com INH é longo e alguns pacientes desistem antes de completar os 6m.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Todo avanço e ampliação na oferta de medicamento disponível e valida. Desde que comprovada sua eficácia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eu ouço as queixas dos pacientes com relação ao atual esquema de tratamento de tuberculose, principalmente os efeitos colaterais bem intensos., Positivo: Nunca usei. Mas se usado corretamente promove a cura, Negativo: Eles relatam enjoô tontura e por tempo mais prolongado, uma fraqueza no corpo.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, isoniazida, etambutol, Positivo: Tratar a doença , Negativo: Náuseas e vômitos. Hepatite medicamentosa</p>
26/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Minha experiência como coordenação de programa de controle de tuberculose mostra que o tempo de tratamento é uma das principais causas de abandono.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Boa aceitação por parte do paciente, Negativo: tempo de tratamento longo</p> <p>3ª - Não</p>
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Tenho acompanhado o efeito benéfico do medicamento na melhoria de vida de minha irmã, tenho tem acompanhado o drama e desgaste provocado pela necessidade da judicializa ao para adquirir a medicação. Já há um sofrimento com a senha. Não é justo mais um sofrimento para adquirir a medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Tenho acompanhado o efeito benéfico do medicamento na melhoria de vida de minha irmã, tenho acompanhado o drama e desgaste provocado pela necessidade da judicialização para adquirir a medicação. Já há um sofrimento com a senha. Não é justo mais um sofrimento para adquirir a medicação. 2ª - Não 3ª - Não
26/03/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: 9H, Positivo: A isoniazida é acessível, não falta, causa poucos efeitos adversos ao paciente., Negativo: Apesar da efetividade da isoniazida, um tratamento prolongado de 9 meses para ILTB dificulta a adesão da pessoa ao tratamento, mesmo que orientado. Para crianças, com a falta de rifampicina suspensão no País, o tratamento 9H é totalmente desfavorável visto o cuidador tem que macerar o comprimido e calcular a dosagem de acordo com o peso. 3ª - Não
26/03/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Excelente opção 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Boa eficácia, Negativo: NDN
26/03/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tuberculose Pulmonar e Pleural, Positivo: Melhora clínica, Negativo: Não houve 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, Precisamos dar mais oportunidades para tratar uma doença que mata tanta gente 2ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro o nome, Positivo: Não senti efeitos, Negativo: Não 3ª - Não
14/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Todas as firmas que podemos ajudar a melhorar e proteger com redução de danos e prevenção tudo e válido este medicamento vem com este propósito então concordo 2ª - Não 3ª - Não
26/03/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Comprovadamente eficaz na prevenção da tuberculose, Negativo: Hepatotoxicidade 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, Positivo: Tempo de tratamento menor, poucos efeitos adversos, Negativo: Alterações hematológicas

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Será excelente a incorporação da nova droga, uma vez que diminuirá o tempo de tratamento da Infecção Latente por TB. 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Excelente estratégia para aumentar a adesta quimioprofilaxia e por conseguinte diminuir o número de novos casos 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquema básico para tratamento da TBEsquemas alternativos para intolerância e resistência medicamentosa, esquema I, IR, esq III, esq MR, esq TBXDR incluindo bedaquilina. Acho q com todos os medicamentos usados no Brasil , Positivo: Esq básico- o melhor, comprimido com drogas combinadas e o mais eficiente. Efeitos colaterais contornáveis com um adequado manejo do paciente, Negativo: Tratamento prolongado favorece o abandonoEsq básico Efeitos colaterais contornáveis com um adequado manejo do pacientelsoniazida comprimido para criança - muito difícil para administrar, não dissolve bem na água, instável na presença de açúcar. Tem q usar os comprimidos dispersíveis.Falta de formulação das drogas para usos especiais, tipo paciente entubado, gastrectomizado, intolerante à medicação via oralDificuldade de usar sistemas para infusão de drogas a nível ambulatorial, principalmente em pacientes sem massa muscular para aplicação por via intramuscular
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniasida efeito hepatotxico, Positivo: Boa tolerabilidade metabólica, Negativo: Aumento das enzimas hepáticas 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Existem vários estudo que comprovam a eficácia da prevenção, porém deve-se ter atenção para as reações adversas. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida por 6 meses e rifampicina por 4 meses., Positivo: Com isoniazida tive poucos efeitos adversos, bem como paea a rifampicina., Negativo: Tempo prolongado de uso.
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Facilitará muito a aderência ao tratamento e com isso a prevenção da doença. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: isosniazida / rifampicina, Positivo: proteção para TB, Negativo: Muito tempo de acompanhamento facilitando a perda de seguimento.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Apontar contato com a micobactéria, Negativo: nenhum
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Tratamentos curtos e eficazes para ILTB só tendem a ajudar no combate à tuberculose. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida isoladamente., Positivo: Eficaz, Negativo: Tempo longo de tratamento (9 meses, uso diário), potencial toxicidade 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina isoladamente , Positivo: Eficaz , Negativo: Tempo longo (4 meses) e uso diário.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, Pirazinamida, Isoniazida, Positivo: Eficazes para o tratamento da tuberculose , Negativo: Tratamento muito prolongado, com várias doses por dia</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, reduz tempo de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Diminui o tempo de tratamento de 280 dias para 12, aumentando a adesão e controle da doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquema tríplice Com rifampicina, Positivo: São capazes de tratar , Negativo: Vários efeitos colaterais por hepatotoxicidade, vômitos, náuseas, cefaleia.Má adesão. Quando o paciente começa a melhorar, para de tomar ou toma de forma irregular</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, REDUÇÃO DO TEMPO DE TRATAMENTO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIMFAMPICINA, ISONIAZIDA, PIRAZINAMIDA E ETAMBUTOL, Positivo: Tratamento padrão ouro, Negativo: Resistência bacterianaProtocolo com tempo prolongado &gt; 6 mesesAlta taxa de abandono pelo paciente</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Seria um esquema de tratamento para a ILTB de maior eficácia e em curto período de tempo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina , isoniazida , pirazinamida, etambutol e outros , Positivo: Eficácia e uso seguro, Negativo: Hepatite medicamentosa e alteração visual ( etambutol)</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Trato de PVHA há anos e a redução do tempo de um tratamento preventivo é fundamental pra garantir a efetividade Estamos aguardando esse fármaco há anos para podermos expandir a prevenção da TB. A opção, isoniazida e um tratamento de 6-9 meses e as pessoas não ficam muito motivadas até o final.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida 6 meses e 9 meses Rifampicina 4 meses , Positivo: A rifampicina permite um tratamento mais curto e com menor toxicidade mas o sal do fármaco está em falta e só e portanto recomendado para pessoas &gt;50 anos ou crianças Então a chegada dessa associação vai permitir um tratamento 1x semana o que é fantástico , Negativo: Isoniazida diária causa neuropatologia periférica e hepatotoxicidade (apesar de raro)A rifampicina precisa ser administrada diariamente, por 4 mesesRifapentina com isoniazida 1X semana por 3 meses tem se mostrado superior em estudos clínicos devido a melhor adesão</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina e isoniazida, Positivo: Rifampicina (tem formulação em xarope), menos tempo de uso para ILTB , Negativo: Isoniazida( Não tem formulação em xarope, dificuldade para pacientes pediátricos é maior tempo de uso para ILTB)</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, menor número de doses, maior adesão 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rifampicina/ isoniazida, Positivo: sem efeitos adversos, Negativo: aumento da resistencia a isoniazida
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Redução do tempo de tratamento e melhora da adesão 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: isoniazida , Positivo: Efetivo quando usado corretamente, menos tempo de uso do que o tradicional., Negativo: Tempo prolongado. Hepatite 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, pirimetamina, Positivo: Boa efetividade quando tomado corretamente e tempo previsto, Negativo: Hepatite, gastrite, tempo prolongado que diminui a aderência.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Ajuda na resolução / cura, Negativo: Poucos efeitos colaterais 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Cura /tratamento , Negativo: Poucos efeitos colaterais
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: isoniazida, Positivo: Paviente obteve melhora, Negativo: longo tempo de uso
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhora da adesão ao tratamento por ser necessário menos doses 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: . , Negativo: Baixa adesão
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Redução do tempo de tratamento 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida isoladamente, Positivo: Tratamento da ILTB, Negativo: Tempo de tratamento prolongado
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, Se ajuda a minimizar, eu concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Quando eu tinha 7 anos, tomei medicamentos para tuberculose, pois o exame deu positivo, Positivo: Não lembro, Negativo: Não lembro

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicinalsoniazida, Positivo: Resolucao da doenca, Negativo: Tempo de uso prolongadoNauseasInapetencia
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento clássico para tuberculose, Positivo: Resultado favorável , Negativo: Demora de tempo para tratamento
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Importante para reduzir tempo do tratamento cê com isso melhorar a adesão 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Eficaz e seguro, Negativo: Tempo prolongado do tratamento
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, A diminuicao de doses contribua para adesão e conclusão do tratamento da tuberculose. 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhora muito a adesão pelo menor tempo de tratamento 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quando era estudante , Positivo: Tratamento de pacientes e possibilidade de inserção na comunidade , Negativo: Baixa adesao tto longos

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Bactericida, Negativo: Tempo necessário de uso
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Existem vários estudos comprovando a eficácia desse medicamento para pacientes em tratamento p tb 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquema clássico RiP, Positivo: Redução do tempo de contágio , Negativo: Efeitos colaterais e baixa adesão
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquema ripe , Positivo: Funciona na grande maioria dos casos, Negativo: Mas é muito longo e pode gerar desistências de tratamento
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, Pelo fato de estar em contato com médicos e pessoal da saúde - pneumologistas e fisiologistas, desde o tempo do meu esposo, Fernando Augusto Fiuza de Melo - também pneumologista e fisiologista - procuro me manter informada e atualizada sobre assuntos relacionados à Tuberculose em todos os seus níveis. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Se ajuda a minimizar, eu concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Quando eu tive 7 anos de idade tive o mantur positivo e na época tomei os medicamentos recomendados pela saúde pública., Positivo: Não lembro, Negativo: Não lembro</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento da Tuberculose, Positivo: Tratamento mais curto sempre é melhor para adesão., Negativo: Isoniazida: neuropatia diabética.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Reduz tempo de tratamento e melhora a adesão</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicia, isoniazida, etambutol, pirazinamida, Positivo: Tratamento da doença em casos aderentes, Negativo: Náusea, vômito, lesão ocular, na adesão, abandono de tratamento, alteração da cor da pele</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ISONIAZIDA/ RIFAMPICINA, Positivo: POUCOS EFEITOS COLATERAIS, BOA ADESÃO, Negativo: TEMPO DE TRATAMENTO PROLONGADO COM ISONIAZIDA</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Sou infectopediatra e as evidências falam a favor da introdução da medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquema RIPE usado usualmente, Positivo: Disponibilidade no sistema público, Negativo: Efeitos colaterais, mesmo que ainda pendendo a favor no risco-benefício</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifapentina e isoniazida, Positivo: Reduzir o tempo de tratamenro (doses necessrias), Negativo: --</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquema classico, Positivo: --, Negativo: Tempo de tratamento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Reduzirá de forma drástica o tempo de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O uso da Rifapentina irá auxiliar na adesão ao tratamento, tendo em vista que a fosagem é semanal.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Prevenção da TB , Negativo: Alguns pacientes apresentam evento adverso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, Isoniazida, pirazinamida, etambutol, Positivo: Drogas seguras na cura da TB, Negativo: Tempo de tratamento longo</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida 6m, isoniazida 9m, rifampicina 4m, Positivo: Bons efeitos, Negativo: Favorecem o abandono de tratamento devido à duração do mesmo</p>
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Gostaria de sugerir um aumento no número de tratamentos que serão ofertados ...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Isoniazida , Positivo: Prevenção a TB, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Isoniazida, Positivo: Prevenção a TB, Negativo: Não houve</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida,Rifampicina, Pirazinamida, Etambutol., Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não tive nada digno de nota, foi tranquilo., Positivo: Iniciado t tratamento, os sintomas d doença, foram desaparecendo em uma semana., Negativo: Não houve.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento da tuberculose , Positivo: Cura do paciente , Negativo: Problemas no fígado</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O uso da Rifapentina irá auxiliar na adesão ao tratamento, tendo em vista que a fosagem é semanal.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Prevenção da TB , Negativo: Alguns pacientes apresentam evento adverso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, Isoniazida, pirazinamida, etambutol, Positivo: Drogas seguras na cura da TB, Negativo: Tempo de tratamento longo</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina Isoniazida etambutol, Positivo: .., Negativo: ..</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Diminui o tempo de tratamento e com isso melhora a adesão 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, Melhora a adesão 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Para crianças tem solução, o que facilita muito, Negativo: Tempo de uso prolongado, efeitos gastrointestinais
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Rifampicina, Positivo: Rifampicina, tempo de tratamento reduzido., Negativo: Isoniazida eventos adversos como hepatotoxicidade 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida Rifampicina, pirazinamida etambutol, Positivo: Efetividade no tratamento , Negativo: Eventos adversos
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Vai ajudar na adesão ao tratamento 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Ferramenta importante na profilaxia, Negativo: Dificuldade na adesão devido ao tempo de tratamento 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifabutina, rifampicina, pirazinamida, etambutol, isoniazida, streptomina, Positivo: Importante quando há tb resistente ou paciente em uso Arvs que impossibilita a rifampicina, Negativo: Hepatotoxicidade, surdez , alterações gastro intestinais, dificuldade de adesão pelo tempo de tratamento e ou uso concomitante de ARVs
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, Positivo: Tratamento efetivo, Negativo: Muitos efeitos colaterais e tempo prolongado
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhorar a adesão dos paciente devido a redução do numero de doses necessárias para tratar 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquema RIPE, Positivo: Efetivos no tratamento., Negativo: Duração do tratamento, muito grande e dificuldade em manter adesao adequado dos pacientes
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Diminuição do tempo de tratamento e número doses medicação 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhor adesão Menor tempo de tratamento 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Somente isoniazida, Positivo: Único tratamento disponível atualmente , Negativo: Longuíssimo tempo de tratamento. Comprimido muito grande.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Melhora importante da adesão</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina e isoniazida, Positivo: Tuberculostático antigo com efeitos e paaefeitos bem descritos, Negativo: Múltiplos comprimidos diários e muitas interações medicamentosas, dificultando a adesão</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IsoniazidaRifampicina, Positivo: Eficácia para tratamento de ILTB, Negativo: Posologia desfavorável e longo tempo de tratamento, dificuldade de adesão dos pacientes e altas taxas de abandono com o tratamento padrão</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, rifampicina, Positivo: Rifampicina tempo de tto mais curto, Negativo: Isoniazida tempo prolongado com abandono do tto</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rhz, Positivo: Efetividade, Negativo: Efeitos colaterais</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Isoniazida para quimioprofilaxia., Negativo: Pode levar à resistência ao medicamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquema triplíce. RIFA, ISO E ETAMBUTOL, Positivo: Rifampicina diminui o tempo do tratamento, Negativo: Indicação sem cultura, após constatar resistência e não curar o paciente que fica mais debilitado nos retratamentos. Hepatotoxicidade</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Eficácia , Negativo: Efeitos colaterais Longo prazo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RifampicinaEtambutol, Positivo: Eficácia , Negativo: Tratamento de longo prazo
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida e Rifampicina, Positivo: Isoniazida: seguraRifampicina: encurta o tratamento, Negativo: Isoniazida: tratamento longoRifampicina: muita interação medicamentosa
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, A diminuição das doses é importante 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida Rifampicina, Positivo: Rifampicina tem menor tempo de tratamento e menos efeitos colaterais , Negativo: Pouco acesso a rifampicina 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Isoniazida é efetiva neste tratamento , Negativo: Muito longo o tratamento
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida 100mg e isoniazida 300mg (p/ PVHIV) para TILTB e uso de ridampicina cápsula ou solução tb p/ tratamento da TILTB, Positivo: Isoniazida 300mg : positivo pela redução na quantidade de comprimidos a serem tomados Rifampicina: positivo pois o tempo de tratamento p/ ILTB é menor do q com uso de isoniazida, Negativo: Isoniazida 100 ou 300 mg: tempo de tratamento de 6 meses faz com q as pessoas desistam do tratamento
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Reduz tempo de tratamento 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Tratamento da TB latente, Negativo: Toxicidade hepatica 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina Etambutol, estreptomicina, capramicina, Positivo: Tratamento de tuberculose, Negativo: Hepatotoxicidade
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Isso nos permitiria reduzir o tempo de tratamento entre outros aspectos 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifabutina. E RHZE tratando muitos pacientes com TB. , Positivo: Facil uso. Eficacia no uso adequado. Efeito bactericida de 2 delas. Experiência de uso de muitos anos de todas elas, Negativo: Muita interação medicamentosa com a Rifampicina Dados pouco seguro de uso por pouco tempo Muitas cepas resistentes a Rifampicina
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifapentina e Isoniazida, Positivo: Menor tempo de tratamento e maior aderência., Negativo: Nenhum. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Efetividade, Negativo: Efeitos colaterais.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Acompanhamento de tratamento a pacientes na APS., Positivo: Melhora daqueles que foram acompanhados e tiveram boa adesão ao tratamento e aos cuidados., Negativo: Tratamento longo, dificultando adesão de alguns pacientes.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, Diminui o tempo de tratamento 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Adesão ao tratamento 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Aumentará a adesão, pois diminuirá o tempo de tratamento 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento da tuberculose com rifampicina, isoniazida, Positivo: Cura, Negativo: Intolerancia medicamentosa, hepatite medicamentosa, tempo de tratamento estendido
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Devera melhorar a adesao pois diminui o tempo de tratamento 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Evitar manifestação TB, Negativo: Abandono de tratamento devido podologia
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Rifampicina e Isoniazida , Positivo: Melhoras dos sintomas , Negativo: Nenhum
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina IsoniazidaEtambutolPirazinamida , Positivo: Resolução com tratamento , Negativo: Efeitos adversos: náuseas, vômitos. Abandono de tratamento devido longo período tempo de tratamento.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os do esquema de tuberculose e com a Isoniazida para QP, Positivo: Comodidade da posologia e eficácia, Negativo: Efeitos colaterais gástricos,acne , ganho de peso,resistência medicamentosa,hepatite medicamentosa 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina que propiciou a abreviação do tempo de tratamento ,isoniazida utilizada como durante muito tempo como quimioprofilaxia e os coadjuvantes que aumentam a eficácia atuando de modo que somam a eficácia , Positivo: A posologia cômoda e na maioria dos casos com efeitos colaterais que não implicaram na suspensão da medicação , Negativo: O aparecimento de resistência bacteriana e hepatite medicamentosa

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, A incorporação de novas tecnologias no campo da prevenção da Tb são indispensáveis no enfrentamento da TB. O tratamento profilático com rifapentine + isoniazida tem duração menor ao utilizado para tratamento de ILTB atualmente no Brasil provavelmente possibilite uma melhor adesão.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho acompanhado a incorporação do Tratamento profilático 3HP em outros países bem como protocolos de pesquisas que avaliam a implementação deste tratamento na rotina dos serviços de saúde e os possíveis impactos positivos na adesão ao tratamento de ILTB., Positivo: Alguns estudos evidenciam impactos positivos na adesão ao tratamento profilático quando utilizasse a terapia 3HP. A redução no tempo de tratamento é uma questão fundamental neste cenário quando comparado com o tratamento incorporado atualmente pelo MS., Negativo: Apesar da redução no tempo de tratamento (06 meses para 03 meses) e da supressão de doses diárias de medicamentos, o paciente em terapia profilática 3HP deve ingerir uma quantidade expressiva de medicamentos de uma única vez. Este aspecto pode dificultar a adesão de pessoas que tem dificuldade com ingestão de medicamentos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já acompanhei pessoas que vivem com Aids em tratamento de ILTB com o protocolo atual de isoniazida. , Positivo: O tratamento atual é bastante efetivo para quem tem boa adesão., Negativo: Pouca adesão devido a longa duração do tratamento. Apesar de preconizado, o tratamento de ILTB é bastante incipiente no Brasil e os dados disponíveis em relação a cobertura são muito incipientes, A expectativa e que com a incorporação do serviço de vigilância dos dados relacionados a ILTB e a incorporação de novas tecnologias possamos ser mais assertivos nas ações de prevenção a TB.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Melhora do quadro, Negativo: Náuseas</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Em hospital Universitário , Positivo: Melhor adesão , Negativo: Não diferem de efeitos habituais</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Vai ajudar a melhorar a adesao ao tratamento da ILTB</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Paciente	1ª - Concordo, Como pneumologista ja tive tuberculose e hoje uso rituximab para polineuropatia por síndrome de Sjogren e para quimioprofilaxia seria muito menos intolerante o tratamento 2ª - Sim, como paciente, Qual: Isoniazida,rifampicina,pirazinamida,etambutol, Positivo: Desaparecimento do gânglio mediastinal aumentado, Negativo: Náuseas,vômitos,alergia,hepatite 3ª - Sim, como paciente, Qual: Rifampicina,isoniazida,pirazinamida e etambutol, Positivo: Rifampicina,isoniazida e etambutol curei a Tb ganglionar mediastinal, Negativo: Fiz alergia a pirazinamida no 1º dia de tratamento ,nauseas
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Pouca reação adversa, Negativo: Tratamento longo e com alguns efeitos colaterais.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com ambos , Positivo: Melhora clínica importante nos pacientes com CD4 ruim após início de profilaxia , Negativo: Interação de rifampicina com a maioria dos antirretrovirais 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: A profilaxia reduz o risco de ativar a doença., Negativo: Tempo de uso prolongado, levando a baixa adesão, efeitos adversos como prurido. 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Com a diminuição de doses aumenta ,em muito,a adesão. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Seguro, poucos efeitos colaterais,porém tratamento muito longo., Negativo: Tempo de tratamento
14/04/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Muitos dos pacientes com infecção latente podem desenvolver forma ativa e aumentar a incidência da doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina Rifabutina Isoniazida Etambutol Pirazinamida Ofloxacin Estreptomina , Positivo: Bactericida bacteriostático Cura e redução da propagação da doença , Negativo: Toxicidade hepática ocular neurológica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina. Rifabutina. Pirazinamida. Etambutol Isoniazida Ofloxacin , Positivo: Bactericida e bacteriostático , efetivos para cura Melhora do estado geral do paciente , ganho de peso, diminuição de transmissão , Negativo: Efeitos colaterais as vezes graves. Hepatite medicamentosa. Neuropatia</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: A associação promoverá um tempo de tratamento mais curto e com menos efeitos adversos. , Negativo: Tempo de uso prolongado, hepatotóxico.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Poucos efeitos colaterais em crianças. , Negativo: Tempo de tratamento prolongado, com falhas na adesão.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RHZE, Positivo: Cura para aqueles pacientes que aderem, Negativo: Efeitos adversos</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Sem dúvida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Redução do tempo de tratamento e melhor adesão</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Eficácia do medicamento , Negativo: Tempo longo</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, É importante ter alternativas de tratamento eficaz e com duração menor 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Reduz tempo de tratamento aumentando assim a adesao 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida para tratamento de TB latente, Positivo: Prevencao de desenvolvimento de atividade de doenca (TB), Negativo: Neuropatia perifericaAumento de transaminases
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhora o tratamento, reduz o numero de doses necessários parano tratamento em relação ao tratamento mais antigo. Menos efeitos colaterais e mais fácil adesão para o paciente. 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Paciente	1ª - Concordo, Acredito que se implementado no tratamento, os profissionais da saúde poderão controlar melhor os pacientes que tomam o medicamento até o final, melhorando a qualidade de vida destes pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Já li sobre o assunto e ha publicações confiáveis a favor 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida e rifampicina, Positivo: Prevenção da tuberculose, Negativo: Isoniazida: tempo de tratamento
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhora da adesão ao tratamento pela redução do tempo. Desta forma, pode vir a melhorar o controle da tuberculose, doença prevalente e que tantos prejuízos traz aos pacientes e ao sistema de saúde. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos, Positivo: Eficácia no tratamento da tuberculose., Negativo: Possíveis efeitos colaterais, sendo a toxicidade o pior cenário, já que determina a suspensão e troca dos medicamentos. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Demais medicações para tratamento da tuberculose, tais como pirazinamida, etambutol, fluorquinolonas, estreptomomicina, entre outros, Positivo: Algumas mantém a eficácia, nem todas., Negativo: Algumas não são tão eficazes e normalmente prolongam o tempo de tratamento, e conseqüentemente reduzem a adesão.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhor adesão e tempo curto com menor risco de efeitos colaterais 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Facilidade de acesso ao medicamento , Negativo: Tempo de profilaxia e eventos adversos
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Viabilidade de tratamento supervisionado nas aldeias indígenas. Construindo para melhor adesão do tratamento. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: somente (hum) Isoniazida , Positivo: Positivo pelo fato de ser dose única diária , Negativo: Negativo pelo fato de ter o tempo de tratamento longo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RHZE , Positivo: Por ser de dose única diária , Negativo: Negativo pelo fato de ter o tempo de tratamento longo
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhora na adesão à terapêutica 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Eficácia, Negativo: Desconforto gástrico
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Redução no tempo de tratamento da ILTB 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Reducao dos casos de Tb entre contatos, HIV+, conversão tuberculínica., Negativo: Longo tempo de tratamento, levando a muitos abandonos.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isonoazida. Testes CULTURAIS PARA BK, Positivo: Melhora da adesão e diminuição do tempo de tratamento, Negativo: A maior parte dos tratamentos para tubérculos são longos e com vários efeitos adversos o que diminui a adesão ao tratamento. 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhorar a adesão ao tratamento 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Redução no tempo de tratamento da ILTB</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Reducao dos casos de Tb entre contatos, HIV+, conversão tuberculínica., Negativo: Longo tempo de tratamento, levando a muitos abandonos.</p>
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A perspectiva de encurtar o time de tto é bom p aderência.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Isoniazida mostra se eficaz na quimioprofilaxia p TB latente em pacientes reumatológicos, com acréscimo do novo fármaco acredito que encurtar o tempo de tto é positivo., Negativo: No que se refere a isoniazida NDN.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina e Isoniazida, Positivo: Eficácia no tratamento e baixos índices de Síndrome parestesia periféricas., Negativo: Efeito GI, porém pontual.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A incorporação permite reduzir o tempo de tratamento, garantindo melhor adesão e menor toxicidade. Isso facilita no tratamento de uma infecção sem manifestação clínica, como a iltb. Manter um paciente por 9 meses em uso diário de isoniazida, gera um trabalho hercúleo de adesão além de favorecer o aparecimento de eventos adversos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina e isoniazida, Positivo: Medicação conhecida e disponível, Negativo: Alta toxicidade renal e hepática. Alta carga de comprimidos. 6 a 9 meses de tratamento</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Melhora a adesão ao tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifapentina e isoniazida, Positivo: Rifapentina requer um tempo de tratamento menor, o que facilita a adesão e o término do tratamento , Negativo: Contra indicações</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Boa tolerância e eficácia , Negativo: Tratamento mais prolongado em torno de 180 dias</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Porque existem pessoas infectadas com o vírus com outras patologias, como: TB 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: A cura de pessoas que fizeram tratamento de TB, Negativo: Quando o paciente não mantém o tratamento correto de 6 meses, o bacilo da tuberculose se torna resistente, levando o paciente a óbito. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Planta Medicinal : como LEITE DA ÁRVORE DO AMAPÁ.Os.: Planta utilizada em locais ou regiões onde não há assistência medica, e não existe outro meio e tratamento para TB., Positivo: A CURA., Negativo: Se o paciente negligenciar o tratamento e não mantiver uma boa alimentação, o resultado do tratamento terá efeito negativo, o bacilo se torna resistente.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Ok 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inh, Positivo: Tomada unics, Negativo: Efeitos adversos
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, De acordo com profissionais da área, com quem consultei informações, o uso melhora a adesão, reduzindo o tempo de tratamento que varia entre 180 e 270 doses para apenas 12 doses. 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os dois, Positivo: Eficiência , Negativo: Os descritos em suas respectivas bulas 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: os dois, Positivo: Eficiência , Negativo: Os esperados
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Se é um medicamento que vai reduzir o tempo de tratamento, vai facilitar a adesão do paciente e melhor controle da doença. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: isoniazida, Positivo: uso em conjunto com outros medicamentos, difícil descrever, Negativo: uso em conjunto com outros medicamentos, difícil descrever 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Deve proporcionar uma melhor adesão ao tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Melhorar a adesão ao tratamento, pela expressiva diminuição do tempo de tratamento; a toxidade pode ser controlada e só pneumologistas terão acesso</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina e Isoniazida, Positivo: Combate verdadeiramente a infecção , Negativo: Rifanpicina tem efeito negativo 1/5; Orovicandi: hepatite medicamentosa</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, Isoniazida, Positivo: Tratamento de tuberculose na atencao basica, multidrogas resistente e XDR, Negativo: Embora positiva, a amicacina causa grande danos musculares, visto nosso paciente ja chegar caquetico aos ambulatorios, o uso da mesma em iv afasta a adesao do usuario do servico, frente ao tempo gasto na administracao e os gastos para comparecer as unidades. Dor gástrica, náuseas, vômitos.</p>
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Tudo q possa melhorar a qualidade do tratamento com adesão e menor efeitos colaterais em menor tempo só pode trazer ao/a paciente e ao SUS e a sociedade processos de otimização da produção do país. Com qualidade de vida só poderemos ter como resultado a melhora enqto economia mundial!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: rifampicina e azitromicina, Positivo: Se for tomado nos 6 meses subsequentes de forma continua vislumbra-se a cura da TB. , Negativo: Esquecimento na tomada da medicação, alguns enjoos, a percepção de estar bem e não fazer mais a adesão.</p>
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Tudo q possa melhorar a qualidade do tratamento com adesão e menor efeitos colaterais em menor tempo só pode trazer ao/a paciente e ao SUS e a sociedade processos de otimização da produção do país. Com qualidade de vida só poderemos ter como resultado a melhora enqto economia mundial!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: rifampicina e azitromicina, Positivo: Se for tomado nos 6 meses subsequentes de forma continua vislumbra-se a cura da TB. , Negativo: Esquecimento na tomada da medicação, alguns enjoos, a percepção de estar bem e não fazer mais a adesão.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isonoazida. Testes CULTURAIS PARA BK, Positivo: Melhora da adesão e diminuição do tempo de tratamento, Negativo: A maior parte dos tratamentos para tubérculos são longos e com vários efeitos adversos o que diminui a adesão ao tratamento.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trabalhei 25a. em Posto de Saúde com o tratamento da Tuberculose na ponta e portanto tenho certeza dos bons resultados no Brasil. É um programa sério e que sempre funcionou.O uso da Rifapentina e Isoniazida na ILTB será necessário para manutenção dos bons resultados., Positivo: Ambas as drogas eliminam o desenvolvimento do Bacilo e impedem a evolução da doença., Negativo: Hepatotoxicidade controlada. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquema tríplice INH, RMP, Emb e Estreptomina anteriormente ., Positivo: Cura da Tuberculose , Negativo: Resistência a alguma dessas drogas
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhora nos Tratamentos de ILTB. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Isoniazida : prevenção , Negativo: Intolerância e diluição. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina , Positivo: Rifampicina: duração menor do tratamento , Negativo: Nenhum
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, Positivo: Cura de Tb ativa qdo associados , Negativo: Hepatotoxicidade rara com a isoniazida
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Isoniazida, Positivo: Fiz tratamento profilático para TB latente com isoniazida 300 mg/dia. Me sinto mais protegida., Negativo: O tempo de tto é muito longo. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina , pirazinamida, etambutol, Positivo: Quando usados adequadamente promovem a cura da TB, Negativo: Em alguns pacientes causam eventos adversos como hepatite medicamentosa principalmente a isoniazida, alergias,náuseas.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, Positivo: Diminuir tempo de tratamento, Negativo: Nao se aplica
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloroquina, Positivo: Não há dados suficientes na literatura , Negativo: Não há dados suficientes na literatura

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Devido ao aumento da adesão ao tratamento 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Menos doses, maior adesão, possível diminuição da indução de resistência 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida como profilaxia e tratamento , Positivo: Uso 2 medicações diminui seleção resistência Queda tempo e especialmente número de doses. Maior adrsao, Negativo: Custo mais elevado? Possível maior efeitos adversos 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Sem observações , Negativo: Sem observações 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, Positivo: Sem observações , Negativo: Sem observações
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ILTB com isoniazida, Positivo: Combate a TB latente. , Negativo: Tempo prolongado de tratamento, dificuldade de adesão e efeitos gastrointestinais.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Facilita a adesão 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida e rifampicina , Positivo: Reduzir risco de tuberculose ativa, Negativo: Baixa adesão pelo tempo de tratamento
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ISONIAZIDA RIFAMPICINA, Positivo: Isoniazida- Rifampicina-duração do tratamento mais curta, Negativo: Isoniazida-Duração do tratamento longa dificultando a adesão ao tratamento. Hepatotoxicidade. Rifampicina - desabastecimento.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RHZE, Positivo: Cura para aqueles pacientes que aderem, Negativo: Efeitos adversos 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, isoniazida de 100mg e Isoniazida de 300 mg, Positivo: A Hisoniazids de 300 facilita adesão ao tratamento da ILTB porém não reduz o tempo de tratamento Rifampicina adequado pelo menor tempo de tratamento em relação à Isoniazida , Negativo: Isoniazida - tempo muito longo de tratamento Rifampicina - desabastecimento nacional 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tiltb, PPD RHZE , TDO ACOMPANHAMENTO DIS CSSOS , vigilância dos casos e Contatos . , Positivo: Xxxx, Negativo: Xxxx
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Redução do risco de doença , Negativo: Ma adesão pelo tempo prolongado de tratamento
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Diminui tempo de tratamento e aumenta adesão. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, rifampicina, etambutol e pirazinamida, Positivo: Normalmente tratamento eficaz seguindo o protocolo do sus., Negativo: Vários paciente abandonam tratamento em decorrência do tempo prolongado. 6 meses.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Importante pela redução do tempo de TILTB, facilitando adesão. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina e Isoniazida para TILTBDemais drogas para tratamento de TB em atividade. , Positivo: Rifampicina: menor tempo de profilaxia Isoniazida: fácil aquisição , Negativo: Rifampicina: dificuldade de liberação para TILTB Isoniazida: longo período de tratamento, tendo eficácia melhor na prevenção com uso de 270 doses

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Tem Boa eficácia 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Isoniazida segurança para tratamento imunossupressor , Negativo: Isoniazida irritabilidade gástrica 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Encurtaremos o tempo de tratamento, o que facilita a adesão 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tuberculostáticos disponíveis no Brasil, Positivo: Tratamento efetivo em quase todos os casos, Negativo: Dificuldade de adesão
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Da maioria do protocolo de tuberculose do MS, Positivo: Apresentação conjunta dos princípios ativos num único comprimido favorecendo a adesão., Negativo: Tempo prolongado de tratamento
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Redução do tempo de tratamento melhora adesão. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RH e RHZE, Positivo: Eficácia , Negativo: Longo período de tratamento favorece abandono. 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Isoniazida, Positivo: Isoniazida tratei por 9 meses, efeito positivo é que a dose é 1 vez por dia., Negativo: Isoniazida efeito negativo foi o tempo longo de tratamento profilático para ILTB. 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Aumentaria muito a adesão, reduzindo o número de infecções ativas por consequência 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IsoniazidaRifampicina, Positivo: Efetivos , Negativo: Muito baixa aderência

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rifampicina, isoniazida, pirazinamida , Positivo: Eficácia terapêutica, Negativo: Nem todas são disponíveis em solução para crianças
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Isoniazida, Positivo: Tomada de 1x/dia, me senti protegida., Negativo: Tempo de tto muito longo. 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina e isoniazida, Positivo: Poucos efeitos colaterais , Negativo: Tempo de tratamento longo
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Tenho amigos especialistas que estão.muito otimistas com essa combinação 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inz, Positivo: Eficaz, Negativo: Tempo de tratamento
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Diminui tempo de uso aumentando adesão 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, rifampicina, Positivo: Com rifampicina houve maior adesão devido tempo de uso menor , Negativo: Tempo de uso maior para isoniazida diminuindo adesão Dificuldade de adquirir e usar rifampicina
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Diminuirá o tempo de tratamentoMais uma alternativa para o tratamento da ILTB 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento da ILTBUse de Isoniazida, Positivo: Tratamento eficiente , Negativo: Efeitos colateraisTempo de duração do tratamento
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rifapentina e isoniazida , Positivo: Melhora clínica , Negativo: Nenhum foi observado nos casos referidos 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RHZE, Positivo: Ótima resposta tanto para tratamento de infecção ativa quanto latente, Negativo: Dificuldade gastrointestinal pelos pacientes</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Bem tolerado.Vasta avaliação na literatura., Negativo: Efeitos colaterais controláveis , quando bem indicado.</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Aguardando com grande expectativa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Só isoniazida. , Positivo: Parcialmente satisfatório para o q se propõe. , Negativo: Pelo tempo prolongado em assintomáticos, houve casos de abandono.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifapentina, Positivo: Diminui o tempo/ dose do tratamento melhorando muito a adesão , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifapentina, Positivo: Melhora a adesão, pois diminui o tempo/ dose de tratamento , Negativo: Nenhum</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, isoniazida., Positivo: Tratamento mais curto para ILTB., Negativo: Mesmo com a redução no tratamento, a duração é mínima de 4 meses, o que causa baixa adesão.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Melhora da adesao ao tratamento com menos doses necessárias para tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Reduz o tempo de duração do tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, A principal vantagem é o tratamento com uma dose semanal, podendo ser administrada como tratamento diretamente observado (DOT) e a duração reduzida do esquema -tres meses-.O inconveniente é a interação com o Dolutegravir. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida 300 mg diários por nove ou seis meses.Acompanho pacientes com HIV frequentemente expostos a familiar ou companheiro com escarro +. Por sinal, nas últimas oportunidades fui obrigada a enviar o paciente com copia da pagina 68 do Manual de Tuberculose para que liberassem a medicação de ILTB no CMS. , Positivo: A isoniazida é relativamente bem tolerada., Negativo: Necessário acompanhar as enzimas hepáticas -não é raro ter que suspender temporariamente a medicação até normalizarem- e sempre que possível administrar piridoxina para evitar neuropatias periféricas. Infelizmente a piridoxina não é mais disponível no SUS.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Derrame pleural por tuberculose durante 30anos como tisiologista do Instituto Clemente Ferreira , Positivo: Cura na grande maioria dos casos, Negativo: Rifampicina e isoniazida hepatotoxicidade
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Tratamento eficaz e seguro, Negativo: Tempo longo para a conclusão 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Sim, concordo!Pois conforme a recomendação o seu uso é benéfico para a melhora da adesão e diminuição no tempo de tratamento. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, A possibilidade de redução de tempo de quimioprofilaxia é favorável 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Poucos efeitos colaterais com Isoniazida, Negativo: Longo tempo de quimioprofilaxia 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, A possibilidade de redução de tempo de quimioprofilaxia é favorável 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Poucos efeitos colaterais com Isoniazida, Negativo: Longo tempo de quimioprofilaxia 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, A incorporação de um esquema encurtado para o tratamento da infecção latente por tuberculose será um enorme avanço para o controle da doença. Espera-se maior adesão ao tratamento e, conseqüentemente, melhores desfechos. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: É um medicamento efetivo para tratar a infecção latente, Negativo: Tratamento muito longo e, por isso, altas taxas de abandono.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Redução na taxa de adoecimento por tuberculose , Negativo: Tempo de tratamento muito longo e com alta taxa de abandono
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicinalzoniazida etambutol, Positivo: Cura da doença, Negativo: Efeitos colaterais
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoziazida para tratamento de ILTB , Positivo: Um dos grandes efeitos positivos nos 9 anos que trabalho diretamente com esse agravo, é muito visível a diminuição no número de casos de tuberculose que eram contatos domiciliares de paciente com Tuberculose bacilifera, Negativo: Ponto negativo é o tempo de tratamento, o que muitas vezes dificulta a adesão e o tratamento completo
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, Melhor adesão pelo paciente 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina,isoniazida, Positivo: Proteção contra tuberculose doença naqueles pacientes com risco, Negativo: Tempo longo de tratamento
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inh, Positivo: Resolveu o problema, Negativo: Nauseas 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ripe, Positivo: Curou a doença , Negativo: Artralgia
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, Positivo: Eficácia no tratamento., Negativo: Mais tomadas diárias, mais efeitos colaterais e toxicidade em relação a rifapentina.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Muitos, Negativo: Muitos
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Comodidade do tratamento. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ILTB com Isoniazida., Positivo: ILTB como uma possibilidade de prevenção, embora o tratamento por 6 meses para quem não era doente as vezes dificulta a adesão., Negativo: Tempo, efeitos colaterais das doses, pcte idoso. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RHZE, Positivo: Cura., Negativo: Efeitos colaterais, dificuldade na adesão por longo tempo de tratamento.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Vai melhorar a adesão e melhorar muito a vida do paciente. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, RHZE e Rifampicina., Positivo: Xxxx, Negativo: Longo período de tratamento.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Estudos são pertinente ao uso 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Dosagem baixa boa tolerabilidade, Negativo: Tempo muito longo de tratamento 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, Positivo: Droga bactericida , Negativo: Nenhum
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento em paciente com HIV, alternativa por ef adverso, MDR, Positivo: Tratamento de ILTB 1x/semana, Negativo: Dn 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, isoniazida, piirazinamida., Positivo: Uso isolado de rifampicinaAssociação de isoniazida e rifampicina diminui tempo de tratamento e isoniazida associada rifapentina 1x/semana aumenta adesao, Negativo: Não tem São drogas conhecidas e fAcilitam tratamento de ILTB
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Reduz o tempo de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Para melhora da adesão</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prescrição de pirazinamida, rifampicina, etambutol, isoniazida , Positivo: Tratamento de tuberculose, Negativo: Leucopenia, icterícia</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Diminuir o tempo de profilaxia, aumentar Adesão</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: E um tuberculostático, Negativo: Hepatotoxicidade</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIPE, Positivo: Tuberculostáticos, Negativo: Hepatotoxicidade</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O manejo do paciente com tuberculose multirresistente é complexo e necessita de novas drogas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, Isoniazida, estreptomicina, etambutol, Positivo: Diversos, Negativo: Diversos</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Praticidade na posologia com menor número de comprimidos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos , Positivo: Para tratamento de tuberculose e outras micobacterias, Negativo: Sintomas gástricos , hepatite medicamentosa , neurite periférica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos, Positivo: Tratamento de tuberculose e outras micobacteria para ambas drogas, Negativo: Hepatite medicamentosa , neurite periférica , leucopenia , plaquetopenia , uveíte posterior</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ISONIAZIDA, RIFAMPICINA, Positivo: ISONIAZIDA BEM TOLERADA RIFAMPICINA BEM TOLERADA REAÇÃO ADVERSA POUCO FREQUENTE, Negativo: ISONIAZIDA : FORMULAÇÃO NÃO ADEQUADA PARA CRIANÇAS PEQUENAS PERÍODO DE TRATAMENTO LONGO DIFICULTA A ADESÃO</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina isoniazida e pirazinamida, Positivo: Eficácia ótima, Negativo: Náuseas e epigastralgia
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Redução do tempo de tratamento 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IsoniazidaRifampicina, Positivo: Com a Rifampicina houve melhor adesão ao tratamento., Negativo: Com a Isoniazida houve uma grande taxa de abandono.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Abrevia tempo de tratamento 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, Principalmente pela redução do tempo de tratamento 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso de esquema RIPE em ambulatório de tisiologia, Positivo: Todos encontrados na rede SUS, Negativo: Tempo prolongado de tratamento
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Abrevia tempo de tratamento 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida e rifapentina, Positivo: Redução do risco de adoecimento em pacientes com tb, Negativo: Não observei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, etambutol, Positivo: Melhora acentuada em casos de tb, Negativo: Não observei efeitos negativos</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Facilidade posologia para adesao</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tto usual segundo protocolos, Positivo: Efeitos descritos na literatura, Negativo: Hepatite medicamentosa, dificuldade de adesao</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, Positivo: Disfunção hepática. , Negativo: Hepatite</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O manejo do paciente com tuberculose multirresistente é complexo e necessita de novas drogas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, Isoniazida, estreptomicina, etambutol, Positivo: Diversos, Negativo: Diversos</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida. Excelente droga, extremamente eficiente quando bem aplicada, Positivo: Isoniazida cumpre bem a sua função de tuberculostático, com segurança e baixo custo, Negativo: Efeitos colaterais (raros)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A primeira linha de tratamento para a tuberculose ativa já utiliza a Isoniazida!, Positivo: Eficaz, segura, possui comodidade posológica e baixo custo, Negativo: Já descrito acima</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A adesão é um dos grandes desafios no tratamento de TB, diminuir o tempo melhora a adesão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RHZE, Isoniazida, , Positivo: Tem o efeito esperado, Negativo: Tempo de tratamento</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Melhora dos sintomas como febre e astenia , com ganho de peso durante o tratamento , Negativo: Náuseas, vômitos, hepatite</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida 1 vez ao dia por 6 meses como quimioprofilaxia, Positivo: Resolução do quadro, Negativo: Tempo prolongado de tratamentoEventos adversos</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida e rifampicina, Positivo: Posologia , Negativo: Duração do uso</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Tal recomendação terá impacto em termos de saúde pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol em crianças e adolescentes. , Positivo: Boa taxa de cura e disponibilidade na rede pública., Negativo: Exceto a rifampicina, os demais não têm no momento disponível a suspensão oral para crianças, o que prejudica a adesão ao tratamento na referida faixa etária.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Vai melhorar muito a adesao ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida, Etambutol, Levofloxacina, Amicacina, Positivo: Tratamento de tuberculose no esquema básico ou em esquema especial, se resistência, Negativo: Efeitos colaterais como náuseas, urticárias, lesão hepática ou agravamento de hepatopatia, hiperglicemia</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Comprimido unico 300mg, Negativo: Hepatotoxicidade</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Reduzi o tempo de tratamento, melhorando a adesão 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Redução do tempo de tratamento , Negativo: Possibilidade de mais efeitos adversos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RHZE RifabutinaEstreptomycinacapreomicinaLevofloxacina, etionamida, Positivo: Maior eficácia , Negativo: Mais efeitos advetsos
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIPE, Positivo: Rapida redposta clinica, Negativo: Hipersensibilidade
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Tratamento da tuberculose , Negativo: Não observei nos meus pacientes 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina pirazinamida etambutosl, Positivo: Sucesso na cura da tuberculose, Negativo: Reação alergica como prurido e hepatotoxicidade com a pirazinamida
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Rifampicina, Etambutol, Pirazinamida, Positivo: Controle adequado da tuberculose. Profilaxia da Tuberculose Latente em pacientes HIV, Negativo: Efeitos colaterais como Neuropatu oa periférica e Hepatopatia

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifapentinalsoniazida, Positivo: Eficiente , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IsoniazidaRifabutina, Positivo: Podem ser usados junto com antirretrovirais, Negativo: Não há</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Reduzir o tempo de tratamento preventivo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Fácil tomada., Negativo: Longa duração, dificuldade de adesão pelo tempo.Hepatiotoxicidade.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isonoazida , Positivo: Substância única , Negativo: Uso prolongado</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Aumentaria muito a adesão, reduzindo o número de infecções ativas por consequência</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IsoniazidaRifampicina, Positivo: Efetivos , Negativo: Muito baixa aderência</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Alta efetividade com melhor adesão ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O uso da rifapentina associado à isoniazida, assim como outras formulações para o tratamento da infecção latente é fundamental para oferecer alternativas para a prevenção da tuberculose particularmente em população HIV+ e outras populações vulneráveis.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Isoniazida, Positivo: Foi útil num longo período - desde quando fiz a profilaxia, ttm da infecção latente, em 1994, quando já era recomendado pelas diretrizes do ttm do HIV e aids (1993). Entretanto, tive tuberculose em 2002, numa fase em que estava em falência terapêutica para a aids e estive exposto a uma pessoa em estado crônico e grave de tuberculose, que chegou a ter crises de hemoptíase. , Negativo: Mal-estar principalmente matinal associado à isoniazida, entretanto facilmente contornável.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pessoalmente tive experiência com o uso de diversos medicamentos utilizados no tratamento da tuberculose, uma vez que, apesar de não ser multidrogarresistente (MR), os efeitos adversos com as drogas me obrigou a usar alternativamente drogas usadas para o tratamento da TBMR. Os medicamentos são extremamente tóxicos, particularmente os injetáveis, e inclusive com efeitos neurológicos graves (terizidona). É fundamental que a CONITEC aprove urgentemente o uso de drogas como a bedaquilina, a pretomanida, a linezolida, a delamanida e a sutezolida para que tenhamos alternativas menos tóxicas e mais eficazes para o tratamento da tuberculose, e alternativas para o tratamento da infecção latente com uso de novas drogas, ou novas associações., Positivo: O uso da bedaquilina associada a outras drogas como a pretomanida, moxifloxacina e a pirazinamida tem mostrado excelentes resultados no estudo SimpliciTb no Brasil e no exterior, assim como os fabulosos resultados do estudo Nix-Tb com bedaquilina, pretomanida, linezolida que tiveram taxas de cura nunca vistas inclusive para pessoas pré-XDR (extra resistentes). A OMS JÁ RECOMENDOU o uso de tratamentos completamente ORAIS, e o Brasil está ATRASADO no uso desses medicamentos!!! Precisamos de tratamentos que salvam vidas! Tratamentos longos e tóxicos como temos apenas levam ao baixíssimo nível de taxas de cura que temos. , Negativo: Os níveis de hepatotoxicidade, problemas cardíacos eventuais foram pouco observados e contornados com tratamento observado pelos profissionais.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Como o tempo de tratamento é menor, há maior adesão ao tratamento e menor taxa de abandono do mesmo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol (esquema RIPE), Positivo: Positivo é que são medicamentos fornecidos pelo SUS, sem custo para o paciente, com controle pelas Unidades de Saúde, e eficazes no tratamento da Tuberculose., Negativo: Longo tempo de tratamento, muitas vezes com interrupção e abandono do mesmo.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Não tenho experiência com a rifapentina, mas trabalho com médicos e enfermeiros de credibilidade que validam seu uso com isoniazida. Confiando na experiência destes, valido seus posicionamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Melhor adesão ao tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IsoniazidaOu rifampicina quando o paciente é hepatopata ou adultos com mais de 50 anos ou crianças até 10 anos de idade ou contato de monorresistente à isoniazida ou intolerância à isoniazida., Positivo: Medicamento barato e seguro, Negativo: Tempo longo de tratamento</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Na ILTB com isoniazida. Não tenho experiência com Rifabutina.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Uso de isoniazida na profilaxia da TB no período de 6 a 9 meses, Negativo: A tolerância é excelente a isoniazida</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento TB com esquema básico RHZE, Positivo: Cura clínica com uso correto do esquema basico, Negativo: Poucos efeitos colaterais com o esquema básico: náusea, alergia cutânea leve. Hepatopatia medicamentosa em poucas ocasiões</p>
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Facilita a vida dos ptes coinfectadis Tbc/HIV e ou Hepatites</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RifampicinalsoniazidaEtambutolPirazinamida, Positivo: Tratamento clínico de tuberculose adequados, Negativo: IcteríciaInsuficiência hepática
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Poderá evitar muitos casos de tuberculose 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Broncodilatador para asma, Positivo: Melhora da dispneia , Negativo: Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Broncodilatador , Positivo: Melhora da dispneia, Negativo: Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Aumenta eficacia 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ripe e segunda linha, Positivo: Habituais esperados, Negativo: Habituais esperados 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ripe e segunda linha, Positivo: Habituais, Negativo: Habituais
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Efetividade, Negativo: Tempo de tratamento mais longo
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Tratamento efetivo da tuberculose latente, Negativo: Neuropatia periférica Hepatotxicidade 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol, linezolida, terizidona, levofloxacina, moxifloxacina, PAS, etionamida, clofazimina, capreomicina, amicacina, estreptomina, Positivo: Cura microbiológica , Negativo: Intolerâncias

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Importante essa associação 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Eficaz, barato, bem tolerado , Negativo: Nenhum observado 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Posologia fácil , Negativo: Tempo de tratamento muito demorado.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Menor tempo de tratamento preventivo. 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida., Positivo: Potencializa a ação preventiva., Negativo: Nenhum. 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Reduzira i tempi do tratamento e haverá melhor adesão. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina,isoniazida, piraxinamida,etambutol, Positivo: Bons resultados., Negativo: Baixa adesão, tempo longo de tratamento.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Acentuada redução no tempo de tratamento 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, etambutol, rifampicina., Positivo: Eficiência no tratamento, Negativo: Longo tempo de tratamento.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Precisamos de novos medicamentos para TB 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RMP, RFB, EMB, IHH, Estreptomicina, Amicacina, ofloxacino, Positivo: O principal efeito positivo é a cura., Negativo: Longa duração do tratamento, toxicidades, resistência relacionada a uso inadequado
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ISONIAZIDA, Positivo: Tratamento de tuberculose, Negativo: Efeitos colaterais de neuropatia
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Medicamento barato, Negativo: Apresentação apenas em comprimidos
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, A diminuição do tempo de tratamento é enorme. Isso ajuda na adesão ao tratamento, coisa fundamental em se tratando de doença infecciosa 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Melhor adesao ao tratamento 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos, Positivo: Diminuição do tempo de tratamento e melhor adesão ao tratamento , Negativo: Abandono de tratamento 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos, Positivo: Diminuição do abandono ao tratamento , Negativo: Isoniazida remadores taxas de abandono
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Excelente ação, Negativo: Como tratamento da infecção latente de modo isolado o tempo prolongado que favorece o prejuízo à adesão ao tratamento. 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Possibilitou tratamento de familiares de recém-nascido , Negativo: Longo período, parou no início da gravidez</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Acredito q teremos uma taxa menor de abandono, garantindo a redução do adoecimento por Tb nos contatos, nos pacientes HIV+, e em todas as pessoas q apresentarem viragem tuberculínica, pois com a Rifapentina conseguiremos reduzir o tempo de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, e Rifampicina, Positivo: Tratei com Rifampicina uma paciente com diagnóstico de Psoríase e q apresentou efeito adverso grave a Isoniazida. Completou o tratamento da ILTB com sucesso., Negativo: Poucos pacientes apresentaram efeitos adversos. Muitos pacientes abandonaram o tratamento da ILTB, pela longa duração do tratamento.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A rifapentina +isoniazida vai facilitar a aderência ao tratamento com diminuição considerável do número de doses a serem tomadas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida/Rifampicina, Positivo: Boa resposta e proteção com baixo índice de efeitos colaterais, Negativo: Longo tempo de tratamento com dificuldade na adesão</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Diminuir o risco dos pacientes q vivem c hiv de adoecer com tuberculose , Negativo: Muito tempo de uso Os pacientes acabam não completando as doses</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIPE levofloxacino terizidona amicacina streptomycin, Positivo: Tratamento da tb, Negativo: Efeitos colaterais</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O tempo de tratamento será muito mais curto permitindo uma melhor adesão entre os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Isoniazida, efeito de eficácia comprovada para o tratamento ILTB. Poucos efeitos colaterais. Rifapentina, eficácia comprovada e menor tempo de tratamento., Negativo: Isoniazida, reações dermatológicas, longo tempo de tratamento, pouca adesão por conta disso.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não tenho conhecimento sobre o assunto para opinar 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Isoniazida + rifampicina, Positivo: Acompanhei pacientes em tratamento com bom resultado, Negativo: Emagrecimento, perda de apetite.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida Esquema RIPE, Positivo: Melhora clínica e radiológicas em caso de doença ativa e evitar manifestações da doença em casos latentes, Negativo: Efeito adverso hepático
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquema básico para Tb ativa (isoniazida, rifampicina, etambutol, pirazinamida), e ILTB (rifampicina e isoniazida) Também esquema alternativo com estreptomicina, Positivo: Cura da doença, posologia facilitada, Negativo: Intolerância à rifampicina e isoniazida hepatotoxicidade a Isoniazida
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Redução do tempo de tratamento 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida Rifampicina, Positivo: Com a Rifampicina houve melhor adesão ao tratamento., Negativo: Com a Isoniazida houve uma grande taxa de abandono.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, De acordo com os estudos apresentados, o esquema 3H (3 meses) demonstra ser mais eficaz comparado ao esquema isoniazida 9H (9 meses). O efeito indesejado mais relevante foi a intoxicação do fígado. O uso de rifapentina associado à isoniazida semanal durante 3 meses é uma alternativa segura quando comparada ao uso diário da isoniazida por 9 meses, aumentando assim, a adesão ao tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida , Positivo: Não houve evolução para doença , Negativo: Abandono do tratamento
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Esquema O p tto tb, Positivo: Uma boa resposta terapêutica, Negativo: EpigastralgiaNáuseasNeuropatia periféricaE o número de comprimidos e o tempo de tto
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, facilita muito o tratamento 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIPE, Positivo: eficácia clínica, Negativo: náuseas, hepatotoxicidade, tratamento longo.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Aumenta a adesão ao tratamento 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, isoniazida, etambutol, estreptomicina., Positivo: São medicacoes eficazes para o tratamento, Negativo: Efeitos colaterais próprios de cada medicamento. Uso diário da medicação.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Aumenta a adesão ao tratamento 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, isoniazida, etambutol, estreptomicina., Positivo: São medicacoes eficazes para o tratamento, Negativo: Efeitos colaterais próprios de cada medicamento. Uso diário da medicação.
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Rifampicina, Etambutol, Levofloxacina, Positivo: Melhora da perda de peso e dos sintomas , Negativo: Raramente hepatite medicamentosa
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Ideal para população de rua. Menor tempo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alimentação diaria saudável ; RHZ primeiro esquema, Positivo: Resolutividade., Negativo: Muito tempo de tratamento.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trabalho com tuberculose , praticamente todas as drogas , Positivo: Menor tempo de tratamento e maior eficácia , Negativo: Inúmeros Necessita de tempo prolongado , hepatoxidade, nefrotoxicidade , gastrite medicamentoso , neuropatia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: 25 anos de experiência , não da pra falar em poucas linhas , Positivo: Eficácia e segurança , isto que procuramos em um medicamento , Negativo: Qualquer efeito colateral é negativo em um droga , seja qual for</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apenas com a isoniazida, que é o medicamento padronizado para tratamento de infecção latente., Positivo: Eficácia, Negativo: Tempo de tratamento</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Melhorar a adesão do tratamento, pelo encurtamento do tratamento de ILTB.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com isoniazida, Positivo: Isoniazida, infelizmente não vejo ponto positivo, pensando na ILTB, devido meditação de vários efeitos colaterais e a ma adesão devido o tempo prolongado de uso. , Negativo: Tempo de uso muito prolongado, dificultando a conclusão do tratamento.</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Como diminui o quantitativo de doses e o tempo, promove uma melhor aceitação e conclusão do tratamento, promovendo assim maior quantitativo de cura e diminuição no abandono e posterior retorno ao tratamento, se tornando então mais eficaz.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIP, Positivo: Pacientes curados ao final do tratamento, Negativo: Muitos abandonos e retorno multi resistente devido ao longo tempo de tratamento</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Concordo com o conitec</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Isoniazida, Positivo: Faz a prevenção , Negativo: Muito efeito colateral, hepatotoxicidade</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina isoniazida etambutol pirimetamina, Positivo: Melhora do quadro clínico. , Negativo: Náuseas e vômitos</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: isoniazida, Positivo: efeito excelente com pouco efeito colateral, Negativo: alguns efeitos colaterais leves</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rifampicina, sulfa, Positivo: rifampicina diminuição do tempo de internaçãoSULFA IDEM, Negativo: rifampicina ALERGIA CUTANEA SULFA- DIM FUNÇÃO HEPÁTICA</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Com base no estudo, o novo esquema possibilitará maior taxa de conclusão no tratamento de indivíduos com ILTB, por apresentar alguns pontos significativos como, baixa hepatotoxicidade e principalmente pela comodidade posológica (12 doses semanais em comparação a 270 doses diárias).</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Ideal para população de rua. Menor tempo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alimentação diária saudável ; RHZ primeiro esquema, Positivo: Resolutividade., Negativo: Muito tempo de tratamento.</p>