

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Liberação interferon-gama (interferon gamma release assay - IGRA) para tuberculose - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Por termos na rede do SUS apenas o PPD para investigação da ILTB na população imunocomprometida como é o caso dos pacientes que vivem com o HIV o mesmo pode apresentar resultados alterados, sendo que o IGRA suprime esse viés e contribui para o melhor encaminhamento da investigação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo: Melhor especificidade , Negativo: Operacionalização do exame. O mesmo necessita de uma estrutura laboratorial para a execução.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Pode ser executado por outros profissionais de saúde como enfermeiros pode ser realizado na própria unidade de saúde, seja ela Basica, secundária ou terciária., Negativo: Treinamento difícil, e erros na leitura do teste.</p>	
05/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Alternativa mais dinâmica ao diagnóstico por meio de aplicação de PPD. Ou seja, maior chance de adesão ao processo de diagnóstico e tratamento da ILTB.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Serviço que trabalho faz diagnóstico de ILTB por aplicação de PPD., Positivo: Ter o diagnóstico de ILTB disponível ajuda a conter o avanço da tuberculose entre contatos de casos de TB ativa. Tratar o paciente com um único fármaco ajuda na adesão., Negativo: Diagnóstico por aplicação de PPD é menos dinâmico que pelo IGRA. Tratar crianças com comprimidos piora a adesão.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trabalho com vigilância epidemiológica em tuberculose, anexa à equipe de cuidado em tuberculoses resistentes e multirresistentes e de ILTB para adultos e crianças, portanto tenho experiência profissional com todos os procedimentos diagnósticos formas de tratamento., Positivo: Doses fixas combinadas, acesso a TRM, opções de tratamento alternativo com incorporação de bedaquilina., Negativo: Resistência do próprio paciente em ser tratado com doses supervisionadas, tratamento longo, efeitos colaterais intoleráveis dos fármacos em geral, dificuldades em coletas de escarro para diagnóstico. Falta de medicamentos dispersíveis para crianças. Falhas programáticas.</p>	
04/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, So temos no mundo um produtor de PPD, seu uso depende de treinamento para aplicação e leitura e ter outro metodo mais acessivel.para os profissionsis identifcsem marcador de contato previo com M. Tuberculosis é importante</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIPE, PPD, Positivo: Tratamento e apoio diagnostico, Negativo: Tempo necessario para a cura; leitura do PPD</p>	
04/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A tuberculose é um importante problema de saúde pública, causa de óbito entre a população imunodeprimidas, a qual pela alta taxa de infecção contribuir para perpetuar a disseminação da doença. A tecnologia vai favorecer o manejo individual e coletivo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIPE, Positivo: Rápida redução da baciloscopia do escarro, Negativo: Caso de hepatotoxicidade grave</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O exame facilita o acesso do contato ou grupo de risco</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prova tuberculínica, Positivo: Ela é de fácil implantação nos serviços, porém requer duas idas da pessoa para sua realização. , Negativo: Duas idas ao serviço. Não pode ser realizada todo dia.</p>	
04/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Devido diversas vantagens, como ser mais específico, o resultado não sujeito ao viés do leitor e menor risco de efeitos adversos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Não necessita de laboratório, não existe resultado indeterminado, pode ser usada de forma seriada., Negativo: Treinamento difícil, necessidade de retorno para leitura do exame, possibilidade de efeito booster.</p>	
04/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Medicação muito cara para necessitados que não dispõem condições financeiras</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: COXCIP-4 Estreptomicina oflocacino, Positivo: Cura da TB , Negativo: Perda auditiva com uso da estreptomicina</p>	
04/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A investigação da tuberculose latente dentre os pacientes imunocomprometidos para prevenção da doença é de suma importância para o manejo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Igra quantiferon, Positivo: O retorno que o paciente tem do exame, a forma de realizar o exame que não interfere na rotina do paciente que não tem a necessidade de retornar a fundação para leitura., Negativo: A rotina, a implementação</p> <p>3ª - Não</p>	
04/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Baixo custo, Negativo: Sofre alteração frente a algumas condições como gestação</p>	
05/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quantiferon, Positivo: Exame laboratorial e não examinador-dependenteMais prático e fidedignoAgilizaria os atendimentos, Negativo: Peeço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Mais barato, Negativo: Examinador dependente, mais trabalhoso, exige 2 avaliações, pouco pratico</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo: Método auxiliar confiável para detecção de TB latente e cujos resultados sofrem menos interferências externas do que a prova tuberculínica., Negativo: Atualmente mesmo na rede privada é muito difícil acessar este método propedêutico, além de ser oneroso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prova tuberculínica, Positivo: Método clássico para averiguação de TB latente, Negativo: Depende de duas visitas do paciente (na aplicação e na leitura após 72-96h), depende muito de bom treinamento técnico para aplicação e leitura correta, sofre mais interferências externas.</p>	
04/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, É preciso incorporar novos métodos de diagnóstico para detecção da ILTB visto que o método de PPD requer grande operacionalização das Técnicas de aplicação e leitura do PPD além do exame ser realizado em dois momentos o que dificulta que os pacientes possam comparecer às UBS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Processo de treinamento para as Técnicas de aplicação e leitura da PT., Positivo: Oportunidade de oferta do PPD para contatos identificados e examinados. Identificação oportuna dos casos em doença em atividade e ILTB. Oportunidade de tratamento de ILTB para pessoas com maior risco de adoecimento por TB., Negativo: Alto Número de pacientes faltosos na leitura da PT. Erro de interpretação nas leituras. Falta de padronização das Técnicas de aplicação e leitura nos Estados e MUNICÍPIOS. Alta rotatividade dos profissionais treinados.</p> <p>3ª - Não</p>	
04/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quantiferon TB Gold Quantiferon Gold tB in Tube, Positivo: Maior especificidade na reação positiva, menor custo para o paciente em transporte, ..., Negativo: Talvez uma sensibilidade não muito elevada em determinadas populações</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste tuberculínico menor especificidade e muitas causas de falso negativo, Positivo: Positivo apenas o custo, Negativo: Já respondido.</p>	
04/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Igra, Positivo: Sou Pneumologista Infantil é o Igra é muito importante pra avaliação dos pacientes com Tuberculose e também com Infecção Latente de Tuberculose., Negativo: Nenhum efeito negativo!</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Como pneumologista infantil o Igra é extremamente importante para o diagnóstico de ILTB e de TB ativa., Negativo: Não há efeitos negativos!</p>	
04/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A tuberculose é um importante problema de saúde pública, causa de óbito entre a população imunodeprimidas, a qual pela alta taxa de infecção contribuir para perpetuar a disseminação da doença. A tecnologia vai favorecer o manejo individual e coletivo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIPE, Positivo: Rápida redução da baciloscopia do escarro, Negativo: Caso de hepatotoxicidade grave</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/09/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
04/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA para diagnóstico , Positivo: Ajuda para o diagnóstico nos casos de PPD negativo, Negativo: Ainda tem limitações em paciente linfopenico 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Custo e realização em unidades básicas , Negativo: Reação cruzada e pacientes imunossuprimidos	
09/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Esse teste é muito importante em nosso país endêmico para tuberculose especialmente na população de pacientes que recebem terapia imunossupressora ou apresentam algum grau de desnutrição com resultados falso negativos apos a realização do ppd 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Igra, Positivo: Melhorar a sensibilidade de detecção de tuberculose latente em pacientes que receberão terapia imunomoduladora., Negativo: Ainda precisamos aprender em relação a resultados nconclusivos em areas endemicas para tuberculose 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ppd e igr, Positivo: Mesmo do item 8.2, Negativo: Mesmo do otem 8.3	
04/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todo o tratamento e arsenal de diagnóstico pois trabalho na referência estadual pra controle de tuberculose do estado, Positivo: Medicações muito eficaz para a cura do paciente PPD barato e larga experiência mundial, Negativo: Medicação combinada pra tuberculose com aumento expressivo de eventos adversos PPD - dificuldade técnica para aplicação e leitura do teste, necessidade de duas visitas para completitude do teste, interferência com Bcg e com deficiência de imunidade em especial a celular	
07/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, extremamente importante para o controle da tuberculose 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: isoniazida , Positivo: tratamento para infecção latente de TB , Negativo: nenhum	
01/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Esse teste é muito importante em nosso país endêmico para tuberculose especialmente na população de pacientes que recebem terapia imunossupressora ou apresentam algum grau de desnutrição com resultados falso negativos apos a realização do ppd</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Igra, Positivo: Melhorar a sensibilidade de detecção de tuberculose latente em pacientes que receberão terapia imunomoduladora., Negativo: Ainda precisamos aprender em relação a resultados nconclusivos em areas endemicas para tuberculose</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ppd e igras, Positivo: Mesmo do item 8.2, Negativo: Mesmo do item 8.3</p>	
08/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Sim, uma vez que tuberculose é prevalente em nosso meio, o ppd ter subjetividade no metodo alem da chance de ocorrer tuberculose doenca com uso principalmente de anti tnf justifica a recomendacao de igras pra detecção de tb latente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ppd, Positivo: Custo, Negativo: A dependencia de operador para o exame. A possibilidade de impericia com a aplicacao nao sendo subepidermica</p>	
08/09/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
08/09/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
08/09/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Conheço o produto pois trabalhei em uma empresa de biotecnologia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
08/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, muitos ptes imunossupressos tem BCG falso neg</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: interferom, PPD, ptes imunossupresso, Positivo: maior acuracia nos ptes imunossupressos, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BCG com muitos falsos neg, aplicação e leitura em dias diferentes, Positivo: ---, Negativo: ----</p>	
08/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
07/09/2020	Grupos/associação/organização de pacientes	1ª - Concordo, de grande importância para o controle da TB 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: discussão sobre medicamentos e métodos de prevenção à TB , Positivo: universalidade no tratamento , Negativo: não se aplica	
05/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD., Positivo: Auxilia no diagnóstico de TB., Negativo: Só pode repetir após 3 meses. Necessita de treinamento específico para aplicação. Fica positivo com a BCG. Pouco resolutivo.	
06/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Sou oftalmologista e me deparo diariamente com citações que o IGRA é de suma importancia. O Brasil é um país endêmico e necessita de um diagnóstico correto. A tuberculose pode gerar inúmeras alterações médicas, inclusive oftalmológica. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sempre solicito IGRA nos casos onde a tuberculose faça parte do diagnóstico diferencial., Positivo: O diagnóstico de tuberculose, muitas vezes, é presumido. Não é possível dar o diagnóstico etiológico somente ppd, Negativo: Não tem efeitos negativos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ppd, Positivo: Fácil de fazer e de fácil mensuração, Negativo: Não é específico	
05/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quantiferon, Positivo: Exame laboratorial e não examinador-dependenteMais prático e fidedignoAgilizaria os atendimentos, Negativo: Peeço 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Mais barato, Negativo: Examinador dependente, mais trabalhoso, exige 2 avaliações, pouco pratico	
05/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD., Positivo: Auxilia no diagnóstico de TB., Negativo: Só pode repetir após 3 meses. Necessita de treinamento específico para aplicação. Fica positivo com a BCG. Pouco resolutivo.	
05/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Os testes IGRA vão contribuir para a prevenção da TB nesse grupo de pacientes sob maior risco.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quantiferon, Positivo: Diagnóstico rápido e de maior comodidade para o paciente , Negativo: Não encontrei nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quantiferon., Positivo: Diagnóstico rápido e de maior comodidade para o paciente , Negativo: Não encontrei nenhum.</p>	
05/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trabalhei no Departamento Municipal de Vigilância Epidemiológica., Positivo: A testagem para a infecção latente permite um maior controle da doença., Negativo: Não vejo efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>	
04/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: COXCIP-4 Estreptomicina oflocacino, Positivo: Cura da TB , Negativo: Perda auditiva com uso da estreptomicina</p>	
08/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quantiferon, Positivo: Exame laboratorial e não examinador-dependenteMais prático e fidedignoAgilizaria os atendimentos, Negativo: Peeço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Mais barato, Negativo: Examinador dependente, mais trabalhoso, exige 2 avaliações, pouco pratico</p>	
02/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Método Método rápido é viável...</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Paciente com suspeita de tuberculose., Positivo: Agilidade na resposta, Negativo: Adquirir o produto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Efeitos colaterais indesejáveis de pacientes em tratamento, Positivo: Sem resposta, Negativo: Sem resposta</p>	
03/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD., Positivo: Auxilia no diagnóstico de TB., Negativo: Só pode repetir após 3 meses. Necessita de treinamento específico para aplicação. Fica positivo com a BCG. Pouco resolutivo.</p>	
03/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
03/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
03/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
03/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD., Positivo: Auxilia no diagnóstico de TB., Negativo: Só pode repetir após 3 meses. Necessita de treinamento específico para aplicação. Fica positivo com a BCG. Pouco resolutivo.	
03/09/2020	Paciente	1ª - Concordo, o exame é essencial para diagnóstico. 2ª - Não 3ª - Não	
03/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Fácil manipulação, Negativo: Paciente nem sempre retorna para leitura	
04/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: QuantiFERON-TB Gold , Positivo: Resultados mais precisos para tomada de decisão e manejo clínico dos casos, Negativo: Necessidade de laboratório com pessoal treinado, não julgo negativo, apenas precisa de garantir essa ação 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: teste tuberculínico , Positivo: valor do produto , Negativo: necessidade de pessoa treinada e retorno do paciente para leitura	<a href="#">Clique aqui</a>
02/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, É mandatório o rastreio de TB latente para pacientes imunossuprimidos e temos muitas dificuldades de conseguir PPD 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imunossupressores , Positivo: Rastreio de ILTB, Negativo: Falta de evidências para interpretação em pacientes pediátricos em determinadas situações 3ª - Não	
03/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Muito importante, pelo risco de falso negativo da prova tuberculínica. 2ª - Não 3ª - Não	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
02/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ensaio de Liberação de Interferon Gamma (IGRA)., Positivo: O IGRA é um ensaio importante que pode auxiliar no diagnóstico objetivo da tuberculose latente, apresentando vantagens significativas sobre a prova tuberculínica. A incorporação de novas tecnologias no Brasil no campo da tuberculose é absolutamente essencial, assim como a pesquisa para o desenvolvimento nacional de métodos alternativos para o diagnóstico, prevenção e tratamento desta enfermidade. , Negativo: Custo. É um ensaio mais caro do que a prova tuberculínica, mas na minha opinião sua utilização trará benefícios significativos.</p> <p>3ª - Não</p>	
02/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
02/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Técnica que permite que entre em contato com paciente apenas uma vez. Independe dele retornar a unidade para conclusão do resultado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Técnica utilizada para realizar o exame, Positivo: Não corre o risco de perder um paciente suspeito. Técnica mais confiável, Negativo: Exame que deve ser incorporado pelo Ministério da Saúde na aquisição dos kits para baratear custo ao serviço público</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferon e PPD, Positivo: PPD mais barato. Interferon mais preciso. , Negativo: PPD mais barato, mas é necessário rever o paciente para fazer a leitura do teste. A leitura depende do técnico treinado, mas mesmo assim é uma leitura subjetiva. Demora 48 a 72 horas para realização da leitura. Interferon mais caro, mais preciso e basta realizar a coleta e o equipamento dará o resultado independente do paciente retornar o serviço</p>	
02/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Igra, Positivo: Para auxiliar o diagnóstico , Negativo: Não reportado</p> <p>3ª - Não</p>	
02/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, É uma importante ferramenta para auxiliar no diagnóstico e tratamento da infecção latente por tuberculose.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo: É um método mais rápido e fácil para o diagnóstico da TB latente tendo em vista que o paciente só precisa coletar o sangue para realizar o exame, em contraposição ao PPD (uma vez para a aplicação e outra para a leitura). Não depende de um profissional com certificação de aplicação e leitura como no PPD., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Método auxiliar no diagnóstico da TB latente com muitos anos de utilização pelos serviços de saúde pública., Negativo: Mais trabalhoso, depende de dois contatos do paciente com o serviço de saúde (aplicação e leitura) e depende de profissional capacitado.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
02/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Essa incorporação já é esperada por profissionais de saúde que cuidam de PVHA. E um avanço inquestionável. O diagnóstico da infecção latente leva a prescrição de uma profilaxia que protege o paciente contra TB. Mas se a infecção latente e mal diagnosticada ou não diagnosticada devido a perda de leitura do PPD, por exemplo, a profilaxia não é oferecida e o paciente está em risco de TB e de morrer de TB</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Conduzo um estudo multicritério nacional que utiliza o quantiferon para diagnóstico de TB latente , Positivo: Coleta de sangue que independe de um retorno para leitura, comodidade de coleta junto com outros exames de sangue, maior sensibilidade que o PPD em imunodeprimidos e controle de qualidade do exame de fácil realização além de uma leitura precisa do teste (ao contrário do PPD), Negativo: O preço e a experiência com o PPD e muito maior devido ao tempo de uso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD e o quantiferon de 3ª geração , Positivo: O PPD e barato. O quantiferon de 3ª geração não tem vantagens sobre o de 4ª, nem o preço , Negativo: PPD necessita aplicação e leitura 72 horas após e muitas vezes a pessoa perde a leitura algumas vezes por motivos financeiros. A leitura depende do leitor e tem uma variabilidade grande entre leitores O QTF de 3ª geração menos sensível e específico que o QUANTIFERON GOLD PLUS</p>	
01/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ppd e Igra, Positivo: Ppd baixo custo; Igra maior sensibilidade, Visita única ao laboratório. , Negativo: Ppd precisa retornar para leitura em 72 horas. Igra alto custo</p> <p>3ª - Não</p>	
01/09/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
02/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Sim, além da questão da sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo, um ponto importantíssimo em nosso dia a dia é a necessidade de duas visitas, que muitas vezes impossibilita a leitura do PPD. Outro ponto é a necessidade de capacitação e dependência de profissional capacitado. Muitas vezes quando se consegue um profissional capacitado, o mesmo não permanece na equipe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com ambos, muito maior com PPD. , Positivo: PPD: Disponível no SUS, fácil avaliação e interpretação, de conhecimento geral IGRA: Coleta única, sem influência da vacinação, Negativo: PPD: Frequente falta de insumo, necessidade de voltar ao serviço para leitura, necessidade de capacitação de funcionário para aplicação e leitura IGRA: Não disponível, requereria uma capacitação dos profissionais de saúde para interpretação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exames de imagem, laboratoriais (ziehl Neelsen, anatomopatológico, imunohistoquímica, Geneexpert e outros exames moleculares, cultura lowenstein e middlebrook). No entanto, todos são para diagnóstico de tuberculose doença, e não ILTB. Em imunodeprimidos, muitas vezes pode ser bem difícil diagnosticar tanto a doença quanto a infecção latente., Positivo: Bons para o diagnóstico de doença ativa, Negativo: Não fazem diagnóstico de ILTB</p>	
03/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Aumenta a capacidade diagnostica, diminui o tempo para o diagnostico, reduzindo a possibilidade de transmissão.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste Igra, Positivo: maior sensibilidade diagnostica na tuberculose paucibacilar., Negativo: maior custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BAAR e Genexpert para tuberculose, Positivo: boa sensibilidade nos pacientes bacilífero, Negativo: baixa sensibilidade ou não realizado na ausência de secreção</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Igra, Positivo: Ajudou no diagnóstico , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ppd, Positivo: Ajuda no diagnóstico , Negativo: Falso negativo pode acontecer em imunodeprimidos</p>	
03/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Igra, Positivo: Ajudou no diagnóstico , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ppd, Positivo: Ajuda no diagnóstico , Negativo: Falso negativo pode acontecer em imunodeprimidos</p>	
21/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
02/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamentos: Coxcip4, Estreptomina, Capreomicina, Levofloxacin;Procedimentos: PPD, Coleta de material para exames (BK, Cultura, TRM e TS de escarro e urina);Sistemas de Informação: TBWeb, ILTB-site, LabTB, Positivo: MedicamentosCoxcip4: leva à cura se utilizado corretamente;Estreptomina e Capreomicina: alternativos aos impossibilitados do esquema básico;ProcedimentosPPD: fácil aplicação e leitura, baixo custo aos serviços de saúde por usar poucos insumos para realização;Coleta de material para exames: baixo custo aos serviços municipais;Sistema de Informação: visualização geral do tratamento do paciente e monitoramento dos casos, Negativo: MedicamentosCoxcip: muitas cápsulas à serem ingeridas, tempo prolongado de tratamento;Estreptomina e Capreomicina: requer massa corpórea para longo período de aplicações IM, adesão prejudicada;ProcedimentosPPD: dificuldade de adesão na leitura (paciente não retorna), baixa especificidade;Coleta de material para exames: material insuficiente por coleta inadequada, descarte de material pelos laboratórios centrais (estadual) caso a amostra não atinja os critérios burocráticos estabelecidos;Sistemas de Informação: não dinâmicos, trava demais desestimulando o digitador.</p>	
02/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamento isoniazida. Teste diagnóstico IGRA., Positivo: Identificação e tratamento da infecção latente por tuberculose., Negativo: Longo tempo de tratamento pela isoniazida.</p> <p>3ª - Não</p>	
02/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, TEMOS DESABASTECIMENTOS CONSTANTES DO PPD. A NECESSIDADE DO RETORNO DO PACIENTE AO CENTRO DE SAÚDE PARA LEITURA TAMBÉM É PERDA NA CASCATA DE CUIDADO DO PACIENTE PARA INVESTIGAÇÃO DE ILTB.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo: NÃO PRECISA RETORNAR PARA LEITURA, RESULTADO RELATIVAMENTE RÁPIDO. , Negativo: CUSTO DO EXAME.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA E PPD, Positivo: JÁ RELATADO ACIMA., Negativo: JÁ RELATADO ACIMA.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
02/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O tratamento da tuberculose latente é fundamental para o controle da tuberculose e o alcance das metas pactuadas pelo Brasil. Estudos mostram que o diagnóstico da infecção latente é uma das dificuldades na cascata do cuidado para que mais pacientes sejam tratados. Os IGRA têm o potencial de simplificar e agilizar o diagnóstico da infecção latente aumentando o número de pessoas tratadas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com QTF em projetos de pesquisa, Positivo: Foi positiva no sentido da viabilidade de implementar em unidades de assistência e laboratório público., Negativo: Pela natureza dos testes IGRA eles não podem ser feitos nas unidades de saúde (testes rápidos) pois requerem laboratórios e pessoal treinado.</p> <p>3ª - Não</p>	
02/09/2020	Secretaria Municipal de Saúde	<p>1ª - Concordo, O teste IGRA incorporado a rede pública de saúde deve aumentar a sensibilidade de detecção de casos de infecção latente proporcionando maior efetividade no diagnóstico, além de ser um grande avanço nas questões do controle da Tuberculose no país hoje.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo: Maior efetividade e confiabilidade no diagnóstico, Negativo: nenhum observado até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos disponíveis para tratamento da Tuberculose Latente, Ativa e Resistente disponíveis hoje., Positivo: Efetividade nos tratamentos, Negativo: Reações adversas aos componentes e as vezes dificuldade na aquisição dos medicamentos de forma imediata ao início do tratamento dos casos identificados. Também tem ocorrido falta dos insumos a nível municipal, devido os medicamento não serem repassados pela Assistência Farmacêutica da regional de saúde da região de Campinas, uma vez que a grade de recebimento é trimestral e as vezes não ocorre o envio dos insumos.</p>	
03/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo: MAIS UMA ALTERNATIVA PARA DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE LATENTE, Negativo: CUSTO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD- PROVA TUBERCULÍNICA, Positivo: BAIXO CUSTO, Negativo: EVENTUAL FALTA, NECESSIDADE DE TREINAMENTO E AFERIÇÃO DOS PROFISSIONAIS, RESULTADOS FALSO-POSITIVOS DEVIDO AO BCG</p>	
03/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Fazer o IGRA é fundamental para o diagnóstico da tuberculose.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o IGRA., Positivo: IGRA positivo + exame de imagem sugestivo é forte indicativo de TB., Negativo: Não há efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Desconheço. , Negativo: Fortes reações cutâneas, incluindo abscessos podem acontecer. Dificuldade de aplicação em crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais. Necessidade de aplicar num dia e "ler" dois dias depois. Como é uma aplicação subcutânea há risco do paciente coçar ou aplicar pomada, antisséptico, esparadrapo ou algo que altere o resultado. A aplicação e leitura dependem de profissional de enfermagem muito habitado. Nem sempre um PPD zero significa que a pessoa nunca teve contato com a TB.</p>	
03/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumab, Positivo: Identificou a necessidade de fazer a ILTB, Negativo: banhinho</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento com Adalimumab, Positivo: Melhora clínica, Negativo: Nenhum</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
03/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Tuberculose ainda é uma doença extremamente prevalente em nosso meio. Para a faixa etária infantil, que é aquela com que eu trabalho, a vacinação BCG e o fato das crianças geralmente não serem bacilíferas, tornam esse exame extremamente útil!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o IGRA, Positivo: Não é examinador-dependente., Negativo: Custo elevado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dosagem de ADA., Positivo: Não recebe interferência da vacinação BCG., Negativo: Não pode ser realizado no sangue</p>	
03/09/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
03/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RifampicinaPPDRadiografia de torax, Positivo: Radiografia de torax para diagnóstico de tuberculose doença PPD baixo custo, Negativo: PPD - interferencia do BCG, retorno do paciente para leitura</p>	
03/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ....., Positivo: ....., Negativo: .....</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: jnjww....., Positivo: sddf, Negativo: sdfd....</p>	
03/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A incidência de tuberculose é muito alta. Tudo que facilite o diagnóstico será bem vindo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rx de tóraxPPD, Positivo: Rx baixo custoSegurança, Negativo: Emissão de Radiação2;idas ao laboratório</p>	
03/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
03/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Tuberculose é endêmica no Brasil. Novas drogas mais eficazes, necessitam mais segurança do paciente em relação as doenças infectocontagiosas .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Excelente procedimento para substituição da aplicação de tuberculina, Positivo: Não é necessária a aplicação no paciente, não precisando ir até o laboratório 2 vezes para análise. Tira a subjetividade da leitura do PPD., Negativo: Custo elevado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tuberculina, Positivo: Não há, Negativo: APLicação pode ser incomoda, tem quer retornar ao local de aplicação para leitura.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
15/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Mais efetivo menos taxa de abandono devido ao prazo de aplicação e leitura 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aplicação e leitura ppd, Positivo: Ampliação da rede de diagnóstico e tto de iltb na região , Negativo: Baixa adesão no retorno para leitura	
16/09/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
16/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
16/09/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, Concordo devido o teste auxiliar de forma expressiva na detecção da tuberculose 2ª - Não 3ª - Não	
16/09/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
16/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Custo inferior, Negativo: Necessidade de retorno do paciente para leitura	
16/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
16/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, As razões explicitadas no documento já explicam por si só as vantagens do Interferon-gama sobre a Prova Tuberculinica. A leitura do PPD em muitas ocasiões é bastante complicada, as reações em crianças principalmente são muito exacerbadas, com sintomas bastante desagradáveis, a necessidade de retorno com data restrita para a leitura faz com que muitas crianças acabem perdendo o exame</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou Enfermeira do programa de Tuberculose e realizo as aplicações e leitura do Teste tuberculínico, Positivo: de positivo só temos a revelação do contato e da primo infecção da Tuberculose, Negativo: Sempre foram o PPD23</p>	
15/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Facilita diagnóstico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ripe noeflixacino, Positivo: Tratamento satisfatório, Negativo: Efeitos colaterais</p>	
16/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Existe grande dificuldade logística para realização de PPD nos paciente soropositivos para a triagem de TB latente, de tal modo que grande parte dos pctes ambulatoriais de hiv ou fazem tto de ILTB de forma presumida quando têm CD4&lt;350 ou ficam sem fazer por não conseguirem sair do trabalho em 2 dias na semana para realizar o teste de PPD</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tive a oportunidade de solicitar o IGRA em rede privada, Positivo: Solicitei IGRA para triagem de ILTB em pacientes com hiv, com excelente adesão a coleta já que pode ser feita no mesmo dia dos exames de rotina, Negativo: o custo do exame é um fator limitante para que se peça no SUS e mesmo em rede privada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Quando realizado adequadamente proporciona a possibilidade de se realizar tratamento de ILTB , Negativo: Dificuldade logística , horários pré estabelecidos e rígidos para a realização do ppd de tal modo que a situação mais frequente que enfrento é a do paciente que faz a aplicação mas não faz a leitura, desqualificando o teste</p>	
16/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Sim , concordo em adultos imunocomprometidos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quantiferon e Elispot, Positivo: Quantiferon é mais pratico que o Elispot e necessita menso recursos de laboratorio., Negativo: Baixa sensibilidade em crianças e principlamnte em crianças imunossuprimidas.</p> <p>3ª - Não</p>	
15/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
15/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Mais efetivo menos taxa de abandono devido ao prazo de aplicação e leitura</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aplicação e leitura ppd, Positivo: Ampliação da rede de diagnóstico e tto de iltb na região , Negativo: Baixa adesão no retorno para leitura</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
15/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Concordo devido a maior eficacia do teste em relacao ao PPD 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exame baciloscopia, TRM, Positivo: Pode ser realizado apirafo bronquico, Negativo: Demora no resultado	
15/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Alto indice de falsos negativos em outros exames para deteccao de tuberculose latente em pacientes imunossuprimidos. Risco de diagnostico tardio com prognostico ruim nestes pacientes. Disponibilidade do IGRA permite diagnostico e tratamento precoce. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, Positivo: Diagnostico e tratamento precoce de tuberculose latente em pacientes imunossuprimidos., Negativo: Nenhum. 3ª - Não	
15/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Igra, Positivo: Mais diagnosticos de tbc que mantoux , Negativo: Custo? 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste tuberculinico, Positivo: Larga experiencia , Negativo: Faltas do antígeno Leitura subjetivaFalsos negativos	
15/09/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
09/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Há perda de diagnóstico de tb latente com uso único do PPD 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quantiferon, Positivo: Melhora o diagnóstico de TB latente em pacientes com doença inflamatória intestinal que serão submetidos a tratamento com imuno biológicos, Negativo: custo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD e Radiografia de torax não impedem o aparecimento de TB ativa se negativos, Positivo: custo e disponibilidade, Negativo: falsos negativos em pacientes previamente imunossuprimidos	
16/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, TODAS AS INOVAÇÕES QUE FACILITE A VIDA DO PACIENTE E COLABORE PARA UM MELHOR DIAGNÓSTICO SÃO BEM VINDAS 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INCORPORAÇÃO DO TESTE RÁPIDO MOLECULAR PARA TUBERCULOSE ( Xpert MTB/Rif <sup>®</sup> ), Positivo: MAIOR RAPIDEZ E SENSIBILIDADE NO DIAGNÓSTICO,DIAGNÓSTICO PRECOCE DE RESISTÊNCIA A RIFAMPICINA,CONFIANÇA NO DIAGNÓSTICO, POIS JÁ IDENTIFICA O O DNA DO BACILO, Negativo: NÃO OBSERVEI	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
21/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Teste com desempenho extremamente melhor que o PPD 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA e PPD, Positivo: Melhor sensibilidade, especificidade e acurácia diagnóstica, Negativo: nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Custo baixo, Negativo: dificuldade em encontrar reagentes, baixa acurácia, pouca reprodutibilidade	
21/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, A alta prevalência de resultados indeterminados pode ser uma das principais limitações para o uso rotineiro de IGRAs em Pessoas que vivem com o HIV. A necessidade de repetir o teste aumenta seus custos e deve ser levada em consideração nos estudos de custo-efetividade. O processamento de amostras pode alterar significativamente os resultados. (referencia em anexo). 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fiz o curso pela GSK na época que chegou no Brasil no Rio Grande do Sul., Positivo: Não vejo efeito positivo sem estudos em rotina e se será custo-efetivo em vários locais do Brasil., Negativo: Existem poucos estudos no Brasil em rotina e com avaliação de custo-efetividade para justificar a introdução. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: KIT SIRE Nitratase. Teste de sensibilidade a fármacos de primeira linha., Positivo: Kit Nacional com boa acurácia, que servirá para substituir em locais de baixos recursos o MGIT SIRE BActec. Já realizado em vários locais do país (estudo multicêntrico)., Negativo: Ainda não foi introduzido no SUS.	<a href="#">Clique aqui</a>  IGRA imunossuprimido
20/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
20/09/2020	Paciente	1ª - Concordo, Necessario. 2ª - Não 3ª - Não	
19/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
18/09/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento com Isoniazida 300mg/dia para Tuberculose Latente e faço tratamento com Golimumab (Simponi) para Espondilite Anquilosante. , Positivo: A Isoniazida é assintomática, se tive sintomas de tuberculose não tive conhecimento no momento de atividade da bactéria. O tratamento com Simponi está no início, fiz apenas a primeira aplicação, mas com redução significativa no quadro de dor. , Negativo: O tratamento para Isoniazida, no meu caso que possuo esofagite, gastrite grau B e erosiva, é uma tortura estomacal, causa muitas dores abdominais. Mas suportável. 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, NADA 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: NAO, Positivo: NAO, Negativo: NAO 3ª - Não	
18/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Para que possamos ter mais uma opção de exame diagnóstico em pessoas imunocomprometidos, evitando desenvolvimento da tuberculose, bem como a sua transmissão. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste rápido molecular - GeneXpert, Positivo: Sensibilidade alta., Negativo: Alto custo.	
16/09/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Imunobiológicos e imunossupressores , Humira e azatioprina ., Positivo: Tem eficacia no tratamentos da Dii., Negativo: Pode baixar a imunidade da pessoa , deixando caminhos abertos para infecções e doenças como tuberculose entre outras . 3ª - Não	
18/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, SERA DE MUITA VALIA PRA EVITARMOS A DOENÇA E AMPLIAR O TRATAMENTO DA ILTB 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIFAMPICINA, ISONIAZIDA, PIRAZINAMIDA E ETAMBUTOLPPDPROVA TUBERCULINICA (APLICACAOME LEITURA), ALEM DE TREINAMENTOS, Positivo: O PPD EH DE MUITA UTILIDADE DO DIAGNOSTICO DA ILTB E A INTERVENCAO PRECOCE, EVITANDO CASOS DE TB EM PTES QUE VIVEM COM HIV, Negativo: COM RELACAO AS DROGAS, OS EFEITOS COLATERIAS SAO OS EFEITOS NEGATIVOS, MAS POUCOS PTES POR NOS ACOMPANHADOS APRESENTAM TAIS EFEIROS. COM RELACAO AO PPD, EH SIMPLES, FACIL E PRATICO (TANTO A APLICACAO COMO A LEITURA), POREM EH UM INCOMODO PRO PTE TER DE VIR PRA APLICACAO E RETORNAR COM 72 HORAS PRA LEITURA (O QUE POR VEZES LEVA-O A NAO RETORNAR).	
16/09/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/09/2020	Paciente	1ª - Concordo, É um teste mais uma nova forma de saber se a pessoa teve contato com a tuberculose 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
16/09/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, É importante para nós pacientes com doença inflamatória intestinal um acompanhamento adequado e de fácil acesso no SUS, a fim de garantir a saúde e bem estar, com exames que possam nos auxiliar a um melhor tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu atualmente faço uso de azatioprina, predinisona e infliximab para o tratamento da RCU e faço constantemente exames e um dele é o PDD., Positivo: Os medicamentos, exames e procedimentos realizados, são essenciais para ter uma vida melhor e mais saudável., Negativo: Alguns exames causam desconforto e mal estar, os remédios me causam outros efeitos colaterais como: enjoo, queda de cabelo, ressecamento da pele, osteoporose, entre outros, porém são necessários para me manter viva e tentando ter uma vida um pouco melhor.</p>	
16/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Para diagnóstico de ILTB será importante sobretudo nos serviços de referência em tuberculose.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Testes para diagnóstico de ILTB pré Imunobiológicos , Positivo: Diferencial com BCG (cicatriz vacinal), dificuldade técnica de alguns profissionais na leitura do PPD, por exemplo, pois o IGRA auxilia o diagnóstico precoce e início do tto para ILTB, Negativo: Principal: o valor do IGRA e pouco oferecido pelos laboratórios.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imunobiológicos, imunossuppressores/CO, Positivo: Precocidade do diagnóstico e tto de ILTB , Negativo: Preço e disponibilidade</p>	
16/09/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, De suma importância e necessário...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
16/09/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
16/09/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medição injetável na pele e aguardo de reação, depois de 3 dias você retorna para medição !, Positivo: Só em ter um centro de referência você ser atendido com qualidade e depois saber que você nunca teve contato com a doença ,tranquiliza a alma! Se faz muito importante., Negativo: A demora para medição ,você injeta hoje após três dias retorna para vê o resultado .. deveria ser algo imediato!</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p> <p>Exame feito em Feira de Santana 2020</p>
16/09/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medição injetável na pele e aguardo de reação, depois de 3 dias você retorna para medição !, Positivo: Só em ter um centro de referência você ser atendido com qualidade e depois saber que você nunca teve contato com a doença ,tranquiliza a alma! Se faz muito importante., Negativo: A demora para medição ,você injeta hoje após três dias retorna para vê o resultado .. deveria ser algo imediato!</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p> <p>Exame feito em Feira de Santana 2020</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Devido diversas vantagens, como ser mais específico, o resultado não sujeito ao viés do leitor e menor risco de efeitos adversos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Não necessita de laboratório, não existe resultado indeterminado, pode ser usada de forma seriada., Negativo: Treinamento difícil, necessidade de retorno para leitura do exame, possibilidade de efeito booster.</p>	
18/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, DEVIDO ALTA PREVALÊNCIA DE TUBERCULOSE NO BRASIL, MUITOS PACIENTES IMUNOCOMPROMETIDOS NÃO TEM O DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO LATENTE DE TUBERCULOSE E ACABAM DESENVOLVENDO A FORMA ATIVA DA DOENÇA, MUITAS VEZES COM GRAVIDADE E NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E TRATAMENTO COM VÁRIOS MEDICAMENTOS ADICIONAIS, TORNANDO MAIS CARO O TRATAMENTO COMPLETO. O EXAME INTERFERON GAMA (IGRA) CONTRIBUIRIA NO TRATAMENTO PRECOCE DOS PACIENTES.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
10/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação funciona e existe vários relatos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, TEMOS PROBLEMAS PARA REALIZAÇÃO DE PPD NOS MUNICIPIOS, O QUE TEM DIFICULTADO A REALIZAÇÃO DOS TESTES, A CAPACITAÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS EXIGE UM ELEVADO NUMERO DE PACIENTES E DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS. OS PROFISSIONAIS ANTIGOS SE APOSENTARAM E A OFERTA DE TESTES ACABOU FICANDO BASTANTE PREJUDICADA AOS PACEINTES PELA MENOR OFERTA DE POSTOS CAPACITADOS PARA REALIZAÇÃO DO MESMO. O IGRA IRIA CERTAMENTE AUXILIAR E AUMENTAR A CAPACIDADE DO MUNICIPIO COM GRANDE BENEFICIO A POPULAÇÃO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O Teste tem um custo-benefício melhor do que o PPD.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD - realizado teste por 2 vezes., Positivo: PPD - Sem efeitos positivos., Negativo: PPD - Demora na leitura do teste, que necessita de 72 horas para a realização.</p>	
11/09/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sim, pois somente o teste para saber se já teve contato com vírus não é eficiente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Somente o teste tradicional de TB aplicado na pele oferecido pelo sus, Positivo: Fácil de fazer., Negativo: Não dá a devida resposta se tem a doença latente no organismo. Somente se já teve contato.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Está disponível na rede pública., Negativo: Necessita de pessoal treinado para aplicação e, principalmente, leitura/interpretação do resultado. Paciente precisa retornar ao serviço para a leitura na data agendada (48 ou 72 horas após a aplicação). Caso ele não apareça, o teste está perdido.	
11/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Esse teste é muito importante em nosso país endêmico para tuberculose especialmente na população de pacientes que recebem terapia imunossupressora ou apresentam algum grau de desnutrição com resultados falso negativos após a realização do ppd 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Igra, Positivo: Melhorar a sensibilidade de detecção de tuberculose latente em pacientes que receberão terapia imunomoduladora., Negativo: Ainda precisamos aprender em relação a resultados inconclusivos em áreas endêmicas para tuberculose 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ppd e igras, Positivo: Mesmo do item 8.2, Negativo: Mesmo do item 8.3	
11/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, O exame é muito importante para protegermos os imunocomprometidos. 2ª - Não 3ª - Não	
15/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Esse teste traz ganho diagnóstico importante, sendo mais sensível que o teste com PPD. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já realizei o teste IGRA como patologista clínico, Positivo: Permitiu identificar susceptibilidade em paciente com imunodepressão fazendo transplante de cornea, Negativo: na 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PCR para Tuberculose, muito melhor que escarro corado por Ziehl PBK, Positivo: Permite o diagnóstico rápido, Negativo: na	<a href="#">Clique aqui</a> pdf metanálise diagnóstico Tb 2019
10/09/2020	Paciente	1ª - Concordo, Entendo que este tipo de exame é um investimento, em vários aspectos e sem dúvida um preventivo. 2ª - Não 3ª - Não	
11/09/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Acredito que este teste trará muitos benefícios, principalmente no que tange aos custos de internações e controle da doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
10/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Esse teste é muito importante em nosso país endêmico para tuberculose especialmente na população de pacientes que recebem terapia imunossupressora ou apresentam algum grau de desnutrição com resultados falso negativos após a realização do ppd</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Igra, Positivo: Melhorar a sensibilidade de detecção de tuberculose latente em pacientes que receberão terapia imunomoduladora., Negativo: Ainda precisamos aprender em relação a resultados inconclusivos em áreas endêmicas para tuberculose</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ppd e igrã, Positivo: Mesmo do item 8.2, Negativo: Mesmo do item 8.3</p>	
10/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Aplicação rápida, Negativo: Problemas na leitura, subjetiva</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Fácil aplicação, Negativo: Erros de leitura, subjetiva</p>	
09/09/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, Exame de extrema necessidade visto que a condição de pacientes sofre riscos já comprovados pela medicina.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Exames, Positivo: Controle e detecção precoce para tratamento profilaxia da tbm., Negativo: Não obtive nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Isome5, Positivo: Melhora após 6 meses de tratamento., Negativo: Nenhum</p>	
09/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/09/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O último consenso da World Glaucoma Association coloca o OCT como a principal ferramenta para diagnóstico de glaucoma. Todos os estudos que avaliam cegueira por glaucoma colocam o diagnóstico tardio como fator de risco. O OCT tem sensibilidade e especificidade suficiente melhor que outros métodos para justificar sua incorporação baseado em extensa publicação na área (como consta no parecer da SBG). Entendo que uma vez incorporado, teremos muito mais diagnósticos precoces e mesmo reconhecimento de vários pacientes que estão sendo tratados sem necessidade. Mais diagnósticos corretos e correção de tratamentos indevidos, menos cegueira.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tomografia de coerência óptica., Positivo: Melhor sensibilidade e especificidade que qualquer outra ferramenta diagnóstica tanto funcional como estrutural., Negativo: Não se aplica.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Campo Visual e retinografia. São exames complementares., Positivo: A avaliação da sensibilidade retiniana com o campo visual é complementar a avaliação estrutural quantitativa (OCT) e qualitativa (retinografia). Retinografia sempre vai contribuir com o diagnóstico, mesmo com a mudança de hardware., Negativo: Variabilidade do exame de campo visual, alguns pacientes não conseguem realizar o exame. Pode estar normal em estádios iniciais. Retinografia a avaliação é subjetiva com concordância ruim mesmo entre os especialistas.</p>	
14/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o teste IGRA para detecção de ILTB latente., Positivo: Acurácia e efetividade., Negativo: Não se aplica.</p> <p>3ª - Não</p>	
15/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Acho que o teste é imprescindível</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PPD para diagnóstico de Tb latente e todos os de tratamento para TB, Positivo: preço, Negativo: Dificuldade de se encontrar tuberculina para teste</p>	
15/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
15/09/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
15/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Sou médica patologista clínica e paciente transplantada de Medula Óssea e sei o valor desse exame.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA, na tentativa de disponibilizar para os pacientes, Positivo: Substitui o PPD (teste in vivo) com vantagens, Negativo: Dificuldade de acesso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD RT-23, Positivo: Importante para auxiliar no diagnóstico da TBC, Negativo: O único antígeno confiável era do Statens Serum Institut.</p>	
15/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fizemos um estudo em receptores de transplante renal, a ser publicado, com aumento das indicações de tratamento de tuberculose latente em relação ao TT. , Positivo: Aumento do diagnóstico de tuberculose latente em relação ao TT, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TT, Positivo: É o exame disponível no Sus, Negativo: Nos pacientes com doença renal a taxa de falso negativo é elevada Também houve falta de distribuição do reagente por vários períodos</p>	
15/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Esse teste tem muito a contribuir, em vista da praticidade de realização, menor interferentes em relação ao PPD e potencial diminuição de custo com ganho em escala</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quantiferon Gold - Qiagen, Positivo: Rápido Diagnóstico, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Não</p>	
15/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Operacionalmente mais fácil que o teste tuberculínico, não exige retorno para leitura (uma parcela dos que fazem o PPD não retornam para leitura) e não é subjetivo como a leitura do PPD. Sensibilidade e especificidade semelhante ao PPD.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: - como assessora de pesquisa de um serviço de referência para pacientes HIV+, tenho estudado sobre o tema (IGRA para diagnóstico de TB Latente) há alguns anos, e tenho convicção que será um bom meio diagnóstico para essa população. O ideal seria que houvesse mais de um teste disponível no mercado brasileiro, pois a concorrência sempre é bom para o consumidor. , Positivo: - coleta por punção venosa, o material podendo ser coletado por ocasião de coleta de exames de rotina- não há subjetividade na interpretação do resultado- sensibilidade e especificidade semelhante ao PPD- não há necessidade de profissional treinado para realização , Negativo: - Custo alto- cuidado no procedimento de coleta</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: teste tuberculínico, Positivo: - baixo custo- boa sensibilidade e especificidade, Negativo: - retorno para leitura (perda de pacientes)- prurido no local da aplicação do PPD, principalmente em casos de resultado flictenular-</p>	
11/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rifampicina, isoniazida, Etambutol e Pirazinamida, Positivo: Cura do Paciente., Negativo: Nenhum</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, sim, o ganho seja em sensibilidade, especificidade para o paciente e saúde pública do IGRA comparado ao PPD é internacionalmente reconhecida como superior e visando seguir com o plano nacional de combate à tuberculose a inclusão do IGRA em substituição ao TST é de imensa valia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: T-SPOT.TB da empresa Oxford Immunotec, Positivo: Desempenho clínico incomparável. Muitos poucos resultados falsos negativos (sensibilidade de 98,8%) Detecção confiável de indivíduos realmente infectados. Sem exclusões de pacientes. Pode ser usado em HIV, crianças muito pequenas, triagem antes do tratamento com anti-TNF &amp;#945;; transplante, diálise renal, grupos de pacientes desnutridos e outros imunocomprometidos, bem como na gravidez. Desempenho de laboratório simples e robusto. Teste de repetição reduzido (devido à baixa frequência de indeterminados). Resultados no dia seguinte. Não há necessidade de consulta de retorno do paciente. Todos os procedimentos realizados em um ambiente de laboratório controlado. Economiza custos no controle de TB. Minimiza os custos associados à transmissão posterior. Reduz os custos desnecessários de tratamento e monitoramento de resultados falsos positivos. As estratégias de rastreamento baseadas em teste T-SPOT.TB são significativamente econômicas quando comparadas aos programas de controle de TB baseados em TST. O uso do teste T-SPOT.TB reduz muito o número de contatos tratados para prevenir um caso de TB, Negativo: necessário estrutura de equipamentos para absorção da solução pelo laboratório.</p> <p>3ª - Não</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p> <p>Litetaruta IGRA_TST</p>
11/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, o teste IGRA para o diagnóstico de ILTB (infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis) representa uma alternativa válida ao PPD (Purified Protein Derivative), ou pode ser utilizado em conjunto com este, principalmente em indivíduos imunocomprometidos e crianças, além de representar a melhor escolha para indivíduos vacinados com BCG.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA em pacientes portadores de doença de Crohn que necessitariam de terapia biológica, Positivo: aumenta a chance de diagnosticarmos TB latente em pacientes que serão submetidos a imunossupressão, assim como vacinados previamente pela BCG, Negativo: custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: custo baixo, Negativo: pouco disponível, pouco específico</p>	
14/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, SERÁ UM IMPORTANTE INSTRUMENTO DE DETECÇÃO DA ILTB, UMA VEZ QUE MUITAS VEZES TEMOS DIFICULDADES EM REALIZAR O PPD EM PACIENTES DE DIFÍCIL ADESAO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Exame que pode ser feito quando o PPD fica indisponível e em casos duvidosos de reatividade de PPD.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD e IGRA, Positivo: Não se trata de medicamento, Negativo: Resultados indeterminados acontecem. O exame é caro. Continuaria dando prioridade ao PPD que é mais barato mas às vezes não está disponível no Brasil (país rico em casos de tuberculose). Pacientes em uso de imunossupressor constituem um grupo de risco e merecem todo o cuidado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD, Positivo: Preço acessível. Teste bom para rastreamento., Negativo: Indisponibilidade ocasional.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Esse teste é muito importante em nosso país endêmico para tuberculose especialmente na população de pacientes que recebem terapia imunossupressora ou apresentam algum grau de desnutrição com resultados falso negativos após a realização do ppd</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Igra, Positivo: Melhorar a sensibilidade de detecção de tuberculose latente em pacientes que receberão terapia imunomoduladora., Negativo: Ainda precisamos aprender em relação a resultados inconclusivos em áreas endêmicas para tuberculose</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ppd e igras, Positivo: Mesmo do item 8.2, Negativo: Mesmo do item 8.3</p>	
12/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IGRA em imunocompetentes, Positivo: Apesar da boa correlação com o teste tuberculínico, vacinação BCG não interfere no resultado do IGRA., Negativo: Custo elevado mas em imunodeficientes seu emprego se justifica.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste tuberculínico, Positivo: Baixo custo, Negativo: Desabastecimento no mercado nacional e internacional</p>	
12/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PPD e IGRA, Positivo: PPD* É o teste que utilizo na grande maioria dos casos IGRA: * Ainda não tem no SUS, Negativo: PPD* Falta frequente do insumo (PPD) no Brasil* Falta de locais adequados e de condições operacionais para o treinamento dos profissionais de saúde na aplicação e na leitura dos resultados* necessidade de 2 visitas aos serviços de saúde IGRA* Só existe na rede particular e tem alto custo</p> <p>3ª - Não</p>	
12/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O IGRA é uma ferramenta diagnóstica importante na detecção de tuberculose latente e auxiliará o médico na definição de conduta que terá impacto na redução da carga de ILTB no Brasil., Positivo: O IGRA é importante ser incorporado ao SUS no Brasil, país com grande cobertura de vacinação BCG, Já que ele não apresenta o inconveniente da Prova Tuberculínica (PPD) em relação à reação cruzada., Negativo: Não vejo efeitos negativos. A incorporação do IGRA irá fornecer uma ferramenta importante na detecção de ILTB no Brasil.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho larga experiência com a utilização da Prova Tuberculínica (PPD) e IGRA. Essas ferramentas de detecção de ILTB não são excludentes - são complementares e importantes., Positivo: O IGRA não sofre a influência da vacinação BCG quando utilizado como ferramenta de detecção de ILTB. No Brasil, com larga cobertura de vacinação pelo BCG, essa vantagem do IGRA sobre a Prova Tuberculínica (PPD) é extremamente relevante., Negativo: Não vejo efeitos negativos na incorporação do IGRA no Brasil.</p>	
12/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Pq é comum eles serem coefectados</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
21/09/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
15/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fizemos um estudo em receptores de transplante renal, a ser publicado, com aumento das indicações de tratamento de tuberculose latente em relação ao TT. , Positivo: Aumento do diagnóstico de tuberculose latente em relação ao TT, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TT, Positivo: Eh o exame disponível no Sus, Negativo: Nos pacientes com doença renal a taxa de falso negativo é elevada Também houve falta de distribuição do reagente por vários períodos	