

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Exame de dosagem de anticorpo antirreceptor de acetilcolina para diagnóstico da Miastenia Gravis - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Sou neurologista, especialista em doenças neuromusculares e as dosagens de anticorpos na Miastenia Gravis representam um marco ao diagnóstico e escolha de tratamento à luz dos conhecimentos científicos atuais. Torna possível uma estratificação de condutas, incluindo indicações melhores a timectomia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Solicito com frequência estes exames de anticorpos que auxiliam, por sua especificidade, no diagnóstico da doença. Creio que devido ao perfil clínico peculiar dos pacientes com anticorpo anti MUSK, este também deveria ser incorporado ao protocolo para melhoria do atendimento dos demais casos negativos do anticorpo antireceptor de acetilcolina., Positivo: A dosagem do receptor antireceptor de acetilcolina auxiliar muito na escolha do tratamento e no encaminhamento dos casos refratários a timectomia. Também a dosagem do anti MUSK auxilia na escolha dos tratamentos, uma vez que os pacientes que não possuem o anticorpo antireceptor de acetilcolina tendem a responder menos a alguns tratamentos habituais., Negativo: Em relação a dosagem de anticorpos não tenho visto efeitos negativos significativos (O custo da do exame, tem dificultado a sua realização pelo SUS). Apenas reforço que não é necessário a dosagem seriada frequente, pois isso não tem modificado as condutas, em relação ao tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Acompanho todos os tipos de pacientes com miastenia. Sigo as recomendações da ABN e demais comitês científicos nos tratamentos. Cada paciente é tratado dentro de um protocolo, mas com as individualizações necessárias., Positivo: Os corticoides ajudam no resgate, enquanto os anticolinesterásicos melhoram os sintomas. Nos períodos de agravamento, prescrevo imunoglobulina humana, ou plasmaferese. Em geral, uso azatioprina para manutenção. , Negativo: Os corticóides a longo prazo sempre trazem seus efeitos colaterais, especialmente se as doses precisam ser mantidas altas por maior tempo.</p>	
16/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Se o diagnóstico precoce possibilita um tratamento mais eficiente é muito importante essa tecnológica ser adicionada ao SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dosagem do anticorpo anti-receptor de acetilcolina., Positivo: Biomarcador diagnóstico Biomarcador prognóstico em alguns casos Orientador de condutas em outros casos Essencial em situações de difícil diagnóstico diferencial , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Concordo porem a resolução não inclui os distratares de terço médio de face ( técnica fundamental na correção de deformidades craniometrias faciais em fissuramos) e a distração alveolar, amplamente utilizada no correção de atrofia alveolares severas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Distratores mandibulares, de preço médio da face e alveolares de diversos tipos e marcas comercias, Positivo: Técnica com maior previsibilidade na correção de deformidades e atrofia ósseas severas, possibilidade de tratamento precoce das deformidades, menor morbidade, Negativo: necessidade de segunda cirurgia, técnica requer grande curva de aprendizado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: enxertias e proteses , Positivo: resolução em um unico procedimento, Negativo: indicações limitadas, maior morbidade/custo, ,menor previsibilidade</p>	