

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Técnico - Citrato de tofacitinibe para o tratamento de retocolite ulcerativa ativa moderada a grave - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. A retocolite ulcerativa é uma doença crônica que afeta dramaticamente a qualidade de vida do paciente e o tofacitinibe tem resultados excelentes. É imperativo que tenhamos mais esta opção terapêutica.</p> <p>2ª - Utilizei o tofacitinibe em 10 pacientes e obtive resultados muito bons, principalmente ao levar em conta que usei em pacientes refratários aos outros tratamentos incluindo biológicos.</p> <p>3ª - O tofacitinibe por tratar-se de molécula pequena tem custo muito inferior aos biológicos, o que pode beneficiar mais gente com menor gasto.</p> <p>4ª - Já dito acima.</p> <p>5ª - Totalmente a favor da inclusão do tofacitinibe na farmácia de alto custo. Beneficiando assim uma população muito sofrida e trazendo uma nova opção terapêutica eficaz e mais barata.</p>
03/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
03/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. Estudos randomizados e controlados comprovando melhora clínica e endoscópicas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
03/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
04/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
04/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo. O Tofacitinibe é uma opção importante sos pacientes com retocolite moderada e grave qye não responderam as drogas biologicad 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
04/05/2021	Paciente	1ª - Concordo. É uma e excelente medicação conforme publicações de uso oral o que facilita bastante a adesão. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
04/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo. o tofacitinibe mostrou excelentes resultados no tratamento de pacientes com retocolite ulcerativa moderada a grave falhados de terapia biológica (anti-TNF, anti-integrina) 2ª - comprovação científica no tratamento dos pacientes com retocolite ulcerativa moderada a grave falhados do tratamento conservador e anti-TNF 3ª - custo menor que as novas moléculas de agentes biológicos 4ª - custo menor que as novas moléculas de agentes biológicos 5ª - tenho pacientes em uso com excelentes resultados

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. Já existe forte evidências para o uso da medicação</p> <p>2ª - não</p> <p>3ª - não</p> <p>4ª - sim, a medicação têm um custo bem mais barato que os biológicos</p> <p>5ª - Não</p>
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. A incorporação do Tofacitinibe é de fundamental importância para os pacientes com RCU. É uma molécula oral, sem imunogenicidade e com rápido início de ação.</p> <p>2ª - “Real-world evidence of tofacitinib effectiveness and safety in patients with refractory ulcerative colitis” Digestive and Liver Disease. 2020 Mar;52(3):268-273. doi: 10.1016/j.dld.2019.10.003. Epub 2019 Nov 13., , “Tofacitinib for ulcerative colitis: results of the prospective Dutch Initiative on Crohn and Colitis (ICC) registry” Aliment Pharmacol Ther 2020;51(9):880–8 , , “Safety of Tofacitinib in a Real-World Cohort of Patients With Ulcerative Colitis” Clinical Gastroenterology and Hepatology. <a href="https://doi.org/10.1016/j.cgh.2020.06.050">https://doi.org/10.1016/j.cgh.2020.06.050</a>., , “Tofacitinib in Treatment-Refractory Moderate to Severe Ulcerative Colitis: Real-World Experience from a Retrospective Multicenter Observational Study”, Hoffmann P, et al. J Clin Med 2020;9(7). doi: 10.3390/jcm9072177.</p> <p>3ª - "Tais medicamentos são mais ""baratos"" que os biológicos e agregam ao tratamento destes pacientes"</p> <p>4ª - aumentar acesso aos tratamentos</p> <p>5ª - nao</p>
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. Medicação eficaz por via oral para colites ulcerativas moderada a grave</p> <p>2ª - Baixo número de efeitos adversos</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. Uma boa medicação com menor custo e que diminuirá necessidade de internações e qualidade de vida dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
04/05/2021	Empresa fabricante da tecnologia avaliada	<p>1ª - Concordo. Conforme discutido no documento de contribuição anexado a este formulário, a empresa concorda totalmente com esta recomendação preliminar favorável à incorporação do citrato de tofacitinibe para tratamento da retocolite ulcerativa moderada a grave, resumidamente, pelos seguintes motivos: As evidências disponíveis mostram superioridade do medicamento em relação ao placebo, tanto no tratamento de indução quanto na manutenção; quando comparado indiretamente (meta-análise em rede), citrato de tofacitinibe parece apresentar eficácia similar ao infliximabe e vedolizumabe nos desfechos indução da remissão da doença e indução da melhora endoscópica; na fase de manutenção, citrato de tofacitinibe parece ter eficácia similar ao vedolizumabe. Do ponto de vista de segurança, para o desfecho evento adverso grave, parece não haver diferença entre tofacitinibe e os dois comparadores biológicos. Além disso, por ser de administração oral, citrato de tofacitinibe pode melhorar a adesão, contribuir para os deslocamentos dos pacientes para a administração do tratamento biológico e reduzir os custos logísticos. Além de proporcionar economia para o sistema de saúde (menor custo direto de tratamento em relação aos biológicos sem o custo da cadeia fria), o modelo de custo-utilidade mostrou um cenário de dominância em relação ao vedolizumabe (menor custo e maior efetividade) e um cenário de menor custo e menor efetividade em relação ao infliximabe.</p> <p>2ª - Os aspectos relacionados à evidência do citrato de tofacitinibe estão no documento anexo a este formulário</p> <p>3ª - Os resultados da avaliação de custo-utilidade mostraram cenário de dominância em relação ao vedolizumabe e menor custos e menor efetividade em relação ao infliximabe. Contudo, como qualquer modelo econômico, há limitações intrínsecas ao próprio modelo. Apesar de considerar que os métodos empregados estão adequados às diretrizes nacionais e com resultados robustos, a CONITEC fez alguns apontamentos metodológicos, cuja análise e considerações, por parte da empresa, estão mostrados no anexo a este formulário.</p> <p>4ª - Nos cenários apresentados no modelo original, foi possível demonstrar que a incorporação do citrato de tofacitinibe no SUS poderá proporcionar economia para o sistema de saúde na ordem de R\$ 37,8 milhões (variação de R\$ 25,9 milhões a R\$ 59,3 milhões) nos cinco anos da análise. Alguns aspectos apontados no relatório de recomendação preliminar estão discutidos no documento em anexo a este formulário.</p> <p>5ª - Como conclusão, a empresa gostaria de ressaltar a qualidade técnica do relatório submetido em consulta pública e que, aliado às evidências científicas e a possibilidade de economia para o sistema de saúde, a incorporação do citrato de tofacitinibe poderá contribuir para o melhor cuidado dos pacientes diagnosticados com retocolite ulcerativa.,</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. A Droga tofacitinibe poderá trazer importante contribuição para o manejo da colite ulcerativa moderada a grave refrataria ao manejo convencional ou refrataria a agentes anti-TNF. Por ser droga de uso oral alia-se isto a comodidade, redução de custo relacionado a necessidade de ida do paciente a clínicas de infusão e o fato de não induzir formação de anticorpos anti-drogas (como os agentes anti-TNF) que acaba por levar a perda de resposta ou a reações adversas de hipersensibilidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Do ponto de vista econômico, comparado com outras terapias biológicas injetáveis, a droga poderá reduzir custos do tratamento da RCU moderada a grave refrataria, inclusive ao reduzir a necessidade de cirurgias.</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - A Droga tofacitinibe poderá trazer importante contribuição para o manejo da colite ulcerativa moderada a grave refrataria ao manejo convencional ou refrataria a agentes anti-TNF. Por ser droga de uso oral alia-se isto a comodidade, redução de custo relacionado a necessidade de ida do paciente a clínicas de infusão e o fato de não induzir formação de anticorpos anti-drogas (como os agentes anti-TNF) que acaba por levar a perda de resposta ou a reações adversas de hipersensibilidade.</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo. Ainda não tive contato</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - nao sei</p> <p>4ª - nao sei</p> <p>5ª - nao sei</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. É necessário novas opções terapêuticas para os pacientes com retocolite</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. As formas moderadas a graves da Retocolite Ulcerativa possuem poucas alternativas terapêuticas, em se tratando de pacientes não responsivos ao tratamento clássico. Seria assim mais um recurso terapêutico na abordagem desse grupo de pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. Temos pacientes que não respondem a ação de determina medicação e precisam ter disponível outras moléculas com.mecanismos distintos de ação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Ter o controle completo da inflamação, mínimo da custos de cirurgias, internações, tratamento para câncer, se não resolvemos a atividade tendência logo no início</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. Tenho pacientes em uso da droga com grande benefício clínico.</p> <p>2ª - A droga demonstrou eficácia em pacientes com falha ao tratamento convencional e a biologicos.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. NECESSIDADE DE MELHORES DROGAS PARA O TRATAMENTO DE UMA DOENÇA QUE MUITAS VEZES NÃO SE CONSEGUE A REMISSÃO COM SALICILATOS</p> <p>2ª - NAO</p> <p>3ª - NOA</p> <p>4ª - NÃO</p> <p>5ª - NÃO</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. Processo importante para regularização de novas conquistas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
06/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. Opção de medicação via oral com perfil de segurança bom para pacientes com falha aos tratamentos atuais</p> <p>2ª - nao</p> <p>3ª - nao</p> <p>4ª - nao</p> <p>5ª - nao</p>
07/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. Importante termos uma opção de uma, Pequena molécula no tratamento da RCU</p> <p>2ª - Medicação com resposta rápida e preço reduzido em relação aos biológicos</p> <p>3ª - Nao</p> <p>4ª - Nao</p> <p>5ª - Existem pacientes que preferem medicação via oral</p>
07/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. CONCORDO QUE TOFACITINIBE ESTÁ INDICADO PARA O TRATAMENTO DE RETOCOLITE ULCERATIVA MODERADA A GRAVE</p> <p>2ª - NÃO</p> <p>3ª - FÁCIL ADMINISTRAÇÃO POR SER ORAL SEM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO . DEVIDO OTIMA RESPOSTA DE CONTROLE DA DONEÇA MODERADA A GRAVE, DIMINUI CUSTOS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR.</p> <p>4ª - NÃO</p> <p>5ª - NÃO</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
08/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo. É necessário novas opções para o tratamento da RCUI moderada a grave que atenda a diferentes perfis de pacientes sempre avaliando a eficácia e segurança da droga 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
09/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo. Liberação da medicação 2ª - Não 3ª - Nao 4ª - Não 5ª - Não
13/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - inumeras estudos que demonstarm rapida resposta na melhora de casos moderados/graves de rcu., , ÓTIMAS JANELA DE OPORTUNIDADE DE USO EM PCTES RCUI MODERADOS/GRAVES COM MANIFESTAÇÕES EXTRA-INTESTINAIS ARTROPATICAS . 3ª - EM TERMOS DE FARMACO-ECONOMIA - TOFACITINIBE REVELOU-SE UM TRATAMENTO MUITO MAIS BARATO TANTO DURANTE REMISSÃO/ MANUTENÇÃO/ OTIMIZAÇÃO DE DOSE. 4ª - Não 5ª - EXPERIENCIA CLÍNICA POSITIVISSIMA, COM ENORME IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DESTES PACIENTES
14/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
15/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. A medicação Tofacitinibe será uma importante opção para tratamento por via oral para pacientes com Retocolite ulcerativa moderada/grave e pacientes corticodependentes/corticoresistentes e refratários a Azatioprina.</p> <p>2ª - Nao</p> <p>3ª - Medicação com custo inferior comparada com as medicações infusionais. Outra consideração, a posologia por via oral dispensa as idas aos centros de infusões.</p> <p>4ª - Nao</p> <p>5ª - Nao</p>
16/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. Considero o medicamento ( Tofacitinibe ) uma opção para os pacientes portadores de retocolite ulcerativa moderada a grave e para os pacientes refratários aos tratamentos convencionais , por apresentarem estudos robustos na literatura a respeito da segurança e eficácia , mecanismo de ação alternativo, além de facilitar a aderência ao tratamento devido a comodidade posológica e via de administração.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sou coloproctologista na cidade de Guarulhos e presto assistência aos portadores de doença inflamatória intestinal como médico especialista desde 2005. Atualmente, nosso ambulatório possui cerca de 700 pacientes com DII. ( SUS )</p>
16/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. Sabemos da necessidade de mais opções de tratamento para a retocolite ulcerativa, devido a resposta nem sempre adequada aos disponíveis, com risco de câncer nos pacientes com inflamação crônica e da necessidade de colectomia total e de estomas definitivos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não, embora seja claro que é um medicamento de custo menor comparado aos disponíveis hoje, com menor gasto com infusões venosas por ser de uso oral</p> <p>4ª - Vide acima</p> <p>5ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/05/2021	Sociedade médica	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo. Como foi recomendada a incorporação do tofacitinibe por este órgão, o Gediib apresenta seu parecer favorável, porém, como só cita a incorporação na falha à terapia convencional e não cita a falha à terapia biológica o grupo apresenta parecer com concordância parcial ao documento sugerido pela CONITEC requerendo que o mesmo medicamento seja utilizado, também após biológico.</p> <p>2ª - "O tofacitinibe já apresenta aprovação na ANVISA para uso na retocolite ulcerativa (RCU) desde março/2019 (1) e está incorporado nos algoritmos nacionais e internacionais de tratamento dessa doença (2,3). O tofacitinibe (CP-690,550) é uma pequena molécula para uso oral. A inibição da JAK1, JAK3, e, em menor grau, JAK2 (4-6) resulta no bloqueio da sinalização de diversas citocinas, incluindo interleucina (IL)IL-2, IL-4, IL-6, IL-7, IL-9, IL-15, IL-21 e interferon-gama, entre outros (4-6). Estas citocinas estão diretamente envolvidas na patogênese da doença inflamatória intestinal exercendo suas funções na sinalização de diferentes vias inflamatórias incluindo ativação e proliferação linfocitária., , Vários estudos científicos demonstram a eficácia do tofacinib (4-8) e o posicionamento de órgãos internacionais orientam o uso deste medicamento nos casos de falha a terapia convencional ""ou"" terapia biológica, conforme descrito abaixo:, , 1) National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2018): Tofacitinibe é recomendado pelo NICE como uma opção para o tratamento de retocolite ulcerativa ativa moderada a grave, quando a terapia convencional (aminossalicilatos, corticosteroides ou tiopurinas) ou um agente biológico (infliximabe, adalimumabe e golimumabe ou vedolizumabe) não pode ser tolerado, ou a doença respondeu inadequadamente ou perdeu a resposta ao tratamento. O medicamento será recomendado apenas se a empresa fornecer um desconto acordado. , , 2) Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH, 2019): O CADTH recomenda o reembolso do tofacitinibe para o tratamento de pacientes adultos com RCU ativa moderada a grave, com resposta inadequada, perda de resposta ou intolerância a terapia convencional (5- aminosalicilatos, corticosteroides e imuno- moduladores) ou biológica (vedolizumabe, infliximabe, infliximabe biossimilar, adalimumabe e golimumabe), se as seguintes condições forem atendidas: 1) o custo do tratamento com tofacitinibe 10mg duas vezes ao dia não pode exceder o custo do tratamento da RCU com o anti-TNF biológico menos custoso; 2) após oito semanas do início do tratamento com tofacitinibe, deve-se realizar avaliação da resposta e caso não seja alcançada a resposta clínica esperada, o medicamento deve ser descontinuado; 3) apenas gastroenterologistas podem prescrever o medicamento. , 3) Scottish Medicines Consortium (SMC, 2019): A agência recomendou o tofacitinibe ao sistema de saúde escocês para retocolite ulcerativa ativa moderada a grave em pacientes adultos com resposta inadequada, perda de resposta ou intolerância a terapia convencional ou um agente biológico."" , , "</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - "3) Scottish Medicines Consortium (SMC, 2019): A agência recomendou o tofacitinibe ao sistema de saúde escocês para retocolite ulcerativa ativa moderada a grave em pacientes adultos com resposta inadequada, perda de resposta ou intolerância a terapia convencional ou um agente biológico."" , , Assim, conforme relatório emitido pela CONITEC, referente à sua 96ª reunião ordinária, realizada em abril do corrente ano, no qual recomenda a incorporação no SUS do tofacitinibe, indo ao encontro dos posicionamentos internacionais acima citados, o que impactará de maneira positiva o tratamento dos pacientes com RCU no Brasil. Esse medicamento, se incorporado, estará indicado para tratamento de pacientes adultos com retocolite ulcerativa ativa moderada a grave com resposta inadequada, perda de resposta ou intolerância a corticosteroides, azatioprina e 6-mercaptopurina. O tofacitinibe, conforme o próprio relatório da CONITEC, demonstrou eficácia comparável às terapias disponíveis na indução de remissão, porém com superioridade ao infliximabe na manutenção da remissão clínica e melhora endoscópica.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
--------------	-----------------	---------------------------

Além disso, tem perfil de segurança que se assemelha aos comparadores. , , Porém, algumas considerações são válidas: , a)O tofacitinibe é opção terapêutica não só nos casos de falha ou intolerância à prednisona, azatioprina e 6-mercaptopurina, mas também pode ser utilizada naqueles pacientes falhados ou intolerantes à terapia biológica (9);, Há indicação de tofacitinibe em outras doenças imunomediadas, que muitas vezes estão associadas à RCU, e o uso dessa medicação poderia permitir o tratamento de mais de uma doença ao mesmo tempo; , Em resumo trata-se de medicamento com características favoráveis para utilização: a) substância não biológica (sintético), b) sem imunogenicidade, c) segurança, d) custo efetividade, , Mediante eficácia já comprovada do tofacitinibe na RCU e a possibilidade de ser um terceiro agente terapêutico disponível o GEDIIB entende que o TOFACINIBE é mais uma opção de tratamento do paciente com doença moderada a grave, que não apresentaram resposta aos tratamentos prévios (convencional ou terapia biológica) antes de se considerar a colectomia total ao indivíduo portador de RCU. Assim, recomendamos a incorporação do Tofacitinibe para uso em pacientes com doença moderada a grave e índice de atividade da doença igual ou maior a 6 pelo escore de Mayo (com subescore de endoscopia de pelo menos 2), refratários ou intolerantes ao uso de corticoides, aminossalicilatos, tiopurinas e biológicos. , , Referências, 1. Xeljanz. Bula do produto, último acesso em 10/Jun/2019, 2. Teixeira FV, Vilela EG, Damião AOMC, Vieira A, Albuquerque IC, Parente JML et al. Rev Assoc Med Bras (1992). 2019 May 2;65(4):547-553. doi: 10.1590/1806-9282.65.4.547., 3. Rubin DT, Ananthakrishnan AN, Siegel CA, Sauer BG, Long MD. ACG Clinical Guideline: Ulcerative Colitis in Adults. Am J Gastroenterol. 2019;114(3):384–413., 4. Olivera P, Danese S, Peyrin-Biroulet L. Next generation of small molecules in inflammatory bowel disease. Gut. 2017;66:199-209., 5. Olivera P, Danese S, Peyrin-Biroulet L. JAK inhibition in inflammatory bowel disease. Exp Rev Clin Immunol. 2017;13:693-703., 6. De Vries LCS, Wildenberg ME, De Jonge WJ, D’Haens GR. The future of Janus Kinase inhibitors in inflammatory bowel disease. J Crohn’s Colitis. 2017;11:885-93., 7. Boland BS, Sandborn WJ, Chang JT. Update on Janus kinase antagonists in inflammatory bowel disease. Gastroenterol Clin North Am. 2014;43:603-17., 8. Sandborn WJ, Ghosh S, Panes J, Vranic I, Su C, Rousell S, et al. Tofacitinib, an oral Janus kinase inhibitor, in active ulcerative colitis. N Engl J Med. 2012;367:616-24., 9. Joseph D. Feuerstein, Kim L. Isaacs, Yechezkel Schneider, Shazia Mehmood Siddique, Yngve Falck-Ytter, Siddharth Singh. AGA Clinical Practice Guidelines on the Management of Moderate to Severe Ulcerative Colitis. Gastroenterology 2020;158:1450–1461., , Rogério Saad Hossne , Presidente , Gestão 2021-2022, "

17/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
------------	---	--

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. Sou favorável à incorporação do medicamento. Droga de ação oral com estudos demonstrando eficácia e segurança. Sou favorável à recomendação de uso na falha de derivados do 5-aminosalicilato orais e retais, além da azatioprina, antes do uso de biológicos, como infliximabe ou vedolizumabe.</p> <p>2ª - Estudos OCTAVE-1 e OCTAVE-2 comprovam resposta e remissão clínica, além de resposta endoscópica, nas semanas 8 e 52, tanto para dose de 5mg 2 vezes ao dia quanto para a dose de 10 mg 2 vezes ao dia.</p> <p>3ª - Artigo PMID: 33502905 mostra que tofacitinibe é custo-efetivo como opção terapêutica para pacientes com recólite ulcerativa moderada a grave na Alemanha, quando comparado ao uso de terapia biológica com infliximabe, adalimumabe, golimumabe, vedolizumabe e ustekinumabe. Artigo PMID: 33615953 mostra que a droga pode ser tratamento menos custoso e mais efetivo quando comparado à vedolizumabe na população da Espanha. ,</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Tenho boa experiência clínica com a droga, com boa tolerabilidade, resposta e perfil de segurança.</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/04/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
27/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo. O medicamento Tofacitinibe apresenta um grande avanço no tratamento da Retocolite Ulcerativa. Por ser oral e com um rápido início de ação é uma opção maravilhosa para os pacientes, além de reduzir o custo para o sistema único de saúde. 2ª - Não 3ª - Reduz o custo direto e indireto. 4ª - Não 5ª - Não
28/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
28/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo. Mais uma opção terapêutica para o tratamento de RCU moderada à grave 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
29/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo. Esta nova droga pode ajudar em muito no tto da RCU em pacientes em vias de imunossupressão. 2ª - Efeitos colaterais são inferiores ao uso de azatioprina. Sobretudo em pacientes idosos em necessidade de imunossupressão. 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo. Muito importante termos novas opções de tratamento com mecanismos de ação diferente 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
29/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
29/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
29/04/2021	Paciente	1ª - Concordo. Nós pacientes precisamos de um leque maior de medicações 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
30/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo. Sim 2ª - Sim 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
--------------	-----------------	---------------------------

30/04/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
------------	----------	---