

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Técnico - Pregabalina para o tratamento de dor neuropática e fibromialgia - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
01/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
02/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
02/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
02/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
08/06/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo. E necessario 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
10/06/2021	Secretaria Estadual de Saúde	1ª - Discordo. , 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - A dor neuropática é um tipo complexo de dor iniciada ou causada por uma lesão primária, ou por uma disfunção do sistema nervoso. É definida como dor que surge como consequência direta de uma lesão ou de uma doença que afeta o sistema somatossensorial em nível periférico ou central. A neuropatia periférica se desenvolve primeiro nos nervos mais longos do corpo. Existem inúmeras causas de neuropatia periférica, incluindo certas condições hereditárias, doenças virais, insuficiência hepática ou renal e toxinas, bem como doenças, como diabetes, doenças vasculares e doenças reumatoides. A neuropatia periférica pode ser de natureza motora, sensorial ou autonômica. Também pode afetar um nervo (mononeuropatia), dois ou mais nervos em diferentes áreas (mononeuropatia múltipla) ou muitos nervos (polineuropatia). É sabido que a dor neuropática periférica é associada à Febre Chikungunya (FC) e tem sido descrita e relacionada a um cenário clínico mais agressivo da doença. Segundo descrito neste relatório técnico em consulta pública, o Scottish Medicine Consortium recomenda o uso da pregabalina para o tratamento de adultos com dor neuropática periférica, sendo restrita aos pacientes que não obtiveram alívio adequado da dor ou não toleraram os tratamentos convencionais de primeira e segunda linha. Corroborando com tal fato, estudos demonstram que os casos em que a dor decorrente da FB apresente características neuropáticas (dor em queimação e/ou latejante, fisgada ou sensação de choque, agulhadas, frio ou formigamento), pode-se fazer uso do anticonvulsivante pregabalina nas doses recomendadas. , Em detrimento disso, sugerimos uma abordagem mais sistemática sobre dor neuropática periférica, além da descrição existente para neuropatia periférica diabética e neuralgia pós herpética e avaliação de estudos com o medicamento vislumbrando a possibilidade de incluí-lo também no manejo clínico da dor atribuída à FC e/ou inclusão do CID 10 A92.0 no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Dor Crônica.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
14/06/2021	Sociedade médica	1ª - Discordo. Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), através da Comissão de Fibromialgia, Dor e Outras Lesões de Partes Moles, entende que a disponibilização da pregabalina, duloxetina e tramadol pelo SUS, via Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, beneficiaria um grande contingente de pacientes e, portanto, recomenda esta medida. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
14/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
14/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
15/06/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo. - 2ª - - 3ª - - 4ª - - 5ª - -

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo. Fundamental tratar dor crônica. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
15/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
15/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo. Importante pra melhora da dor e da qualidade de vida do paciente 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
27/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo. Sou farmacêutica e portadora de fibromialgia e sei da importância e necessidade da adesão desse medicamento no tratamento de dores crônicas. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
28/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não