



## 96ª Reunião da Conitec

Data e horário: 07 de abril de 2021 - 9h às 18h

08 de abril de 2021 - 9h às 18h

### 07 de abril

1. Assinatura da ata da 95ª Reunião da Conitec.
2. Apreciação inicial do certolizumabe pegol para o tratamento de pacientes com psoríase em placas moderada a grave.  
**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.**
3. Apreciação inicial do secuquinumabe para o tratamento da espondilite anquilosante ativa em pacientes adultos na primeira etapa de terapia biológica.  
**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.**
4. Apreciação inicial do citrato de tofacitinibe para tratamento de pacientes adultos com retocolite ulcerativa ativa moderada a grave com resposta inadequada, perda de resposta ou intolerância a corticosteroides, azatioprina e 6-mercaptopurina.  
**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.**
5. Apresentação das contribuições das consultas públicas dos temas:
  - a) Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Artrite Psoriásica; e  
**Recomendação final de atualização.**
  - b) secuquinumabe para tratamento da artrite psoriásica ativa em pacientes adultos na primeira etapa de terapia biológica.  
**Será pautado na próxima reunião. O Plenário achou conveniente aguardar procedimento de compra (pregão eletrônico) a ser realizado pelo Ministério da Saúde para aquisição do medicamento adalimumabe, com previsão de realização em 14/04/2021.**
6. Apreciação inicial do certolizumabe pegol para tratamento de pacientes com artrite psoriásica moderada a grave.  
**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.**



7. Apreciação inicial de nova apresentação da enoxaparina (60mg/ 0,6mL) para tratamento do tromboembolismo venoso em gestantes com trombofilia.

**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.**

8. Apreciação inicial do teste comercial de sondas em linha para detecção do Complexo Mycobacterium tuberculosis (MTB), bem como mutações nas regiões determinantes de resistência à rifampicina e isoniazida (1ª linha) e à fluoroquinolonas e aminoglicosídeos/peptídeos cíclicos (2ª linha).

**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.**

9. Apreciação inicial da ampliação de uso da dosagem de sirolimo para pacientes adultos com linfangioleiomiomatose.

**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.**

## 08 de abril

10. Informe sobre alterações no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de Risco à Infecção pelo HIV, Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais.

**Recomendação final de atualização.**

11. Apresentação das contribuições das consultas públicas dos temas:

- a) Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Transtorno Esquizoafetivo;

**Recomendação final de atualização.**

- b) Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Mucopolissacaridose Tipo VII;

**Recomendação final de aprovação.**

- c) xinafoato de Salmeterol aerossol bucal 50 mcg para tratamento da Asma e da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC);

**Recomendação final de exclusão.**

- d) spray de formoterol + budesonida para o tratamento da asma;

**Recomendação final de não incorporação.**

- e) aflibercepte e ranibizumabe para tratamento de pacientes com degeneração macular relacionada à idade (DMRI) neovascular (úmida); e

**Recomendação final de incorporação de ambos os medicamentos para tratamento de DMRI neovascular em pacientes acima de 60 anos conforme**

**Protocolo do Ministério da Saúde e Assistência Oftalmológica no Sistema Único de Saúde (SUS).**

- f) alentuzumabe para tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente recorrente com características comparáveis aos critérios de tratamento com natalizumabe conforme o estabelecido no PCDT.

**Recomendação final de incorporação para tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente recorrente com alta atividade da doença em falha terapêutica ao natalizumabe conforme o estabelecido no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).**

12. Apreciação inicial do lanadelumabe para profilaxia de longo prazo em pacientes com angiodema hereditário com 12 anos ou mais que não obtiveram redução da frequência de crises ou que apresentaram intolerância à profilaxia atualmente disponível.

**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.**

13. Apreciação inicial da givosirana sódica para o tratamento da porfiria hepática aguda (PHA) em adultos.

**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.**

14. Apreciação inicial do cloridrato de migalastate para tratamento de longa duração de adultos e adolescentes a partir dos 16 anos, com diagnóstico confirmado de Doença de Fabry (deficiência de alfa-galactosidase A).

**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.**