

98ª Reunião da Conitec

Data e horário: 09 de junho de 2021 - 9h às 18h
10 de junho de 2021 - 9h às 18h

09 de junho

1. Assinatura das atas da 97ª Reunião Ordinária e da 5ª Reunião Extraordinária da Conitec.
2. Apreciação inicial de inclusão de nova apresentação do levetiracetam (500mg e 1000mg) como terapia adjuvante para o tratamento de crises mioclônicas em adultos, adolescentes e crianças com idade superior a 12 anos e peso igual ou acima de 25kg.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.

3. Apreciação inicial da exclusão do eculizumabe para tratamento de pacientes com Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN).

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável à exclusão.

4. Apreciação inicial do pembrolizumabe, axitinibe, ipilimumabe e nivolumabe para tratamento de primeira linha de câncer de células renais.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.

5. Apreciação inicial do cabozantinibe ou nivolumabe para o tratamento de segunda linha para pacientes com carcinoma de células renais metastático.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.

6. Informe sobre o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Artrite Psoríaca.

Aprovada a alteração do nome do Protocolo para Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Artrite Psoríaca, sem alteração de conteúdo do documento.

7. Apreciação inicial da suplementação nutricional oral para pacientes clínicos ou cirúrgicos desnutridos ou em risco de desnutrição.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.

8. Apresentação da contribuição da consulta pública do tema:

- a. certolizumabe pegol para o tratamento de artrite psoríaca em primeira linha de tratamento biológico (MMCD-b).

Recomendação final de não incorporação.

- b. certolizumabe pegol para tratamento de pacientes com psoríase em placas moderada a grave;

Recomendação final de não incorporação.



- c. enoxaparina 60 mg/0,6 mL injetável para a prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com trombofilia;

Recomendação final de incorporação.

- d. ampliação de uso da dosagem de sirolimo para pacientes adultos com linfangioleiomiomatose;

Recomendação final de ampliação de uso.

- e. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Linfangioleiomiomatose (LAM);

Recomendação final de aprovação do protocolo.

- f. testes comerciais de sondas em linha para detecção do Complexo *Mycobacterium tuberculosis* (MTB), bem como mutações nas regiões determinantes de resistência à rifampicina e isoniazida (1ª linha) e a fluoroquinolonas e aminoglicosídeos/peptídeos cíclicos (2ª linha);

Recomendação final de incorporação.

- g. citrato de tofacitinibe para o tratamento de retocolite ulcerativa ativa moderada a grave em pacientes adultos com resposta inadequada, perda de resposta ou intolerantes ao tratamento prévio com medicamentos sintéticos convencionais;

Recomendação final de incorporação.

- h. migalastate para o tratamento de pacientes com doença de Fabry com mutações suscetíveis e idade igual ou superior a 16 anos;

Recomendação final de não incorporação.

- i. lanadelumabe para profilaxia de longo prazo em pacientes com angioedema hereditário;

Recomendação final de não incorporação.

- j. givosirana para o tratamento de pacientes adultos com porfirias hepáticas agudas; e

Recomendação final de não incorporação.

- k. secuquinumabe como primeira etapa de terapia biológica para o tratamento de espondiloartrite axial em pacientes adultos.

Recomendação final de não incorporação.



10 de junho

9. Apreciação inicial do rindesivir para tratamento da Covid-19 em adultos e adolescentes (com idade igual ou superior a 12 anos e com peso corporal de, pelo menos, 40kg).

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.

10. Apresentação das contribuições das consultas públicas dos temas:

- a. Vacinas da Fiocruz [ChAdOx-1 (Vacina Covid-19 recombinante)] e da Pfizer/Wyeth [BNT162b2 (Vacina Covid-19)] para prevenção da Covid-19;

Recomendação final de incorporação.

- b. casirivimabe + imdevimabe para pacientes de alto risco infectados por SARS-CoV-2;

Recomendação final de não incorporação.

- c. oxigenação Extracorpórea (ECMO) para Suporte de Pacientes com Insuficiência Respiratória Grave e Refratária;

Recomendação final de não incorporação.

- d. Diretrizes Brasileiras para Tratamento Hospitalar do Paciente com Covid-19 - Capítulo 1: Uso de oxigênio, intubação orotraqueal e ventilação mecânica; e

Recomendação final de aprovação.

- e. Diretrizes Brasileiras para Tratamento Hospitalar do Paciente com Covid-19 - Capítulo 2: Tratamento Medicamentoso.

Recomendação final de aprovação.

11. Apreciação inicial do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.

12. Informe sobre HemoCue WBC DIFF para uso em pacientes que necessitem de dosagem de leucócitos para auxílio diagnóstico, acompanhamento e manejo de infecções.

Recomendado o arquivamento do processo a pedido do demandante.

13. Informe sobre a exclusão do abatacepte 125mg/ml injetável para o tratamento de pacientes com Artrite Idiopática Juvenil (AIJ).

Informada correção no texto do PCDT de AIJ.

14. Apreciação inicial do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Artrite Idiopática Juvenil (AIJ).

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.

15. Apreciação inicial do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Artrite Reumatoide.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.

16. Informe sobre o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Epilepsia.

Informada correção no texto do PCDT de Epilepsia.